

## MEMELIHARA INDUK KERING BUNTING

Oleh : Agus Syaiful Bakhri, S.Pt



Sapi kering bunting

Sapi perah memerlukan masa kering sekitar 8 minggu, sebelum beranak

**Tujuannya adalah :**

- A. Mengembalikan kondisi tubuh sapi agar produksi yang akan datang baik.
- B. Mengisi kembali kebutuhan zat makanan, sehingga sapi tetap sehat
- C. Menjamin pertumbuhan *foetus* dalam kandungan.

Untuk itu perlu dilakukan memberikan pakan yang baik (*steaming up*) untuk mendukung pertumbuhan anakan dan kesehatan indukan., pada 2-4 minggu menjelang kelahiran anaknya.

Untuk mengeringkan sapi perah dapat dilakukan dengan cara penghentian pemerahan secara tiba-tiba.

Pada pemerahan yang terakhir kali dianjurkan puting susu diberi desinfektan untuk mencegah terinfeksi mikroorganismenya

Sebelum melahirkan sapi dipindahkan ke kandang beranak yang diberi alas jerami kering yang bersih dan tebal.

**Tanda - tanda sapi akan melahirkan yaitu :**

- A. Pada 1-2 minggu menjelang kelahiran ambingnya nampak mulai membesar dan mulai berisi susu.
- B. Semakin kendur tegangan dari otot-otot di sebelah kanan dan kiri pangkal ekor.
- C. Bila saat kelahiran makin dekat, sapi menjadi makin gelisah dan merejam secara teratur.