



TEKNOLOGI BUDIDAYA KEDELAI



BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2008

SUMBER DANA:

DIPA BPTP LAMPUNG

SKPA BADAN LITBANG PERTANIAN

KEGIATAN APRESIASI GAPOKTAN PUAP TAHUN 2008

Oplah : 100 eksemplar

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung

Jl. Z.A. Pagar Alam No.1a, Rajabasa, Bandar Lampung

Telp. (0721)781776, Fax.(0721)705273

e-mail: bptp.lampung@telkom.net

Seri buku inovasi: TP/02/2008



Teknologi Budidaya KEDELAI

PENYUSUN

Amrizal Nazar

Dewi Rumbaina Mustikawati

Alvi Yani

PENYUNTING DAN REDAKSI PELAKSANA

Slameto

Kiswanto

Zakiah

Hermanto

DESAIN DAN SETTING

Tri Kusnanto

ISBN: 978-979-1415-23-1



BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, seri buku inovasi teknologi pertanian ini dapat diterbitkan. Buku-buku ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian, khususnya para penyuluh lapangan dalam upaya menumbuhkan kegiatan usahatani yang lebih baik.

Keseluruhan buku yang disusun pada tahun 2008 berjumlah 19 judul yang mencakup teknologi budidaya padi, jagor, kedelai, ketela pohon, cabai merah, pisang, kambing, itik, sapi potong, ayam buras, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, jarak pagar, lada, nilam, jahe, dan panili.

Besar harapan kami, semoga buku-buku tersebut bermanfaat dalam rangka mendorong pengembangan agribisnis komoditas pertanian.

Ucapan terima kasih kepada tim penyusun dari BPTP Lampung yang telah menginisiasi penerbitan buku ini, penyunting dan redaksi pelaksana, serta pihak-pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Kritik dan saran penyempurnaan sangat kami harapkan.

Bogor, Nopember 2008,
Kepala Balai Besar Pengkajian,

Dr. Muhrizal Sarwani

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
SYARAT TUMBUH	1
TEKNOLOGI BUDIDAYA	2
Bahan Tanaman.....	2
Persiapan Lahan.....	4
Penanaman.....	4
Pemupukan.....	4
Penyiangan	5
Pengendalian Hama Kedelai.....	5
Pengendalian Penyakit Kedelai.....	8
PANEN DAN PASCA PANEN.....	9
Panen.....	9
Penyimpanan	11
ANALISIS USAHATANI.....	12
BAHAN BACAAN.....	14

PENDAHULUAN

Komoditas kedelai sudah umum dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan tahu, tempe, kecap dan susu kedelai serta pakan ternak. Namun dewasa ini kedelai tidak hanya digunakan sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai pangan fungsional yang dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, seperti jantung koroner dan hipertensi. Zat isoflavon yang ada pada kedelai ternyata berfungsi sebagai antioksidan. Dengan beragamnya penggunaan kedelai menjadi pemicu peningkatan kebutuhankomoditas ini.

Saat ini harga kedelai di pasar Internasional naik 100%. Kalau di awal 2007 harga kedelai masih 300 dollar AS per ton di akhir tahun 2007 meningkat menjadi 600 dollar per ton. Kenaikan harga kedelai di pasar dunia berdampak langsung terhadap kenaikan harga kedelai di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia kembali menggalakkan menanam kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi kedelai, antara lain melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, penyediaan varietas unggul memegang peranan penting, di samping penerapan teknologi budidaya lain, sarana produksi, penyuluhan, dan jaminan pasar yang baik.

SYARAT TUMBUH

Pengembangan kedelai dapat dilakukan di lahan sawah maupun di lahan kering, bergantung kepada iklim dan kebutuhan petani setempat. Tanaman Kedelai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah asal drainase (tata air) dan aerasi (tata udara) tanah cukup baik, curah hujan 100-400 mm/bulan, suhu udara 23-30°C, kelembaban 60-70%, pH tanah 5,8-7 dan ketinggian kurang dari 600 m dpl.

TEKNOLOGI BUDIDAYA

Bahan tanaman

Berdasarkan warna bijinya dikenal kedelai kuning dan kedelai hitam. Pemeliharaan kedelai hitam umumnya lebih mudah dari pada kedelai kuning. Kedelai kuning membutuhkan tanah yang lebih subur, serta memerlukan pengairan dan pemeliharaan lebih baik dari pada kedelai hitam. Kedelai hitam umumnya hanya digunakan untuk bahan baku kecap, sedangkan kedelai kuning untuk bahan baku tempe dan tahu serta makanan lainnya (tauco dan lain-lain).



Gambar 1. Varietas Tanggamus



Gambar 2. Varietas Wilis



Gambar 3. Varietas Anjasmoro

Tabel 1. Beberapa varietas unggul kedelai rakitan Badan Litbang Pertanian.

Varietas	Umur (hari)	Bobot 100 biji (gr)	Potensi Hasil (ton/ha)	Warna biji	Sifat-sifat penting	Tahun
Wilis	85-90	10,0	3,00	Kuning	Adaptasi luas	1983
Burangrang	80-82	17,0	1,2-2,50	Kuning	Tahan penyakit karat rendemen susu tinggi	1999
Kaba	85	10,4	3,25	Kuning		2001
Anjasmoro	83	14-15,3	2-2,25	Kuning	Tahan karat, tidak mudah pecah	2001
Sinabung	88	11,0	2,16	Kuning	Agak tahan karat, tidak mudah pecah	2001
Ijen	83	11,2	2,15-2,49	Kuning	Tahan ulat grayak	2003
Tanggamus	88	11,5	2,5	Kuning	Agak tahan karat, adaptif lahan masam	2001
Lawit	84	10,5	1,90	Kuning	Adaptif pada lahan rawa tipe B & C	2001
Cikuray	82-85	11,5	1,70	Hitam		1993
Merapi	85-90	8,8	1,50	Hitam		1999
Mallika	90	9,0	2,40	Hitam		

Persiapan lahan

Pada lahan kering, tanah dibajak 2 kali sedalam 30 cm, sedangkan pada lahan sawah dengan tanaman monokultur, tanah dibersihkan dari jerami, kemudian tanah diolah dua kali. Kemudian dibuat saluran drainase setiap 4 m, sedalam 20-25 cm, lebar 20 cm. Pembuatan saluran drainase dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggenangan air, karena tanaman kedelai tidak tahan terhadap genangan.

Jika keadaan lahan masam, perlu diberi kapur bersamaan dengan pengolahan lahan yang kedua atau paling lambat seminggu sebelum tanam. Pengapuran menggunakan dolomit dilakukan dengan cara menyebar rata dengan dosis 1,5 ton/ha. Jika ditambah pupuk kandang 2,5 ton/ha, maka dosis kapur dapat dikurangi menjadi 750 kg/ha.

Penanaman

Pilihlah waktu yang tepat, sehingga tidak mengalami banjir atau sebaliknya kekeringan. Penanaman dilakukan dengan tugal, dengan jarak tanam 40 cm x 15 cm atau 40 cm x 20 cm, dua biji per lubang. Semakin subur lahan, sebaiknya jarak tanam semakin lebar.

Pemupukan

Untuk lahan kering masam, dosis pupuk yang diberikan 75 kg Urea + 100 kg SP36 + 100 kg KCl/ha + 500 kg CaO/ha (setara 1500 kg dolomit). Pupuk urea, SP36 dan KCl diberikan paling lambat saat tanaman berumur 14 hari. Pupuk diberikan dengan cara ditugal atau dilarik 5-7 cm dari tanaman, kemudian ditutup tanah. Sedangkan kapur (dolomit) ditebar sebelum tanam saat pengolahan lahan kedua. Untuk lahan sawah, dosis pupuk 50 kg Urea + 50 kg SP36 + 100 kg KCl/ha.



Gambar 4. Cara pemupukan

Penyiangan

Penyiangan dilakukan pada umur 15 dan 30 hari. Bila rumput masih banyak, maka penyiangan dilakukan lagi pada umur 55 hari.

Pengendalian Hama Kedelai.

Tanaman kedelai pada musim tanam kedua, umumnya banyak diserang hama, apalagi kalau lokasi tersebut sebelumnya juga ditanami kedelai atau kacang-kacangan lain. Hama yang sering menyerang adalah lalat kacang (*Ophiomyia phaseoli*), ulat pemakan daun seperti ulat grayak (*Spodoptera litura*), ulat jengkal (*Chrysodeixis chalcites*), dan ulat *Heliothis*, serta penggulung daun (*Lamprosema indicata*), pengisap polong (*Riptortus linearis*, *Nezara viridula* dan *Piezodorus rubrofasciatus*), penggerek polong (*Etiella zinckenella*), penggerek batang (*Melanagromyza sojae*), kutu kebul (*Bemisia sp*), dan kutu daun (*Aphisglycines*)

Pengendalian hama-hama tersebut dilakukan secara terpadu (PHT) dengan komponen pengendalian sebagai berikut:

- Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan kedelai atau bukan kacang-kacangan. Pergiliran kedelai dengan padi, jagung, atau ubijalar, merupakan salah satu cara dalam pengendalian hama kedelai.
- Tanam seawal mungkin dan serempak dengan beda waktu tanam kurang dari 10 hari dalam satu hamparan/wilayah.
- Penggunaan varietas berumur genjah agar tanaman tidak terlalu lama menjadi sasaran hama.
- Penanaman secara tumpangsari atau strip cropping dengan tanaman bukan kedelai atau bukan kacang-kacangan.
- Menghindari penanaman tanaman inang diluar musim tanam, seperti kacang panjang, kacang guda dan kacang hijau.
- Penanaman varietas tahan hama, seperti varietas Kerinci dan Tidar.
- Penggunaan mulsa jerami untuk mengurangi serangan hama lalat kacang.
- Pengumpulan dan pemusnahan kelompok telur, ulat dan serangga hama dewasa secara mekanis/fisik.

Penggunaan insektisida secara bijaksana, apabila populasi hama telah mencapai ambang kendali. Kalau kemampuan mengamati hama terbatas, aplikasi insektisida dapat berpedoman pada kondisi tanaman dalam periode kritis, yaitu ketika tanaman berumur 5-7 hari untuk lalat kacang, 16-24 hari untuk hama daun, umur 40-50 hari untuk hama daun dan polong, dan umur 60-60 hari untuk hama polong. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan insektisida adalah ketepatan waktu, takaran, dan cara penyemprotannya.

1. Lalat bibit (*Ophiomya phaseoli*)

PHT hama lalat bibit dilakukan dengan cara pengamatan berkala terhadap populasi lalat bibit pada tanaman kedelai bila ditemukan 1 ekor imago/ 5 (lima) baris atau 1 ekor/ 50 rumpun pada umur 6–10 hari. Dilakukan tindakan pengendalian dengan menggunakan insektisida Spontan. Untuk mengurangi serangan hama tersebut, benih diberi perlakuan insektisida Marshal.

2. Hama Grayak (*Spodoptera litura*)

PHT hama Grayak dilakukan dengan cara pengamatan berkala terhadap populasi grayak. Jika ditemukan serangan 12,5% pada umur kurang dari 20 Hari setelah tanam (HST) pada daun dan kerusakan 20% saat umur lebih dari 20 hari, maka dilakukan pengendalian secara kimia dengan menyemprotkan insektisida Marshal atau insektisida lain yang sejenis, sesuai dengan dosis anjuran. Penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari.



Gambar 5. Kel. Larva instar 1 *S.litura*



Gambar 6. Ulat instar 3 atau 4 *S.litura*.

3. **Hama penggerek polong (*Helicoverpa armigera*, *Etiella* sp).**

Pengendalian hama penggerek polong dapat dilakukan dengan cara:

- Tanam serempak dalam kurun 10 hari
- Pergiliran tanaman
- Penyemprotan NPV 180 ulat/500 lt/ha
- Tanaman perangkap jagung umur genjah, sedang dan dalam pada pematang
- Pelepasan parasitoid *Trichogramma*
- Jika sudah mencapai ambang kendali yaitu kerusakan polong 2,5% atau ditemui 2 ekor ulat/rumpun pada umur lebih dari 45 hari, tanaman disemprot insektisida efektif.



Gambar 7. Gejala serangan penggerek polong

Pengendalian Penyakit Kedelai

Ada beberapa penyakit utama yang dominan pada tanaman kedelai, yaitu karat daun (*Phakopsora pachyrhizi*), hawar batang (*Sclerotium rolsii*) dan Virus.

Penyakit karat daun dapat dikendalikan dengan fungisida mancozeb. Untuk penyakit hawar, perawatan benih dengan fungisida mankozeb (Dithane M 45). Untuk penyakit yang disebabkan oleh virus dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dengan rotasi tanaman, pembakaran tanaman inang, pemberantasan serangga vektor, penggunaan benih sehat dan prmbuangan tanaman sakit.



Gambar 8. Gejala penyakit hawar batang

PANEN DAN PASCA PANEN

Panen.

Waktu, cara dan alat panen yang digunakan dalam pemanenan dapat mempengaruhi jumlah dan mutu hasil kedelai. Bila dipanen terlalu awal akan banyak biji muda dan perontokkan biji relatif sulit dilakukan. Sebaliknya, kalau terlambat panen menyebabkan tercecernya (hilangnya) biji di lapang. Untuk itu dianjurkan beberapa hal sebagai berikut :

- Panen dilakukan apabila semua daun tanaman telah rontok, polong berwarna kuning/coklat dan mengering.

- Panen dimulai sekitar pukul 09.00 pagi. Pada saat ini air embun sudah hilang. Pangkal batang tanaman dipotong menggunakan sabit bergerigi atau sabit tajam.
- Hindari pemanenan dengan cara mencabut tanaman, agar tanah/kotoran tidak terbawa.
- Brangkasan tanaman (hasil panen) dikumpulkan ditempat yang kering dan diberi alas terpal/plastik.

Penanganan pasca panen yang terdiri dari penjemuran brangkasan tanaman, pembijian, pengeringan, pembersihan, dan penyimpanan biji perlu mendapat perhatian yang cukup. Sebab, kegiatan ini mempengaruhi kualitas biji atau benih yang dihasilkan. Kedelai sebagai bahan konsumsi dipetik pada umur 75 - 100 hari, sedangkan untuk benih umur 100 - 110 hari, agar kemasakan biji betul-betul sempurna dan merata. Penjemuran yang terbaik adalah penjemuran brangkasan kedelai diberi alas terpal.



Gambar 9. Cara penjemuran brangkasan dan biji kedelai

Penyimpanan

Penyimpanan biji kedelai untuk konsumsi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- biji disimpan dalam kantong plastik berukuran 30-40 kg, ketebalan 0,2 mm dan kedap udara.
- Setelah biji dimasukkan ke dalam kantong plastik, bagian atas kantong diikat kuat dengan tali rafia.
- Kantong-kantong yang telah berisi biji-biji kedelai tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik (seperti karung pupuk), dan bagian atas karung diikat dengan tali rafia. Kemudian disusun rapi ditempat penyimpanan/gudang.

Kalau biji akan digunakan untuk benih, cara penyimpanannya adalah :

- Benih sebaiknya disimpan pada kadar air 8-9% dalam wadah kedap udara, antara lain seperti :
 - kantong plastik dengan ketebalan 0,8 mm, ukuran kantong 10 kg, dan kantong diikat kuat.
 - Kaleng/kotak kayu kedap udara.
 - Kantong kertas semen, dan
 - Kantong aluminium foil.
- Selanjutnya benih dalam wadah kedap udara tersebut disimpan di tempat/ruangan kering atau berpendingin.

ANALISIS USAHATANI**Tabel 2. Analisis usahatani kedelai Varietas Anjasmoro di lahan sawah, tahun 2006.**

Uraian	Unit/ha	Nilai Rp/ha
1. Penerimaan		
• Rataan hasil (ton/ha)	2,4	
• Harga kedelai (Rp/kg)	4.000	
• Nilai produksi (Rp/ha)	-	9.600.000
2. Biaya Tenaga Kerja/ha		
• Pengolahan tanah	Borong	400.000
• Meratakan lahan	4 HOK	60.000
• Tanam dan memupuk	18 HOK	270.000
• Penyiangan-pembumbunan	20 HOK	300.000
• Penyemprotan	8 HOK	120.000
• Pengairan	6 HOK	90.000
• Panen dan prosesing	30 HOK	450.000
3. Biaya Sarana Produksi/ha		
• Benih kedelai	40 kg	200.000
• Pupuk Urea	50 kg	105.000
• Pupuk SP36	50 kg	125.000
• Pupuk KCl	100 kg	250.000
• Pestisida Decis	0.8 lt	184.000
• Curacron	0.4 lt	98.800
• Antracol	0.2 lt	15.600
• Dithane M-45	0.8 lt	97.600
• Furadan	0.8 lt	11.000
• Matador	0.8 lt	197.600
5. Total Biaya (2+3)		2.974.600
6. pendapatan (Gross Margin)		6.625.400
7. BEP yield (kg/ha)		743.600
8. BEP price (Biaya/kg delai		1.239.400
9. Margin/kg		2.760.600
10. R/C ratio		3.23

Keterangan :

1. Gross margin = Penerimaan – total biaya
2. BEP yield = total biaya/harga kedelai
3. BEP price = total biaya/rataan hasil
4. margin/kg = gross margin/rataan hasil
5. R/C Ratio = penerimaan/total biaya.

6. Harga : benih kedelai Rp. 4.000/kg; Urea Rp.1.500/kg; SP-36 Rp. 2.500/kg; KCl Rp. 2.500/kg; Insektisida cair : Decis Rp. 231.000/lit Dithane-M45 Rp.122.000/lit; Curacron Rp. 247.000/lit; Antracol Rp. 78.000/kg ; upah tenaga kerja Rp. 15.000/HOK (5 jam).

Tabel 3. Analisis usahatani kedelai di lahan kering masam tahun 2006.

Uraian	Var. Anjasmoro		Var. Sinabung	
	Unit	Rp/ha	Unit	Rp/ha
Biaya tenaga kerja :				
Pengolahan tanah		150.000		150.000
Perataan tanah	6 HOK	90.000	6 HOK	90.000
Pemberian kapur	4 HOK	60.000	4 HOK	60.000
Pemberian pukan	-	-	-	-
Tanam	20 HOK	300.000	20 HOK	300.000
Menyulam	1 HOK	15.000	1 HOK	15.000
Memupuk	8 HOK	120.000	8 HOK	120.000
Menyiang	20 HOK	300.000	20HOK	300.000
Panen dan prosesing	24HOK	360.000	24HOK	360.000
Sub-total		1.395.000		1.395.000
Biaya Saprodi :				
Benih	40 kg	200.000	40 kg	200.000
Pupuk Urea	75 kg	97.500	75 kg	97.500
Pupuk SP-36	100 kg	180.000	100 kg	180.000
Pupuk KCl	100 kg	280.000	100 kg	280.000
Dolomit (kg/ha)	1500 kg	495.000	1500 kg	495.000
Marshal	400 g	60.000	400 g	60.000
Pestisida		590.000		590.000
Pupuk kandang	-	-	-	-
Sub-total		1.902.500		1.902.500
Total biaya		3.297.000		3.297.000
Penerimaan :				
Rataan hasil	1.470 kg	-	1.540 kg	
Harga kedelai	4.000/kg	-	4.000/kg	
Nilai produksi	-	5.880.000		6.160.000
Pendapatan		2.583.000		2.863.000
R/C		1,78		1,87

BAHAN BACAAN

- Anonimous. 1991. Budidaya dan pengolahan hasil kedelai. Departemen Pertanian.
- Anonimous. 2007. Pedoman umum produksi benih sumber kedelai. Badan Litbang Pertanian. 29 hal.
- Anonimous. 2008. Ketersediaan teknologi dalam mendukung peningkatan produksi kedelai menuju swasembada. Siaran Pers. Badan Litbang Pertanian. Jakarta 12 Februari 2008.
- Amrizal Nazar, Kiswanto, Arfi Irawati, Endriyani, Walyono. 2006. Pengkajian sistem usahatani kedelai di lahan sawah. Laporan Akhir Tahun. BPTP Lampung.
- Arief, R. Wylis dan D. R. Mustikawati. 2007. Kajian cara penjemuran brangkasan terhadap mutu biji kedelai untuk pangan. Makalah Seminar “Ketahanan Pangan” Peranan P2BN dan Prima Tani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Jawa Barat. Bandung, 27 November 2007.
- Erythrina, Minimes Sabki, Dewi Rumbaina, Zulkifli Zaini, Elma Basri, Endriani, Walyono, Tri Kusnanto. 2006. Kajian sistem usahatani kedelai di lahan kering Propinsi Lampung. Laporan Akhir Tahun. BPTP Lampung.
- Kalshoven, L.G.E. 1981. The pests of crops in Indonesia. Rev. by Dr. P.A. Van der Laan. PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. p. 336-339.
- Kurniawan B. 2007. Mallika, Si raja kedelai hitam. Detik Finance. Senin 10/09/2007.
- Marwoto, E. Wahyuni, K.E. Neering. 1991. Pengelolaan pestisida dalam pengendalian hama kedelai secara terpadu. Monograf Balittan Malang No.7.

- Marwoto, Suharsono dan Supriyatin. 1999. Hama kedelai dan komponen pengendalian hama terpadu. Monograf Balitkabi No.4.
- Marwoto dan Suharsono. 2002. Pengendalian hama kedelai berdasarkan pada sistem pengelolaan agroekosistem. Prosiding Seminar Nasional. Inovasi Teknologi Palawija. Badan Litbang Pertanian. hal. 429-440.
- Mustikawati, D.R. Y. Pujiharti, Agusni dan M. Sabki. 2002. Serangan beberapa hama pada tumpangsari kedelai dengan jagung. Prosiding Seminar Nasional. Inovasi Teknologi Palawija. Badan Litbang Pertanian. hal. 647-653.
- Mustikawati, D.R. 2004. Serangan ulat *Spodoptera sp.* dan *Heliothis sp.* pada tanaman jagung manis yang diberi berbagai dosis pupuk anorganik. BPTP Lampung. Tidak diterbitkan. 7 hal.
- Rumbaina, D., Amrizal N., Widiyantoro, Marwoto, A. Taufiq, H. Kuntastyuti, D.M.A. Arsyad dan Heryanto. 2004. Pengembangan kedelai melalui PTT di lahan masam. Lokakarya. BPTP Lampung. 30 September 2004. hal 61-72.
- Supriyatin. 2002. Pemanfaatan jamur entomopatogen untuk mengendalikan hama ulat grayak dan pengisap polong pada kedelai. Prosiding Seminar Nasional. Inovasi Teknologi Palawija. Badan Litbang Pertanian. hal. 168-175.
- Tengkanan, W. dan J. Soejitno. 1993. Hasil-hasil utama penelitian hama tanaman pangan. Pemantapan Penelitian Hama Tanaman Pangan. Risalah Lokakarya. Sukarami, 4-7 Maret. hal. 8-39