




IOHI

Indeks Obat Hewan Indonesia

EDISI IX 2014




DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI
2014

INDEKS OBAT HEWAN INDONESIA

IOHI

EDISI IX 2014



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI)

Edisi IX,--- Jakarta: Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)

844 Hal ukuran: 14,5 x 20,5 cm

ISBN 978-979-628-028-5

Judul:

Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI)

Edisi ke Sebilan : Pebruari 2014

Disain Sampul : rsa.azizi@yahoo.com

Tata letak : Nunk

Alamat Penerbit:

Subdit POH, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Kementerian Pertanian RI. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan - Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Data dan informasi yang cukup lengkap di bidang obat hewan akan sangat berguna dalam upaya perkembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan secara luas.

Untuk itu maka disusunlah buku Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI) yang dapat dipergunakan sebagai jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di bidang produsen, importer, eksportir, distributor, depo obat hewan dan toko obat hewan.

Buku ini merupakan Edisi SEMBILAN sebagai penyempurnaan dari buku edisi ke delapan yang diterbitkan pada tahun 2012, dengan tambahan data informasi baru tentang obat hewan.

Kami menyadari informasi yang disajikan dalam Buku Indeks Obat Hewan Indonesia belum sepenuhnya lengkap, oleh karena itu masih tetap akan disempurnakan lebih lanjut dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pelaku Agribisnis bidang peternakan dan bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam upaya mengembangkan bidang usaha obath hewan.

Sekian dan terima kasih

Jakarta Pebruari 2014

Tim Penyusun

INDEKS OBAT HEWAN INDONESIA

IOHI-IX 2014

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Drh. Pudjiatmoho, PhD

1. Drh. Bahruddin Syahroni, M.Si
2. Drh. Caravonica Salam
3. Drh. Dadang Polrianto
4. Drh. Dewi Sholihah
5. Drh. Erna Rahmawati Fitriastuti
6. Drh. Irlia Nur Agustin
7. Drh. Liys Desmayanti
8. Drh. Mhd. Fauzi
9. Drh. Margaretha
10. Drh. Helmi Erika R

SAMBUTAN

DIREKTUR KESEHATAN HEWAN

Buku Indeks Obat Hewan (IOHI) Edisi IX tahun 2014 yang merupakan kelanjutan dari buku IOHI Edisi VIII tahun 2012 yang disusun Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan c.q. Direktorat Kesehatan Hewan bersama dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dalam rangka pembinaan bidang obat hewan di Indonesia. Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada ASOHI yang telah berperan secara maksimal dalam penyusunan serta penerbitan buku IOHI edisi terbaru.

Dengan diterbitkannya buku Indeks Obat Hewan Indonesia Edisi IX yang berisikan daftar obat hewan yang telah mempunyai nomor registrasi, akan memberikan kemudahan dan sebagai bahan informasi perusahaan obat hewan, seperti distributor, depo, poultry shop, toko obat hewan, lembaga Pemerintah dan para peternak serta masyarakat pengguna obat hewan dalam memilih obat hewan yang akan digunakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya peredaran dan penggunaan obat hewan ilegal.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pelaku agribisnis bidang peternakan dan bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi obat hewan dalam upaya pengembangan bidang kesehatan hewan.

Jakarta, Februari 2014

Direktur Kesehatan Hewan



Drh. Pudjiatmoko, PhD

NIP : 19590417.198603.1001

PETUNJUK PENGGUNAAN INDEKS OBAT HEWAN

JIKA ANDA INGIN MENGETAHUI	PADAHAL ANDA SUDAH MENGETAHUI	DAPAT ANDA CARI	
		PADA	HAL
Nama Dagang Obat Hewan Berdasarkan Farmakologi	Golongan Obat Hewan Berdasarkan farmakologi, lalu	- Daftar Golongan Obat - Paparan Pemeriaan Sediaan Obat Hewan: - Farmasetik - Biologik - Premiks - Alami - Lain-lain	6 11 349 481 597 603
Bentuk Sediaan, Komposisi, Indikasi/ Kontra Indikasi, Efek Samping, Peringatan, Dosis dan Cara Pemakaian, Kemasan, Nama/Produsen/ Importir	Nama Dagang	- Indeks Umum. - Paparan Pemeriaan Sediaan Obat Hewan : - Farmasetik - Biologik - Premiks - Alami - Lain-lain	811 11 349 481 597 603
Nama Dagang	Jenis Hewan	Indeks Obat Hewan Berdasarkan Kelompok Hewan	681
Nama Dagang	Nama Produsen/ Importir/Distributor	Daftar Alamat Produsen/ Importir/Distributor dan Nama Obat Hewan	625
Nomor Pendaftaran (Registrasi)	Nama Dagang	- Indeks Umum, Lalu - Paparan Pemeriaan Sediaan Obat Hewan: - Farmasetik - Biologik - Premiks - Alami - Lain-lain	11 349 481 597 603
<i>Withdrawal Time</i>	Nama Generik	<i>Withdrawal Time</i> Obat Hewan	669
Alamat dan No Telpon Produsen/Importir/ Distributor	Nama Produsen/ Importir/Distributor	Daftar Nama dan AlamatProdusen/ Importir/Distributor Obat Hewan	625

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	3
Tim Penyusun IOHI edisi IX	4
Sambutan Direktur Kesehatan Hewan	5
Petunjuk Penggunaan IOHI (Indeks Obat Hewan Indonesia)	6
Daftar Isi	7
Daftar Golongan Obat Hewan Berdasarkan Farmakologi	8
Daftar Singkatan	9
Bab I. Paparan Pemerian Sediaan Farmasetik	11
Bab II. Paparan Pemerian Sediaan Biologik	349
Bab III. Paparan Pemerian Sediaan Premiks	481
Bab IV. Paparan Pemerian Sediaan Alami	597
Bab V. Paparan Pemerian Sediaan Lain-lain	603
Daftar Alamat Produsen / Importir / Distributor dan Nama Obat Hewan	625
Daftar <i>Withdrawal time</i> (Waktu Henti) Obat Hewan	669
Daftar Instansi Pemerintah Lingkup Departemen Pertanian yang Berkaitan dengan Obat Hewan	673
Daftar Fakultas Kedokteran Hewan	675
Daftar Dinas Peternakan di Indonesia	676
Indeks	679
Indeks Obat Hewan Berdasarkan Kelompok Hewan	681
Indeks Produk Biologik	783
Indeks Obat Hewan Berdasarkan Nama Generik	797
Indeks Umum	811

DAFTAR GOLONGAN OBAT HEWAN BERDASARKAN FARMAKOLOGI

		Hal
01.	SEDIAAN FARMASETIK.....	11
01-01	Depresansia Susunan Syaraf Pusat.....	13
01-02	Anestetika.....	15
01-03	Antiseptika dan Desinfektansia.....	17
01-04	Anti Bakteria.....	55
01-05	Anti Mikotik.....	173
01-06	Anti Protozoa.....	177
01-07	Anthelmintika.....	199
01-08	Anti Ektoparasit.....	237
01-09	Antihistaminika.....	251
01-10	Diuretika.....	253
01-11	Obat Pencernaan Lain.....	255
01-12	Hematinik, Ruboransia dan Tonika.....	259
01-13	Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino.....	265
01-14	Analgesika, Antipiretika dan Anti Inflamasi.....	333
01-15	Hormon Reproduksi.....	337
01-16	Obat yang bekerja secara lokal (Mata, telinga, mulut, kuku, kambing, kulit dan mukosa).....	345
02.	SEDIAAN BIOLOGIK.....	349
02-01	Vaksin Unggas.....	351
02-02	Vaksin Ternak.....	357
02-03	Vaksin Hewan Kesayangan.....	465
02-04	Vaksin Hewan Air.....	477
02-05	Bahan Diagnostika.....	479

DAFTAR GOLONGAN OBAT HEWAN BERDASARKAN FARMAKOLOGI

		Hal
03.	SEDIAAN PREMIKS	481
03-01	Imbuhan Pakan (<i>Feed Additive</i>)	483
03-02	Pelengkap Pakan (<i>Feed Suplement</i>)	557
04.	SEDIAAN ALAMI	597
05.	LAIN-LAIN.....	603
05-01	Kosmetika (Shampo, Deodoransia, Parfum).....	605
05-02	Pelarut Vaksin, Aquadest.....	607
05-03	Obat Infus (Glukosa, NaCl Fisiologis, larutan Ringer dan lain-lain)...	
05-04	BOH (Bahan baku obat hewan)	613

DAFTAR SINGKATAN

AE	: <i>Avian Encephalomyelitis</i>	IBR	: <i>Infectious Bovine Rhinotracheitis</i>
AI	: <i>Avian Influenza</i>	ILT	: <i>Infectious Laryngotracheitis</i>
b/v %	: Bobot/volume %	IM	: Intramuskular
BB	: Berat badan	IP	: Intraperitoneal
Ca	: Kalsium	IU	: <i>International Unit</i>
CAV	: <i>Canine Adenovirus</i>	IV	: Intravena
CCID50	: <i>Cell Culture Infectious Dose</i>	Kg	: Kilogram
CDV	: <i>Canine Distemper Virus</i>	L	: Liter
CFU	: <i>Colony-Forming Unit</i>	lb	: <i>Pound (s)</i>
CPI	: <i>Canine Parainfluenza Virus</i>	mcg	: Mikrogram
CPV	: <i>Canine Parvovirus</i>	Mg	: Magnesium
CRD	: <i>Chronic Respiratory Disease</i>	mg	: Miligram
Cu	: <i>Cuprum</i>	Mgrek	: Miligrek
EDS	: <i>Egg Drops Syndrome</i>	ml	: Mililiter
EID50	: <i>Embryo Infectious Dose</i>	Mn	: Mangan
ELD50	: <i>Embryo Letal Dose</i>	Na	: Natrium
Fe	: <i>Ferum</i>	Oz	: <i>Ounce (s)</i>
FPV	: <i>Feline Parvo Virus</i>	PFU	: <i>Plaque Forming Unit</i>
FVR	: <i>Feline Viral Rhinotracheitis</i>	PMK	: Penyakit Mulut dan Kuku
g	: Gram	ppm	: Part per million
Gal	: Galon	SHS	: <i>Swollen Head Syndrome</i>
Grek	: Gram Ekuivalen	SC	: Sub cutan
HAU	: <i>Hemagglutination Unit</i>	SPF	: <i>Spesific Pathogen Free</i>
IB	: <i>Infectious Bronchitis</i>	TCID₅₀	: <i>Tissue Culture Infectious Dose 50</i>
		v/v %	: Volume/volume %
		Zn	: Zinkum

Bab I.

Paparan Pemerian Sediaan **Farmasetik**

Paparan pemerian (*Description*) obat hewan disusun sesuai dengan golongan obat hewan berdasarkan farmakologi. Dalam setiap kelompok, sediaan obat hewan disusun menurut alfabetis nama dagangnya. Secara umum penyusunan materi ini dimulai dari nama obat hewan, nama produsen, nama importir (bila ada), nama distributor, bentuk sediaan, komposisi, indikasi, kontra indikasi (bila ada), peringatan (bila ada), dosis, cara pemakaian, kemasan, nomor pendaftaran dan klasifikasi obat hewan. Paparan sediaan ini disusun sejauh mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

BAB I. SEDIAAN FARMASETIK

01

DEPRESANSIA SUSUNAN SYARAF PUSAT

01.01

1. **CASTRAN**

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung acepromazine maleat 15 mg **Indikasi** Segala situasi dimana sedasi diperlukan seperti dalam transportasi, mengatasi berbagai macam stress, hiperaktif, operasi ringan dan preanastesi pada operasi besar/anastesi umum **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IV atau IM pada sapi, kambing, domba, kuda dan babi. Untuk sedasi ringan dan premedikasi pada anastesi umum secara IV dengan dosis 0,5 ml/100 kg BB, secara IM dengan dosis 1 ml/100 kg BB. Untuk sedasi kuat secara IV dengan dosis 1 ml/100 kg BB, secara IM dengan dosis 2 ml/100 kg BB. Pada anjing dan kucing untuk sedasi ringan dan premedikasi anastesi umum: 0,25 ml/10 kg BB dan untuk sedasi kuat: 0,5 ml/10 kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 07013162 PKC. Obat keras.

2. **DUPHASPASMIN**

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/PT. Pfizer Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** mengandung Isoxsuprin Lactate **Indikasi** relaksasi otot uterus untuk kuda, sapi, babi, domba, kambing, anjing dan kucing. **Dosis dan cara pemakaian** Kuda dan sapi 20 ml, Babi 4-8 ml, Kambing dan domba 4 ml, Anjing 0,4-2 ml, Kucing 0,2ml. Injeksi intramuskular atau intravena **Kemasan** Botol 20ml dan 100ml **Deptan RI** No. I. 02042011 PKC.1. Obat keras.

3. **PARAMOL – 50**

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Paracetamol 500 g/kg **Indikasi** Untuk mengurangi stres pada ayam post vaksinasi **Kontra Indikasi** Tidak ada **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g/kg makanan atau 2 g/L air minum **Kemasan** 1 kg, 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 09023550 PTS. Obat bebas terbatas.

4. **XYLA**

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung Xylazine 20 mg **Indikasi** Premedikasi anastesi umum dan penenang untuk segala situasi dimana sedasi diperlukan seperti dalam transportasi, partus, hiperaktif, pengobatan kuku/teracak, operasi ringan pada sapi, kuda, babi, kambing, domba, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada sapi secara injeksi IM, untuk sedasi dan operasi kecil: 0,25 ml/100 kg BB. Untuk operasi kecil (hewan tetap berdiri): 0,5 ml/100 kg BB. Operasi besar (hewan rebah): 1 ml/100 kg BB. Operasi yang sangat ekstensif: 1,5 ml/kg BB. Kuda: 4 ml/100 kg BB secara IV atau 10 ml/100 kg BB secara IM. Operasi besar dikombinasikan dengan obat lain: 4 ml/100 kg BB dengan halotan atau fluotan sebagai intubasi narcosis. Domba: 0,15 ml/10 kg BB secara IM. Anjing: 0,15 ml/kg BB secara IM/IV, bila dikombinasikan dengan ketamin: 0,1 ml/kg BB dan 6-10 mg ketamin/kg BB. Kucing: 0,15 ml/kg BB secara IM/SC, bila dikombinasikan dengan ketamin: 0,1 ml/kg BB dan 6-10 mg ketamin/kg BB **Kemasan** Vial 50 ml **Deptan RI** No. I. 07063241 PKC. Obat keras

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

ANESTETIKA

01.02

1. **KETAMIL** **Troy Laboratories Pty, Ltd, Australia/Harapan Maju Indah**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung ketamin Hydrochloride, Cetrimide, Sodium citrate dan Acid citrate **Indikasi** Anaestesi umum pada kuda, ternak, domba, babi, anjing, kucing, kambing, reptil, wombat dan koala **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada brosur Kemasan Botol 50 ml **Deptan RI** No. I. 09063630 PKC. Obat keras
2. **KETAMINE 10 % INJ.** **Kepro B.V., Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap ml mengandung ketamine (sebagai HCl) 100 mg **Indikasi** Pengobatan tunggal: sebagai zat pengendali untuk diagnostik, prosedur pembedahan singkat atau minor yang tidak memerlukan relaksasi otot-otot skeletal. Pengobatan gabungan: (kombinasi dengan atropine dan Xylazine) prosedur pembedahan seperti ovariectomy, kastrasi, seksio sesaria, dan ekstarksi gigi **Dosis dan Cara Pemakaian** Terapi tunggal. Pada anjing: 0,01-0,1 mg/kg BB secara IV atau 0,05-0,15 ml/kg BB. Kucing: 0,1- 0,2 ml/kg BB Kemasan Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 04032739 PKC. Obat bebas terbatas
3. **LIDOCAIN** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung lidocain hydrochloride **Indikasi** Anestesi local **Dosis dan Cara Pemakaian** Operasi minor: 0,5-10 ml melalui infiltrasi. Operasi mayor: 10-20 ml melalui epidural/IM **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Kementan RI** No. D. 11124198 PKC. Obat keras
4. **SETON 2%** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Tiap 1 ml mengandung Xylazine 20 mg **Indikasi** Sebagai sedatif dengan aktivitas analgesik dan relaksasi muscular. Pada semua spesies hewan, indikasi obat ini memiliki efek sedasi dengan waktu analgesik singkat **Kontra Indikasi** Tidak dianjurkan digunakan pada pasien penderita gangguan gastrointestinal, seperti obstruksi esophagus, torsio lambung atau hernia, karena Xylazin memiliki efek emetik **Perhatian** Stimulasi sensorial sebaiknya dihindari ketika hewan masih terpengaruh efek dari Xylazine, karena dapat mengakibatkan hilangnya efek sedatif. Jangan diberikan pada kuda yang dagingnya akan dikonsumsi oleh manusia **Waktu Henti Obat** Susu dan daging 3 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM kucing: 3 mg Xylazine/kg BB (ekuivalen dengan 0,15 ml SETON 2%/kg BB). Anjing: 1-3 mg Xylazine/kg BB (ekuivalen dengan 0,05-0,15 ml SETON 2%/kg BB) **Kemasan** 25 ml **Deptan RI** No. I 04012714 PKC. Obat keras
5. **ZOLETIL – 50** **Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk injeksi **Komposisi** Mengandung zolazepam dan titelamin **Indikasi** Sebagai anestetikum umum **Dosis dan Cara Pemakaian** Anjing dan kucing: 7-15 mg/kg BB. Karnivora liar: 8-10 mg/kg BB. Kucing besar: 4-6 mg/kg BB. Primata: 4 mg/kg BB **Kemasan** Kotak isi 1 vial aktif dan 1 vial pelarut **Kementan RI** No. I. 12021542 PKS. 2. Obat keras****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

ANTISEPTIKA DAN DESINFEKTANSIA

01.03

- 1. ABREUVAL TABLET** **Ceetal Laboratories – Perancis/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Mengandung asam sitrat, hidrogen peroksida dan poliheksametilen biguanida hidroklorida (PHBM) **Indikasi** Pembersih saluran air dan sanitasi air minum pada unggas, babi, sapi dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** Masukkan 1 tablet untuk 1.000 L air. Berdasarkan level kontaminasi air, dosis dapat ditingkatkan hingga maksimum 3 tablet untuk 1.000 L air. Tablet dapat dibagi untuk jumlah air yang tidak seragam dan hentikan pemakaian 24 jam sebelum dan 24 jam setelah hewan di vaksinasi dengan sistem pipa air **Kemasan** Ember @ 200 tablet, 500 tablet, 1.000 tablet, 1.500 tablet dan 2.000 tablet **Kementan RI** No. I. 11024012 PTM. Obat bebas terbatas.
- 2. ADVANTAGE 256** **Preserve International, Amerika Serikat/Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung Ortho-Phenylphenol 11%, Ortho-Benzyl-para-Chlorophenol 6% dan para-tertiary-amyphenol 4% **Indikasi** Disinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk disinfeksi dan deodorizing dinding, lantai, meja, tempat minum, kandang, peralatan kandang dan fasilitas produksi dengan pengenceran 1:256. Untuk sanitasi telur tetas menggunakan air bersuhu 25-40 °C dengan pengenceran 1:256. Untuk pengasapan campur 1 bagian dalam 5 bagian air **Kemasan** 1 gallon dan 1 drum (55 gallon) **Deptan RI** No. I. 02081335 PTC. Obat bebas terbatas
- 3. AGRICID** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung povidon iodida 30 g **Indikasi** Desinfektan yang berspektrum luas **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi tangan, ambing sebelum diperah, luka terbuka dan bagian yang akan dioperasi 1:300. Desinfeksi bangunan, kendaraan, peralatan kandang, tempat susu, tempat cuci kaki di peternakan dan penetasan 1:400. Desinfeksi peralatan mesin tetas, tempat makan/minum, peralatan rumah potong 1:600. Desinfeksi hijauan makanan ternak 1:1.500. Sterilisasi air minum ternak 1:2.500 **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No D 0207081 PTC. Obat bebas terbatas
- 4. AGRIGERM 1510** **Ceetal Laboratoires – Perancis/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaraldehyde dan Dimethyl didecyl ammonium Chloride **Indikasi** Desinfektan yang sangat ampuh untuk semua jenis permukaan dan untuk industri peternakan-bebas dari formaldehida **Dosis dan Cara Pemakaian** Periode sanitasi untuk pembersihan pendahuluan dan pembersihan dari serangga: Encerkan dengan konsentrasi 0,25%-1,25%. Gunakan dengan cara disemprot, diredam, disikat dan kemudian diamkan selama 20 menit. Bilas dengan air dan periksa residu AGRIGERM 1510 pada permukaan yang akan dipakai untuk menyimpan makanan serta jangan dibilas pada dinding, lantai dan sekitarnya. Desinfektan dalam kondisi terdapat hewan ternak: encerkan dengan konsentrasi 1,25%. Gunakan dengan cara disemprot 2-7 kali

dalam seminggu. Jangan disemprotkan secara langsung pada hewan. Untuk kaki dan roda: selalu lakukan penyemprotan dengan larutan yang baru, yang diencerkan dengan konsentrasi 1,25% **Kemasan** Botol 1 kg, 5 kg, 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I. 12124416 PTC. Obat bebas terbatas

5. AGRIGERM 2000 **Ceetal Laboratoires – Perancis/Tri Dinamika Nusantara**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung Glyoxal, Formaldehyde, Glutaraldehyde dan Dimethyl dicetyl amonium chloride **Indikasi** Sebagai desinfektan pada kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Periode sanitasi: dinding, langit-langit, lantai, tempat makanan dan minuman, pipet, sistem sirkulasi air, kandang, silo, pembersihan awal dan pembasmian serangga: Encerkan AGRIGERM 2000 dari konsentrasi 0,5% (desinfeksi rutin) (200 ppm glutaraldehyde) hingga 3% (desinfeksi kuat) (1200 ppm Glutaraldehyde). Gunakan dengan cara disemprot, direndam, digosok dan biarkan selama 20 menit, kemudian bilas dengan air agar tidak ada sisa AGRIGERM 2000 pada permukaan yang mengalami kontak dengan bahan makanan. Jangan bilas sisa pada dinding, lantai dan lingkungan. Desinfeksi dengan cara *thermo-fogging* (dengan udara) selama periode sanitasi: Untuk AGRIGERM 2000 konsentrat atau di encerkan dengan konsentrasi 50% pada mesin. *Fogging* sebanyak 2,3 g (91 ppm glutaraldehyde) AGRIGERM 2000 konsentrat/m³ lingkungan, kemudian biarkan selama 3 jam serta biarkan jendela dan pintu tertutup. Desinfeksi dengan keberadaan hewan, untuk dinding, lantai, dsb: Encerkan AGRIGERM 2000 dengan konsentrasi 1% (400 ppm glutaraldehyde). Gunakan dengan disemprotkan 2 hingga 7 kali seminggu dengan penyemprot. *Foot-wheelbaths*: Secara teratur perbaharui larutan AGRIGERM 2000 pada konsentrasi 3% (1.200 ppm glutaraldehyde). Efisien termasuk pada virus avian influenza H7N1 dan H5N1 pada konsentrasi 0,5% selama 60 menit, persetujuan dari *French Veterinary Direction* No. 7282 untuk desinfektan pada kasus penyakit *contagious*, termasuk penyakit kaki dan mulut **Kemasan** Botol 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 220 kg **Kementan RI** No. I. 11064094 PTC. Obat bebas terbatas.

6. AGRI-QUAT **Agro Makmur Sentosa**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 100 ml mengandung benzalkonium chloride 20% **Indikasi** Bersifat bakterisidal, virusidal dan fungisidal. Efektif untuk sanitasi dan disinfeksi bangunan, kandang dan peralatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis umum: 2 ml/L air. Untuk disinfeksi klinik, kandang dan peralatan kandang: 2 ml/L air. Sanitasi telur tetas: 1 ml/L air **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. D. 05103001 PTC. Obat bebas terbatas

7. ALDEKOL DES FF **EWABO CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG, Germany/ Sehat Cerah Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap kg mengandung glutaraldehyde 110 g, quaternary ammonium compound (QAC): benzalkonium chloride 72,5 g dan didecyl-dimethyl-ammonium chloride (dalam 2-propanol sebagai solven) 45,0 g **Indikasi** Desinfektan pada kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi umum: 300 ml larutan (0,5%)/1 m². Pengasapan untuk disinfeksi pencegahan: 0,75 L/1.000 m³. Pengasapan untuk

desinfeksi khusus: 1,5 L/1.000 m³. Desinfeksi aerial: 1 larutan (0,25%)/volume ruang 100 m³ **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 5 L dan 25 L, drum 200 L **Kementan RI** No. I. 11074114 PKC. Obat keras.

8. ALLCIDE

SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehid dan dimetilcoco benzyl ammonium klorid **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L dan 5 L **Kementan RI** No. D. 12082064 PTC. 2. Obat bebas terbatas.

9. ANTIGERMEN FORTE

IQF SA, Argentina/Biotek Sarana Industri

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Didecyl dimethyl ammonium chloride, Glutaraldehyde dan Formaldehyde **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang, dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2-4 ml/L air **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. I. 08053436 PTC. Obat bebas terbatas.

10. ANTISEP

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung iodium 5%, kalium iodide 10% dan dapar B secukupnya **Indikasi** Unggas: cacar, luka dan infeksi kulit dan membasmi kuman penyakit yang mudah menyebar di kandang. Sapi: membilas ambing sebelum diperah dan pencelupan ambing sesudah diperah **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 sendok teh (3 ml) tiap 2 L air minum untuk mencegah korisa pada peralihan musim. Penularan penyakit ke ayam yang sehat dalam satu kandang, dan membunuh kuman-kuman yang dapat menyebabkan ND (tetelo), korisa, kolera, typhoid, pullorum dan koksidirosis. Untuk membunuh kuman dan menghilangkan bau di kandang: 1 sendok teh (3 ml) tiap L air. Sapi: 10 ml tiap 100 ml air untuk membilas ambing sebelum diperah. 25 ml tiap 100 ml air: untuk pencelupan puting ambing selama 1 menit setelah pemerahan **Kemasan** Botol isi 60 ml, 120 ml dan 1 L. Jerigen isi 5 L, 20 L dan 60 L **Deptan RI** No. D. 0206153 PTC. 1. Obat bebas terbatas

11. ASABEN

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Benzalkonium chloride 10% **Indikasi** Desinfektan dan antiseptika untuk sanitasi rutin. Mampu membasmi virus, bakteri, jamur dan kuman-kuman penyebab penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang, peralatan, sepatu, mesin tetas, alat-alat bebas vaksinasi: 60 ml/10 L air. Desinfeksi kandang dan bekas wabah: 150 ml/10 L air. Cuci tangan sebelum masuk kandang: 20 ml/10 L air. Sanitasi air minum: 5 ml/10 L air **Kemasan** Jerigen 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 10023796 PTC. Obat bebas terbatas

12. ASADINE

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung povidone iodine 2% **Indikasi** Desinfektan berspektrum luas. Untuk membasmi virus, bakteri, jamur dan kuman-kuman penyebab penyakit

Dosis dan Cara Pemakaian Desinfeksi bangunan, kendaraan, mesin tetas, peralatan dan tempat cuci kaki: 17 ml/10 L air. Desinfeksi tangan, ambing sebelum diperah, daerah operasi dan luka terbuka: 33 ml/10 L air. Sanitasi air minum: 5 ml/10 L air **Kemasan** Jerigen 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 10023797 PTC. Obat bebas terbatas

13. ASEPTIC SOLUTION LIQUID

**Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/
Yung Shin Pharmaceutical Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung Povidone iodine **Indikasi** Desinfeksi kulit pada *pre-* dan *post-*operasi. Juga digunakan pada luka bakar, trauma, frigorisim, vaginitis, uteritis dan infeksi kulit. Untuk desinfeksi ambing (pencegahan terhadap mastitis). Untuk desinfeksi kandang dan peralatan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Infeksi kulit: encerkan larutan obat dengan air hingga 300 kali. Desinfeksi ambing: encerkan larutan obat dengan air hingga 750 kali. Peralatan kandang: Encerkan larutan obat dengan air hingga 400-1.000 kali. Desinfeksi uterus dan vagina: Encerkan larutan obat dengan air hingga 400 kali. Air minum: encerkan larutan obat dengan air minum hingga 2.500 kali **Kemasan** Botol 60 ml, 100 ml, 1 L, 3,8 L, dan 25 L **Kementan RI** No. I. 11044048 PTC. Obat bebas terbatas

14. AVIODINE

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung Iodine complex 18,05% dan Phosporic acid 16%. **Indikasi** efektif untuk santasi bangunan, kandang peralatan dan rumah potong serta untuk sanitasi air minum. **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sanitasi umum : 1 cc/liter air, untuk santasi air minum : 1 cc/2 liter air. Untuk sanitasi saat wabah ND, Gumboro, Mycoplasma, IB, ILT, E.coli dan Salmonella : 5 cc/liter air **Kemasan** Botol 1 liter **Deptan RI** No D. 05072951 PTC. TM. Obat bebas terbatas.

15. BENCHLOR

Fatro S.p.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung Benzalkonium chloride **Indikasi** Digunakan untuk antiseptik, desinfeksi peralatan, *fogging*, desinfeksi kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** antiseptik umum pada pelarut lendir mukosa dan lesi luka kecil dikaki 20 ml per L air (2% larutan), desinfeksi tangan, syringe, peralatan kedokteran hewan, perban 10 ml diencerkan dalam 1 L air (1% larutan), menyegarkan udara area peternakan atau desinfeksi kandang 500-1000 ml per 100 L secara spray termasuk ayam dan hewan ternak lainnya, deodorant area dan desinfeksi peralatan, kandang, inkubator 1000 ml per 100 L air (1% larutan) secara *spray* **Kemasan** Botol 1 L, botol 5 L **Deptan RI** No. I. 051223035 PTC.1. Obat bebas terbatas.

16. BENZADES®

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung Benzalkonium chloride dan Etanol. **Indikasi** Digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan. **Dosis dan Cara Pemakaian** 5ml per liter air, desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, mesin tetas, sepatu kandang. 1ml per liter air minum, desinfeksi alat-alat operasi. **Kemasan** 1 L. **Deptan RI** No. D 07123368 PTC. Obat bebas terbatas.

17. BENZAKLIN®

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Dimethyl cocobenzyl ammonium chloride 10% **Indikasi** Sebagai desinfeksi kandang, alat peternakan dan mesin tetas, desinfeksi air minum dan telur. Pengobatan lokal pododermatitis yang disebabkan oleh jamur pada ternak dan hewan kesayangan. Untuk dipping puting dan cuci ambing. Untuk membilas cucian pakaian, handuk, lap dll **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 ml/10 L air untuk desinfeksi kandang area 40-50 m². Tempat pakan dan minum, mesin tetas, sepatu kandang: 5 ml/10 L air. Untuk desinfeksi air minum: 3 ml/10 L air minum, 2 ml/10 L air minum. 10 ml/L air untuk alat-alat operasi. 2 ml/L air untuk *dipping* puting (± 30 detik). 15 ml/L air untuk pengobatan lokal pododermatitis dan dermatitis yang disebabkan oleh jamur. 4 ml/L air untuk membilas cucian **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. D. 06093123 PTC. Obat bebas terbatas

18. BENZALKONIUM CHLORIDE 10%

Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride **Indikasi** Sebagai antiseptik, desinfektan, sanitiser dan fungisid untuk membersihkan peralatan perusahaan susu atau daging, kandang dan peralatan peternakan, klinik hewan serta air minum ternak **Kontra Indikasi** Penggunaan bersama sabun dan deterjen anionik **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 ml/10 L air untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, sepatu dan mesin tetas. 5 ml/10 L air untuk desinfeksi air minum ternak. 25 ml/10 L air untuk desinfeksi alat-alat perusahaan susu ataupun pengolahan daging. 20 ml/10 L air untuk desinfeksi maupun sterilisasi di klinik hewan **Kemasan** Botol 100 ml, jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 09093703 PTC. TM. Obat bebas terbatas

19. BENZALVAKS

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride 10% **Indikasi** Desinfeksi kandang yang tercemar penyakit. Sanitasi dan sterilisasi ruang hatchery, setter dan hatcher. Sterilisasi peralatan, desinfeksi kaki dan tangan sebelum masuk kandang. Sterilisasi air minum, untuk mencuci telur supaya tahan lama **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur dengan air bersih untuk desinfeksi kandang yang tercemar penyakit: 60 ml/10 L air. Sanitasi dan sterilisasi ruang hatchery, setter dan hatcher: 60 ml/10 L air. Sterilisasi peralatan: 60 ml/10 L air. Cuci kaki dan tangan sebelum masuk kandang: 20 ml/10 L air. Sterilisasi air minum: 5 ml/10 L air. Mencuci telur supaya tahan lama: 10 ml/1 L air **Kemasan** 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 05102130 PTC. 1. Obat bebas terbatas

20. BENZALVET-10

Mitravet

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung benzalkonium chloride 10% **Indikasi** Desinfektan dan antiseptik. Sanitasi dan sterilisasi air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang: 60 ml/10 L. Sterilisasi air minum: 5 ml/10 L **Kemasan** 1 L, dan 20 L **Deptan RI** No. D. 05103004 PTC. TM. Obat bebas terbatas

21. BENZOGARD

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung alkyl dimethyl benzyl dan

ammonium chloride 20% **Indikasi** Efektif untuk sanitasi bangunan, kandang dan peralatan, mesin tetas dan telur tetas **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi umum: 2 cc/L air. Telur tetas: 1 cc/L air **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. D. 05123024 PTC. TM. Obat bebas terbatas

22. **BESTAQUAM** **China Bestar Laboratotium Ltd, Taiwan/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung didecyl dimetil ammonium bromida dan etilen glikol **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 15 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 04062789 PTC. Obat bebas terbatas

23. **BIO DINE** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung iodine 30 mg **Indikasi** Sebagai desinfektan kandang dan peralatan peternakan serta kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/300 L air (1:300) untuk desinfeksi tangan, ambing, tempat operasi, dan luka terbuka. 1 L/400 L air (1:400) untuk desinfeksi bangunan maupun peralatan pada pengolahan susu. 1 L/600 L air (1:600) untuk desinfeksi mesin tetas dan peralatannya, kandang, serta rumah potong hewan. 1 L/2.500 L air (1:2.500) untuk sanitasi air minum ternak **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Kementan RI** No. D. 12094341 PTC. Obat bebas terbatas

24. **BIO QUAT 20** **Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Cairan. **Komposisi** tiap 1 ml mengandung Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%) Dimethyl benzyl ammonium chloride 20%, Bahan-bahan lembam 80%. **Indikasi** efektif untuk sanitasi dan desinfeksi bangunan, kandang, telur tetas, mesin tetas dan peralatan lain karena bersifat bakterisidal, virusidal dan fungisidal. **Dosis dan Cara Pemakaian** desinfektan umum 2 ml/liter air, klinik, peternakan 2 ml/liter air, sanitasi telur tetas 1 ml/liter air, air minum 1 ml/5 L air. **Kemasan** 1 gallon. **Deptan RI** No. I. 02061740 PTC.1. Obat bebas terbatas.

25. **BIOCET DRY** **Ceetal Laboratoires – Perancis/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kaolin 160 µm, kaolin 60 µm, ascophyllum nodosum (rumpun laut), *clay*, *yucca schidigera*, *eucalyptus essential oil*, *laurel essential oil* dan lemon essential oil **Indikasi** Untuk sanitasi kotoran dan menciptakan kondisi kesehatan yang lebih baik karena efisiensi dari serbuk kering serta mengabsorpsi cairan dan bau ammonia **Dosis dan Cara Pemakaian** *Bovine stalling*: 50-100 g/m², sekali hingga dua kali tiap minggu. *Keeping in sheds*: 50-100 g/m², sekali hingga dua kali tiap minggu. *Breeding claves*: 100 g/m², tiga kali tiap minggu. Unggas: Pada lantai, *putting straw*, gunakan BIOCET DRY dengan laju 2.000-300 g/m². Ayam: 70 g/m², dua kali tiap minggu, dari minggu pertama hingga minggu kelima. Turkey: 70 g/m², dua kali tiap minggu, dari minggu pertama hingga minggu kesepuluh. Duck pada *loose straw*: 70 g/m², tiap hari, dari minggu pertama hingga minggu kedua belas. Pada sarang: dengan laju 20 g/sarang. Ulangi pengoperasian 1-2 kali tiap minggu berdasarkan tempat sarang. Babi hamil, anak babi: 40 g/babi tiap hari atau 100 g, tiga kali tiap minggu. Maternity: Gunakan BIOCET DRY pada sarang anak babi setiap hari dan juga pada lempeng panas. *Dip* anak babi dalam BIOCET DRY sebisa mungkin setelah kelahiran pada kulit yang kering dan sanitasi sehingga dapat meminum kolostrum dengan lebih cepat. Babi yang kehilangan *straw*: 300 g/babi dan tiap minggu. Kuda: setelah dibersihkan, spread

6-7 kg dalam kotak dan letakkan *straw*, kemudian tambahkan 1 kg tiap minggu dalam 2 atau 3 aplikasi. *Mare*: 3 kg tiap minggu dalam 2 atau 3 aplikasi. Transport vehicles: *spread* secara langsung 1 kg BIOCET DRY pada kuda bagian belakang atau truk **Kemasan** Kantong 25 kg, 500 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 12074301 PTS. Obat bebas terbatas

26. **BIOCID 30** **Evans Vanodine International PLC, England/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung iodine 3% dan surfactant 25% **Indikasi** Desinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** Mendesinfeksi dan membersihkan tangan, ambing sebelum diperah, bagian yang akan dioperasi dan luka terbuka, dengan pengenceran 1:300. Mendesinfeksi dan membersihkan bangunan, instalasi, kendaraan, semua peralatan dan tempat susu, tempat mencuci kaki peternakan dan penetasan, dengan pengenceran 1:400. Mendesinfeksi dan membersihkan mesin tetas serta peralatan lainnya, rumah potong hewan dan tempat pemerahan, dengan pengenceran 1:600. Mendesinfeksi hijauan makanan ternak, dengan pengenceran 1:1500. Sterilisasi air minum ternak, dengan pengenceran 1:2.500 **Kemasan** Jerigen polyethylene (HDPE) 1 L, 2 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 0410312 PTC.2. Obat bebas terbatas
27. **BIODAN** **Vaksindo Satwa Nusantara**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde 15% dan cocobenzil dimethyl ammonium chloride 10% **Indikasi** Membunuh virus, bakteri dan jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur dengan air bersih. Untuk membasmi virus: 1-6,7 cc/L air, bakteri: 1-5 cc/L air dan jamur: 1 cc/L air. Untuk campuran air minum: 0,3 cc/L air. Untuk semprot kandang: 2,5 cc/L air **Kemasan** 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 06040318 PTC. 1. Obat bebas terbatas
28. **BIODAN PLUS** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung cocobenzyl dimethyl ammonium chloride 20% dan glutaraldehyde 30% **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 08053437 PTC. Obat bebas terbatas
29. **BIODES – 100** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung benzalkonium chloride 12% **Indikasi** Desinfektansia peralatan peternakan, tempat makan dan minum, pakaian, sepatu, mesin tetas, air minum ternak, ambing sapi dan kandang **Dosis dan Cara pemakaian** Desinfeksi kandang dan peralatan: 60 ml/10 L air. Desinfeksi air minum unggas: 10 ml/20 L. Desinfeksi ambing sapi: 20 ml/10 L air. Desinfeksi kandang: 150 ml/10 L air **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L **Kementan RI** No. D. 1205053 PTC. 1. Obat keras
30. **BIODES FORTE** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride 50% **Indikasi** Desinfeksi kandang, peralatan peternakan, desinfeksi ambing sapi sebelum dan sesudah diperah

Dosis dan Cara Pemakaian Desinfeksi kandang: 15 ml/10 L air. Desinfeksi ambung sapi: 5 ml/100 L air. Desinfeksi kandang bekas wabah ND, IB, IBD, dll: 35 ml/10 L air **Deptan RI** No. D. 07093286 PTC. Obat bebas terbatas

31. BIOGEL **CID Lines NV., Belgia/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sodium hidroksida **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 10 kg, 25 kg, 210 kg, 600 kg dan 1.000 kg **Deptan RI No. I. 12124402 PTC.** Obat bebas terbatas

32. BIOPHENE **Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung O-phenylphenol 7,92%, O-benzyl-p-chlorophenol 9,97% dan P-tert-amylphenol 1,95% **Indikasi** Efektif sebagai desinfektan pembersih satu tahap dimana terdapat 5% serum organik untuk fasilitas perawatan kesehatan, institusional, industrial, unggas, babi, fasilitas perawatan hewan, ternak dan penggunaan untuk kehewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Disemprotkan pada permukaan dengan dosis 1-4 ml/L air **Kemasan** 1 L dan 1 gallon **Deptan RI** No. I. 02061731 PTC.1. Obat bebas terbatas

33. BIOPUR **Laboratorium Biove, Perancis/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung hidrogen peroksida **Indikasi** Sebagai pembersih saluran air dan sanitasi air minum pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Drum HDPE 5 kg dan 20 kg **Deptan RI No. I. 08043407 PTC.** Obat bebas terbatas

34. BIOSEPT **Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/
Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde 2%, alkyldimethylbenzylammonium chloride 8,68%, octyldecyldimethylammonium 6,51%, dioctyldimethylammonium chloride 2,60%, didecyldimethylammonium chloride 3,91% dan inert ingredients 76,3% **Indikasi** Efektif untuk desinfeksi melawan virus, bakteri g (+) dan (-), spora, bakteri, mycoplasma, fungi dan mold yang menyebabkan penyakit ikutan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dipping (kaki, kendaraan dan benda mati): 1/100 (10 ml/L). Desinfeksi rutin dan akhir kandang hewan: 1/300 (3,3 ml/L). Desinfeksi bangunan kandang ternak untuk melawan penyakit virus (dengan hewan didalamnya): 1/150-200 (5-6 ml/L). Desinfeksi bangunan dan kandang ternak untuk melawan penyakit bakteri (dengan hewan didalamnya): 1/150-200 (4 ml/L). Desinfeksi alat transportasi rumah potong, area pemerah susu dan penetasan: 1/400 (2,5 ml/L). Desinfeksi telur sebelum inkubasi: 1/1.000 (1 ml/L) **Kemasan** Jerigen 1 L dan 5 L **Kementan RI** No. I. 12124415 PTC. Obat bebas terbatas

35. BLUE ROYALE **Anitox Corp-USA/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung propionic acid dan copper sulphate **Indikasi**

Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:2.000 s/d 1:1.000 **Kemasan** 1 gallon **Deptan RI**
No. I. 02011630 PTC. 1. Obat bebas terbatas

36. BROMOQUAD 10

SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung didecyl-dimethyl ammonium bromide
Indikasi Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml dalam 2 L air minum **Kemasan** 1 L,
5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 07013166 PTC. Obat bebas terbatas

37. BROMOQUAD 50

AAKO BV, Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung didecyl-dimethyl ammonium bromide
Indikasi Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:2.000 s/d 5:3.000 dan 1:10.000 **Kemasan**
1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 0504489 PTC. 2. TML. Obat bebas terbatas

38. CAPRIDES

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride dan ethanol
Indikasi Untuk desinfeksi kandang dan lingkungan serta peralatan peternakan lainnya dari
kontaminasi virus (AI, ND, ILT, IB, marek's, fowl pox, adenovirus, rabies, canine distemper,
feline pneumonitis, yellow fever, psittacosis, herpes simplex) dan bakteri (Escherichia coli,
Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus, Enterobacter
aerogenes, Streptococcus faecalis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang (luas
40-50) m² dan peralatan peternakan (ayam, sapi, kambing, domba, babi, dll): 40 ml/10 L air.
Alat-alat operasi (dokter hewan dan pabrik): 7 ml/10 L air **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 20 L
Deptan RI No. D. 07093304 PTC. Obat bebas terbatas

39. CID 2000

CID Lines NV, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung paracetic acid, hydrogen peroxide dan
acetic acid **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara**
Pemakaian Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 10 L, 5 kg dan 10 kg **Kementan RI** No.
I. 1208582 PTC. 1. Obat bebas terbatas

40. CLEANATOR

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung glutaraldehyde dan benzalkonium
chloride **Indikasi** Disinfeksi umum, peralatan kandang, lingkungan kandang dan peralatan
kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sanitasi umum semprot/pengasapan 1:200.
Disinfeksi peralatan semprot/pengasapan 1:100. Disinfeksi sepatu, kendaraan celup/semprot
1:100. Saat wabah semprot/rendam 1:50 **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D.
06093117 PTC. Obat bebas terbatas

41. CLEANUP – F

Woogene B&G – Korea Selatan/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kalium monopersulfat, natrium
dikloroisosianurat, asam sulfamat, natrium heksametafosfat, natrium dodesilbenzena sulfonat,
pigmen dan flavor food red No. 2-amaranth **Indikasi** Sebagai desinfektan **Dosis dan Cara**

Pemakaian Lihat pada kemasan **Kemasan Botol** 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I. 12094365 PTC. Obat bebas terbatas

42. **CLINAFARM SMOKE** **Elanco Animal Health, Belgia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Smoke generator **Komposisi** Mengandung enilkonazol **Indikasi** Desinfektan/fungisida pada kandang **Perhatian** Setelah di sulut dan asap putih keluar dari generator biarkan selama 5 menit untuk proses pendinginan **Dosis dan Cara Pemakaian** Tempatkan smoke generator pada tempat yang tahan api, kemudian nyalakan sumbunya. 1 generator untuk 50 m³ ruangan **Kemasan** Smoke generator 5 g dan kaleng 65 g **Deptan RI** No. I. 1208305 PTS. 1. Obat bebas terbatas
43. **CLINAFARM SPRAY** **Elanco Animal Health, Belgia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enilkonazol **Indikasi** Desinfektan/fungisida pada kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L di larutkan dalam 99 L air kemudian disemprotkan pada permukaan 7.500 m² atau difumigasikan untuk ruangan dengan volume 30.000 m³ **Kemasan Botol** 1 L **Deptan RI** No. I. 1211339 PTC. 1. Obat bebas terbatas
44. **CRESOVEX – S** **S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung o-benzyl-p-chlorophenol, hexachlorphan/exofene dan cresylic acid **Indikasi** Digunakan sebagai desinfektan untuk gudang, dinding, kandang, peralatan kandang dan alat transportasi kandang ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Digunakan dengan cara dibuat emulsi dengan penambahan air dan disemprotkan pada permukaan yang akan didisinfeksi dengan pengenceran sebagai berikut: Untuk premises: 1 L/200-400 L air. Untuk lantai, peralatan dari bahan kayu atau poros: 1 L/100 L air. Untuk pintu masuk kandang: 1 L/800 L air. Untuk perlengkapan, peralatan dan transportasi kandang: 1 L/600 L air **Kemasan** 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 07073246 PKC. Obat keras
45. **CUATS – 20** **S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride **Indikasi** Sebagai antiseptik umum untuk semua spesies hewan dan sebagai desinfektan kandang dan alat-alat peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara topical: 0,5-2,5 ml/L air. Alat-alat peternakan: 7 ml/L air. Semprot kandang 4 ml/L air **Kemasan** 1 L dan 5 L **Kementan RI** No. I. 12022043 PTC. 2. Obat bebas terbatas
46. **DERMASEPT IODE GEL** **Ceetal Laboratoires – Perancis/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Gel **Komposisi** Mengandung PVPI (polyvidone iodine), thickener (xanthum gum) dan glycerin **Indikasi** Membentuk lapisan yang transparan untuk melindungi puting susu tanpa mewarnai kulit puting susu dan sangat mudah dibersihkan. Melembabkan puting, menjaga puting dalam kondisi yang baik sepanjang tahun. Menghasilkan iodine organik yang dapat mengontrol mikroorganisme berspektrum luas, termasuk: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis dan Streptococcus agalactiae **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan setelah proses pemerahan, siap untuk digunakan dan selalu menggunakan produk

yang masih bagus. Gunakan cup pencelup yang bersih, isi sebanyak $\frac{3}{4}$ cup pencelup kemudian celupkan pada setiap putting serta jangan di lap. Cuci *cup* pencelup dengan sebelum proses pemerahan berikutnya **Kemasan** Botol 1 L, 5 L, 10 L dan 20 L **Kementan RI** No. I. 12094364 PTM. Obat bebas terbatas

47. DES HP

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung benzalkonium chloride 100 g dan ethanol 30 ml **Indikasi** Antiseptik dan disinfektan untuk sanitasi rutin dengan tujuan menekan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, mikoplasma dan jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang: 5 cc/1 L air. Air minum: 1 cc/5 L air. Mesin tetas dan peralatan kandang: 1 cc/2 L air. Cuci tangan dan kaki sebelum masuk kandang: 2 cc/L air **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 25 L **Deptan RI** No. D. 0203371 PTC. Obat bebas terbatas

48. DESGRIN

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung benzalkonium kloride 260 ml dan glutaraldehyde 70 ml **Indikasi** Untuk disinfeksi kandang, peralatan dan hatchery **Dosis dan Cara Pemakaian** Cuci kandang, peralatan dan hatchery: 4 ml/L air. Fumigasi kandang sebelum ayam masuk: 8 ml/L air. Fumigasi kandang (penambahan sekam): 20 ml/L air. Thermofogging 1:1 **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 04032741 PTC. Obat bebas terbatas

49. DESINSEP

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap ml mengandung chloramines – T 50 mg **Indikasi** Desinfektan pada kandang, peralatan kandang dan ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** 30 ml atau kira-kira 4 tutup kemasan/1.000 L air **Kemasan** Jerigen 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 08093494 PTC. Obat bebas terbatas

50. DESOGERM – 3A

Diasham–Singapura/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung QAC, glutaraldehyde dan formaldehyde **Indikasi** Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:200 s/d 1:800 **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 04081628 PTC. 2. Obat bebas terbatas

51. DESPADAC

Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung didecil dimethylammonia chloride (Bardac® 22) 10%, glutaraldehyde 4%, formalddehyde 3,15%, glyoxal 3,2%, isopropyl alcohol 5%, non active vehicle and satbilizing agents q.s. 100% **Indikasi** Sebagai pembersih dan disinfektan kandang, alat-alat peternakan, transportasi dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi umum 1 L dalam 250 L air **Kemasan** 5 L **Deptan RI** No. I 0012775 PTC. Obat bebas terbatas

52. DESTACAP

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung benzalkonium chloride dan etanol **Indikasi** Untuk desinfeksi kandang dan lingkungan, peralatan peternakan, alat-alat transportasi dan ruang

penetasan terhadap: virus (Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Laryngotracheitis, Infectious Bronchitis, Marek's Disease, EDS⁷⁶, Rabies) dan bakteri (Pseudomonas aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Shigella, Enterobacter aerogenes, Streptococcus faecalis, Bacillus anthracis) **Dosis dan Cara Pemakaian** 6 ml/L air untuk desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, mesin tetas dan sepatu kandang. 1 ml/L air untuk desinfeksi alat-alat operasi **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 08043416 PTC. Obat bebas terbatas

53. DESTAN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride (alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) **Indikasi** Digunakan sebagai desinfektan dan antiseptik pada peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 ml/10 L untuk desinfeksi kandang untuk luas area 40-50 m², tempat pakan dan minum, mesin tetas, sepatu kandang. 5 ml/10 L untuk desinfeksi air minum pada unggas. 3 ml/10 L untuk desinfeksi air minum pada babi. 2 ml/10 L untuk desinfeksi air minum pada sapi, kambing dan kuda. 10 ml/1 L untuk desinfeksi alat-alat operasi bagi para dokter hewan praktek. 2 ml/1 L untuk dipping puting ($\pm$ 30 detik) **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 0403939 PTC. 3. Obat bebas terbatas

54. DESTA – SAN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride dan isopropanol **Indikasi** Digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 4 ml/L untuk desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, mesin tetas, sepatu kandang. 4 ml/2,5 L untuk desinfeksi peralatan peternakan dan alat-alat operasi **Deptan RI** No. D. 07093288 PTC. Obat bebas terbatas

55. DESTASID

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride dan etanol **Indikasi** Digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 ml/L air untuk desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, mesin tetas, sepatu kandang. 1 ml/L air minum untuk desinfeksi alat-alat operasi **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. D. 07123369 PTC. Obat bebas terbatas

56. DINALON

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Cetylpyridium chloride, cetyltrimethyl ammonium bromide dan benzalkonium chloride **Indikasi** Desinfeksi berbagai macam bakteri, virus, dan spora penyebab penyakit lain pada unggas, udang, sapi, babi dan ternak lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 09011323 PTC. 2. Obat bebas terbatas

57. DM CID

Cid Lines, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung potasium hidroksida dan sodium hipoklorit **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian**

0,5% **Kemasan** Jerigen 25 kg, 30 kg dan 240 kg **Deptan RI** No. I. 09063641 PTC. Obat bebas terbatas

58. **DSC 1000** **Antec International DuPont Company/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung quartener amonium chloride (QAC) **Indikasi** Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:100 s/d 300 dan 1:1.000 **Kemasan** 1 L, 5 L, 20 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 03062603 PTC. Obat bebas terbatas
59. **DUPONT BIOSOLVE PLUS** **Antec International Ltd/
Dupont Agricultural Products Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sodium hidroksida dan bahan pengisi lainnya **Indikasi** Cleaner pada kotoran yang mengeras di kandang, tempat penetasan, tempat pemotongan hewan dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air dengan pengenceran 1:400 hingga 1:100 tergantung kebutuhan. Disiramkan atau dengan penyemprotan bertekanan tinggi **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 09103724 PTC. Obat bebas terbatas
60. **DYNE O MIGHT** **Preserve International, Amerika Serikat/Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung mineral, asam organik kompleks, iodine dengan polimer polioksietilen dan polioksipropilen 59,62% **Indikasi** Menetralkan bau tajam dari amoniak, menurunkan PH yang tinggi, mengatasi debu yang mengandung jamur dan mikroorganisme berbahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Disinfeksi kandang 1:200-1:400 dan sanitasi air 1:250 **Kemasan** 1 L dan 1 gallon **Deptan RI** No. I. 01091054 PTC. Obat bebas terbatas
61. **ECOFOAM EXTRA** **Kilco Internasional, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk warna putih **Komposisi** Mengandung sodium hydroxide, sodium alkaline sulphonate dan monocarboxylic acid **Indikasi** Pembersih kelas berat. Sangat efektif terhadap kotoran. Lekat pada permukaan dan lantai di kandang. Sangat efektif untuk membersihkan bahan organik serta melarutkan minyak dan lemak. Dirancang guna untuk pembersih alat dan bangunan sebelum didisinfeksi **Kontra Indikasi** Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Ecofoam extra 1-2% (pengenceran 1:100 sampai 1:50), diaplikasikan dengan menggunakan pompa bertekanan antara 80-120 bar dan foam lance **Kemasan** Jerigen 25 L **Kementan RI** No. I. 11024006 PTC. Obat bebas terbatas
62. **EXTRAGUARD** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung glutaraldehyde 300 g dan ammonium quartener 200 g **Indikasi** Desinfeksi kandang, peralatan peternakan dan lalu lintas lingkungan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi umum: 2cc/L air **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. D. 09033588 PTC. TM. Obat bebas terbatas
63. **FARM FLUID S** **Antec International DuPont Company/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik aktif dan surfaktan **Indikasi** Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:50 s/d 400 **Kemasan** 1 L, 5 L, 20 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 03062604 PTC. Obat bebas terbatas

64. **FORMADES** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung formalin 24 g, glutaraldehyde 4 g, benzalkonium chloride 3 g, dan bahan pembantu sampai 100 ml **Indikasi** Desinfeksi kandang untuk mencegah penularan penyakit oleh virus, bakteri, jamur dan koksidia **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 ml tiap 25 L air (1:250), disemprotkan ke seluruh bagian kandang seluas 80 m². Bila ada wabah, berikan dengan pengenceran 100 ml tiap 10 L air (1:100), disemprotkan ke seluruh bagian kandang seluas 30 m² **Kemasan** Botol isi 100 ml dan 1 L. Jerigen isi 5 L, 20 L dan 60 L **Deptan RI** No. D. 06021396 PTC. 2. Obat bebas terbatas
65. **FORMALIN ACT** **USFA, CV**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung formaldehyde **Indikasi** Membasmi seluruh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, khamir dan virus **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol plastik 1 L, 5 L dan 30 L **Deptan RI** No. D. 07023168 PTC. Obat bebas terbatas
66. **FUMISID** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung thymol, formaldehyde, benzalkonium chloride, ethanol, methanol, isopropanol dan aqua DM qs **Indikasi** Untuk desinfeksi kandang dan lingkungan, peralatan peternakan, alat-alat transportasi serta ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 ml/L untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan. 20 ml/L untuk mencegah menularnya penyakit. 5 ml/L untuk desinfeksi ruang penetasan **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 01071348 PTC. 2. Obat bebas terbatas
67. **G – MICROCID** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung povidone iodine 30 g dan gliserin 50 g **Indikasi** Desinfektan yang dapat membunuh virus, bakteri dan jamur (fungi) **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang, bangunan, kendaraan, peralatan, tempat susu, tempat cuci kaki, mesin tetas, tempat pemerahan, rumah potong hewan: 25,5 ml/10 L air. Desinfeksi tangan, ambing sebelum dan sesudah diperah, luka terbuka dan bagian yang akan dioperasi: 49 ml/10 L air. Desinfeksi kandang bila terjadi wabah penyakit: 150 ml/10 L air. Desinfeksi air minum ternak: 7,5 ml/10 L air. Memberantas penyakit PMK: 75 ml/10 L air **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI** No. D. 1205477 PTC. Obat bebas terbatas
68. **GERM – IOD** **Cenavisa SA, Spain/Lito Prima Mandiri**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung iodine kompleks 183,5 g dan phosphoric acid 30 g **Indikasi** Desinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** 25-100 ml/10 L air **Kemasan** Jerigen 5 L dan drum 200 L **Deptan RI** No. I. 07041414 PTC. 2. Obat bebas terbatas
69. **GLUTACAP** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde, benzalkonium chloride dan isopropanol **Indikasi** Desinfektan kandang dan lingkungan, peralatan peternakan, alat-alat transportasi dan ruang penetasan terhadap kontaminasi virus, bakteri dan jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** 3,5 ml/L air untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, ruang penetasan, alat transportasi yang tercemar (wabah penyakit). 1 ml/L air untuk cuci tangan atau kaki sebelum masuk kandang **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 08053433 PTC. Obat bebas terbatas
70. **GLUTACID** **Hendy Pharmindo Satwa untuk Delta Prima Agrindo**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde, cocobenziil dimethyl dan

ammonium chloride **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 050022869 PTC. TM. Obat bebas terbatas

71. **GLUTACID** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung glutaraldehyde 30% dan benzalkonium chloride 20% **Indikasi** Dapat membunuh virus berenvelope dan non envelope (avian influenza, IBD, ND, IB, ILT, EDS dll), bakterisidal (E. Coli, Salmonella spp, Pasteurella spp, Haemophilus spp, Mycoplasma, dll), fungisidal (Aspergillus spp dll) serta sporisidal **Dosis dan Cara Pemakaian** Foot dipping/wheel bath: 5 ml/L air. Desinfektan kandang: 12-15 ml/10 L air **Kemasan** Jerigen 1 L dan jerigen 20 L **Deptan RI** No. D. 08043402 PTC. Obat bebas terbatas
72. **GLUTACIDE** **Delta Prima Agrindo**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung BKC 10% dan glutaraldehyde 15% **Indikasi** Desinfeksi kandang dan sanitasi air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang: 10 ml/4 L air. Sanitasi air minum: 20 ml/4 L air **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 05022868 PTC. TM
73. **GLUTADES** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehyde, benzalkonium chloride dan isopropanol **Indikasi** Digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 3,5 ml/L untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, ruang penetasan, alat transportasi yang tercemar. 1 ml/L untuk cuci tangan/kaki sebelum masuk kandang **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. D. 08023389 PTC. Obat bebas terbatas
74. **GLUTAMAS** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung glutaraldehyde 15% dan alkilbenzyl dimethyl ammonium chloride 10% **Indikasi** Desinfektan efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, virus dan jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi rutin 7-10 cc/L air (100 ml/100m²) **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 06043068 PTC. Obat bebas terbatas
75. **GLUTANOL** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehyde, benzalkonium chloride dan isopropanol **Indikasi** Digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 3,5 ml/L untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, ruang penetasan, alat transportasi yang tercemar. 1 ml/L untuk cuci tangan/kaki sebelum masuk kandang **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. D. 07093282 PTC. Obat bebas terbatas
76. **GLUTARALDEHYDE 30% BENZALKONIUM CHLORIDE 20%** **Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehyde dan benzalkonium chloride **Indikasi** Bersifat biocidal total dengan formula ganda sehingga menghasilkan daya basmi yang tinggi terhadap mikroorganisme seperti virus, bakteri, mycoplasma dan jamur penyebab penyakit pada ternak **Kontra Indikasi** Penggunaan bersama sabun dan deterjen anionik **Dosis dan Cara Pemakaian** Semprot kandang dan peralatan ternak: 1:800 (1 L/800 L air). Sanitasi telur tetas: 1:1.200 (1 L/1.200 L air). Sanitasi air minum ternak: 1:6.000 (1 L/6.000

L air) **Kemasan** Botol 100 ml, jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 09083681 PTC.
TM. Obat bebas terbatas

77. **GPC 8** **Evans Vanodine International PLC, England/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde dan didecyl dimethyl ammonium chloride **Indikasi** Desinfektan untuk hatchery, kandang, peralatan kesehatan hewan dan desinfeksi udara (fogging) **Kontra Indikasi** Dapat menyebabkan iritasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi umum: 5-10 ml/L air. Desinfeksi udara/fogging: 5ml/L air. Desinfeksi kendaraan: 10 ml/L air. Sterilisasi peralatan kandang: 5 ml/L air. Efektif terhadap berbagai mikroorganisme patogen dalam industri peternakan, penyakit bakterial dengan pengenceran 1:100 untuk fowl thypoid dan pengenceran 1.200 untuk arizonosis, colisepticaemia, pullorum, salmonellosis. Pengenceran 1:250 untuk *yolk sac infection* dan pengenceran 1:1000 untuk Staphylococcal infection. Penyakit viral dengan pengenceran 1:33 untuk egg drop syndrome dan pengenceran 1:100 untuk infectious bursal/Gumboro. Pengenceran 1:190 untuk newcastle/fowl pest, turkey rhinotracheitis dan pengenceran 1:200 untuk infectious laryngotracheitis serta pengenceran 1:220 untuk AI. Penyakit fungi dengan pengenceran 1:10 untuk aspergillosis, pengenceran 1:50 untuk favus/ring worm dan pengenceran 1:100 untuk moniliasis **Kemasan** Jerigen polyethylene (HDPE) 5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 06093121 PTC. Obat bebas terbatas
78. **GQ PLUS** **Diasham Pte, Ltd, Singapura/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung coco benzyldimethyl ammonium chloride, didecyl dimethyl ammonium chloride dan glutaraldehyde **Indikasi** Desinfektan berspektrum luas yang bekerja terhadap bakteri, virus, fungi pada peralatan peternakan dan desinfeksi lantai **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:500-800 **Kemasan** HDPE/drum 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 08013373 PTC. Obat bebas terbatas
79. **HI – G** **Kalbe Farma, Tbk**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde dan alkyl dimetyl benzyl ammonium chloride dan pine oil **Indikasi** Desinfeksi untuk lingkungan peternakan, fasilitas transport dan peralatan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 07113343 PTC. Obat bebas terbatas
80. **HI – G PLUS** **Kalbe Farma, Tbk**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde, dimethyl cocobenzyl ammonium chloride dan pine oil **Indikasi** Desinsektisida lingkungan peternakan dan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 07063222 PTC. Obat bebas terbatas
81. **HYPEROX** **Antec International-A DuPont Company, Inggris/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam parasetat, hydrogen peroksida dan asam asetat **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara**

Pemakaian Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 1 L, 5 L, drum 20 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 06103131 PTC. Obat bebas terbatas

82. INTERCIDE

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung povidone iodine 10% **Indikasi** Untuk membunuh semua virus, bakteri dan jamur patogen pada ternak dengan mendesinfeksi air minum, kandang, peralatan mesin tetas, telur dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Cuci tangan, ambing dan dipping putting: 1 ml/L air. Antiseptic luka dan bagian yang akan dioperasi: 1 ml/L air. Desinfeksi kandang, peralatan peternakan dan peralatan pemerahan: 1 ml/2 L. Desinfeksi kandang bekas wabah: 2 ml/L air. Desinfeksi kendaraan dan cuci kaki: 1 ml/2 L air. Desinfeksi mesin tetas dan rumah potong hewan: 1 ml/2 L air. Irigasi uterus: 5 ml/20 ml aquades **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 25 L **Kementan RI** No. D. 12114384 PTC. Obat bebas terbatas

83. INTRA HYDROCARE

Intracare B.V, Belanda/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung hidrogen peroksida 49,9% **Indikasi** Agen oksidasi untuk menghilangkan pencemar organik dan deposit mangan dalam sistem peralatan air minum pada peternakan intensif **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 1 L, 5 L dan 10 L **Kementan RI** No. I. 11104166 PKC. Obat bebas terbatas

84. IODENE

Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung alpha-(P-nonylphenyl)-Omega-Hydroxypoly (Oxyethylene)-Iodine complex 18,05%, (providing 1,75% iodine titrasi) 16,00% dan phosphoric acid 65,05% **Indikasi** Digunakan pada permukaan yang keras seperti dinding, lantai, alat rumah tangga dll. Siapkan larutan segar setiap hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi: 1 oz/2 gallon air, permukaan dibiarkan basah 10 menit. Sanitasi tangan dalam proses daging unggas: 1 oz/5 gallon air. Dalam tabung air pendingin untuk pengalengan: 1 oz/6-10 gallon. Sanitasi air minum unggas: 3 oz/gallon air. Sanitasi induk babi: 1 oz/gallon untuk menggosok panggung dan ambing. Deodorant: 1 oz/gallon air **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 002061739 PTC. 1..

85. IODINACID

Multi Meditas Pratama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung iodium 30 mg dan kalium iodida 50 mg **Indikasi** Membunuh virus, bakteri dan jamur. Desinfeksi dan sanitasi kandang, peralatan, air minum dan lingkungan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi umum: 4 ml dilarutkan dalam 1 L air. Sanitasi air minum: 0,8 ml dilarutkan dalam 1 L air **Kemasan** 100 ml x 50 botol dan 1 L x 12 botol **Deptan RI** No. D. 09113743 PTC. Obat bebas terbatas

86. IODOPHORE 11,5%

AVICO/Maju Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung povidon iodine **Indikasi** Sebagai antiseptik dan desinfektan untuk infeksi kulit pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 4,8 L **Kementan RI** No. I. 11094148 PTC.

- 87. IODOSEPT** **SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung PVD iodine **Indikasi** Disinfeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:4.000 s/d 1:5.000 **Kemasan** 1, 5 dan 20 L **Deptan RI** No. I. 00111793 PTC. 1. Obat bebas terbatas
- 88. IOGUARD – 300** **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung iodine dan phosphoric acid **Indikasi** Disinfektan kandang dan peralatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Disinfeksi kandang dan peralatan: 2 cc/L. Sterilisasi air minum: 4 cc/10 L air minum **Kemasan** Botol plastik 1 L, 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 0609311 PTC. Obat bebas terbatas
- 89. ISTAM** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 10% **Indikasi** Desinfeksi dan sanitasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada pembedahan: 10 ml/L air. Untuk mencuci dan merendam alat operasi: 20 ml/L air. Untuk desinfeksi tangan dan daerah sekitar operasi dan desinfeksi kandang: 30 ml/5 L air disemprot/dicuci. Desinfeksi air minum dan lain-lain lihat pada brosur **Kemasan** 1L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 0409348 PTC. 3. Obat bebas terbatas
- 90. ISTAM 20%** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 20% **Indikasi** Desinfeksi dan sanitasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk desinfeksi kandang dan lingkungan: 3 ml/L air. Desinfeksi alat-alat pemerahan: 1 ml/L air. Desinfeksi alat-alat pemotongan daging: 0,65 ml/L air. Desinfeksi air minum dan lain-lain lihat pada brosur **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 08043405 PTC. Obat bebas terbatas
- 91. ISTAM 30%** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 30% **Indikasi** Desinfeksi dan sanitasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk desinfeksi kandang dan lingkungan: 2 ml/L air. Desinfeksi alat-alat pemerahan: 0,65 ml/L air. Desinfeksi alat-alat pemotongan daging: 0,4 ml/L air. Desinfeksi air minum dan lain-lain lihat brosur **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 08043406 PTC. Obat bebas terbatas
- 92. KICKSTART** **CID Lines NV, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung asam parasetik dan hydrogen perioksida **Indikasi** Desinfektan kandang, peralatan dan tempat penyimpanan pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen HDPE 1 L, 5 L, 10 L, 20 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 10073854 PTC. Obat bebas terbatas
- 93. KILCOX EXTRA** **Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan bening Komposisi Mengandung 4-chloro-3-methylphenol, glutaraldehyde dan benzalkonium chloride **Indikasi** Untuk mengendalikan coccidiosis **Kontra**

Indikasi Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Perhatian** Jangan menambah air ke dalam produk ini **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi standar pada akhir pemeliharaan 1% v/v, 2-3% v/v. Pada saat terjadi wabah koksidia spesifik 1-2% v/v untuk kolam foot dip Kemasan 5 L **Kementan RI** No. I. 12044252 PTC. Obat bebas terbatas

94. KLOORIN – GARD

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Tablet effervescent **Komposisi** Mengandung sodium dichloroisocyanurate 5.000 mg **Indikasi** Efektif untuk desinfeksi kandang dan permukaan ruangan, peralatan peternakan, sterilisasi air minum dan sebagai antiseptik saat pemerahan susu. Bersifat spektrum luas, mampu membunuh mikoplasma, bakteri, virus, jamur, kapang dan protozoa seperti AI, ND, gumboro, hog cholera, PRRS, E. coli, Salmonella spp., Brucella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., dan lain-lain. Aman dipakai pada semua jenis ternak seperti sapi, domba, kambing, babi, unggas dan ternak lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Sterilisasi air: 1 tablet/500-1.500 L air. Semprot kandang dan permukaan ruangan: 1 tablet/10 L air. Desinfeksi peralatan peternakan: 1 tablet/100 L air. Celup kaki: 1 tablet/30 L air. Cuci ambing dan puting saat pemerahan: 1 tablet/20 L air **Kemasan** Pot 50 tablet **Deptan RI** No. D. 11094149 PTM.

95. LIFE JACKET

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Tablet effervescent **Komposisi** Mengandung potasium monopersulfate, sodium dichloroisocyanurate, sulphamic acid, sodium hexametaphosphate dan sodium dodecylbenzene sulphonate **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding dan peralatan kandang dan peternakan, rumah potong, pasar ternak dan operasi **Kontra Indikasi** Jangan dicampur dengan bahan kimia lain **Perhatian** Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi rutin: 1 tablet:10 L air. Kondisi wabah dan kontaminasi tinggi: 1 tablet:1 L air **Kemasan** Pail 1 kg dan 10 kg **Deptan RI** No. I. 08013378 PTS. Obat bebas terbatas

96. LIFE GARD – T

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Tablet effervescent **Komposisi** Mengandung natrium dichloroisocyanurate (NaDCC) **Indikasi** Desinfeksi unggas, babi, sapi, domba, kandang, rumah potong hewan dan fasilitasnya serta sterilisasi air minum dan peralatan **Kontra Indikasi** Jangan disinfeksi air minum 2 hari sebelum dan sesudah vaksinasi per oral **Perhatian** Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi: 1 tablet/10 L air. Sterilisasi air minum: 1 tablet/500-1.500 L air. Bak celup kaki: 1 tablet/30 L air **Kemasan** Botol isi 50 tablet dan 100 tablet serta pail 1 kg **Deptan RI** No. I. 04052758 PTM. Obat bebas terbatas

97. LIFELINE

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride, glutaraldehyde dan formaldehyde **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding dan peralatan kandang dan peternakan **Kontra Indikasi** Jangan dicampur dengan bahan kimia lain **Perhatian** Simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi

rutin: 1 L/100 L air. Disinfeksi fasilitas kandang dan bak celup kaki: 1 L/50 L air **Kemasan** Botol HDPE 1 L **Deptan RI** No. I. 08013377 PTC. Obat bebas terbatas

98. LIPTODRY **Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sepiolite, ekstrak eucalyptus, calcium carbonate dan magnesium oxide **Indikasi** Desinfektan kandang ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Hari pertama: tebarkan 100 g produk pada lapisan pertama dari lantai yang bersih/m². Untuk hari selanjutnya: 50-80 g/m² **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 10123952 PTS. Obat bebas terbatas

99. LONGLIFE 250 S **Antec International-DuPont Company, Inggris/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung high boiling tar acid (HBTA), chlorinated xylenols dan dodecil benzene sulphonic acid **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 4:1 L **Kemasan** Jerigen 1 L, 5 L, 20 L dan drum 200 L **Deptan RI** No. I. 06103143 PTC. Obat bebas terbatas

100. MEDIBIRD **Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung glutaraldehyde 3 g dan alkyldimethylbenzyl ammonium chloride 1 g **Indikasi** Membunuh kuman (virus dan bakteri), jamur dan sporanya, pencegahan penyakit ND (tetelo, cekak), CRD (ngorok), korisa (pilek), desinfeksi kandang, mengkilapkan bulu dan menyegarkan badan, menyembatkan kulit dan mengobati luka **Perhatian** Simpan di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 ml (1 tutup botol) tiap 1 L air. Pada dosis pemakaian aman meskipun campuran terminum atau terkena mata burung **Kemasan** Botol 60 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 08043411 PTC. Obat bebas terbatas

101. MEDISEP **Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung cetyl pyridinium chloride (CPC) 1% b/v, cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) 2% b/v dan benzalkonium chloride (BKC) 2% b/v **Indikasi** Menyucihamakan kandang (semprot), tempat ransum dan minum. Mesin tetas (mencegah penularan CRD dan pullorum). Desinfeksi sepatu/alas kaki dan mobil yang akan masuk kandang, mencegah penularan penyakit melalui air minum (bila sedang ada wabah). Sesudah vaksinasi, membas alat-alat bekas vaksinasi seperti jarum suntik, tempat minum, mengobati luka bekas cacar atau diadu. Desinfeksi tangan atau bagian yang akan dioperasi atau luka terbuka **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang (semprot), tempat ransum dan minum, mesin tetas (mencegah penularan CRD dan pullorum): 15 ml tiap 10 L air. Desinfeksi sepatu/alas kaki dan mobil yang akan masuk kandang: 15 ml tiap 10 L air. Mencegah penularan penyakit melalui air minum (bila sedang ada wabah): 3 ml tiap 10 L air. Sesudah vaksinasi, membas alat-alat bekas vaksinasi seperti jarum suntik, tempat minum, dll: 8 ml tiap 1 L air. Mengobati luka bekas cacar atau diadu: 6 ml tiap 1 L air. Desinfeksi tangan atau bagian

yang akan dioperasi atau luka terbuka: 2 ml tiap 1 L air **Kemasan** Botol isi 100 ml, 1 L dan 5 L. Jerigen isi 5 L, 20 L dan 60 L **Deptan RI** No. D. 0206894 PTC. 2. Obat bebas terbatas

102. MEFISTO

Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Cairan (larutan desinsektisida) **Komposisi** Mengandung quaternary ammonium chloride, glutaraldehyde dan permethrin **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Perhatian** Jangan dicampur dengan produk lain. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan diminum, dan hindari terkena mata serta kulit **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan secara spraying, dipping setelah dilarutkan dalam air dengan dosis 1%, setara dengan 1 L/100 L air. Semprotkan 0,3 larutan yang sudah diencerkan per m². Fogging, thermofogging: 2 ml/m³, campurkan 2 L air Mefisto+0,3 L oil fogger (thermo additive) atau 2 L Mefisto+6 L air untuk 1.000 m³ **Kemasan** Jerigen 1 L, 5 L, 10 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 05032903 PTC. Obat bebas terbatas

103. MICROCID

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung iodium 30 mg dan kalium iodida 50 mg **Indikasi** Membunuh virus, bakteri dan jamur/fungi **Dosis dan Cara Pemakaian** Mencuci tangan dan ambing, sebelum dan sesudah diperah, untuk luka terbuka dan bagian yang akan dioperasi: 33 ml/10 L air. Desinfeksi kandang, bangunan, kendaraan, peralatan, tempat susu, tempat cuci kaki, mesin tetas, tempat pemerahan, rumah potong hewan: 25 ml/10 L air. Memberantas virus newcastle disease (ND/tetelo), virus avian influenza: 90 ml/10 L air **Kemasan** Botol 1 L dan jerigen 20 L **Deptan RI** No. D. 06093125 PTC. Obat bebas terbatas

104. MICRODES 100

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung benzalkonium chloride 10% **Indikasi** Desinfektan multiguna, aman dan non korosif **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, sepatu: 6 ml/L air. Desinfeksi kandang bekas wabah penyakit: 15 ml/L air. Cuci tangan sebelum operasi dan desinfeksi daerah operasi (dokter hewan praktek): 10 ml/L air. Desinfeksi alat-alat perusahaan susu: 2 ml/L air. Desinfeksi alat-alat perusahaan daging: 2,5 ml/L air. Supaya telur lebih tahan lama bila disimpan: 10 ml/L air (rendam telur dalam larutan selama 40 detik) **Kemasan** Botol 1 L dan jerigen 20 L **Deptan RI** No. D. 06093126 PTC. Obat bebas terbatas

105. MICROGEN FARM DESINFECTANT

Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/

Lisan Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde, alkylbenzylidimethyl ammonium chloride, pine oil dan terpineol **Indikasi** Desinfektan yang bersifat virusidal, bakterisidal dan fungisidal pada peralatan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 08013381 PTC. Obat bebas terbatas

106. MIKROSID

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung sodium-p-toluensulfonklamamide

50 mg **Indikasi** Desinfeksi untuk bakteri, virus dan jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfektan kandang dan peralatan: 4 ml/L air atau 16 ml/L air setelah terjadi infeksi viral. Desinfeksi incubator dan hatchery: 16 ml/L air. Desinfeksi air: 30 ml/1.000 L air. Irigasi uterus: 40 ml/960 ml air. Desinfeksi kolam ikan: 8 ml/1.000 L air **Kemasan** 1 L, 5 L, 20 L dan 200 L **Deptan RI No. D.** 02112283 PTC. 1. Obat bebas terbatas

107. MULTICIDE **Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung alkyl-dimethylbenzylammoniumchloride, didecyldimethylammoniumchloride, glutaraldehyde, isopropanol dan propyleneglycol **Indikasi** Sebagai desinfektan pada kandang dan peralatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI No. I.** 13014432 PTS.

108. MULTICIDE 150 **Meriden Animal Health Ltd, Inggris/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung gluteraldehyde dan dimetyl cocobenzyl chloride **Indikasi** Desinfeksi kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang dan foging kandang: pengenceran 1:150. Dipping putting susu pada sapi perah dan desinfeksi telur: pengenceran 1:200. Desinfeksi air minum: pengenceran 1:3.000. Cuci kaki: pengenceran 1:50 **Kemasan** Jerigen 5 L dan 20 L **Deptan RI No. I.** 07032415 FTC. 1. Obat bebas terbatas

109. MULTIDES **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde, coco dimethyl benzyl ammonium chloride, formalin dan Isopropanol **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi rutin: 5-7 ml/L air. Desinfeksi jamur/protozoa: 1 ml/L air. Semprot kandang: 2,5 ml/L air **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L **Deptan RI No. D.** 08063449 PTC. Obat bebas terbatas

110. MULTISEPT **Multifarma Satwa Maju**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung cethyl pyridium chloride (CPC) 1% b/v, cetyl pyridium ammonium bromide (CTAB) 2% b/v dan benzalkonium chloride 2% b/v **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap cethyl pyridinium chloride, cethyl trimethyl amonium bromide dan benzalkonium chloride **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi tempat pakan, tempat minum dan peralatan lainnya: 15 cc/10 L. Sterilisasi air minum untuk mencegah penularan penyakit: 3 cc/10 L air **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. D.** 04092804 PTC. Obat keras

111. NEO ANTISEP **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung 3% iodium aktif **Indikasi** Membasmi virus yang ada di kandang, tempat ransum, tempat minum, mesin tetas dan peralatan lain. Membasmi virus penyebab penyakit ND, PMK, IB dan cacar. Membasmi bibit penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Mencegah penularan penyakit pada waktu ada wabah

dengan menyemprotkan dan menyucihamakan peralatan kandang. Mencegah mastitis pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mengobati cacar, luka, dsb. Oleskan pada tempat yang luka. Untuk cuci kandang, mesin tetas dan peralatan lainnya: 9 ml tiap 5 L air. Mencegah penularan penyakit lewat udara, jika ada wabah (ND ds.): 15 ml tiap 1,5 L air, disemprotkan ke seluruh kandang. Mencegah penularan penyakit lewat air minum: 3 ml tiap 7,5 L air minum. Mencegah mastitis, dipakai untuk membersihkan ambing sebelum dan sesudah diperah: 18 ml tiap 100 ml air **Kemasan** Botol plastik isi 20 ml, 60 ml, 120 ml dan 1 L. Jerigen isi 5 L, 20 L dan 60 L **Deptan RI** No. D. 0604835 PTC. 2. Obat bebas terbatas

112. NEO ANTISEP NEW FORMULA

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung povidone iodine 5% **Indikasi** Membasmi virus yang ada di kandang, tempat ransum, tempat minum, mesin tetas dan peralatan lain. Membasmi virus penyebab penyakit ND, PMK, IB dan cacar. Membasmi bibit penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Mencegah penularan penyakit pada waktu ada wabah dengan menyemprotkan dan menyucihamakan peralatan kandang serta mencegah mastitis pada sapi **Perhatian** Jangan mencampur obat dengan larutan sabun. Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mengobati cacar, luka dsb: oleskan pada tempat yang luka. Untuk cuci kandang, mesin tetas dan peralatan lainnya: 9 ml tiap 5 L air. Mencegah penularan penyakit lewat air minum: 3 ml tiap 7,5 L air. Mencegah penularan penyakit lewat udara, jika ada wabah (ND dsb): 15 ml tiap 1,5 L air. Mencegah mastitis: 18 ml tiap 100 ml air dan dipakai untuk membersihkan ambing sebelum dan sesudah diperah. Setelah dibersihkan dengan neo antisept new formula, lakukan pembilasan pada ambing dengan air bersih **Kemasan** Botol plastik 1 L dan jerigen 20 L **Deptan RI** D. 11013991 PTC. Obat bebas terbatas

113. NEO ULTRADES

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung glutaraldehyde 30% w/v dan benzalkonium chloride 20% w/v **Indikasi** Untuk desinfeksi dan sanitasi kandang dan peralatan, telur tetas dan air minum ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/800 L air (1:800) untuk desinfeksi kandang dan peralatan ternak. 1 L/1.200 L air (1:1.200) untuk sanitasi telur tetas. 1 L/6.000 L air (1:6.000) untuk sanitasi air minum ternak **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No D. 07083268 PTC. Obat bebas terbatas

114. OMNICIDE **Coventry Chemicals Ltd, Inggris/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehyde dan QAC **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:400 untuk semprot kandang **Kemasan** Botol plastik 100 ml, 1 L, 5 L dan drum 200 L **Deptan RI** No. I. 05021242 PTC. 2. Obat bebas terbatas

115. OO – CIDE **Antec International-A DuPont Company, Inggris/SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Kemasan I: ammonium chloride. Kemasan II: sodium hidroksid **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara**

Pemakaian Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet berisi 2 sachet kecil yaitu Oocide pack No.1 masing-masing 1,46 kg dan Oocide pack No. 2 masing-masing 1,65 kg **Deptan RI** No. I. 06063083 PTS. Obat bebas terbatas

116. OPTICIDE

Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehid dan QAC **Indikasi** Sebagai antiseptik dan desinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** System air 1:150. Peralatan peternakan 1:150. Footdipping 1:50. Fowl pest (ND, fowl plaque) 1:125. Pengasapan dengan ternak dalam kandang 1:150. Kontrol fungi 1:50 **Kemasan** 1 L, 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. **03062037 PTC. 1. Obat bebas terbatas**

117. PACOM – A

Samu Median, Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung octyldecyl dimethyl ammonium chloride 2,250%, dioctyl dimethyl ammonium chloride 1,125%, didecyl dimethyl ammonium chloride 1,125% dan alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 3% **Indikasi** Desinfektan peternakan dan pembibitan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1:300 **Kemasan** Jerigen 18 L **Deptan RI** No. I. 09061034 PTC. 1. Obat bebas terbatas

118. PANKILL

Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung potassium peroxymonopersulphate, sodium dichloroisocyanurate, sulphamic acid, sodium hexamethaphosphate dan sodium dodecylbenzene **Indikasi** Sebagai desinfektan pada kandang dan peralatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Kantung 1 kg **Kementan RI** No. I. 13014431 PTS.

119. PHENVIRO PLUS

Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan coklat tua **Komposisi** Mengandung cresol yang diperkaya dengan phenol 45% **Indikasi** Desinfektan phenol yang berspektrum luas. Kandungan surfaktan tinggi untuk desinfeksi akhir sebelum pengisian kandang, desinfeksi roda dan alas kaki. Untuk tujuan umum dan untuk jenis penyakit tertentu **Kontra Indikasi** Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi akhir sebelum pengisian kandang 1:200. Desinfeksi roda dan alas kaki 1:100. Desinfeksi umum 1:200. Desinfeksi jenis penyakit tertentu 1:240 **Kemasan** 1 L, 4x5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 07113351 PTC. Obat bebas terbatas

120. PINOCID

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde, benzalkonium chloride dan pine oil **Indikasi** Untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, alat-alat transportasi ternak, ruang penetasan dan mencegah menularnya penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-5 ml/L air untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan. 5 ml/L air untuk mencegah menularnya penyakit dan alat-alat transportasi ternak serta desinfeksi ruang penetasan **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 05042925 PTC. Obat bebas terbatas

121. PRIMA CUATS – 30

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung benzalkonium chloride 200 g dan isopropanol 90 g **Indikasi** Desinfeksi dan sanitasi kandang, peralatan air minum dan lingkungan kandang sebelum dan setelah pemakaian. Desinfeksi lingkungan luar dan dalam kandang selama pemeliharaan atau selama terjadinya penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 1 L, 5 L, dan 20 L **Deptan RI** No. D. 02112453 PTC. Obat bebas terbatas

122. PRIMA IODINE – 33

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung iodine komplek 10% (eq. iodine complex 3%) **Indikasi** Untuk sanitasi dan desinfeksi kandang dan peralatan kandang, serta cuci tangan dan kaki **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 1 L, 5 L, dan 20 L **Deptan RI** No. D. 02112454 PTC. Obat bebas terbatas

123. PRIMACIDE – 200

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehid 300 g, cocobenzildimetil ammonium chloride 200 g dan isopropanol 90 g **Indikasi** Untuk desinfeksi dan sanitasi kandang, peralatan, air minum dan lingkungan kandang sebelum dan setelah pemakaian atau setelah infeksi atau wabah penyakit viral, bacterial dan fungal. Desinfeksi lingkungan luar dan dalam kandang selama pemeliharaan atau selama terjadinya penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 03032546 PTC. Obat bebas terbatas

124. PRIMADES

Delta Prima Agrindo

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung benzalkonium quartener 10% **Indikasi** Desinfeksi kandang dan sanitasi air minum. Dapat membunuh virus, bakteri dan fungi **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang: 60 ml/10 L air minum. Desinfeksi air minum 3 ml/10 L air **Kemasan** Botol 100 ml, jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 10123972 PTC.

125. PRIMADINE

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung iodium 3 g **Indikasi** Untuk desinfeksi kandang, peralatan dan lingkungan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang, peralatan, mesin tetas, foot dipping, tempat pakan dan minum: 1-2 ml/L air. Desinfeksi ruangan/bangunan, rumah potong hewan dan tempat pemerahan susu: 1-2 ml/L air. Sterilisasi air: 1 ml/3 L air **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 09103714 PTC. Obat bebas terbatas

126. PRISTAM

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung alkyldimethyl benzyl ammonium chloride dan glutaraldehyde **Indikasi** Untuk desinfeksi kandang, peralatan dan lingkungan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi rutin, mesin tetas dan alat transportasi peternakan: 5 ml/L air. Desinfeksi kandang kosong dan sebagai pengganti fumigasi kandang: 10 ml/L air **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 09023565 PTC. Obat bebas terbatas

127. PROPHYL

Coophavet Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung 4-chloro 3-methylphenol 100 g dan 2-benzyl 4-chlorophenol 50 g **Indikasi** Desinfeksi dan sanitasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk desinfeksi lantai dan dinding kandang: 5 ml dilarutkan dalam 1 L air. 1 L larutan untuk luas 4 meter². Untuk bak cuci kandang/dipping kaki: 10 ml dilarutkan dalam 1 L air. Untuk desinfeksi lingkungan sekitar kandang: 10 ml dilarutkan dalam 1 L air **Kemasan** 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 05022870 PTC. Obat bebas terbatas

128. PVP IODINE 50 G

Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung PVP iodine **Indikasi** Iodine adalah desinfektan spektrum luas yang digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan, klinik dokter hewan dan untuk digunakan sebagai sanitasi air minum ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/500 L air untuk desinfeksi tangan, ambing, tempat operasi dan luka terbuka. 3 L/2.000 L air untuk desinfeksi bangunan maupun peralatan pada pengolahan susu. 1 L/1.000 L air untuk desinfeksi mesin tetas dan peralatannya, kandang serta rumah potong hewan. 1 L/4.000 L air untuk sanitasi air minum ternak **Kemasan** Botol 100 ml, jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 09113747 PTC. TM. Obat bebas terbatas

129. PYROSPLASH

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung glutaraldehyde 58 g, formaldehyde 84 g, benzalkonium chloride 61,5 g dan isopropanol 40 g **Indikasi** Desinfektan yang efektif membasmi berbagai macam virus penyebab penyakit seperti: flu burung (avian influenza), newcastle disease (ND), swollen head syndrome (SHS), avian encephalomyelitis (AE), gumboro, marek, egg drop syndrome (EDS), dll. Aktif membunuh berbagai macam bakteri g (+) dan (-), jamur (termasuk spora) serta protozoa penyebab penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Semprot: larutkan 2,5-5,0 ml ke dalam setiap L air. Mencuci peralatan kandang: 4 ml dilarutkan dalam setiap L air. Pengasapan: 1,5 L untuk setiap 1.000 m³ **Kemasan** 1 L, 5 L dan 30 L **Deptan RI** No. D. 07073244 PTC. Obat bebas terbatas

130. QUAT 50

Kilco International, Scotland/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan kuning pucat Komposisi Mengandung amonium quarterner **Indikasi** Agen pembersih yang kuat, konsentrasi tinggi, aktifitas biocidal, efektif terhadap biofilm **Kontra Indikasi** Toksik terhadap hewan akuatik **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebelum pencucian 1:100 dengan pencuci bertekanan 3.000 psi. Sebelum pencucian 1:100 dengan pencuci bertekanan 3000 psi. Saat pencucian 1:20 dengan alat pencuci bertekanan 3000 psi. Tempat makan dan minum 1:200. Semua peralatan sebaiknya dibilas setelah pembersihan **Kemasan** 4x5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 07113352 PTC. Obat bebas terbatas

131. RODALON

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung cetylpyridinium chloride 1%, cetylrimethyl ammonium bromide 2% dan benzalkonium chloride 2% **Indikasi** Desinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfektan ruangan, semua peralatan kandang, telur tetas dan bak pencuci kaki

disemprot/dicuci: 15 ml/10 L air. Desinfektan kandang pada saat kosong disemprot/cuci: 40 ml/L air. Sterilisasi air minum ternak: pengenceran 3 ml/10 L air minum. Mendesinfeksi sayuran dan pakan ternak: pengenceran 5 ml/10 L air minum. Pada wabah ND: pengenceran 80 ml/10 L air. Luka-luka cacar atau akibat kanibalisme: dioleskan 60 ml/10 L air. Desinfeksi tangan, ambing sebelum diperah, bagian yang akan dioperasi dan luka-luka terbuka: dioleskan/dicuci 20 ml/10 L air **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 30 L **Deptan RI** No. D. 0211386 PTC.

2. Obat bebas terbatas

132. SANITAS – 151

Mitravet

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung glutaraldehide 15% dan benzalkonium chloride 10% **Indikasi** Desinfeksi kandang, sanitasi peralatan dan sterilisasi air minum terhadap virus, bakteri dan jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi kandang: 6,7 ml/L. Sterilisasi air minum: 0,2 ml/L **Kemasan** 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 03092626 PTC. TM. Obat bebas terbatas

133. SANIVIR

Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehide 15% dan didecyl dimethyl ammonium chloride 10% **Indikasi** Efektif untuk bakteri g (+) dan (-), virus beramplop dan yang tidak beramplop, jamur dan spora bakteri. Untuk disinfeksi klinik, fasilitas dan peralatan di peternakan, RPH dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dengan pengenceran: 1:100-1:400. Penyemprotan: 100-300 ml/m² tergantung kondisi permukaan. Untuk fumigasi: 1:150 **Kemasan** 250 ml, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 05022866 PTC. Obat bebas terbatas

134. SANIVIR PLUS

Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehide 15%, didecyl dimethyl ammonium chloride 10% dan cypermethrin 10% **Indikasi** Disinfeksi dan insektisida untuk rumah sakit, klinik, laboratorium, industri, RPH, truk, kandang unggas, babi, dan sapi, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan dengan air. Dosis yang dianjurkan: 1 L/300 L air. Dosis untuk efek maksimum: 1 L/100 L air. Berikan 1 L larutan untuk 10 m² **Kemasan** 250 ml dan drum 200 L **Deptan RI** No. I. 07043211 PTC. Obat bebas terbatas

135. SARAKILL

Choong Ang Biotech, Korea/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap l mengandung alkilpoliaminoetilglisin HCl (50%) 140 g dan polioksietilen alkilfenileter 30 g **Indikasi** Desinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** Semprot kandang: 1.500. Semprot peralatan: 1.500. Mesin susu: 11.000. Ambing dan puting sapi: 1.500-1.000. Kulit dan luka: 11.000. Uterus: 11.000. Air minum: 11.000. Semprot pada tubuh hewan: 1.500-1.000 **Kemasan** Botol plastik 1 L, 5 L jirigen dan 200 L **Deptan RI** No. I. 06061660 PKC. 2. Obat keras

136. SEPTIDES

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung benzalkonium chloride 10% **Indikasi** Sebagai antiseptik, desinfektan, sanitiser dan fungisid untuk membersihkan peralatan

perusahaan susu atau daging, kandang dan peralatan peternakan, klinik hewan serta air minum ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 ml/10 L air untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, sepatu dan mesin tetas. 5 ml/10 L air untuk desinfeksi air minum ternak. 25 ml/10 L air untuk desinfeksi alat-alat perusahaan susu ataupun pengolahan daging. 20 ml/10 L air untuk desinfeksi maupun sterilisasi di klinik hewan **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Kementan RI** No. D. 12032089 PTC. 2. Obat bebas terbatas

137. SEPTISAN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride dan etanol **Indikasi** Digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 ml/L air untuk desinfeksi kandang, tempat pakan dan minum, mesin tetas, sepatu kandang. 1 ml/L air untuk desinfeksi alat-alat operasi **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. D. 08023390 PTC. Obat bebas terbatas

138. SEPTOCID

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung povidone iodine 2% **Indikasi** Membasmi bakteri, jamur, virus, dan kuman-kuman penyebab penyakit utama pada unggas, ternak besar dan manusia **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi ruangan kandang, peralatan, tempat makan dan minum: 17 cc/10 L air. Desinfeksi kandang bila terjadi wabah penyakit: 100 cc/10 L air. Desinfeksi tangan, ambing dan luka: 33 cc/10 L air. Desinfeksi air minum ternak: 5 cc/10 L air. Penyakit mulut dan kuku: 50 cc/10 L air **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L **Kementan RI** No. D. 12061299 PTC. 2. Obat bebas terbatas

139. SHIFT

Evans Vanodine International PLC, England/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sodium hydroxide **Indikasi** Berfungsi sebagai bakterisidal, fungisidal dan virusidal **Kontra Indikasi** Dapat menyebabkan iritasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Kalibrasi tekanan pencucian dengan pengaturan pelarutan yang benar sebelum digunakan. Untuk kotoran banyak pelarutan 1:250 dengan air dan untuk kotoran ringan pelarutan 1:500. Basahi semua permukaan dengan menggunakan larutan ini dengan tekanan rendah, biarkan terendam minimal selama 15 menit sampai mencapai efek penetrasi maksimum dan kotoran terangkat. Kemudian lanjutkan pencucian dengan menggunakan tekanan tinggi hingga seluruh permukaan menjadi bersih **Kemasan** Jerigen polyethylene (HDPE) 5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 07073251 PTC. Obat bebas terbatas

140. SIERADES

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung PVP Iodine 50 mg **Indikasi** Sebagai desinfektan spektrum luas yang digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan peternakan, klinik dokter hewan dan digunakan untuk sanitasi air minum ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/500 L air (1:500) untuk desinfeksi tangan, ambing, tempat operasi dan luka terbuka. 3 L/2.000 L air (3:2.000) untuk desinfeksi bangunan maupun peralatan pada pengolahan susu. 1 L/1.000 L air (1:1.000) untuk desinfeksi mesin tetas dan peralatannya, kandang, serta rumah potong hewan. 11 L/4.000 L air (1:4.000) untuk sanitasi air minum

ternak **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 05109522
PTC. 1. Obat bebas terbatas

141. SPECTARAL

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung dimethyl cocobenzyl ammonium chloride 20% dan glutaraldehyde 30% **Indikasi** Untuk membunuh semua virus, bakteri dan jamur patogen pada ternak dengan mendesinfeksi air minum, kandang, peralatan mesin tetas, telur dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi peralatan dan kandang: 10 ml/8 L air. Desinfeksi kandang bekas wabah AI, ND, gumboro, IB dan penyakit lain: 10 ml/2,5 L air. Desinfeksi telur: 5 ml/6 L air. Desinfeksi air minum ternak: 1 ml/6 L air **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. D. 04102820 PTC. Obat bebas terbatas

142. SPECTARAL – 25

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung dimethyl cocobenzyl ammonium chloride 10% dan glutaraldehyde 15% **Indikasi** Untuk membunuh semua virus, bakteri dan jamur patogen pada ternak dengan mendesinfeksi air minum, kandang, peralatan mesin tetas, telur dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi peralatan dan kandang: 10 ml/4 L air. Desinfeksi kandang bekas wabah AI, ND, gumboro, IB dan penyakit lain: 10 ml/2 L air. Desinfeksi telur: 5 ml/3 L air. Desinfeksi air minum ternak: 1 ml/3 L air **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 25 L **Kementan RI** No. D. 11124180 PTC. Obat bebas terbatas

143. SPORADES

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap 100 ml mengandung glutaraldehyde 15 g dan alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride 10 g **Indikasi** Desinfeksi kandang dan peralatan. Desinfeksi inkubator (mesin tetas) dan peralatannya. Desinfeksi alat transportasi, dan keranjang ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 ml tiap 20 L air, disemprotkan ke seluruh bagian kandang seluas 67 m² **Kemasan** Botol plastik 100 ml. Jerigen 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 0607987 PTC. 1. Obat bebas terbatas

144. STERILE DILUENT

Sante Animale, Perancis /Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung glutaraldehyde dan alkyl dimethylbenzyl **Indikasi** Desinfektan bersifat bakterisidal, fungisidal dan virusidal **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebagai bakterisidal dosis yang diberikan 0,05%-0,1%. Sebagai fungisidal dosis yang diberikan 0,25%-1,0%. Sebagai virusidal dosis yang diberikan 0,1%-0,5%. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada kemasan **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 09033601 PTC. Obat bebas terbatas

145. STERILIDES

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 120 g dan isopropyl alkohol 50 g **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Dosis dan**

Cara Pemakaian 6 ml/L air **Kemasan** Jerigen 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 08063454 PTC. Obat bebas terbatas

146. SUPER BIOSECURITY

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung ammonium quartener 100 g dan glutaraldehyde 150 g **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Perhatian** Dalam penggunaannya jangan diberikan bersamaan dengan sabun karena akan menetralkan fungsi dari ammonium quaterner **Dosis dan Cara Pemakaian** 1:200 **Kemasan** Jerigen 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 08063453 PTC. Obat bebas terbatas

147. SUPER IODOCIDE

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung iodine 30 g dan kalium iodida 50 g **Indikasi** Antiseptik dan desinfektan pada kandang, peralatan kandang dan ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi air minum: 5 ml/10 L air minum. Disinfeksi kandang ayam/hewan dan peralatan peternakan: 20 ml/10 L air minum **Kemasan** Jerigen @ 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 08073465 PTC. Obat bebas terbatas

148. SUPERVETACLEAN

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung zat aktif dimethyl coco benzyl ammonium chloride 10% dan glutaraldehyde 15% yang bekerja secara sinergis dan bersifat sangat reaktif terhadap kuman penyakit **Indikasi** Sebagai desinfektan broadspektrum yang ampuh memusnahkan berbagai kuman patogen antara lain virus, bakteri, spora, Mycoplasma, cendawan, jamur beserta ookista eimeria **Dosis dan Cara Pemakaian** Bervariasi dari 1:50 sampai 1:1.000 tergantung spesies dan tujuan penggunaannya **Kemasan** 500 ml, 2 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 99121672 FTS. 2. Obat bebas terbatas

149. SYNERGIZE

Preserve International, Amerika Serikat/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 26%, glutaraldehyde 7% dan terpine oil 3% **Indikasi** Disinfektan **Dosis dan Cara Pemakaian** Cuci kandang dan peralatan hatchery: 4 cc/L air. Fumigasi kandang sebelum masuk ayam: 8 cc/L air. Fumigasi kandang (dan penambahan sekam): 20 cc/L air. Termofogging 11 **Kemasan** 1 L, 1 gallon dan 1 drum **Deptan RI** No. I. 0601411 PTC. 1. Obat bebas terbatas

150. TEK – TROL

Bio-Tek Industries Inc, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung orthophenylphenol, ortho-benzyl-parachlorophenol dan para-tertiary-amylophenol **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 4 ml/L air **Kemasan** Gallon 3,8 L **Deptan RI** No. I. 05021419 PTC. 2. Obat bebas terbatas

151. TERMINATOR

Bayer New Zealand/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung glutaraldehyde 150 g dan

cocobenzyl dimethyl ammonium chloride (QAC) 100 g **Indikasi** Desinfektan yang efektif untuk bakteri, fungi dan virus **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk semprot kandang: gunakan larutan terminator sebanyak 3%. Untuk air minum: gunakan larutan terminator sebanyak 1% **Kemasan** Jerigen 1 L dan 20 L **Kementan RI** No. I. 12051712 PTC. 2. Obat bebas terbatas

152. THE ONE

Woogene B&G – Korea Selatan/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan kental **Komposisi** Mengandung iodoform kompleks dan gliserin **Indikasi** Antiseptik puting sebagai pencegahan mastitis **Dosis dan Cara Pemakaian** Setelah proses pemerahan, celupkan setiap puting dengan sejumlah The One **Kemasan** 1 galon, 1 L, 5 L, 10 L dan 20 L **Kementan RI** No. I. 12054279 PTC. Obat bebas terbatas

153. TH4 +

Sovegal SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Cairan (larutan desinfeksi) **Komposisi** Mengandung didecyl dimethyl ammonium chloride, dioctyl dimethyl ammonium chloride, octyl decyl methyl ammonium chloride, alkyl dimethyl ammonium chloride dan glutaraldehyde **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Perhatian** Jangan dicampur dengan produk lain. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, Jangan diminum, hindari terkena mata dan kulit **Dosis dan Cara Pemakaian** Spraying - Pemakaian rutin: 5 ml dilarutkan dalam 1 L air. Penanganan penyakit spesifik tergantung kasus penyakit. Thermofogging: 2,5 L dilarutkan dalam 2,5 L air, campuran 5 L larutan tersebut untuk 1.000 m³. Dipping - Pemakaian rutin: 1 L dilarutkan dalam 100 L air, diganti minimal 1 minggu sekali. Penanganan penyakit spesifik: 1 L dilarutkan dalam 50 L air **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 05071530 PTC. 2. Obat bebas terbatas

154. TOLACOX

Pharma Swede, Mesir/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Larutan kuning pucat **Komposisi** Mengandung toltrazuril **Indikasi** Untuk pengobatan koksidiosis pada ayam, kalkun dan angsa **Perhatian** Sebaiknya tidak diberikan pada unggas yang dalam 14 hari akan memasuki masa awal bertelur atau pada unggas yang menghasilkan telur untuk konsumsi manusia **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi ayam, kalkun dan angsa: 1 ml/1 L air minum (25 ppm) untuk dua hari **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI** No. I. 11064103 PKC. Obat bebas terbatas

155. TWENTY 1 WP

Belgagry SA., Belgia/Totwo Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung azamethiphos 10% **Indikasi** Untuk membasmi lalat pada kandang ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 125 g/5 L air hangat dan semprotkan pada permukaan seluas 100 m². Campurkan 250 g/2 L air hangat dan semprotkan ditempat lalat hinggap **Kemasan** Kantong 100 g, 500 g dan 1 kg **Kementan RI** No. I. 13034470 PTS. Obat keras

156. ULTRADES

Bioteck Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung glutaraldehyde 15% w/v dan dimethyl coco benzyl ammonium chloride 10% w/v **Indikasi** Untuk desinfeksi dan sanitasi kandang dan peralatan, telur tetas dan air minum ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/400 L

air (1:400) untuk desinfeksi kandang dan peralatan ternak. 1 L/600 L air (1:600) untuk sanitasi telur tetas. 1 L/3.000 L air (1:3.000) untuk sanitasi air minum ternak **Kemasan** Botol 10 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Kementan RI** No. D. 12062119 PTC. 2. Obat bebas terbatas.

157. ULTRADES PLUS

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung glutaraldehyde 32% w/v, coco benzyl ammonium chloride 22% w/v dan isoprophyl alkohol 7% w/v **Indikasi** Untuk desinfeksi dan sanitasi kandang dan peralatan, telur tetas dan air minum ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/800 L air (1:800) untuk desinfeksi kandang dan peralatan ternak. 1 L/1.200 L air (1:1.200) untuk sanitasi telur tetas. 1 L/6.000 L air (1:6.000) untuk sanitasi air minum ternak **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 10013767 PTC. Obat bebas terbatas

158. ULTRAXIDE

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap L mengandung glutaraldehyde 15% dan ammonium quarternær 10% **Indikasi** Disinfektan berspektrum luas **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan umum 1:400–1:150. Penggunaan di air minum 1: 3.000 **Kemasan** Botol 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. I. 06083111 PTC. Obat bebas terbatas

159. VANODOX

Evans Vanodine International PLC, England/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung peracetic acid dan quarternary ammonium propionate (N,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl) ammonium propionate **Indikasi** Desinfektan yang dapat bekerja sebagai bakterisidal yang efektif terhadap Bordetella bronchoseptica, Campylobacter jejuni, Enterococcus faecalis/hirae, E. coli, E. coli 0157, L. interrogans, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus dan Streptococcus suis; fungisidal terhadap Aspergillus niger dan Candida albicans; virusidal terhadap Aujeszky, Bovine rotavirus, PMK, IBD, ND, penyakit pernafasan pada babi, serta virus penyebab gastroenteritis yang menular **Kontra Indikasi** Dapat menyebabkan iritasi kulit maupun mukosa permukaan tubuh dan apabila terhirup dapat menyebabkan gangguan pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Encerkan dengan perbandingan 1:100 atau 1:300 dengan menggunakan air panas atau air dingin untuk pembersihan kandang. Perbandingan 1:200 untuk pencelupan kaki dan ban. Perbandingan 1:300 untuk pembersihan peralatan dan rendam selama 30 menit, lalu bilas hingga bersih **Kemasan** Jerigen polyethylene (HDPE) 5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 07103319 PTC. Obat bebas terbatas

160. VANOQUAT

Evans Vanodine International PLC, England/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride **Indikasi** Desinfektan yang dapat bekerja sebagai bakterisidal untuk Enterococcus hirae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter monocytogenes, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium; fungistatik untuk Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger dan Candida albicans **Kontra Indikasi** Dapat menyebabkan iritasi **Dosis dan**

Cara Pemakaian Bersihkan kotoran secara manual terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal. Penggunaan dengan spray bertekanan: untuk satu tahap pembersihan menggunakan 1-2% v/v. Untuk mensanitasi menggunakan spray atau mist gunakan dosis 0,5%. Penggunaan secara manual: buat larutan 1-2% v/v dengan menggunakan air panas dan diaplikasikan dengan menggunakan penggosok. Biarkan selama 10 menit kemudian bilas dengan menggunakan air bersih. Untuk fogging aerial kandang ternak setelah dibersihkan, gunakan 0,5% v/v dengan menggunakan peralatan yang sesuai **Kemasan** Jerigen polyethylene (HDPE) 5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 07073252 PTC. Obat bebas terbatas

161. VETA DINE

Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung bahan aktif iodine 100 mg, kalium iodida 200 g, ethanol 0,09 ml, nipasol 1 g dan air suling qs **Indikasi** Untuk sterilisasi kandang dan peralatan kandang. Untuk cuci kaki dan tangan sebelum masuk kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L diencerkan dalam 5 L untuk sanitasi kandang tercemar ringan (normal). 1 L diencerkan dalam 2,5 L untuk sanitasi kandang tercemat berat (Wabah) **Kemasan** Botol 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 12054268 PTC. TM

162. VETA GUARD

Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 100 mengandung zat aktif Glutaraldehyde 30% (b/v), cocco benzyl ammonium chloride 20% (b/v), isopropanol dan air suling qs **Indikasi** Untuk sanitasi dan cuci hama kandang dan peralatan kandang, cuci tangan dan sepatu sebelum masuk kandang **Kontra Indikasi** Sebisa mungkin jangan diaplikasikan pada hewan yang sedang bunting, pada penelitian ammonium kuarterner dapat menyebabkan cacat atau masalah fertilitas pada hewan coba mencit **Dosis dan Cara Pemakaian** Sanitasi kandang/peralatan: 1 L diencerkan dalam 800 L air. Sanitasi akibat kontaminasi mikroorganisme seperti Gumboro, ND: 1 L diencerkan dalam 400 L air. Desinfeksi telur tetas: 1 L diencerkan pada 1.200 L air. Desinfeksi air minum: 1 L diencerkan pada 6.000 L **Kemasan** Botol 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 12044255 PTC. TMP

163. VETA QUAT

Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap g mengandung benzalkonium chlorida dan isopropanol **Indikasi** Sebagai desinfektan kandang dan peralatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Umum: 2 ml/L air. Air minum: 1 ml/L air. Telur tetas: 1 ml/L air. Kandang, klinik: 2 ml/L air **Kemasan** Botol @ 100 ml, 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 12094336 PTC. TM

164. VETIODINE

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung iodium 3% **Indikasi** Sebagai virusidal (virus gumboro, influenza, ND, marek's, pox, PML, rabies), bakterisidal (berbagai kuman g (+) dan (-), fungisidal dan fungistatik (Tricophyton spp, Epidermophyton spp, Monilia spp), yeast (Saccharomyces spp, Torula spp, Sporisidal, Bacillus spp, Clostridium spp), protozoasidal (Amoeba sp, Trichomonas spp) **Dosis dan Cara Pemakaian** Bervariasi

dari 1:300 sampai 1:2.500 tergantung tujuan penggunaannya **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 5 L
Deptan RI No. D. 01022039 PTC. 1. Obat bebas terbatas

165. VIBA ZONE

Samu Median, Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung triple salt (potassium peroxymonosulfate) 500 g dan malic acid 100 g **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Bervariasi dari 1 kg/100 L air (1:100) sampai 1 kg/2.500 L air (1:2500). Tergantung konsentrasi bahan material organik dan tujuan penggunaannya. Dengan cara diteteskan atau disemprot. **Perhatian** jangan diberikan bersamaan dengan desinfektan dan insektisida lain **Kemasan** Kantong aluminium 1 kg **Kementan RI** No. I. 12114394 PTS. Obat bebas terbatas

166. VIDONE

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung iodine **Indikasi** Untuk desinfeksi kandang, peralatan peternakan, alat-alat transportasi, sanitasi air minum dan celup puting **Dosis dan Cara Pemakaian** 17 ml/10 L untuk desinfeksi kandang dengan luas area 50 m². 17-25 ml/10 L untuk desinfeksi bangunan, kendaraan, mesin tetas, tempat cuci kaki, peralatan perah dan semua peralatan lain. 33 ml/10 L untuk cuci tangan, ambing sebelum perah, bagian yang akan dioperasi dan luka terbuka. 4 ml/10 L untuk sanitasi air minum ternak. 4-8 ml/10 L untuk celup puting sesudah pemerahan selama ± 30 detik untuk program pengendalian mastitis **Kemasan** 120 ml, 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 03042355 PTC. 1. Obat bebas terbatas

167. VIRAKIL NG

Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde dan alkyl dimethylbenzil **Indikasi** Desinfektan bersifat bakterisidal, fungisidal dan virusidal **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebagai bakterisidal dosis yang diberikan 0,05%-0,1%. Sebagai fungisidal dosis yang diberikan 0,25%-1,0%. Sebagai virusidal dosis yang diberikan 0,1%-0,5%. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada kemasan **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 09033601 PTC. Obat bebas terbatas

168. VIREX

Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk berwarna merah muda **Komposisi** Mengandung potassium monosulphate, sodium hexametaphosphate, sulphamic acid, malic acid, sodium dichloroisocyanurate anhydrous dan sodium alkyl benzene sulfonate **Indikasi** Efektif terhadap virus, bakteri gram negatif dan positif serta bersifat fungisidal. Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Kontra Indikasi** Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi permukaan dan peralatan 1:300 dengan pencuci bertekanan 500 psi. Sanitasi air pada saat ayam dikandang 1:1000, dan jangan gunakan produk 48 jam sebelum pemberian vaksin atau vitamin. Sanitasi pada akhir pemeliharaan 1:200 (untuk header tang dan sistem pengairan). Kejadian penyakit tertentu PMK 1:1300, penyakit unggas 1:300, penyakit vesicular

babi 1:200, salmonellosis atau pemakaian umum 1:112 **Kemasan** Wadah sachet 100 g, HDPE 2 kg, 5 kg dan 10 kg **Deptan RI** No. I. 08083483 PTC. Obat bebas terbatas

169. VIRIDAN

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzalkonium chloride 20% dan glutaraldehyde 30% **Indikasi** Desinfektan untuk lantai, dinding, peralatan kandang dan peternakan serta alat-alat transportasi dan ruang penetasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L, 5 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 08053438 PTC. Obat bebas terbatas

170. VIRKON S

Antec International-DuPont Company, Inggris/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung KMPS (triple sal yang terdiri dari potasium monopersulfate, potasium hydrogen sulfate, potasium sulfate) dan sodium dodecyl benzene sulphonate **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g/L **Kemasan** Sachet 5 g, 50 g, 100 g, 500 g, pail 1 kg, 2,5 kg, 5 kg dan bucket 10 kg **Deptan RI** No. I. 06103142 PTS. Obat bebas terbatas

171. VIROCID

CID Lines, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung alkil dimetil benzyl ammonium klorid **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L, 5 L, 120 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 02112494 PTC. Obat bebas terbatas

172. VIROGUARD

Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan jernih transparan **Komposisi** Mengandung amonium quaterner, glutaraldehyde dan formaldehyde **Indikasi** Desinfektan berdasarkan aldehid yang memiliki aktifitas berspektrum luas, efektif melawan organisme dan tidak korosif **Kontra Indikasi** Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Dapat diaplikasikan secara manual maupun dengan penyemprot busa bertekanan 3000 psi. Desinfeksi permukaan dan peralatan 1:175. Kejadian penyakit tertentu pada unggas 1:175 **Kemasan** 4x5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 08043420 PTC. Obat bebas terbatas

173. VIROPHOR

Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan coklat tua **Komposisi** Mengandung iodine 2,8% w/v **Indikasi** Desinfektan iodophor yang berspektrum luas dan stabil untuk desinfeksi permukaan hatchery dan inkubator, rak penetasan, area pemecahan telur, tempat makan dan minum, alas kaki, bangunan kandang dan sistem air **Kontra Indikasi** Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Perhatian** Jangan menambah air ke dalam produk ini **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi pada saat ayam dalam kandang 1:2.500. Desinfeksi akhir pemeliharaan dan umum 1:185 **Kemasan** 4x5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 09083702 PTC. Obat bebas terbatas

174. VIROTEC **Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan kuning terang **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde dan amonium quaterner **Indikasi** Desinfektan berbentuk busa yang memiliki aktifitas berspektrum luas, efektif melawan organisme dan tidak korosif **Kontra Indikasi** Toksik terhadap ikan dan hewan akuatik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi permukaan dan peralatan 1:165 dengan pencuci bertekanan 3000 psi. Kejadian penyakit tertentu ND 1:165. Pastikan seluruh permukaan tertutup busa **Kemasan** 4x5 L, 25 L dan 200 L **Deptan RI** No. I. 08043408 PTC. Obat bebas terbatas

175. VIRTOX **Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung diemethyl coco benzyl, ammonium chloride 20% dan glutaraldehyde 30% **Indikasi** Desinfektan yang bersifat virusidal, bakterisidal dan fungisidal **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L dilarutkan dalam 400 L air untuk cuci tangan/sepatu. 1 L dilarutkan dalam 250 L air untuk sanitasi kandang dan peralatan **Kemasan** Botol plastik 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 0106823 PTC. Obat bebas terbatas

176. VIRUCIDAL EXTRA **AVS, Irlandia Utara/Agro Makmur Sentosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung potassium monosulphate 50%, sodium di-chloroisocyanurate 5%, sulphamic acid 15%, sodium hexametaphosphate 24% dan sodium do-decylbenzene sulphonate 5% **Indikasi** Desinfektan efektif membasmi semua virus, bakteri g (-) dan (+). Virucidal extra telah direkomendasikan membasmi berbagai penyakit viral. Seperti EDS, African Swine Fever, Newcastle, Foot and Mouth, SVD, Bursals (Gumboro), Avian Influenza, Infectious Bronchitis, Mareks, Sheep pox, Infectious Laryngotracheitis, Blue Tongue. Selain itu bisa untuk Anthrax, Brucellosis, Contagious Bovine Pleuro pneumonia, glanders, E. coli, Mycoplasma gallisepticum. **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air hangat kemudian semprotkan ke permukaan. Perbandingan (Kg/L) PMK: 1:300. ND dan gumboro: 1:250. E. Coli: 1:75. M. Gallisepticum: 1:112. Candida albicans: 1:800. AI: 1:300, dll **Kemasan** 100 g **Deptan RI** No. I. 04032376 PTS.1. Obat bebas terbatas

177. VIRUKILL **ICA Laboratories, South Africa/Novindo Agritech Utama**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung didecyl dimethyl amonium chloride **Indikasi** Desinfektan kandang dan peralatan kesehatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mencuci dan membersihkan permukaan 200 ml/100 L air. Semprotkan 0,5-1 L/m² pada permukaan dan bilas setelah 30 menit. Desinfeksi semua tempat hewan, permukaan, peralatan, mesin tetas dan membilas saluran air: 1L/100 L air. Rendaman kaki: 1 L/25 L air dan isi kembali setiap 2-3 hari, ganti apabila kotor. Air minum: 100 ml/1.000 L air, digunakan secara spray atau fogging. Desinfeksi telur tetas: 1 L/100 L air, di anjurkan temperatur larutan yang di semprotkan sama dengan telur tetas **Kemasan** 1 L, jerigen 20 L dan jerigen 200 L **Deptan RI** No. I. 12122500 PTC. 1. Obat bebas terbatas

178. VIRUS KLIN **Katraco Santika**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde dan benzalkonium chloride

Indikasi Desinfeksi kandang dan peralatan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 ml/L air untuk semprot kandang **Kemasan** 5 L dalam gallon plastik **Deptan RI** No. D. 09023554 PTC. Obat bebas terbatas

179. YODOR – VEX

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung iodum **Indikasi** Antiseptik dan desinfektan (kandang, alat-alat peternakan, air minum dan ruangan tertutup) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dinding, lantai dan permukaan lainnya: 5-7 ml/L air. Alat-alat bedah dan peternakan: 2-4 ml/L air. Air minum: 6-8/10 L air minum. Desinfeksi ruangan tertutup: 10-12 ml/L air. Antiseptik untuk luka, membersihkan anggota badan: 12 ml/L air **Kemasan** 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 04042003 PTC. 1. Obat bebas terbatas

180. ZALDES

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung benzalkonium chloride 100 g **Indikasi** desinfektan kandang dan peralatan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk desinfeksi kandang dan peralatannya: 6 ml. Desinfeksi air minum: 0,5 ml (unggas) dan 0,2 ml (hewan besar. Membilas alat-alat bekas vaksinasi: 10 ml. Dipping putting: 2 ml **Kemasan** Botol 100 ml. Jerigen 1 L dan 20 L **Deptan RI** No. D. 08043413 PTC. Obat bebas terbatas. ****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

ANTI BAKTERIA

01-04

1. **AAGENT** **Fatro S.p.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung gentamicin, sodium metabisulphite, sodium edetate, methyl-p-hydroxybenzoate dan cairan untuk injeksi Indikasi Antibiotik spektrum luas gentamycin 5% **Kontra Indikasi** Obat tidak boleh digunakan pada hewan yang mengalami gangguan ginjal **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak sapi dan anak kuda: 4-8 ml/100 kg BB (2-4 mg/kg BB) setiap hari. Anak babi: 0,8 ml/10 kg BB (4 mg/kg BB) setiap hari. Ayam: 0,1 ml/kg BB/hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 06011603 PKC. 1. Obat keras
2. **ACLOMAST** **Industrial Veterinaria, SA/Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi tiap 1 ml mengandung cloxacillin sodium 500 mg dan amoxicillin trihidrat 500 mg. Indikasi mastitis kronis atau akut yang disebabkan oleh Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Coilform, Corynebacterium spp. dan Pseudomonas spp. Dosis dan Cara pemberian Sapi: 1 syringe monodosis/kuartir yang terkena mastitis tiap 24 jam. Kambing dan domba: ½-1 syringe/kuartir yang terkena mastitis setiap 12-24 jam. Masa kering berikan 1 syringe/kuartir diberikan selama 10-14 hari setelah pemerahan terakhir **Kemasan** 1 syringe 10 ml **Deptan RI** No. I. 03092375 PKC. 1. Obat keras
3. **AGRISOL** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung enrofloxacin 250 g Indikasi Sebagai antibakteri yang peka pada enrofloxacin untuk unggas Kontraindikasi Hewan yang hipersensitif terhadap enrofloxacin dan hewan yang mengalami insufisiensi ginjal dan hati Dosis dan Cara pemakaian 1 ml dicampur 5 L air minum diberikan selama 3 hari. Untuk pengobatan Salmonellosis harus diberikan selama 5 hari berturut-turut, bila perlu diulang selama 1 minggu **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** Botol plastik 100 ml dan jerigen plastik 1 L **Deptan RI** No. D 10113938 PKC. Obat keras
4. **AGRIXINE** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung enrofloxacin 100 g Indikasi Mengatasi bakteri Mycoplasma gallisepticum (CRD), efektif pengobatan lokal dan infeksi sistemik bacterial seperti Colibacillosis, Streptococcosis, Staphylococcosis Dosis dan Cara pemakaian 1 g untuk 2 L air minum atau 10 mg/kg BB selama 3 hari. Untuk pengobatan Salmonellosis harus diberikan selama 5 hari berturut-turut, bila perlu pengobatan diulang selama 1 minggu **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg @ 100 g, 10 kg @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 0203069 PKS. Obat keras
5. **AGRIXINE SOLUTION** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap kg mengandung enrofloxacin 100 g Indikasi Mengatasi bakteri Mycoplasma gallisepticum (CRD), pengobatan lokal dan infeksi sistemik bacterial seperti Colibacillosis, Streptococcosis, Staphylococcosis Dosis dan Cara pemakaian 1 g untuk 2 L air minum atau 10 mg/kg BB selama 3 hari. Untuk pengobatan Salmonellosis harus

diberikan selama 5 hari berturut-turut, bila perlu pengobatan diulang selama 1 minggu **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 0203467 PKS. Obat keras

6. **ALAMYCIN AEROSOL** **Norbrook Laboratorium, Inggris/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oksitetrasiklin Indikasi Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin pada sapi, kambing, domba dan babi Dosis dan Cara Pemakaian Pemberian melalui semprotan (spray) **Kemasan** Kaleng spray aerosol 140 g **Deptan RI** No. I. 12024225 PKC. Obat keras
7. **ALAMYCIN LA** **Norbrook Laboratorium, Inggris/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oksitetrasiklin dihidrat Indikasi Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin pada sapi, babi dan domba Dosis dan Cara Pemakaian Lihat pada kemasan **Kemasan Botol** 100 ml **Deptan RI** No. I. 03121138 PKC. 2. Obat keras
8. **ALBIPEN LA** **Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung 100 mg ampicillin anhydrate dengan formula yang menghasilkan efek long acting Indikasi Pengobatan dan control terhadap infeksi bakteri yang peka terhadap ampicillin, saluran urogenital, saluran pernafasan, saluran gastro intestinal, mastitis, arthritis, dan infeksi sekunder yang menyertai infeksi virus Dosis dan Cara pemakaian Secara umum: 15 mg/kg untuk hewan dewasa, dan 25 mg/kg BB untuk hewan muda dengan penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan Botol** 80 ml **Deptan RI** No. I. 04112402 PKC. 1. Obat keras
9. **ALZODIN** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung albendazole Indikasi Untuk pengobatan cacing pada sapi, kambing dan domba Dosis dan Cara pemakaian Diberikan secara peroral dengan dosis tunggal sebanyak 10 mg/kg BB **Kemasan Botol** 1 L **Deptan RI** No. D. 10103906 PKC.
10. **AMCO CHICKS** **Hendy Pharmino Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ampicillin trihidrat 12 g, colistin sulfat 250 Juta IU Indikasi Pada unggas: CRD kompleks, colibacillosis, coryza (snot), omphalitis, salmonellosis, pullorum, fowl cholera, paratyphoid. Pada babi: colibacillosis, diare, pneumonia. Pada sapi: mastitis, diare, colibacillosis, pneumonia Dosis dan Cara pemakaian Unggas: 1 g/L air minum selama 3–5 hari berturut-turut. Sapi dan babi: 1–2 g/kg pakan **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 0203086 PKS. Obat keras
11. **AMCOL** **Meiji Indonesia Pharmaceutical**
Bentuk Sediaan Granules **Komposisi** Setiap 1 g mengandung Ampicillin 100 mg (potensi) dan Colistine sulfate 250.000 IU Indikasi Unggas: Colibacillosis, Salmonellosis, Coryza (Snot), Fowl Cholera, Staphylococcosis, Omphalitis, Streptococcosis. Sapi: Diare, Bronchopneumonia, dan Salmonellosis. Babi: Coli-diare, Salmonellosis, Pneumonie, Erysipelosis Dosis dan Cara

pemakaian Dicampur dalam air minum dengan dosis: 200–400 mg/kg BB. Diberikan selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** Kantong alufoil @ 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 0807891 PKS. 1. Obat keras

12. AMIVAKSICOL

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk larut air **Komposisi** Setiap kg mengandung kolistin 500.000.000 IU **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakteri g negatif seperti salmonellosis, pasteurellosis, enterobacter dan E.coli **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: larutkan dalam air minum sebanyak 1 g/10 L air, pemakaian selama 5-7 hari. Hewan lain: 0,1 g/10 kg BB, pemakaian selama 5-7 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g, kemasan induk 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. D. 04082790 PKS. TM. Obat keras

13. AMOXCOL

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Amoxicillin dan Colistin Sulfat **Indikasi** Pneumonia, enteritis, infeksi saluran kemih dan liver abcess pada sapi; Pasteurellosis, pleuropneumonia, atropic rhinitis, Colibacillosis, Salmonellosis, necrotic enteritis dan infeksi saluran kemih pada babi; Fowl Cholera, Colibacillosis, Salmonellosis, snot, Staphylococcosis dan Streptococcosis pada ayam **Waktu Henti Obat** 5 hari **Dosis dan Cara pemakaian** 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** Sak 1 kg **Deptan RI** No. I. 06093124 PKS. Obat keras

14. AMOXYCL

**Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/
Novartis Indonesia Novindo Agritech Utama**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amoxicillin trihydrate, magnesium stearate dan fumed silica **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoxicillin trihydrate. Pada babi untuk mengobati dan mengontrol infeksi bakteri seperti athropic rhinitis yang di sebabkan oleh bordetella bronchiseptica dan pasteurella multocoxida, pleuropneumonia yang di sebabkan oleh actinobacillus pleuropneumoniae, greasy pig disease yang di sebabkan oleh staphylococcus suis, glasser's disease yang disebabkan oleh haemophylus parasuis, infeksi clostridial yang di sebabkan oleh clostridium perfringens dan C. tetani **Dosis dan Cara Pemakaian** **Pengobatan** pada babi: 150-300 ppm selama 5-7 hari **Kemasan** Kantung 10 kg **Deptan RI** No. I. 09033584 PKS. Obat keras

15. AMOXICOL

Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung amoxicillin tryhydrate 200 g dan colistin sulfate 250.000.000 IU **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap amoxycillin dan colistin pada babi, unggas dan sapi **Dosis dan Cara pemakaian** Dilarutkan atau dicampur dalam air minum, pakan selama 3-5 hari berturut-turut. Unggas: 0,11-0,22 g/kg BB/hari. Secara umum untuk pencegahan, berikan larutan 0,1% (10 g/10L air minum). Untuk pengobatan berikan larutan 0,2% (20 g/10L air minum). Babi, sapi: 0,5-0,55 g/10 kg BB/hari **Waktu Henti Obat** Sapi 20 hari, babi 15 hari, dan unggas 5 hari **Kemasan** Sachet 1 kg **Deptan RI** No. I. 0804132 PKS. 1. Obat keras

16. AMOXIN

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung amoxicillin trihidrat 150.000 mg, vitamin A 10.000.000 IU dan vit C 30.000 mg **Indikasi** Pengobatan CRD, CRD kompleks, colibacillosis, cholera, salmonellosis serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri g (+) dan (-) yang sensitif terhadap amoxicillin **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: 5 g (1 sendok teh)/10 L air minum **Kemasan** ½ kg, 1 kg, 5 kg dan 20 kg **Deptan RI No. D.** 02061808 PKS. 1. Obat keras

17. AMOXISOL

Medreich Limited, India/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Amoxicillin trihydrate 50% w/w **Indikasi** Untuk terapi infeksi coliform termasuk kasus penyakit colisepticaemia tunggal atau infeksi sekunder akibat infeksi gumboro (IBD) atau infeksi saluran pernafasan seperti infectious bronchitis, infectious laryngotracheitis (CRD), infeksi coryza, fowl cholera, fowl typhoid, pullorum disease, wingrot dan necrotic enteritis **Dosis dan Cara pemakaian** 40 mg/kg BB dan diberikan melalui pulse dose system dengan menyedot pemberian air minum 30 menit menjelang terapi dilakukan. Larutkan 10 g dalam 100 ml air atau 50 g dalam 500 ml air, dan aduk hingga rata. Kemudian campurkan dengan air minum dan ulangi prosedur ini 1x/hari selama 3-5 hari **Kemasan Botol plastik** 50 g **Deptan RI No. I.** 10023790 PKS. Obat keras

18. AMOXITIN

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung amoxicillin trihidrat 200 mg dan colistin sulfate 800.000 IU **Indikasi** Colibacillosis, korisa, salmonellosis: Avian paratyphoid, Fowl typhoid, dan Pullorum **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap 2 L air minum atau 0,1 g tiap kg BB ayam selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan Sachet** 250 g **Deptan RI No. D.** 07093297 PKS. Obat keras

19. AMOXICILLIN 50% SOLUBLE POWDER

**PT. Y.S.P. Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/
PT.Yung Shin Pharmaceutical Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Amoxicillin 500 mg/g **Indikasi** Unggas: infeksi E. Coli, salmonellosis, staphylococcus, coryza, diare yang disebabkan oleh bakteri, encephalomeningitis dan bronchitis. Babi: infeksi E. coli, salmonellosis, staphylococcus, disentri, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri, pasteurellosis, AR, erysipelas, abses dan encephalomeningitis **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: larutkan 20–40 g obat ke dalam 200 L air minum dan berikan selama 3–5 hari. Babi: 400 mg obat/10 kg BB selama 3–5 hari (Dosis tersebut dibagi dan diberikan dua kali sehari) **Kemasan Kantong** 100 g, 500 g, dan 1 kg **Kementan RI No. I.** 11094144 PKS. Obat keras

20. AMOXINJECT LA

Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan injeksi Komposisi Amoxicillin trihydrate 15% **Indikasi** Pengobatan infeksi pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran urogenitalis, kulit dan luka infeksi. Untuk pencegahan terhadap infeksi virus dan masa setelah operasi (disuntikkan sebelum

operasi) **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang hipersensitif terhadap penicillin. Jangan diberikan pada rodensia kecil **Waktu Henti Obat** (Secara IM), pada daging 28 hari, susu 3 hari. (Secara IU) Pada daging 5 hari, susu 1 hari Dosis dan Cara pemakaian Dosis umum: 7 mg amoxicillin/kg BB sekali sehari atau 15 mg amoxicillin/kg BB tiap 48 jam. Secara IM pada, Sapi, kuda, unta: 4-5 ml/100 kg BB/hari. Anak sapi, anak kuda: 2-3 ml/50 kg BB/hari. Domba, kambing: 1 ml/20 kg BB/hari. Babi: 3 ml/100 kg BB/hari. Anjing, kucing, anak babi: 0,1 ml/2 kg BB/hari. Untuk pengobatan pada saluran pernafasan digunakan dosis ganda tiap 48 jam. Lama pemakaian 3 hari secara IU. Pada sapi: 900 mg (6 ml) diberikan secara IU hanya satu kali. Jika perlu dapat diulangi setelah 4-7 hari dengan dosis yang sama **Kemasan** 50 ml, 100 ml **Deptan RI** No. I. 06012281 PKC. 2. Obat keras

21. **AMOXY – 50** **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amoxycillin trihydrate 50% **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoxycillin pada unggas dan babi **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap amoxicillin **Dosis dan Cara Pemakaian** 20-40 mg/kg BB **Kemasan** Sachet 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 0206527 PKS. Obat keras
22. **AMOXYCILLIN WSP 15%** **Dopharma-Netherland/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amoxycilin trihydrate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoksisilin pada hewan non ruminansia, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum 500 g/1000 L. Pemakaian melalui air minum, **Waktu Henti Obat** (withdrawal time) 5 hari **Kemasan** 100 g, 1 Kg **Deptan RI** No. I. 0112660 PKS. Obat keras
23. **AMPHIMIX** **Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Ampicillin tryhydrate dan erythromycin **Indikasi** Pengobatan terhadap kasus E.coli, mycoplasma, pasteurellosis, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan selama 3-5 hari. Pada anak babi: 7,5 g/hari. Babi/sapi: 17,5 g/hari **Kemasan** Ember 5 kg **Deptan RI** No. D. 05061270 PKS. 2. Obat keras
24. **AMPHOPRIM INJECTION** **Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Mengandung sulfadimetil, pirimidin dan trimethoprim **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap sulfadimetil dan trimethoprim pada kuda, sapi, babi, domba dan anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis umum 1 ml/10-15 kg BB **Kemasan** Vial 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 0409989 PKC. 2. Obat keras
25. **AMPIBIO** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ampicillin dan colistin **Indikasi** Unggas: colibacillosis, snot, fowl cholera, enteritis dan salmonellosis. Babi: scours, pneumonia dan erisipelas **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 1-2 hari setelah pemberian obat **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g dilarutkan dalam 1 L air minum, atau 1 g/10 kg BB. Babi: 1 g/5-10 kg BB dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 03052310 PKS. 1. Obat keras

26. AMPICILLIN – 10

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Ampicillin sodium 10% Indikasi Pengobatan CRD, E. coli, coryza, kolera **Kontra Indikasi** Tidak ada Dosis dan Cara pemakaian 5 g/4 L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg **Deptan RI** No. D. 06041207 PKS. 2. Obat keras

27. AMPICOL

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ampicillin 100 g, colistin sulfate 250.000.000 IU Indikasi Colibacillosis, kolera, infeksi sekunder oleh bakteri pada kasus gumboro **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 3 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi Dosis dan Cara pemakaian 1 g tiap 2 L air minum, diberikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 50 g dan 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 02071752 PKS. 1. Obat keras

28. AMPIVAKSICOL

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Ampicillin trihidrat (setara ampicillin) 100 g, dan colistin sulfat (setara colistin) 200.000.000 IU Indikasi Sebagai antibakteri yang peka pada ampicillin dan colistin untuk unggas, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 g dalam 1 L air minum selama 3-5 hari, Sapi dan anak sapi: 1-2 g per 1 kg konsentrat selama 3-5 hari **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** 100 g sachet alufoil, 1 kg @ sachet alufoil 250 g, ember 5 kg @ 250 g sachet alufoil, dan dus 10 kg @ 250 g sachet alufoil Kementan RI No. D. 12072017 PKS. 2. Obat keras

29. AMPIVETBRITIN

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Suspensi injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung ampicillin trihidrat setara dengan ampicillin 150 mg Indikasi Untuk pengobatan infeksi saluran pernafasan, pencernaan, sistem urogenitalis, dan septicaemia pada hewan **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap penisilin dan turunannya **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis rata-rata 2-7 mg/kg BB/hari. Sapi: 20 ml. Anak sapi: 2,5 ml. Domba: 3 ml. Anak domba dan anak babi: 0,5 ml. Babi: 7 ml. Anjing: 1 ml. Injeksikan secara SC atau IM **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0204071 PKC. Obat keras

30. AMPIVET 24

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung 240 g ampicillin aktif Indikasi Antibiotik bakterisidal spektrum luas yang sangat ampuh untuk mengobati: infectious coryza (snot), pasteurellosis (kolera), berak kapur (pullorum), radang usus/diare (E. Coli/clostridium), colibacillosis, infeksi sekunder dari penyakit virus, infeksi oleh kuman streptococcus dan staphylococcus, radang persendian (infectious arthritis) dan radang paru-paru **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: tiap 0,5 g/L air minum dan diberikan selama 4-5 hari berturut-turut. Pada babi/anak sapi/kuda: 1,25-2 g/kg BB diberikan melalui air minum selama 4-5 hari berturut-

turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 2,5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 98071463 PKS. 1. Obat keras

31. AMPIXIL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 100 g mengandung ampicilin trihydrate 10 g
Indikasi Untuk pengobatan terhadap penyakit snot, kolibasilosis, salmonelosis, streptokokkosis, staphylokokkosis dan penyakit infeksi bakteri yang lain **KontraIndikasi** Jangan diberikan pada kelinci dan kuda **Dosis dan Cara pemakaian** Untuk ayam: 1-2 g/L air minum. Untuk hewan besar: 2 g/10 kg BB. Lama pengobatan antara 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 05022897 PKS. Obat keras

32. ANCOMYCIN 200 LA

ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung oxytetracycline base 200 mg
Indikasi Penggunaan pada infeksi bakteri yang sensitive terhadap oxytetracycline. Juga efektif melawan beberapa mycoplasma, rickettsias, dan protozoa **Dosis dan Cara pemakaian** 20 mg oxytetrasiklin/kg BB (1 ml Ancomycin 200 LA/10 kg BB) diaplikasikan dengan cara injeksi IM **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI** No. I. 1211920 PKC. 1. Obat keras

33. ANFLOX GOLD

Anupco, Inggris/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung norfloxacin 200 mg **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap norfloxacin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 12 mg/kg BB atau setara dengan 25-50 ml/100 L air minum selama 3-5 hari **Waktu Henti Obat** 7 hari setelah habis masa terapi **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1 L **Kementan RI** No. I. 1209584 PKC. 1. Obat keras

34. APRALAN SOLUBLE

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung apramycin sulfat **Indikasi** Antibakteri
Dosis dan Cara Pemakaian 50 mg/kg BB **Kemasan** Botol 100 g dan Sachet 225 g **Deptan RI** No. I. 06011648 PKM. 2. Obat keras

35. ASADOXIN

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung doxycycline 100 mg dan erythromycin 150 mg **Indikasi** Ampuh mengobati CRD complex, fowl cholera, coryza/snot, colibacillosis dan penyakit pernafasan lainnya **Kontra Indikasi** Reaksi hipersensitivitas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Perhatian Waktu Henti Obat** pada unggas 5 hari sebelum dipotong **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 10043829 PKS. Obat keras

36. ASAPRIM

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung trimethoprim 41 mg dan sulfadiazine 205 mg **Indikasi** Ampuh mengobati colibacillosis, fowl cholera, pullorum, snot/coryza dan infeksi sekunder pada CRD complex **Kontra Indikasi** Reaksi hipersensitivitas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/1-2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu**

Henti Obat Pada unggas 5 hari sebelum dipotong **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 10013776 PKS. Obat keras

37. ASAPRO

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung oxytetracycline HCl 100 mg dan amprolium 50 mg **Indikasi** Untuk mengobati cholera, pullorum, coryza/snot, sinovitis dan coccidiosis **Kontra Indikasi** Reaksi hipersensitivitas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/1-2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** Pada unggas 10 hari sebelum dipotong **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI** No. D. 12094351 PKS. Obat keras

38. AQUAPRIME 4/20 Injection

Univet-Irlandia/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung sulfadiazine BP 200 mg dan trimethoprim BP 40 mg **Indikasi** Untuk mengobati penyakit pada sapi dan babi yang disebabkan oleh bakteri g (+) dan (-) termasuk E. Coli **Dosis dan Cara pemakaian** Injeksi secara IM pada anak sapi: 6 ml/50 kg, sapi dewasa: 12 ml/100 kg. Pada anak babi: 6 ml/50 kg, babi grower: 24 ml/20 kg, babi dewasa: 20 ml/25 kg. Dosis maksimum pada satu sisi: 20 ml pada babi 10 ml **Kemasan** Dos berisi 12 botol @ 100 ml **Deptan RI** No. I. 09031657 PKC. 2. Obat keras

39. ATIQUE P.18

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung flumequine **Indikasi** Antibakteri untuk snot, kolera dan kolibasilosis **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: 5 ml/100 kg BB equivalent dengan 50 ml ATIQUE P.18/100 L air minum selama 3-5 hari, kemudian campur dalam air minum. Ikan: 6,7 ml/100 kg BB equivalent dengan ATIQUE P.18/100 kg pakan, dan selanjutnya diberikan pada dosis 1 kg/100 kg BB setiap hari selama treatment **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 03012247 PKC. 1. Obat keras

40. AVANTE INJECTION

KNBP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Ceftiofur sodium **Indikasi** Infeksi saluran pernapasan; foot-rot dan mastitis pada sapi; Infeksi saluran pernafasan pada babi dan kuda; Colibacillosis dan Salmonellosis pada ayam **Perhatian** Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan, simpan di tempat yang kering dan terhindar sinar matahari langsung **Dosis dan Cara pemakaian** Sapi, babi, ayam dan kuda 1-2 mg per Kg BB; DOC 0.08-0.2 mg per ekor secara SC atau IM **Kemasan** Vial 0,1 g, 1 g dan 4 g **Deptan RI** No. I. 08083480 PTS. Obat bebas terbatas

41. AVICILINA PLUS

S.P. Veterinaria SA, Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kombinasi doksisisiklin HCl dan eritromisin thiosianat **Indikasi** Pengobatan terhadap mikoplasmosis, CRD murni maupun komplikasi yang disebabkan oleh E.coli. Infeksi coryza, salmonellosis dan colibasilosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Per oral melalui air minum: 0,5-1 g/L air minum selama 5 hari **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. I. 06033051 PKS. Obat keras

42. **AVICYCLINE 20% L.A INJECTION** **AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung oxytetracycline base 200 mg **Indikasi** Untuk mengobati infeksi bakteri gram negatif dan positif yang menyerang saluran pernafasan, pencernaan dan kemih seperti bronchopneumonia, pleurapneumonia, enteritis, septicemia, mastitis, metritis, actinomycosis, actinobacillosis juga efektif terhadap infeksi anaplasma, mycoplasma, chlamydia dan rickettsia **Perhatian** Tidak dianjurkan untuk diberikan pada anjing, kucing dan kuda dalam waktu yang panjang **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IM. Untuk sapi, kerbau, domba dan kambing diberikan dengan dosis 1 ml/10 kg BB. Anjing, kucing: 1,5 ml/10 kg BB **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 04092809 PKC. Obat keras
43. **AVIFLOX 10** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bacterial yang sensitive terhadap quinolone seperti salmonellosis, pasteurellosis, snot dan colibacillosis serta CRD **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum, atau 100 g untuk 1.000 kg BB. Obat dilarutkan dalam air minum selama 3-5 hari **Kemasan** Pot 500 g **Deptan RI** No. D. 05071058 PKS. TM. Obat keras
44. **AVIFLOX – 10 LIQUID** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Untuk pengobatan mycoplasmosis, infeksi E. coli, colisepticaemia, salmonellosis, serta infeksi oleh bakteri g positif dan negatif lainnya yang sensitif terhadap preparat enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 ml/20 L air minum atau berikan 100 ml untuk 2.000 kg BB **Kemasan** 150 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 05072950 PKC. TM. Obat keras
45. **AVIMOX 12** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung amoxycillin 120 mg, neomicin 50 mg **Indikasi** Antibakteri spectrum luas. Pada unggas efektif untuk pengobatan infeksi saluran pencernaan pathogen seperti salmonella (berak kapur), pasteurilla (berak hijau), colienteritis (peradangan usus halus), haemophyllus (snot), staphylococcus dan enterococcus **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum, atau 100 g/1.000 kg BB obat dilarutkan dalam air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. D. 02071062 PKS. TM. Obat keras
46. **AVIMOX 24** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung amoxycillin 200 mg, neomicin 100 mg **Indikasi** Antibakteri spectrum luas. Pada unggas efektif untuk pengobatan infeksi saluran pencernaan pathogen seperti salmonella (berak kapur), pasteurilla (berak hijau), colienteritis (peradangan usus halus), haemophyllus (snot), staphylococcus dan enterococcus **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/3-4 L air minum, atau 100 g/2.000 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Pot 500 g **Deptan RI** No. D. 02081235 PKS. TM. Obat keras

47. **AVIQUIN 25** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung flumequin 250 mg dan colistin 500.000 IU **Indikasi** Pada unggas efektif untuk pengobatan infeksi negative (pathogen) seperti E.coli, snot (Haemophyllus sp.) dan kolera (Pasteurella spp), serta bakteri g negatif lainnya seperti Aerobacter sp, Shigella spp, Pseudomonas aerogynosa **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/4 L air minum, atau 100 g/2.500 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan pot 500 g **Deptan RI No. D. 02081237 PKS. TM.** Obat keras
48. **AVITRYL – 10 INJECTION** **AVICO/Maju Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Injection **Komposisi** 1ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Efektif untuk mengobati infeksi oleh salmonella, colibacillosis, CCRD, dan CRD pada unggas, mastitis, coli-diarhea, broncopneumonia pada sapi, kambing dan domba. Pada kucing dan anjing dipakai untuk mengobati infeksi paru, pencernaan, dermatitis dan infeksi kemih **Perhatian** Tidak dianjurkan pada anjing dibawah umur 12-18 bulan dan kucing di bawah umur 8 minggu **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan subkutan pada sapi, kambing, anjing, kucing serta IM pada domba dan babi. Hewan besar (sapi, domba, kambing): 2,5-5 mg/kg BB (1-2 ml/40 kg BB) selama 3 hari. Hewan kecil (kucing, anjing, kelinci): 5 mg/kg BB (0,1 ml/2 kg BB) selama 3 hari (kecuali untuk kelinci dua kali sehari). Unggas: 10 mg/kg BB (0,1 ml/kg BB) selama 3 hari **Kemasan** 10, 20, 50 dan 100 ml **Deptan RI No. I. 06033055 PKC.** Obat keras
49. **AVITRYL ORAL SOLUTION** **AVICO/Maju Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Oral solution **Komposisi** 1 ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Efektif untuk mengobati infeksi oleh salmonella, colibacillosis, CCRD, dan CRD pada unggas, mastitis, coli-diarhea, broncopneumonia pada sapi, kambing dan domba. Pada kucing dan anjing dipakai untuk mengobati infeksi paru, pencernaan, dermatitis dan infeksi kemih **Perhatian** Air yang diberi obat digunakan sebagai sumber utama air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas dibawah umur 3 minggu 0,5 ml/L air minum selama 3 hari. Unggas/kalkun diatas umur 3 minggu: 10 mg/kg BB selama 3 hari. Hewan kecil: 5 mg/kg BB selama 3 hari. Hewan besar: 2,5 mg/kg BB selama 3 hari. Kecuali untuk pengobatan pasteurella dan salmonella berikan selama 5 hari **Kemasan** 100 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI No. I. 04032298 PKC.** 1. Obat keras
50. **AVIXIN** **AVICO/Maju Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung menthol, dan bromhexine HCl **Indikasi** Sebagai antimuskolitik pada unggas, sapi, kambing, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** **Kemasan** 500 ml **Kementan RI No. I. 11013981 PTC.**
51. **BACOLAM** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung amoxicillin sodium dan colistin sulphate **Indikasi** Pengobatan terhadap coryza, kolera dan enteritis **Perhatian** Jangan diberikan bentuk oral pada ruminansia dengan rumen fungsional. Kocok injectable suspension sebelum digunakan untuk treatment sapi yang laktasi dan induk petelur **Dosis dan Cara Pemakaian**

Diberikan lewat oral dan produk harus diencerkan dalam air minum atau susu atau campur pakan **Kemasan** Botol 1 kg **Kementan RI** No. I. 12111877 PKS. 2. Obat keras

- 52. BAYTRIL 5 %** **Bayer Korea. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Injeksi **Komposisi** Mengandung Enrofloxacin **Indikasi** Untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif seperti mycoplasma pada sapi, babi dan anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Infeksi umum: Sapi: subcutan 1 ml/20 kg BB selama 3 hari. Babi: intramuscular 1 ml/20 kg BB selama 3 hari. Infeksi saluran pernapasan yang sulit: Sapi: subcutan 1 ml/10 kg BB selama 3 hari. Babi: intramuscular 1 ml/10 kg BB selama 3 hari. Salmonellosis: Sapi: subcutan 1 ml/10 kg BB selama 5 hari. Babi: intramuscular 1 ml/10 kg BB selama 5 hari. Coliform mastitis pada sapi perah: intravena 1 ml/10 kg BB selama 2 hari. MMA pada babi: intramuscular 1 ml/20 kg BB selama 2 hari. Infeksi umum, abses dll pada anjing: subcutan 1 ml/10 Kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Dus, vial @ 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 10033820 PKC. Obat keras
- 53. BAYTRIL 10 %** **Bayer Korea Ltd.,/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Injeksi **Komposisi** Mengandung Enrofloxacin **Indikasi** Diare pada babi dan sapi yang disebabkan oleh E.Coli dan Salmonella, Pneumonia dan digestif yang disebabkan oleh Mycoplasma dan Pasterurella. Untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif seperti mycoplasma pada sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: infeksi bakteri 2,5 ml IM atau SC per 100 kg BB selama 3 hari. Penyakit pernapasan serius 5 ml IM atau SC per 100 kg BB selama 3 hari. Salmonellosis 5 ml IM atau SC per 100 kg selama 5 hari. Sindrom MMA 2,5 ml IM per 100 kg BB selama 1-2 hari. Sapi pedaging: infeksi bakteri 2,5 ml IM, SC atau IV per 100 kg BB selama 5 hari. Penyakit pernapasan kompleks 5 ml per 100 kg BB selama 5 hari. Sapi penghasil susu: infeksi bakteri 2,5 ml IV per 100 kg BB selama 5 hari. Penyakit pernapasan kompleks 5 ml per 100 kg BB selama 5 hari **Kemasan** Dus, vial @ 50 ml **Deptan RI** No. I. 09123754 PKC. Obat keras
- 54. BAYTRIL 10 %** **OLIC (Thailand) Limited Thailand, untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan dalam larutan **Komposisi** Mengandung Enrofloxacin **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit Infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif serta mikoplasma khususnya CRD, infeksi E. coli, colisepticaemia, salmonellosis, kolera dan coryza pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,1 ml/kg BB selama 3 hari berturut-turut. Salmonellosis: 5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 0711402 PKC.3. Obat keras
- 55. BAYTRIL FLAVOUR** **KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH, Jerman. Dikemas ulang oleh OLIC (Thai) Limited, Thailand/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Mengandung Enrofloxacin **Indikasi** Efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif serta mikoplasma. Untuk pengobatan infeksi bakteri saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital, kulit, infeksi luka sekunder, dan otitis eksterna

pada anjing dan kucing **Perhatian** Pada kucing: efek retinotoxic terjadi ketika melebihi dosis yang dianjurkan yaitu >15 mg/kg 1x sehari selama 21 hari berturut-turut. Tidak dianjurkan digunakan pada kucing berumur kurang dari 8 minggu tidak boleh digunakan sebagai profilaksis. Tidak boleh digunakan pada anjing berumur 1 tahun atau pada anjing keturunan besar dengan masa pertumbuhan sangat lama dan berumur dibawah 18 bulan karena tulang rawan sendi dapat terganggu, selama masa pertumbuhan yang cepat. **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 mg/kg diberikan per oral 1x sehari atau sebagai dosis terbagi 2x sehari selama 8–10 hari, dengan atau tanpa makanan. Dosis harian: Baytril Flavour tablet 50 mg–1 tablet/10 kg BB **Kemasan** Dus 5 strip @ 10 tablet **Deptan RI** No. I. 09073673 PKM. Obat keras.

56. BAYTRIL FLAVOUR 150 **KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH, Jerman**

Dikemas ulang oleh OLIC (Thai) Limited, Thailand/Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Mengandung Enrofloxacin **Indikasi** Efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif serta mikoplasma. Untuk pengobatan infeksi bakteri saluran pencernaan, pernapasan, dan urogenital, kulit, infeksi luka sekunder, dan otitis eksterna pada anjing **Perhatian** Tidak boleh digunakan pada anjing berumur kurang dari 1 tahun atau pada anjing keturunan besar dengan periode pertumbuhan sangat lama dan berumur di bawah 18 bulan, karena tulang rawan sendi dapat terganggu, selama masa pertumbuhan yang cepat **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 mg/kg diberikan per oral 1x sehari atau sebagai dosis terbagi 2x sehari selama 8–10 hari, dengan atau tanpa makanan. Dosis harian: Baytril Flavour tablet 150 mg–1 tablet/30 kg BB **Kemasan** Dus 5 strip @ 10 tablet **Deptan RI** No. I. 10073867 PKM. Obat keras.

57. BERNOQUIN **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung ciprofloxacin HCl 100 mg **Indikasi** Mengatasi CRD kompleks, kolibasilosis, kolera, snot, serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh kuman gram negative dan positif, serta mikoplasma **Dosis dan Cara pemakaian** 1g/2 L air minum, berikan 3-5 hari berturut turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg **Deptan RI** No. D. 01092022 PTS. 1. Obat keras

58. BETAMOXIN **Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung amoxicillin (trihidrat) **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoxicillin pada sapi, domba, anjing dan kucing dan digunakan untuk pengobatan infeksi pernapasan, infeksi saluran urogenital, infeksi kulit dan jaringan lunak **Dosis dan Cara pemakaian** Injeksi secara IM, pada sapi, domba, anjing dan kucing: 1,0 ml/10 kg BB **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 09123755 PKC. Obat keras

59. BETAMOX – LA **Norbrook Lab-UK/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung amoxycillin 15% **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** 45 ml/450 kg BB **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 03112682 PKC. Obat keras

- 60. BICORMICINA LA** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung benzylpenicillin procaine, benzylpenicillin benzathine, dihydrostreptomycin sulphate, dexamethasone sodium phosphate dan dexamethasone 21-isonicotinate **Indikasi** Mengandung antibiotik penicillin *long acting* **Perhatian** Jangan diberikan pada ruminansia yang bunting karena dapat menyebabkan abortus atau kelahiran yang prematur, pemakaian tidak diindikasikan untuk hewan yang menderita congesti jantung, atau diabetes melitus, osteoporosis, katarak atau degenerasi mata atau mycosis. Injeksi harus dilakukan pada lebih dari satu sisi untuk kasus pada kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara deep IM dengan dosis hewan besar: 10 ml/100 kg BB, hewan kecil: 1 ml/10 kg BB **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI** No. I. 04092267 PKC. 1. Obat keras
- 61. BIOCILIN** **Eka Farma**
Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Ampicillin tryhydrate **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bacteria yang peka terhadap ampicillin trihydrate **Dosis dan Cara Pemakaian** lihat label pada kemasan **Kemasan** Zak foil 10 kapsul **Deptan RI** No. D. 0812590 PKM. 1. Obat keras
- 62. BIOCIN** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Erythromycin Thiocyanate 80 mg, Doxycycline 40 mg **Indikasi** Mengobati CRD, Coryza (Snot) dan Cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250g **Deptan RI** No. D. 06061898 PKS. 2. Obat keras
- 63. BIODEXAMINE** **Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung 200 mg procaine benzylpenicillin, 250 mg dihydrostreptomycin, 1 mg dexamethasone dan 10 mg triphenellamine **Indikasi** Pengobatan penyakit infeksi bakteri yang sensitive terhadap penicillin atau dihydrostreptomycin dalam kasus pneumonia, septicaemia, enteritis, metritis, mastitis, arthritis akut dan peradangan yang bersifat virulen pada sapi, kambing, domba, kuda, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM atau SC dengan dosis: 15-20 ml pada kuda dan sapi. Dosis 8 ml pada domba dan kambing. Dosis: 8-10 ml pada babi, dan dosis: 0,5-2 ml pada anjing dan kucing. Interval dosis 24 jam dan diberikan selama 2 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I 0509199 PKC. 2. Obat keras
- 64. BIOFLOX – 20** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Ciprofloxacin 200 mg **Indikasi** Untuk mengobati CRD komplek, Collibacillosis, Pullorum, Coryza (Snot), Cholera, Staphylococcus, Streptococcus dan Salmonella **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/4 L air minum (10 mg/kg BB/hari), selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250g **Deptan RI** No. D. 07113341 PKS. Obat keras

- 65. BIOMOX-20** **Biotech Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Amoxycillin Trihidrate 200 g dan Colistin Sulphate 800.000.000 IU **Indikasi** Untuk mengobati infeksi saluran Gastrointestinal, saluran pernafasan dan saluran kemih atau urinaria **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum, selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 dan 250 g **Deptan RI** No. D. 03102654 PKS. Obat keras
- 66. BIOMYCIN – M** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi intra mamaria **Komposisi** Tiap ml mengandung amoksisilin trihidrat 100 mg dan neomisin sulfat 50 mg **Indikasi** Pengobatan mastitis klinis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap amoksisilin dan neomisin seperti corynebacterium, E. coli, staphylococcus dan streptococcus spp. pada sapi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemberian secara intramamaria: 1 syringe/kwartir maksimal selama 3 hari. Pengobatan dapat diulang setelah 12 jam, dan sebelum diberikan, susu sudah diperah sampai habis. Puting susu harus dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu **Kemasan** Syringe plastik @ 5 ml **Deptan RI** No. I. 09063624 PKC. Obat keras
- 67. BIOQUIN – 20** **Biotech Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Flumequine 200 mg **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap flumequine (E.coli, Salmonella spp, Pasteurella multocida, Campylobacter spp, Proteus, Staphylococcus) **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml per 8–16 kg (12 mg/kg BB/hari) berikan setiap 12 jam, selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 09053618 PKC. Obat keras
- 68. BIO – TETRA SPRAY** **Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/
Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama**
Bentuk Sediaan Cairan spray dalam botol **Komposisi** Setiap ml mengandung oxytetracycline HCL 35 mg dan gentian violet 45 mg **Indikasi** Untuk melindungi luka dan area operasi serta melawan lalat dan infeksi bakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Bersihkan luka dengan air hangat, kemudian keringkan sebelum disemprot. Rawat kira-kira 5-20 cm sekitar luka dan semprot. Tekan tombol pompa semprot pada bagian atas botol untuk mendapatkan daya semprot yang baik. Kemudian tutup botol setelah digunakan. Pemberian harus dilakukan 2x sehari **Kemasan** Botol 150 ml **Kementan RI** No. I. 12094338 PKC. Obat keras
- 69. BIO – TETRA 200 LA** **Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/
Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung oxytetracycline 200 mg **Indikasi** Untuk pengobatan pasteurellosis, leptospirosis, pneumonia, mastitis, metritis, omphalitis, arthritis dan infeksi luka operasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas dan anak babi: 1 m/7 kg BB. Kambing, domba dan pedet: 1 ml/10 kg BB. Sapi: 1 ml/12 kg BB. Diberikan

secara tunggal IM dan dengan dosis yang sama dapat diulang 72 jam kemudian **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI** No. I. 12034227 PKC. Obat keras

70. BIO – TYLO 200

Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/

Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung tylosin tartrate 20 g **Indikasi** Untuk pengobatan pneumonia, sinusitis, CRD, arthritis, mastitis, metritis, dermatitis, etitis externa, infeksi saluran urinaria dan pasca operasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 0,5-1 ml/kg BB. Babi: 0,4-0,5 ml/kg BB. Anjing dan kucing: 0,3-0,5 ml/10 kg BB. Unggas: 0,1-0,2 ml/kg BB. Obat diberikan secara injeksi IM, dan untuk pengobatan: 1 dosis sehari selama 2-3 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI** No. I. 12034228 PKC. Obat keras

71. BIOXAN

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap gram mengandung neomycin 75 mg, oxytetracycline 200 mg. **Indikasi** pengobatan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh kuman Salmonella, E. coli, Pasteurella dan bakteri saluran pencernaan lainnya yang tidak spesifik. **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 gram per 2 liter air selama 3 hari berturut-turut. Pengobatan: 1 gram per 2 liter air selama 5 hari berturut-turut atau 100 gram serbuk 500–1000 kg BB. unggas 1 g/ 1 L air selama 5 hari. **Kemasan** 100 g, 1 Kg 10 kg dan 30 kg. **Deptan RI** No. D. 1201260 PKS.1. Obat keras

72. BIO NEO

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Neomycin Sulfate 715 mg **Indikasi** Untuk mengobati dan mengontrol diare (bakterial enteritis) yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap Neomycin Sulfate seperti E. Coli dan untuk mengatasi infeksi gastrointestinal yang spesifik maupun nonspesifik **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mengontrol penyakit pada sapi, kuda, babi, domba, kambing: melalui 1 g/10 L air minum selama 3-4 hari dan untuk unggas: 20 mg/kg BB melalui air minum selama 3-7 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI** No. D. 12094343 PKS. Obat keras

73. BIO TYFLOX-S

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung Enrofloxacin 100 g dan Tylosine 100 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit CRD kompleks, Mycoplasmosis, Colibacillosis, Cholera, Salmonellosis dan penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif **Dosis dan cara pemakaian** Unggas: 1 ml/2 L air minum, selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 09123761 PKC. Obat keras

74. BISEPTYL

SYVA Laboratorios, Spain/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung spectinomycin (sebagai sulfat) 100 mg dan lincomycin (HCl) 50 mg **Indikasi** Babi: vibriosis disenteria, colibacillosis, enzootic pneumonia, salmonellosis, infeksius arthritis. Sapi: pneumonia, colibacillosis. Anjing: pneumonia, colibacillosis. Unggas: CRD (chronic respiratory disease), infectious coryza **Dosis**

dan Cara pemakaian Untuk semua spesies: Unggas 0,2 ml/kg BB selama 4-7 hari **Kemasan** 100 ml dan 250 ml Deptan RI No. I. 0203025 PKC. Obat keras

75. **BMD SOLUBLE** **Alpharma, Inc, USA/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bacitracin methylene disalicylate 50%
Indikasi Pada ayam pedaging mengatasi Necrotis enteritis yang disebabkan oleh Clostridium perfringens. Pada babi sebagai pengobatan *Swine dysentery* yang bersamaan dengan Treponema hyodysenteriae. Pada kalkun untuk mengatasi Transmissible enteritis (blue comb, mud fever) yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap bacitracin metylene Waktu Henti Obat 0 (nol) hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum. Boriler: Pencegahan: 25 g/500 L, pengobatan: 50-100 g/500 L, untuk swine dysentery: berikan selama 7 hari berturut-turut atau hingga hilang gejala klinis tetapi tidak boleh lebih dari 14 hari. Kalkun: 100 g/500 L diberikan hingga hilang gejala klinis **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. I. 09103721 PTS. Obat keras
76. **BOVACLOX DC** **Norbrook Laboratories, Inggris/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung cloxacillin benzathine dan ampicillin trihidrat
Indikasi Antibakteri yang peka terhadap ampicillin dan cloxacillin pada ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Syringe 5 ml **Deptan RI** No. I. 04062296 PKC. 1. Obat keras
77. **BUTASYL** **Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Phenyl butazone dan sodium salicylate **Indikasi** Pengobatan radang akut, alergi dan pireksia pada kuda dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** IM atau IV pada kuda dan sapi **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 0711477 PKC. 1. Obat keras
78. **CALIMICINA 200 CL** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 1 ml mengandung 200 mg oxytetracycline dalam larutan polyvinylpyrrolidone **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi yang sensitive terhadap oxytetracycline (pneumonia, diphtheria, pasteurellosis, salmonella, polyarthritis, erysipelas, mastitis agalactia, dll) **Perhatian** Jangan diberikan bersamaan waktu dengan penicillin. Kadang terjadi memar pada sekitar daerah penyuntikan tapi akan normal kembali **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IM, SC ataupun IV. Sapi, domba/kambing dan babi: 6,6-11 mg/1 kg BB atau 0,33-0,55 ml/10 kg BB **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 0012854 PKC. Obat keras
79. **CAPRICOLI** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sulfadiazine, trimethoprim **Indikasi** Untuk mengobati penyakit pada, Unggas: colibacillosis, snout (infectious coryza), fowl cholera, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis, infeksi sekunder CRD kompleks. Bakteri lainnya yang peka terhadap sulfadiazine dan trimethoprim. Babi: diarrhea, pneumonia, erysipelas, salmonellosis. Bakteri lainnya yang peka terhadap sulfadiazine dan trimethoprim

Perhatian Pemotongan dapat dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum. Babi: 1 g/16 kg BB **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 07093295 PKS. Obat keras

80. CAPRIMOX

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung amoxicillin, colistin **Indikasi** Untuk mengobati penyakit pada Unggas: fowl cholera, colibacillosis, salmonellosis, snot, streptococcosis, staphylococcosis dan infeksi bakteri lainnya yang peka terhadap amoxycillin dan colistin. Babi: diare, pneumonia (infeksi saluran pernafasan), erysipelas, dll **KontraIndikasi** Jangan diberikan pada hewan yang peka terhadap b-laktam, seperti marmut dan hámster **Perhatian** Pemotongan dapat dilakukan 1 hari setelah pemberian obat dihentikan. Melalui pemberian oral, colistin sangat sulit diserap dan tidak ada residu antibiotik dalam jaringan yang dapat dimakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/3 L air minum. Anak babi dan induk babi: 1 g/15 kg BB **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 07053220 PKS. Obat keras

81. CEFABEE OINTMENT

Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri

Bentuk Sediaan Ointment Komposisi Setiap 3g-syringe mengandung cefuroxime sodium 250 mg (as base) **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan mastitis pada sapi selama periode pemerahan **Dosis dan Cara Pemakaian** Isi dalam 1 syringe dimasukkan ke dalam saluran puting dari setiap kuartir yang terinfeksi 2x sehari (setiap 12 jam) setelah pemerahan selesai **Waktu Henti Obat** 3 hari **Kemasan** 4 syringe @ 3 g/box, 20 syringe @ 3 g/box **Kementan RI** No.I. 12104371 PKM. Obat bebas terbatas

82. CEMOXIN

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk. Komposisi tiap gram mengandung erythromycine thiocyanate 100 mg, amoxycilline tryhidrate 240 mg. **Indikasi** Pengobatan penyakit Pernafasan dan pencernaan pada unggas seperti CRD kompleks, Salmonella (berak kapur), Pasteurella (berak hijau) E.coli dan bakteri lainnya yang sensitif terhadap kedua preparat Erythromycine dan Amoxyciline. **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g kedalam 2 L air minum, berikan 3-5 hari berturut-turut atau 100 gram untuk 500-1.000 kg BB **Kemasan** 100 gram, 1 kg, 10 kg dan 30 kg. **Deptan RI** No. D. 12032454 PKS.1. Obat keras

83. CENTRA – ENROX INJECTION 10%

Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/

CV. Fianza Putera

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi Komposisi Tiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Antibiotik untuk mengobati penyakit pernafasan, infeksi saluran pencernaan dan saluran kemih yang disebabkan bakteri g (-) seperti E. Coli, salmonella, klebsiella, pasteurella, haemophilus, pseudomonas dan bakteri g (+) seperti clostridia, streptococcus dan mycoplasma **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan secara IM. Pada sapi dan pedet: 0,5-1 ml/20 kg BB/hari (selama 3 hari). Pada domba dan kambing: 0,5 ml/20 kg BB/hari (selama 3 hari) **Waktu Henti Obat**

pada ternak pedaging 21 hari dan pada ternak perah 7 hari **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Kementan RI** No. I. 130214418 PKC.

**84. CENTRA – OXYTE INJECTION 10% Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/
CV. Fenanza Putera**

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oxytetracycline 100 mg
Indikasi Antibiotik untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri g (+) dan (-) yang sensitif terhadap oxytetracycline seperti pada kasus penyakit saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih dan septisemia pada kuda, sapi, domba, kambing dan babi
Dosis dan Cara Pemakaian Suntikkan secara IM pada semua hewan ternak dengan dosis 1-2 ml/10 kg BB/hari (selama 3 hari) **Waktu Henti Obat** pada ternak pedaging 21 hari dan pada ternak perah 7 hari **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Kementan RI** No. I. 13024444 PKC.

**85. CENTRA-OXYTE LA INJECTION 20% Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/
CV. Fenanza Putera**

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oxytetracycline 200 mg dan Macrogol 400 250 mg **Indikasi** Antibiotik untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri g (+) dan (-) yang sensitif terhadap oxytetracycline seperti pada kasus penyakit saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih dan septisemia pada kuda, sapi, domba, kambing dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan secara IM pada semua hewan ternak dengan dosis 1 ml/10 kg BB/hari **Waktu Henti Obat** pada ternak pedaging 21 hari dan pada ternak perah 7 hari. Sebaiknya tidak menyuntikkan lebih dari 20 ml di satu tempat pada sapi, lebih dari 10 ml di satu tempat pada babi, dan lebih dari 5 ml di satu tempat pada domba dan kambing **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Kementan RI** No. I. 13024445 PKC.

**86. CENTRA – TYLO INJECTION 20% Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/
CV. Fenanza Putera**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung tylosin tartrate 223 mg setara dengan tylosin 200 mg **Indikasi** Antibiotik untuk mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman mycoplasma pada sapi, domba, babi, unggas dan hewan kesayangan lainnya seperti penyakit bovine contagious pleuropneumonia, contagious caprine pleuropneumonia, pig's asthma, chicken's chronic respiratory disease (CRD), infectious rhinitis dan mycoplasma hyorhinis, mycoplasmosis. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengatasi mastitis, pneumonia dan transportation fever, necrotic pododermatitis, swine infectious pleuropneumonia, atropic rhinitis dan disentri pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pedet, domba, babi, anjing dan kucing: 0,025-0,065 ml/kg BB, pemberian 2x sehari selama 5 hari. Pada unggas: 0,125 ml/kg BB, pemberian 1x sehari selama 5 hari **Perhatian Waktu Henti Obat** pada unggas 1 hari **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Kementan RI** No. I. 12124407 PKC.

87. CENTRA-TYLO SOLUBLE POWDER 20%

Aether Centre (Beijing)

Biology Co., Ltd/CV. Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung tylosin tartrate 223 mg setara dengan tylosin 200 mg **Indikasi** Antibiotik untuk mengobati penyakit pada unggas seperti chronic respiratory infection seperti batuk, bersin, mata berair, pembengkakan mata, pembengkakan wajah subcutan, hyperemia, hypertrophy, degenerasi folikel, nekrosis dan atrophy lainnya. Pada babi/sapi: mycoplasma pneumonia, asthma, infectious pleuropneumonia dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pengobatan pada unggas: 1 g/L air minum selama 3-5 hari. Pada sapi dan babi: 15-35 mg/kg BB selama 3-5 hari **Waktu Henti Obat** pada unggas 1 hari **Kemasan** Sachet 100 g, 200 g, 500 g dan 1.000 g. Bag 5 kg, 10 kg, 20 dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094349 PKS.

88. CENTRE – NEOMY SOLUBLE POWDER 5%

Aether Centre

(Beijing) Biology Co., Ltd/CV. Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Soluble powder **Komposisi** Tiap g mengandung tylosin phosphate 286 mg/g setara dengan tylosin 250 mg/g. Tiap g mengandung neomycin sulfate 50 mg **Indikasi** Efektif untuk mengobati infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri g (-). Untuk pengobatan colibacillosis (enteritis bakteri) yang disebabkan oleh Escherichia coli dan kontrol kematian yang berkaitan dengan organisme Escherichia coli pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 100 g/67-100 L air selama 3-5 hari. Untuk babi: 750-1.500 g/1.000 L air selama 3-5 hari **Waktu Henti Obat** Pada ayam: 5 hari sebelum dipotong. Pada kalkun: 14 hari. Pada babi: 3 hari **Kemasan** Sachet 100 g, 200 g, 500 g dan 1.000 g. Bag 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 13054536 PKS.

89. CENTRE – TYLO PREMIX 25%

Aether Centre (Beijing) Biology

Co., Ltd/CV. Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung tylosin phosphate 286 mg/g setara dengan tylosin 250 mg/g **Indikasi** Untuk mengobati enteritis, diare dan penyakit saluran pernapasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk babi: campuran 140-280 g kedalam 1 ton pakan. Ayam: campuran 105-210 g kedalam 1 ton pakan **Waktu Henti Obat** Pada ayam dan babi 5 hari **Kemasan** Sachet 100 g, 200 g, 500 g dan 1.000 g. Bag 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094350 PKS.

90. CERESTOP

Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk Injeksi **Komposisi** Ceftiofur sodium 1000mg/ vial **Indikasi** Infeksi saluran pernapasan; foot-rot dan mastitis pada sapi; Infeksi saluran pernafasan pada babi dan kuda; Colibacillosis dan Salmonellosis pada ayam. **Kontra Indikasi** Jangan gunakan Ceftiofur pada hewan yang hipersensitif terhadap zat ini **Perhatian** Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan, Simpan pada suhu 2-8oC. Dosis dan pemakaian Sapi, babi, ayam dan kuda 1-2 mg per Kg BB; DOC 0.08-0.2 mg per ekor secara SC atau IM **Kemasan** 2 x 1 g/vial **Deptan RI** No. I. 04052759 PKS . Obat keras.

- 91. CHEIL COLISTIN** **Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Colistin sulfate 100g/Kg **Indikasi** Infeksi saluran pencernaan pada ayam, sapi dan babi yang disebabkan oleh bakteri Gram negatif **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam 2g/10 L air minum; babi 2g/10 L air minum; sapi 5g/10 L air minum **Perhatian** Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan, Simpan di tempat yang kering dan terhindar sinar matahari langsung **Kemasan** Sak 10 dan 20Kg **Deptan RI** No. I. 06073086 PKS. Obat keras.
- 92. CHEIL TYLOSIN – 100** **Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tylosin tartrate 100g/kg **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit CRD, Infectious coryza dan Staphylococcus aureus pada ayam. **Perhatian Waktu Henti Obat** 3 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan sebanyak 5 g/L air minum berikan selama 3 hari berturut-turut. **Kemasan** sak 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I 11024011 PKS. Obat keras.
- 93. CHLORTETRACYCLINE – 25** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Chlortetracycline 25% **Indikasi** Pengobatan CRD, coryza, kolera, salmonellosis, blue comb, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 g/L air minum diberikan selama 5–7 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg **Deptan RI** No. D. 06071358 PKS. 2. Obat keras
- 94. CIPROCAP** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung ciprofloxacin **Indikasi** Mengobati CRD kompleks, colibacillosis, snot/infectious coryza, fowl cholera, salmonellosis, staphylococcosis, streptococcosis, dll **Perhatian** Pemotongan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara pemakaian** Larutkan 1 g/1 L air minum. Berikan 2 kali sehari (pagi & sore), selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 07043213 PKS. Obat keras
- 95. CIPROFLOX – 100 SP** **S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung siprofloksasin HCl **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap colibasilosis, salmonelosis, mikoplasmosis, fowl kolera dan coryza pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Per oral melalui air minum: 0,5 ml/L air minum selama 3 hari berturut-turut atau 5 hari untuk kasus salmonelosis **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 07073245 PKC. Obat keras
- 96. CIPROLON** **Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap g mengandung siprofloksasina 100 mg **Indikasi** Efektif mengobati penyakit pencernaan, pernafasan dan perkencingan pada unggas seperti complex of CRD, fowl cholera, infectious coryza/snot, colibacillosis, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis dan penyakit lain yang peka terhadap siprofloksasina **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 1007808 PKS. 1. Obat keras

97. CIPROMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Ciprofloxacin 100 g **Indikasi** Mycoplasmosis, Colibacillosis, Fowl cholera, coryza, snot, Salmonellosis, Staphylococcosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas: 10 g/20 L air minum atau 0,1 gr CIPROMAS/Kg BB/hari selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Kementan RI No. D. 1201420 PKS.1** Obat keras.

98. CIPROMED

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ciprofloxacin **Indikasi** Mengobati CRD kompleks, colibacillosis, fowl cholera, infeksi bakteri gram-positif dan gram-negatif lainnya **Perhatian** Pembedahan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml dilarutkan dalam 2 L air minum atau 1 ml/10 kg BB/hari dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 0507909 PKC. 1.** Obat keras

99. CIPROPAN

Sinar Harapan, UD

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung cyprofloxacin **Indikasi** Untuk mengatasi penyakit infeksi bakterial diantaranya Coryza, CRD kompleks, kolibasilosis, salmonellosis, kolera, infeksi gram positif dan negatif pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat kemasan **Kemasan** Sachet 100 g, 1 kg dan 10 kg **Deptan RI No. D. 07023173 PKS.** Obat keras

100. CIPROSIN^{EXTRA}

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ciprofloxacin HCl 100 g, tylosin tartrate 100g **Indikasi** Mengobati CRD kompleks yang parah dan mengencerkan lendir yang menyumbat pernafasan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g ke dalam 2 L air minum **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg **Kementan RI No. D. 12074299 PKS.** Obat keras

101. CIPROVAKS

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk larut air **Komposisi** Setiap kg mengandung ciprofloxacin 100 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit pada ayam seperti chronic respiratory disease, colibacillosis, fowl typhoid, fowl Cholera, infectious coryza, mycoplasmosis, pullorum, salmonellosis, staphylococcosis dan streptococcosis **Perhatian** Hentikan pengobatan 7 hari sebelum ayam dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g dalam 2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI No. D. 02071049 PKS.** TM. Obat keras

102. CIPROVAKS

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung siprofloksasin HCl **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap ciprofloxacin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g dalam 2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g, kantong plastik 1 kg dan 5 kg **Deptan RI No. D. 08013370 PKS.** Obat keras

103. CIPROVET

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung zat aktif ciprofloxacin aktif 100 g
Indikasi Antibiotik spektrum kerja luas dan sangat efektif membunuh semua bakteri patogen pada unggas antara lain untuk pengobatan dan pengawasan terhadap infeksi bakteri g (-), g (+) dan mycoplasma pada unggas diantaranya chronic respiratory disease (CRD), colibacillosis, fowl typhoid, pullorum, fowl cholera, infectious coryza, necrotic enteritis, salmonellosis, staphylococcosis dan streptococcosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap 0,5 g/L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 9906129 PKS. Obat keras

104. CIPROXACIN

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Suspensi Komposisi Tiap ml mengandung ciprofloxacin 100 mg **Indikasi** Membasmi penyakit unggas seperti CRD, CRD kompleks, colibacillosis, fowl cholera, infectious coryza, pullorum dan streptococcosis serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang sensitif terhadap ciprofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 0,5 ml/L air minum selama 5 hari atau 10 mg/kg BB **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 30 L **Deptan RI** No. D. 04062767 PKC. Obat keras

105. CIPROXAN

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung ciprofloxacin 100 mg **Indikasi** Untuk mengobati penyakit mycoplasmosis, colibacillosis, fowl cholera, coryza, salmonellosis dan staphylococcosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum, atau 10 mg ciprofloxacin/kg BB dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 7 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D. 03052588 PKS. Obat keras

106. CIPRO – 12

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung ciprofloxacin HCl 120 g, laktosa ad 1.000 g **Indikasi** Untuk mengobati CRD kompleks pada saluran pernapasan pada ayam **Dosis dan Cara pemakaian** Larutkan 1 g ke dalam 2 liter air minum. Berikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, dan 5 kg **Deptan RI** No. D. 04122848 PKS. TM. Obat keras

107. CLAVAMOX DROPS

Glaxo Smith Kline, USA & Aurubindo, India/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Amoxicillin trihydrate dan clavulanate acid **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi pada kulit dan jaringan lunak, infeksi periodonta, infeksi saluran kemih (cystitis) yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap amoxicillin dan clavulanate pada anjing dan kucing **Kontra Indikasi** Pemakaian obat ini tidak dianjurkan untuk anjing dan kucing yang mempunyai sejarah pengobatan alergi terhadap penicillin atau cephalosporin **Perhatian** Pemberian obat ini hanya dilakukan atas wewenang dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dengan menambahkan 14 ml air ke dalam botol, kocok hingga rata dan diberikan secara oral. Pada anjing dosis yang direkomendasikan: 12,5 mg/kg BB, diberikan 2x dalam sehari. Pada infeksi infeksi kulit dan infeksi jaringan lunak seperti abses, selulitis,

luka, pyoderma superficial dan infeksi periodontal dilakukan terapi 5-7 hari atau 48 jam setelah semua gejala klinik berkurang. Pada pyoderma yang parah, pengobatan dapat dilakukan hingga 21 hari. Masa pengobatan maksimum tidak melebihi 30 hari. Pada kucing dosis yang direkomendasikan: 12,5 mg/kg BB, diberikan 2x dalam sehari. Pada infeksi infeksi kulit dan infeksi jaringan lunak seperti abses, selulitis/dermatitis terapi dilakukan 5-7 hari atau 48 jam setelah semua gejala klinik berkurang. Infeksi pada saluran kemih membutuhkan terapi 10-14 hari atau lebih dengan masa pengobatan maksimum tidak melebihi 30 hari **Kemasan** 15 ml **Deptan RI** No. I. 08103501 PKS. Obat keras

108. CLAVET 50 TABLET

Cipla, Ltd., India/Paeco Agung

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Amoxicillin dan asam clavulanat **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap amoxicillin dan asam clavulanat pada kucing dan anjing **Perhatian** Obat keras **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan sesuai petunjuk dokter hewan anda **Kemasan** Box isi 10 strip @ 10 tablet **Deptan RI** No. I. 12114393 PKM.

109. CLAVET 250 TABLET

Cipla, Ltd., India/Paeco Agung

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Amoxicillin dan asam clavulanat **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap amoxicillin dan asam clavulanat pada kucing dan anjing **Perhatian** Obat keras **Dosis dan Cara pemakaian** Gunakan sesuai petunjuk dokter hewan anda **Kemasan** Box isi 10 strip @ 10 tablet **Deptan RI** No. I. 12074296 PKM.

110. CLINIC PLUS

PT. Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfadiazine 160 g, trimethoprim 32 g **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap sulfadiazine dan TMP pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 g/2 L air minum selama 2 hari berturut-turut dan ulangi selama 4 minggu. Pengobatan: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kontra Indikasi** Jangan diberikan bersamaan nicotinamide ataupun folic acid **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. D. 04092819 PKS. Obat keras

111. COCCILIN CAPSUL

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tetracycline HCl, sulfadiazine sodium, DL-Methionine, vitamin K3 **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tetracycline dan sulfadiazine pada unggas **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** umur 0-5 minggu: 1/3 kapsul. Umur 5-10: minggu ½ kapsul. Umur > 10 minggu: 1 kapsul. BB lebih dari 3 kg: 2 kapsul dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 10, 100, 250, 500 kapsul **Deptan RI** No. D. 0604575 PKM. 1. Obat keras

112. COCCILIN WATER SOLUBLE POWDER

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tetracycline HCl, sulphadiazin sodium

Indikasi Antibakteri yang peka terhadap tetracycline dan sulfadiazine pada unggas **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara pemakaian** 2,5–5 g dilarutkan 1 L air minum diberikan selama 3–5 hari berturut-turut. Bila perlu dapat diulang setelah istirahat 3 hari **Kemasan** 5 g, 10 g, 100 g, 500 g, 1 kg **Deptan RI** No. D. 0512372 PKS. 1. Obat keras

113. COLA FLOXA

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** tiap gram mengandung Enrofloxacin 100 mg. Indikasi infeksi bakteri Gram positif dan negatif serta mengatasi infeksi yang disebabkan oleh Mycoplasma. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g kedalam 2 liter air minum selama 3-5 hari berturut-turut atau 100 g untuk 1000 Kg BB. **Kemasan** 100 g, dan 1 Kg (kaleng) **Deptan RI** No. D. 0510037 PKS.1. Obat keras.

114. COLA – FLOXA LIQUID

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** setiap ml mengandung Enrofloxacin 100 mg Indikasi Unggas: pengobatan CRD, Colibacillosis, Coryza, Kolera, Fowl typhoid, Salmonellosis, infeksi Staphylococcus dan Streptococcus, Mycoplasmosis. Ruminansia : pengobatan Enteritis, Diare, Pneumonia, Mastitis, Metritis, Nephritis, Colibacillosis, Pasteurellosis, Salmonellosis, Mycoplasmosis, infeksi clostridial, infeksi saluran pernafasan dan urinarius. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 1 ml/2 liter air minum selama 3-5 hari atau 100 ml/kg, BB Ruminansia: 1 ml/40 kg BB atau 2,5 – 5 ml/kg BB selama 3 – 5 hari **Kemasan** 100 ml, 1 L **Deptan RI** No. D. 08073460 PKC. Obat keras

115. COLAMOX 200

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung amoxycillin dan colistin Indikasi Unggas: fowl cholera, colibacillosis, salmonellosis, snout, staphylococcosis, streptococcosis dan infeksi bakteri lainnya yang peka terhadap amoxycillin dan colistin. Babi: diare, pneumonia dan erysipelas **Perhatian** Pemotongan hewan dapat dilakukan 1 hari setelah pemberian obat dihentikan Dosis dan Cara pemakaian Unggas: 1 g/2 L (2 kali/hari). Anak babi dan induk babi: 1 g/20 kg BB dan campurkan dengan air secukupnya serta diminumkan 2 kali/hari **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 0010258 PKS. Obat keras

116. COLERAX

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap gram mengandung amoxycillin trihydrate 100 mg, neomicyn sulphate 50 mg. **Indikasi** mengobati kolera unggas dan bakteri aspesifik pada saluran pencernaan. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1g/ 1 L air minum selama 3-5 hari atau 100 g/ 500-1000 Kg BB. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg dan 30 kg. **Deptan RI** No. D. 1207211 PKS.1. Obat keras

117. COLIBACT

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sulfadiazine dan trimethoprim **Indikasi**

Unggas: colibacillosis, infectious coryza, fowl cholera, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis, infeksi sekunder CRD. Babi: diarrhea, salmonellosis, pneumonia dan erysipelas **Perhatian** Pematangan dapat dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum dan berikan 2 kali sehari. Babi: 1 g/16 kg BB dan campurkan dengan air secukupnya serta diminumkan 2 kali/hari **Kemasan** 10 g, 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 04111278 PKS. 3. Obat keras

118. COLIBACT BOLUS

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Bolus **Komposisi** Mengandung sulfadiazine dan trimethoprim **Indikasi** Melindungi uterus dari infeksi bakteri setelah sapi, kambing, domba dan babi melahirkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 2-4 bolus. Kambing, domba dan babi: 1-2 bolus. Non-ruminansia dan pre-ruminant (pedet/batilan): 1 bolus/40 kg BB **Kemasan** Dus isi 6 strip @ 2 bolus **Deptan RI** No. D. 04111548 PKM. 2. Obat keras

119. COLIBACT INJEKSI

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung sulfadiazine dan trimethoprim **Indikasi** Mengobati infeksi terhadap saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, infeksi sekunder pada penyakit viral, septicemia, radang persendian, foot rot, mastitis, MMA sindrome **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara pemakaian** Sapi, kuda, kerbau: 6,25-12,5 ml/100-200 kg BB. Anak sapi, anak kuda, anak kerbau, domba, kambing: 2,5-5,0 ml/40-80 kg BB. Unggas: BB 1-2 kg, encerkan 1 ml dengan 15 ml aquades. Ambil 1-2 ml dan suntikkan intramuscular atau subkutan **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0408345 PKC. 1. Obat keras

120. COLIBACT SOLUTION

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sulfadiazine dan trimethoprim **Indikasi** Unggas: colibacillosis, infectious coryza, fowl cholera, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis, infeksi sekunder CRD. Babi: diarrhoea, salmonellosis, pneumonia dan erysipelas **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/2 L air minum (2 kali/hari). Anak babi dan induk babi: 1 ml/16 kg BB **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 0507108 PKC. 1. Obat keras

121. COLIMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Trimethoprim 41 g dan Sulfadiazine 205 g **Indikasi** Colibacillosis, Fowl cholera, Pullorum (berak kapur), Snot dan infeksi bakteri sekunder pada kasus CRD complex **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas 1 g/liter air minum atau 200 mg COLIMAS/Kg BB selama 3 – 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Kementan RI** No. D. 1207219 PKS. 1 Obat keras.

122. COLIMAX 100

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Colistin sulfate 100g/Kg **Indikasi** untuk pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kuman yang peka terhadap colistin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan sebanyak 0,25-0,5 gram per liter air minum selama 3-5 hari berturut-turut. **Perhatian** Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan, Simpan di tempat yang kering dan terhindar sinar matahari langsung **Kemasan** Sachet 1 kg dan 5 kg serta kantung 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12014210 PKS. Obat keras.

123. COLIMIX

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kombinasi ampicilin trihidrat dan neomisin sulfat **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi bakteri g negatif dan g positif, khususnya yang disebabkan oleh E. coli dan salmonella. Juga dimaksudkan untuk pengobatan terhadap enteritis bakterial dan bakteri yang sensitif terhadap neomycin yang bergabung dengan CRD **Dosis dan Cara Pemakaian** Per oral melalui air minum: 100 g/200 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. I. 06053067 PKS. Obat keras

124. COLIMIX-20

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung amoxicillin trihidrat 200 g, colistin sulfat 500 juta IU **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g dalam 1-2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 2 g dalam 1 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** 100 g **Deptan RI** No. D. 10093904 PKS. Obat bebas terbatas

125. COLIQUIN

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung flumequine 50 g, colistin sulfate 500.000.000 IU **Indikasi** Colibacillosis, dan kolera **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap L air minum, diberikan selama 3-4 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas isi 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 03011871 PKS. 1. Obat keras

126. COLISID

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Soluble powder **Komposisi** Tiap g mengandung doksisisiklin 50 mg, kolistin 275.000 IU **Indikasi** Mengatasi kolibasilosis, salmonellosis, kolera, snot, black head dan berak darah pada ayam. Mengobati enteritis pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam 1 g/L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 1 g/8 kg BB **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg **Deptan RI** No. D. 04052026 PKS. 1. Obat keras

127. COLISTAM

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung amoxicilline 200 mg dan colistine 500.000 IU **Indikasi** Efektif untuk mengobati infeksi bakteri g negative pathogen seperti E.

coli, snot (Haemophyllus spp), dan kolera unggas serta bakteri g negative lainnya seperti Aerobacter spp, Shigella spp, Pseudomonas aeruginosa dan Vibrio spp. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/3 L air minum atau 100 g/2.000 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan pot 500 g **Deptan RI** No. D. 06043064 PTS. TM. Obat keras

128. COLISTAN

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung doksisisiklin hiklat 50 mg dan kolistin sulfat 360.000 IU **Indikasi** Pengobatan terhadap complex of CRD, fowl cholera, infectious coryza/snot, colibacillosis, salmonellosis, streptococcusis, staphylococcusis dan penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap doksisisiklin dan kolistin pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/L air minum. Babi: 1 g/8 kg BB **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 08083475 PKS. Obat keras

129. COLIVET

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung neomycin sulfate 40 g, oxytetracycline HCl 60 g, vitamin A 1.000.000 IU, dan menadione (vit K3) 2 g **Indikasi** Efektif untuk pengobatan colibacillosis, cholera unggas bentuk pencernaan maupun pernafasan serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh bakteri **Dosis dan Cara pemakaian** Ayam: 10 g (2 sendok teh)/5 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 04042391 PKS. 1. Obat keras

130. COLIVET SOLUTION

**Ceva Sante Animale, Perancis/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Colistin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap colistin pada sapi, domba, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. I. 08013376 PKC. Obat keras

131. COLI-OXY

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Colistin sulfate dan oxytetracycline HCl **Indikasi** Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap kolistin dan oksitetrasiklin pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Lihat kemasan **Kemasan** ½ kg, 5 kg @ 100 g, 5 kg @ 250 g, 15 kg @ 100 g, 15 kg @ 250 g, 50 kg @ 100 g dan 50 kg @ 25 g **Deptan RI** No. D. 08102081 PKS. 1. Obat keras

132. COLLIMEZYN[®]

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfadiazine 205 mg, dan trimethoprim 41 mg **Indikas** Colibacillosis, korisa, kolera, salmonelosis, stafilokokosis, streptokokosis dan CRD kompleks **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1g tiap 2 L air minum atau 0,1 g tiap kg BB diberikan selama 3-5 hari berturut **Kemasan** Kantung plastik 10 sachet @ 100 g. Sachet aluminium 250g **Deptan RI** No. D. 10123950 PKS. Obat keras

- 133. COLMYC – E[®]** **S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung 10 g enrofloxacin **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan oleh salmonella dan E. coli pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/L air minum selama 3 hari **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 11101997 PKC. 1.** Obat keras
- 134. COMOXY 500 WSP** **Better Pharma Co., Ltd., Thailand/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amoxicillin trihydrate dan colistin sulphate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoxicillin dan kolistin pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum **Kemasan** Bag 100 g, 250 g, 500 g, dan 1 kg **Kementan RI No. I. 12124395 PKS.** Obat keras
- 135. COOPERTET LA** **Bimeda Chemicals Ltd, Irlandia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Oxytetracycline dihydrate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap Oxytetracycline pada sapi, kambing, domba dan babi **Perhatian** Obat keras, baca aturan pakai **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 mg/kg BB, suntik IM **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No I. 0512401 PKC. 2.** Obat keras.
- 136. CORISIN** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** tiap gram mengandung trimethoprim sodium 80 mg, sulfadiazine sodium 400 mg **Indikasi** menyembuhkan penyakit Snot/Koriza dan komplikasinya seperti Kolibasilosis, Kolera dan Salmonella. Pada babi, digunakan untuk mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi E.coli dan Salmonella. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 - 5 liter air minum, atau 100 g/1500 Kg BB Babi, Kambing dan Domba 1 g untuk 20 kg BB **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg, 30 kg. **Deptan RI. No. D. 04062768 PKS.** Obat keras.
- 137. CORISIN – 24** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** tiap gram mengandung trimethoprim 40 mg, sulfadiazine 200 mg **Indikasi** menyembuhkan penyakit Snot/Koriza dan komplikasinya seperti CRD kompleks, berak hijau, kolibasilosis, kolera dan Salmonellosis Pada babi, digunakan untuk mengobati Diare yang disebabkan oleh infeksi E.coli dan Salmonella **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/1– 2,5 liter air minum, atau 100 g/ 750 Kg BB . Babi, Kambing dan Domba: 1 gram untuk 10 kg berat badan. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg, 30 kg. **Deptan RI No. D. 0406445 PKS.1** Obat keras.
- 138. CORYDON** **Pyridam Veteriner**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung ampicillin trihydrate 50 mg, colistin sulfate 250.000 IU **Indikasi** Efektif untuk pengobatan cholera, CRD, dan pullorum pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur 0-2 minggu: 5 g (1 sendok teh)/6 L air minum, umur 2 minggu dan seterusnya: 5 g (sendok teh)/5 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0202805 PKS.** Obat keras

139. CORYMYCOL

Laboratories Biove, Perancis/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ampicilin dan eritromisin **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit pada gastrointestinal yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap ampicilin dan eritromisin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 50 g dan botol HDPE 500 g **Deptan RI** No. I. 07073236 PKS. Obat keras

140. CORYVIT WATER SOLUBLE POWDER®

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung oxytetracycline HCl, neomycin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oxytetracycline dan neomycin **Perhatian** Jangan diberikan 3 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyakit ringan: 1 g dilarutkan ke dalam 2 L air minum. Penyakit berat: 1 g dilarutkan ke dalam ½-1 L air minum. Penyakit berat yang sudah tidak dapat minum: 1 g dilarutkan dalam 20 ml air minum, kemudian diberikan 4 ml/kg BB dengan spuit tanpa jarum/pipet. Diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 5 g, 10 g, 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 05100374 PKS. 2. Obat keras

141. COSUMIX PLUS 750

**Shanghai Novartis Animal Health Ld, China/
Novartis Indonesia Novindo Agritech Utama**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sulfachloropyridazine dan trimethoprim **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap sulfachloropyridazine dan trimethoprim pada unggas dan babi **Dosis dan Cara pemakaian** Pada unggas: 0,16 g/L air minum dan untuk pengobatan 0,24-0,32 g/L air minum **Kemasan** Sachet 80 g **Deptan RI** No. I. 031022105 PKS. 2. Obat keras

142. COTRIMAZINE

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung trimethoprim 40 g dan sulfadiazine 200 g **Indikasi** Mengobati penyakit snot/infeksius coryza, fowl cholera, colibacillosis, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis, penyakit lain yang peka terhadap trimethoprim dan sulfadiazin pada unggas dan babi **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: melalui air minum 1 g/2 L air minum, ukuran BB 1 g/16 kg BB selama 3-5 hari (babi) **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 1007246 PKS. 1. Obat keras

143. COTRIMOXAZOLE

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Kaplet 1,2 g **Komposisi** Tiap kaplet mengandung trimethoprim 160 mg dan sulfamethoxazole 800 mg **Indikasi** Mengatasi endometritis, metritis dan diare serta pneumonia **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kerbau dan kuda: 2-4 kaplet/ekor intrauterine. Kambing, domba dan babi: 1-2 kaplet/ekor intrauterine. Pedet (batilan): 1 kaplet/ekor per oral **Kemasan** Botol isi 12 kaplet dan 50 kaplet **Deptan RI** No. D. 10113942 PKM. Obat keras

144. COTRIM 240 INJECTION

ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung trimethoprim 40 mg, sulfadoxine 200 mg **Indikasi** Mengobati penyakit akibat bakteri secara luas (spektrum luas) pada sapi,

domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Setara dengan 1 ml cotrim 240 injeksi/15 kg BB. Sapi dewasa dan kuda: 20-30 ml. Anak sapi dan anak kuda: 5-15 ml. Sapi bunting: 3-5 ml. Babi: 2-8 ml. Kuda: lebih baik dengan IV secara perlahan, dapat juga dengan IM. Sapi: dengan IV atau IM. Babi: dengan IM **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI**. No. I. 12111382 PKC. 1. Obat keras

145. CRD 92

Coophavet Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 100 g mengandung spiramisin 50 juta I dan trimethoprim 5 g **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi penyakit yang disebabkan oleh mikoplasmosis (CRD) dan komplikasi bakteri yang lain **KontraIndikasi** Jangan dipergunakan pada hewan yang mengalami gangguan fungsi ginjal dan hati **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk ayam: 1-2 g/L air minum. Untuk hewan besar: 0,2 g/kg BB/hari dicampur dengan air minum. Lama pengobatan antara 3 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg dan 2,5 kg **Deptan RI** No. I. 03102658 PKS. Obat keras

146. CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap vial mengandung PPG kristal 3.000.000 IU **Indikasi** Antibakteri untuk penyakit-penyakit yang peka terhadap penicillin **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam akuades untuk injeksi subkutan atau IM. Kuda: 20.000-100.000 IU/kg BB. Sapi, kerbau: 10.000-60.000 IU/kg BB. Babi 40.000 IU/kg BB. Anjing, kucing: 20.000 IU/kg BB. Unggas 1.000-2.000/kg BB. Dapat diulang 24-48 jam kemudian **Kemasan** Vial 3.000.000 IU **Deptan RI** No. D. 0510238 PKS. 1. Obat keras

147. CTC SOLUBLE

SDS Biotech-Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung chlortetracycline **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum **Kemasan** 1 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 0508719 PKS. 3. Obat keras

148. CYPROSIN

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kombinasi siprofloksasin HCl dan tylosin tartrat **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap infeksi pernafasan, infeksi enteric dan jaringan halus yang disebabkan oleh bakteri pada unggas, ruminansia dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi, lembu, domba & kambing: 1 g/ekor hewan/hari. Unggas: 1 g/L air minum **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. I. 06033052 PKS. Obat keras

149. CYPROTYLOGRIN

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung Cyprofloxacin 100 gr dan Tylosin tartrate 100 g **Indikasi** Untuk mengatasi penyakit CRD kompleks, Snot, Cholera Pullorum, Colibacillosis dan infeksi umum lainnya yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap Cyprofloxacin dan Tylosin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g Cyprotylogrin

untuk 2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 Kg @ 100 g, 10 Kg @ 1 Kg **Deptan RI** No. D. 07073248 PKS. Obat keras.

150. DAIMETON SODIUM

Daichii Lab-Japan/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sulfamonomethoxine **Indikasi** Antibakteri
Dosis dan Cara Pemakaian 100 mg/kg BB dalam air minum **Kemasan** 100 g dan 5 kg
Deptan RI No. I. 0705192 PKS. 3. Obat keras

151. DENAGARD 20% INJECTION

Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/

Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung tiamulin hidrogen fumarat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tiamulin hidrogen fumarat pada babi **Dosis dan Cara pemakaian** Untuk swine disentri: 1 mg/20 kg BB sebagai pegobatan tunggal. Untuk anzootic pneumonia complex 1-1,5 mg/kg BB selama 3-5 hari. Untuk mycoplasma arthritis: 1-1,5 mg/kg BB selama 3 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 06093128 PKC. Obat keras

152. DENAGARD 45% WSG

Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/

Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tiamulin hidrogen fumarat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tiamulin hidrogen fumarat pada babi dan unggas **Kontra Indikasi** Terhadap produk-produk yang mengandung salinomycin, monensin dan narasin **Perhatian** Unggas atau babi yang sedang diberi pengobatan tiamulin jangan diberi monensin, salinomycin dan narasin **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian melalui air minum, pada unggas dengan dosis untuk pencegahan CRD: 1 g/3,6-2,3 L selama 1-3 hari, untuk pengobatan CRD 1 g/1,8 L selama 3-5 hari. Pada babi untuk swine disentri: 1 g/7,5 L selama 3-5 hari. Untuk swine pneumonia: 1 g/3,8-2,4 L selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 12111921 PKS. 2. Obat keras

153. DEPOLAC

Interchemie Werkend "De Adelaar" BV, The Netherlands/

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan injeksi intra mamaria **Komposisi** Tiap ml mengandung kloksasilin benzatin 100 mg dan neomisin sulfat 50 mg **Indikasi** Terapi mastitis sub klinis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap kloksasilin dan neomisin seperti corynebacterium, E. coli, staphylococcus dan streptococcus spp. pada masa kering pada sapi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemberian secara intramamaria. 1 injektor/kuartr sesudah pemerahan terakhir pada masa kering. Sebelum diterapi, puting susu harus dibersihkan dan didesinfeksi terlebih dahulu **Kemasan** Syringe plastik 5 ml **Deptan RI** No. I. 08113523 PKC. Obat keras

154. DIMETOPRIM ORAL POWDER

Coophavet-Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 100 g mengandung sulphadimethocine sodium 20 g dan trimethoprim 4 g **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tromethoprim dan

sulfadimetoksin pada sapi, kambing, domba, babi, kelinci dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi, domba, kambing, kelinci dan babi: 1-2 g/10 kg BB. Untuk unggas: 1 g dilarutkan dalam 1 L air minum dan diberikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan standing pouch 1 kg **Deptan RI** No. I. 09062378 PKS. 1. Obat keras

155. DIMOXAN WS

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung kolistin sulfat 1.200.000 IU dan amoksisilin trihidrat 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap kolistin dan amoksisilin seperti campylobacter, clostridium, corynebacterium, E. coli, erysipelothrux, haemophilus, pasteurella, salmonella, staphylococcus dan streptococcus spp., pada pedet, kambing, domba, ayam dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pedet, anak kambing, anak domba: 5 g/100 kg BB, 2x sehari selama 3-5 hari. Ayam dan babi: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari. Hanya untuk pre ruminansia **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1.000 g **Deptan RI** No. I. 07073242 PKS. Obat keras

156. DINATRIM

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Micronize trimethoprim, debenal **Indikasi** Pengobatan infeksi coryza (snot). Mengobati komplikasi CRD, fowl cholera. Menanggulangi infeksi bakterial pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** lihat brosur **Kemasan** 200 ml, 1 L **Deptan RI** No. D. 08011334 PKC. 2. Obat keras

157. DINAZOL

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung oksitetrasiklin HCl 55 mg, neomisin sulfat 55 mg **Indikasi** Untuk pengobatan kolera unggas, sinusitis, synovitis, infeksi hepatitis, mengobati infeksi karena salmonella sp., mengobati snot (coryza) dan mengobati komplikasi CRD **Perhatian** Pengobatan dihentikan 3 hari sebelum ayam dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air minum dengan dosis 1 g/L air minum. Dalam keadaan parah gunakan dosis 3 g/2 L air minum diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 5 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 06031351 PKS. 1. Obat keras

158. DOCTRIL

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung enrofloxacin 120 mg dan bahan pembantu sampai 1 g **Indikasi** CRD kompleks, colibacillosis, korisa dan kolera **Perhentian** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap 2 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 mg dan 1 kg. Tin isi 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 05071338 PKS. 1. Obat keras

159. DOXCINE WATER SOLUBLE POWDER

**Better Pharma Co., Ltd., Thailand/
Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Doxycycline hydrochloride **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doxycycline pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 g/200 L air minum/1.000 ekor (1-8 minggu). 200 g/400 L air minum/1.000 ekor (8-18 minggu) **Kemasan** Kaleng plastik 1 kg **Kementan RI** No. I. 12124396 PKS. Obat keras

160. DOXERIN

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg mengandung Doxycycline 10% dan Erythromycin 20% **Indikasi** CRD Kompleks, Fowl Cholera, Snot/Coryza dan penyakit pernafasan lainnya pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; 2 g/liter air minum/hari atau 400 mg DOXERIN/kg BB selama 3 – 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250g **Deptan RI** No. D. 07091300 PKS.2 Obat keras.

161. DOXERIN +

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg mengandung Doxycycline 10% dan Erythromycin 20% **Indikasi** CRD Kompleks, Fowl Cholera, Snot/Coryza dan penyakit pernafasan lainnya pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; 1 g/2 L air minum/hari atau 100 mg DOXERIN +/kg BB selama 3 – 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Deptan RI** No. D. 07043214 PKS. Obat keras

162. DOXINYL

Industrial Veterinaria, SA, Spanyol/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi setiap L mengandung Doxycycline 100 mg **Indikasi** Unggas pengobatan colibacillosis, CRD, dan mycoplasmosis Babi pengobatan penyakit saluran pernafasan antara lain Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica dan Mycoplasma hyopneumoniae **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler 0.5-1 ml/ L air minum selama 3-5 hari Babi 1 ml/ 10 kg BB selama 5 hari **Kemasan** 250 ml dan 1 L **Kementan RI** No. I. 11124188 PKC

163. DOXITRA

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung doxycycline 25 mg dan erythromycin 40 mg **Indikasi** Ampuh mengobati penyakit CRD, snot/coryza, dan penyakit saluran pernafasan lainnya pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 2 g/L air minum dan berikan selama 3–5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D. 03062606 PKS. Obat keras

164. DOXYCAP

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung doxycycline **Indikasi** Mengobati penyakit unggas seperti: chronic respiratory disease (CRD), colibacillosis, fowl cholera, polyarthritis, ornithosis, chlamydiosis dan infeksi bakteri lainnya yang peka terhadap doxycycline **Perhatian** Pemotongan bisa dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/L air minum. Diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 07093306 PKS. Obat keras

- 165. DOXYCOL** **Biotech Indonesia**
Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Doxycycline 150 mg, Colistine Sulphate 500.000 IU **Indikasi** Untuk mengobati penyakit Myoplasmosis, Salmonellosis, Colibacillosis, Pasteurellosis pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 0,5 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Babi 1,25 g/2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 06062343 PKS. 1. Obat keras.
- 166. DOXYCYCLINE – 10** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Doxycycline 10% **Indikasi** Pengobatan CRD, E. coli, coryza, kolera **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5–1 g/L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg **Deptan RI** No. D. 06071358 PKS. 2. Obat keras
- 167. DOXYCYCLINE 50% WSP** **Dopharma BV., Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung doksisisiklin hyclate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doksisisiklin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum **Kemasan** Botol 100 g dan 1.000 g **Kementan RI** No. I. 12014201 PKS. Obat keras
- 168. DOXYMAS** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Doxycycline 25 g **Indikasi** CRD Complex pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas 2 g/1 L air minum atau 400 mg DOXYMAS/kg BB selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Kementan RI** No. D. 1106588 PKS.1 Obat keras.
- 169. DOXYSOL – C** **Dopharma BV., Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung doksisisiklin hyclate dan kolistin sulfat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doksisisiklin dan kolistin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 100 g dan kaleng plastik 1 kg **Deptan RI** No. I. 06082312 PKS. 1. Obat keras
- 170. DOXYTIN** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung doxycycline HCl 50 mg, colistin sulfate 500.000 IU **Indikasi** CRD kompleks, colibacillosis **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap 2 L air minum atau 0,1 g tiap kg BB, diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 06071839 PKS. 1. Obat keras
- 171. DOXYVET** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung doxycycline HCl 25 mg **Indikasi** CRD Waktu Henti Obat Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara pemakaian** 2 g tiap L air minum atau 0,4 g tiap kg BB, diberikan selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah

plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 g. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI**
No. D. 0604732 PKS. 2. Obat keras

- 172. DOXY 10 WSP** **Ewhapharmatek Corporation/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung doksisisiklin hyclate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doksisisiklin pada unggas, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum **Kemasan** Kantung 100 g, 500 g dan 10 kg **Kementan RI** No. I. 12094332 PKS. Obat keras
- 173. DOXY – PLUS** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Doxycycline 50 g dan erythromycine 100 g/kg **Indikasi** Pengobatan CRD, E. coli, coryza, kolera **Kontra Indikasi** Tidak ada **Dosis dan Cara pemakaian** 1 g/L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg **Deptan RI** No. D. 06101357 PKS. 2. Obat keras
- 174. DOXY – 500 WS** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/ Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung doksisisiklin 500 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan dan pernafasan akibat bakteri yang sensitif terhadap doksisisiklin seperti mycoplasma, E. coli, haemophilus, pasteurilla, salmonella, campylobacter, staphylococcus, streptococcus, chlamydia dan rickettsia spp. pada sapi, babi, domba, kambing dan unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Anak sapi, kambing dan domba: 1 g/100 kg BB selama 3-5 hari. Unggas dan babi: 1 g/10 L air minum atau 1 kg/5 ton pakan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1.000 g **Kementan RI** No. I. 1012634 PTS. 1.
- 175. DUFATRIM/SUL ORAL** **Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V-Belanda/ Saka Menara Alam**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Trimethoprim 20 mg/ml dan sulfamethoxazole 100 mg/ml **Indikasi** Mengatasi infeksi bakteri g (+) dan (-) yang peka terhadap trimethoprim dan sulfamethoxazole, seperti infeksi pada saluran pencernaan, pernafasan, urogenital atau infeksi umum pada ternak sapi, babi dan unggas **Kontra Indikasi** Gangguan fungsi hati dan ginjal, hipersensitif terhadap preparat sulfa **Perhatian** Jangan digunakan terus-menerus bersamaan PABA **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: 10 ml/4 L air minum selama 3 hari. Babi: 10 ml/4 L air minum selama 4-7 hari. Sapi: 10 ml/40 kg BB, 1-2 kali sehari selama 4-7 hari **Kemasan** Botol 500 ml dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 03102649 PKC. Obat keras
- 176. DUOCYCLINE – LA** **Univet/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung 200 mg oxytetracycline dehydrate **Indikasi** Untuk pengobatan pada sapi, domba/kambing, babi terhadap infeksi oleh bakteri g (+) maupun g (-) dan beberapa spesies protozoa, mycoplasma, chlamydia dan rickettsiae **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/10 kg BB. Dosis maksimum yang dianjurkan pada satu tempat penyuntikan pada sapi 20 ml, domba/kambing 5 ml, babi 10 ml. Pada babi dengan

BB < 10 kg dapat diberikan suntikan 1 ml, diberikan dengan cara suntikan IM yang dalam dengan membagi dosis yang diberikan pada beberapa tempat **Perhatian** Tidak dianjurkan pada hewan yang sensitive. Jangan melarutkan atau mencampur dengan produk-produk lain
Kemasan Botol @ 100 ml **Deptan RI** No. I. 05091528 PKC. 2. Obat keras

177. DUODIN LA

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Oxytetracycline 20% Indikasi Pengobatan infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri g (+) dan(-) pada sapi, domba, kambing dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Botol @ 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 09023564 PKC. Obat keras

178. DUOKO

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung oxytetracycline 175 g, dan sulfadimethoxine 75 g **Indikasi** Korisa, dan koksidirosis **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 0,5 g tiap L air minum, diberikan selama 3 hari berturut-turut. Pengobatan: 1 g tiap L air minum, diberikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 03011325 PKS. 1. Obat keras

179. DUPHAPEN LA

Norbrook Laboratories Ltd., Irlandia, UK/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Benzatin penicillin dan procain penicillin **Indikasi** Antibacterial untuk kuda, sapi, domba, anjing dan kucing **Dosis dan Cara pemakaian** Hewan besar: 2 ml/50 kg BB. Untuk hewan kecil: 1 ml/10 kg BB secara injeksi IM **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 09061692 PKC. 2. Obat keras

180. DUPHAPEN STREP BP

Fort Dodge Animal Health, Spain/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Benzatin penicillin G dan streptomycin sulfat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap penisillin dan streptomisin pada babi, domba kambing, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC dan IM **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 08091601 PKC. 2. Obat keras

181. DURACOL D

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Doxycycline HCL 50 g, Colistin Sulfat 50.000.000 IU **Indikasi** Untuk mengatasi infeksi saluran pernafasan dan pencernaan Collibacillosis, Salmonellosis, Pasteurellosis, Leptospirosis dan bakteri lain yang peka terhadap Colistin dan Doxycycline **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g untuk 2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 1,25 g untuk 2 L air minum selama 3-5 hari **Waktu Henti Obat** Ayam: 5 hari, Babi: 14 hari **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 Kg @ 100 g, 20 Kg @ 100 g. **Deptan RI** No. D. 06123150 PKS. Obat keras.

182. ENFLOSIN ORAL SOLUTION

**Y.S.P.Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/
Yung Shin Pharmaceutical Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Avian mycoplasmosis; CRD dan CCRD. Infeksi bakterial g positif dan negatif yang sensitif terhadap enrofloxacin; colibacillosis, fowl cholera, infeksius coryza, streptococcosis, pullorum dan staphylococcosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 500 ml ke dalam 1.000 L air minum atau 10 mg/kg BB/ hari (zat aktif) dilanjutkan sampai 3 hari, dilanjutkan sampai 5 hari pada kasus salmonellosis **Kemasan** Botol 100 ml, 500 ml, dan 1 L **Kementan RI** No. I. 11084140 PKC. Obat keras

183. ENFLOX ORAL SOLUTION

Han Poong Industry Co. Ltd., Korea/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung enrofloksasin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap enrofloksasin pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Dicampur melalui air minum **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. I. 1202784 PKC. 1. Obat keras

184. ENOQUYL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Enrofloksasin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap enrofloksasin pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Botol 100 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 08061169 PKC. 1. Obat keras

185. ENOXAN 10%

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Doxycycline hyclate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doxycycline pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Standing pouch 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 08063448 PKS. Obat keras

186. ENOXIN

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Kolistin dan amoksisilin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap kolistin dan amoksisilin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Sachet 100 g dan kantung 1 kg **Deptan RI** No. D. 09073667 PKS. Obat keras

187. ENPRO SOLUTION

Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Enrofloxacin 200g/L **Indikasi** Pengobatan penyakit pernapasan kronis (CCRD), diare yang disebabkan oleh E. coli, Staphylococcosis, Salmonellosis, Fowl Cholera dan Infectious Coryza pada ayam. KontraIndikasi Jangan diberikan pada pasien yang hipersensitif, hewan yang masih muda dan hewan yang sedang hamil atau laktasi. Perhatikan Waktu Henti Obat 12 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Encerkan 1 ml dengan 4 L air minum dan berikan secara oral selama 3–4 hari. **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 07063226 PKC. Obat keras.

188. ENPRO – 50 INJECTION

Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi Komposisi Enrofloxacin 50mg/ml **Indikasi** Pengobatan penyakit saluran pencernaan dan pernapasan pada sapi, babi dan anjing seperti diare karena E coli dan Salmonella; pneumonia karena Mycoplasma dan Pasteurella; penyakit-penyakit infeksi

bakteri yang disebabkan oleh Mycoplasma, bakteri g negatif dan g positif. KontraIndikasi Jangan diberikan pada pasien yang hipersensitif dan jangan diberikan pada hewan yang sedang hamil atau laktasi. Perhatian **Waktu Henti Obat** 20 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan babi secara IM atau SC 5-10 ml/100Kg BB selama 3-5 hari. Anjing dan kucing secara SC 1 ml/10 Kg BB selama 5-10 hari. **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. I. 07043197 PKC. Obat keras.

189. ENROCIN ORAL SOLUTION

**Pfizer Animal Health India Ltd., India/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Enrofloxacin 100 mg/ml **Indikasi** Pengobatan penyakit saluran pernafasan dan pencernaan yang disebabkan bakteri dan mycoplasma (seperti: E.coli, pasteurellosis, mycoplasmosis, salmonellosis) pada unggas **Perhatian** Gunakan sesuai petunjuk dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Berikan 0,1 ml/kg BB bersama air minum selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 100 ml, 500 ml, 1 L dan 5 L **Kementan RI** No. I. 11044062 PKC. Obat keras

190. ENRODIAZ

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung enrofloxacin 100 mg dan trimethoprim synergyzer 192 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi bakteri g positif dan g negatif pada saluran pernafasan dan pencernaan. Bakteri anaerob clostridium, serta snot dan CRD kompleks **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum atau 100 g untuk 1.300 kg BB **Kemasan** Sachet 100 g dan pot 500 g **Deptan RI** No. D. 05032913 PKS. TM. Obat keras

191. ENRODIAZ LIQUID

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung enrofloxacin aktif 100 mg dan trimethoprim aktif 192 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi bakteri g positif dan g negatif pada saluran pernafasan dan pencernaan. Bakteri anaerob clostridium, serta snot dan CRD kompleks **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/2 L air minum atau 100 ml untuk 1.300 kg BB **Kemasan** 150 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 05092989 PKC. TM. Obat keras

192. ENROFOXACIN 100 G

Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Pengobatan CRD, coryza, colibacillosis dan cholera **Kontra Indikasi** Pada pasien yang hipersensitif terhadapnya, karena dilaporkan dapat menyebabkan kristal uria. Hewan seharusnya tidak boleh mengalami dehidrasi selama pemberian terapi dengan enrofloxacin atau ciprofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1L **Deptan RI** No. D. 09073656 PKC. TM. Obat keras

193. ENROJECT 10% LA INJ. SUSP.

Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Enrofloksasin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap enrofloksasi pada sapi, babi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat kemasan **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 07113349 PKC. Obat keras

194. ENROFOXACIN 100 MG

Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Pengobatan CRD, coryza, colibacillosis dan cholera **Kontra Indikasi** Pada pasien yang hipersensitif terhadapnya, karena dilaporkan dapat menyebabkan kristal uria. Hewan seharusnya tidak boleh mengalami dehidrasi selama pemberian terapi dengan enrofloxacin atau ciprofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 09073655 PKS. TM. Obat keras

195. ENROMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Mycoplasmosis (CRD/CCRD), Colibacillosis, Pasteurellosis, Haemophilus (Snot), Salmonellosis, dll **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang mengalami insufisiensi ginjal dan hati, hewan yang resisten terhadap quinolon **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas 1 ml/2 L air minum per hari atau 0,1 ENROMAS/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Kementan RI** No. D. 1112087 PKC.1 Obat keras.

196. ENROXIN

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enrofloxacin 10% **Indikasi** Membasmi penyakit unggas seperti CRD Kompleks, CRD, colibacillosis, coryza, cholera, pullorum serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang sensitif terhadap enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 ml (1 sendok teh)/10 L air minum **Kemasan** 100 ml, 1 L, 5 L dan 30 L **Deptan RI** D. 02041799 PKC. 1. Obat keras

197. ENROSOL

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung enrofloxacin 100 g, excipient qs 1 L **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit unggas seperti colibacillosis, salmonellosis, mycoplasmosis (CRD) dan infeksi paracolon bacteria **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 ml dalam 20 L air minum dan diberikan selama 3–5 hari berturut-turut **Deptan RI** No. D. 03032559 PKC. Obat keras

198. ENROTEN

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Efektif mengobati penyakit pencernaan, pernafasan dan perkencingan pada unggas seperti complex of CRD, fowl cholera, infectious coryza/snot, colibacillosis, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis dan penyakit lain yang peka terhadap enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 1007671 PKS. 1. Obat keras

199. ENROVA 10% INJECTABLE SOLUTION

**Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/
Lisan Mulia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Untuk pengobatan dan pencegahan penyakit bakterial dan mikoplasma yang disebabkan oleh organisme

yang rentan terhadap enrofloxacin, seperti swine enzootic pneumonia, bronchopneumonia, pasteurellosis, atrophic rhinitis, luka diare, salmonellosis, collisepticaemia, dan metritis-mastitis-agalactia pada betina induk **Kontra Indikasi** Enrofloxacin dikontraindikasikan terhadap hewan yang diketahui hipersensitif terhadap quinolone **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi, domba, kambing dan sapi: pemberian tergantung dari keparahan penyakit. Antara 2,5-5 mg/kg BB/hari setara 0,25-0,5 ml/10 kg BB/hari. Pemberian melalui suntikan IM selama 3 hari. Pada kasus salmonellosis dan beberapa penyakit parah lainnya dosis dapat dinaikkan menjadi 1 ml/10 kg BB selama 5 hari **Perhatian** Simpan ditempat sejuk, kering dan terlindung dari sinar matahari Waktu henti obat Daging 14 hari **Kemasan** Vial 50 ml **Deptan RI** No. I. 10053840 PKC.

200. ENRO CHICKS

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung enrofloxacin HCl 120 g **Indikasi** Pada unggas: CRD kompleks, colibacillosis, coryza (snot), omphalitis, salmonellosis, fowl typhoid, fowl cholera, paratyphoid. Pada babi: atrophic rhinitis, penumonia, colibacillosis, salmonellosis. Pada sapi: diare, mastitis, pneumonia **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas, sapi dan babi: 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut atau 10 mg/100 mg/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 0203018 PKS. Obat keras

201. ENRO CHICKS

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung enrofloxacin base 120 g **Indikasi** Pada unggas: CRD kompleks, colibacillosis, coryza (snot), omphalitis, salmonellosis, fowl typhoid, fowl cholera, paratyphoid. Pada babi: atrophic rhinitis, pneumonia, colibacillosis, salmonellosis. Pada sapi: diare, mastitis, pneumonia **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas, sapi dan babi: 1 g/L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut. Atau 10 mg enrofloxacin/100 mg/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml, 1 L **Deptan RI** No. D. 03032536 PKC. TM. Obat keras

202. ENRO FORTE

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Enrofloxacin 200 mg **Indikasi** Mycoplasmosis (CRD/CCRD), Colibacillosis, Pasteurellosis, Haemophilus (Snot), Salmonellosis, dll **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang mengalami insufisiensi ginjal dan hati, hewan yang resisten terhadap quinolon **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral pada unggas: 1 ml/4 L air minum atau 0,05 ml ENRO FORTE/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml, 1 L **Deptan RI** No. D. 05022861 PKC. Obat keras.

203. ENROTIL 10% SOL

Dae Sung Microbiological Labs-Korea/
Saka Menara Alam

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung enrofloxacin 10 g **Indikasi** Pencegahan dan mengatasi CRD kompleks, mycoplasma, colisepticaemia, infeksi coryza, staphylococci, pasteurellosis dan salmonellosis serta penyakit lainnya yang sensitive terhadap

enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/2.000 L air minum selama 3 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 04042752 PKC. Obat keras

204. ENROTIL 50 INJECTION

**Dae Sung Microbiological Labs-Korea/
Saka Menara Alam**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan dan urogenital yang disebabkan bakteri g (+) dan (-), seperti: CRD kompleks, mycoplasma, colisepticaemia, infeksi coryza, staphylococci, pateurellosis dan salmonellosis serta penyakit lainnya yang sensitive terhadap enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 10 mg/kg BB. Babi dan ruminansia: 2,5 mg/kg BB. Anjing: 5 mg/kg BB **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 05062937 PTC. Obat keras

205. ENRO – 10

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung 100 g enrofloxacin **Indikasi** Pengobatan CRD, E. coli, coryza, kolera, salmonella, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 1 L dalam botol plastik **Deptan RI** No. D. 06042106 PKC. 1. Obat keras

206. ENRO – 21

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung 210 g enrofloxacin **Indikasi** Pengobatan CRD, E. coli, coryza, kolera, salmomella, dll **Kontra Indikasi** Tidak ada **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,25 ml/L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 1L dalam botol plastik **Deptan RI** No. D. 0612194 PKC. 1. Obat keras

207. ENPRO SOLUTION

Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Enrofloxacin 200g/L **Indikasi** Pengobatan penyakit pernapasan kronis (CCRD), diare yang disebabkan oleh E. coli, Staphylococcus, Salmonellosis, Fowl Cholera dan Infectious Coryza pada ayam. **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada pasien yang hipersensitif, hewan yang masih muda dan hewan yang sedang hamil atau laktasi. **Perhatian Waktu Henti Obat** 12 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Encerkan 1 ml dengan 4 liter air minum dan berikan secara oral selama 3–4 hari. **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 07063226 PKC. Obat keras.

208. ENPRO – 50 INJECTION

Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi Komposisi Enrofloxacin 50mg/ml **Indikasi** Pengobatan penyakit saluran pencernaan dan pernapasan pada sapi, babi dan anjing seperti diare karena E coli dan Salmonella; pneumonia karena Mycoplasma dan Pasteurella; penyakit-penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycoplasma, bakteri gram negatif dan gram positif. **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada pasien yang hipersensitif dan jangan diberikan pada hewan yang sedang hamil atau laktasi. **Waktu Henti Obat** 20 hari **Dosis dan Pemakaian** Sapi dan babi secara IM atau SC 5-10 ml/100Kg BB selama 3-5 hari. Anjing dan kucing secara

SC 1 ml/10 Kg BB selama 5-10 hari. **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. I. 07043197
PKC. Obat keras.

209. ENROVET

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung enrofloxasina 120 g **Indikasi** Pengobatan CRD kompleks dan infeksi bakteri lain yang menyertainya. Untuk pengobatan penyakit kolera unggas baik bentuk pernafasan, pencernaan, ataupun bentuk kronis. Untuk mengatasi infeksi bakteri g positif dan negatif seperti Mycoplasma sp., Chlamydia sp., baik pada unggas maupun ternak lainnya (sapi, kambing/domba, babi) **Perhatian** Pengobatan dihentikan 5 hari sebelum ayam dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air minum, diberikan selama 3–5 hari. Unggas 1 ml/2 L air minum. Sapi, kambing/domba, dan babi: 1 ml/40 kg BB **Kemasan** 100 ml, 1 L **Deptan RI** No. D. 06081794 PKC. 1. Obat keras

210. ENTEROCILLINE

AVICO/Maju Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 1 g, mengandung amoxycilin trihidrate dan colistin sulphate **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap amoxycilin dan colistin pada unggas, dan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 100 g **Kementan RI** No. I. 12054264 PKS.

211. ENTROCOLIN

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** tiap gram mengandung amoxycillin trihydrate 150 mg, colistine sulphate 500.000 IU. **Indikasi** infeksi saluran pencernaan, seperti infeksi Salmonella sp, E.coli, Pasteurella sp, Clostridium spp. Pada babi, kambing, dan Domba untuk mencegah Diare **Dosis dan Cara Pemakaian** unggas 1 g/ 2 liter air minum selama 3-5 hari atau 100 g/ 1300 Kg BB. Babi, kambing, domba 30 g/ 100 Kg BB selama 3-5 hari. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg, 30 kg. **Deptan RI** No. D. 0705283 PKS. 1 Obat keras.

212. ENTROVET INJ

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enrofloxacin (lactate) **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap enrofloxacin pada sapi, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC tidak lebih dari 10 ml pada satu tempat dan injeksi secara IM tidak lebih dari 2,5 ml pada satu tempat. Sapi dan babi: 2,5 ml/100 kg BB secara SC selama 3 hari berturut-turut dan dosis dapat dinaikkan menjadi 5 ml/100 kg BB selama 5 hari pada kasus salmonella/ komplikasi penyakit pernafasan. Anjing dan kucing: 0,25 ml/5 kg BB **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 09043608 PKC. Obat keras

213. EPIDELIN INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung oksitetrasiklin HCl **Indikasi** Pada hewan besar: diare karena bakteri, enteritis (radang usus), pneumonia (radang paru-paru), bronchitis. Pada unggas: diare, CRD, coryza **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui

suntikan subkutan atau intramuskuler: Sapi, kuda, kambing, domba: 12 ml/60 kg BB. Babi: 10 ml/60 kg BB. Ayam, bebek, kalkun: 0,5 ml/kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml **Kementan RI** No. D. 11034025 PKC. Obat keras

214. ERIDOKSIN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung erythromycin dan doxycycline **Indikasi** Mengatasi CRD, snot, fowl cholera, staphylococcosis, streptococcosis dan colibacillosis **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g dilarutkan dalam 1 L air minum atau 2 g/5 kg BB/hari **Kemasan** 10 g, 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 04031030 PKS. 3. Obat keras

215. ERI – PLUS

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung eritromisin tiosianat 100 mg dan doksisisiklin hiklat 50 mg **Indikasi** Pengobatan penyakit infeksi bakterial seperti CRD, fowl cholera, infectious coryza/snot, salmonellosis, colibacillosis, infeksi bakteri g (+) dan (-) lainnya yang peka terhadap erythromycin dan doxycycline **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g/L air minum dan pengobatan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 08053421 PKS. Obat keras

216. E – FLOX 2,5%

Qingdao Mingzhu Pharmaceutical Co., Ltd/Lito Prima mandiri

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung enrofloxacin 25 mg, kalium hidroksida 5 mg, propylene glycol 200 mg, penambahan air sampai 1 ml **Indikasi** Pengobatan per oral ditujukan untuk Salmonella spp, dan E. coli. Efektif terhadap bakteri gram positif dan negatif seperti Haemophilus paragallinarum, Pasteurella spp., E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., E. rhusiopathia **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan per oral: 0,05 g enrofloxacin/L air minum selama 3-5 hari (setara dengan E-Flox 2,5% sebanyak 2 ml/L air minum atau 8-10 mg/kg/hari) **Kemasan** Botol plastik 250 ml, 500 ml, dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 11044074 PKC. Obat bebas terbatas

217. ERITOCAP

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung eritromisin dan colistin **Indikasi** Mengobati chronic respiratory disease. Penyakit pernapasan dan pencernaan lainnya pada unggas yang disebabkan oleh E. coli, Salmonella, Haemophilus, Pasteurella dll. Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap eritromisin dan kolistin pada unggas **Perhatian** Pembedahan bisa dilakukan 3-5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1g/1 liter air minum. Berikan 2 hari sekali (pagi dan sore) **Kemasan** 100 g, 1 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 08103505 PKS. Obat keras

218. ERITROMISIN – 25

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung 250 g erythromycin **Indikasi** Pengobatan CRD **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 g/L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg **Deptan RI** No. D. 06101480 PKS. 2. Obat keras

219. ERYDOVAKS

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk larut air **Komposisi** Setiap kg mengandung erythromycin 100 g dan doxycycline 40 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit pada ayam CRD, snot/infectious coryza dan cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1-2 g dalam 2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g, kemasan induk 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. D. 08013371 PKS. Obat keras

220. ERYSUPRIM

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung erythromycin 90 g, dan sulfadimethoxine 75 g **Indikasi** CRD, dan korisa **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1g tiap L air minum, diberikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 02071337 PKS. 1. Obat keras

221. ERYTROGRIN HC

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Erytromycin 200 g dan Doxycycline 100 g **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap eritromisin dan doksisisiklin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis 2 g/l L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum dipotong **Kemasan** Sachet alufoil 100 g dan 1 kg, Dus 10 kg @ sachet alufoil 100 g, Drum plastik 20 kg @ sachet alufoil 100 g dan drum plastik 50 kg @ sachet alufoil 100 g **Deptan RI** No. D. 10073868 PKS. Obat keras.

222. ERYTROMYCINE 80 G – DOXYCYCLINE 40 G

**Biotek Indonesia
untuk Indofarma Tbk.**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung erytromisin dan doksisisiklin **Indikasi** Pengobatan CRD, coryza dan cholera pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum/hari dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 09073671 PKS. TM. Obat keras

223. EXCEDE FOR SWINE

Pharmacia & UpJohn Company, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung 100 mg ceftiofur **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit respiratorius pada babi (swine respiratory disease/SRD) yang disebabkan oleh Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis dan Streptococcus suis. Selain itu juga diindikasikan untuk pengobatan terhadap septicaemia, poliartthritis atau poliserositis yang disebabkan oleh infeksi streptococcus suis **Dosis dan Cara Pemakaian** Administrasi injeksi IM pada leher babi di regio post-auricular dilakukan dengan dosis tunggal 2,27 mg ceftiofur ekivalen (CE)/lb (5,0 mg CE/kg) bobot badan (BW). Hal tersebut ekivalen dengan 1 ml suspensi untuk setiap 20 kg BB. Jumlah suspensi yang disuntikan pada lokasi penyuntikan tidak boleh melebihi 2 ml **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 08043417 PKC. Obat keras

224. EXCENEL STERILE POWDER

Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Mengandung ceftiofur sodium 100% **Indikasi** Sapi: penyakit pernafasan yang disebabkan oleh *Pasteurella haemolytica*, *P. multocida*, dan *Haemophilus somnus*, interdigital pododermatitis. Kuda: infeksi pernafasan yang disebabkan oleh infeksi *Streptococcus zooepidermatus*, *S. equi*, *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp. Babi: penyakit pernafasan yang disebabkan oleh *Actinobacillus* (*Haemophilus*) *pleuropneumoniae* dan *Pasteurella multocida*. Anjing: pengobatan infeksi saluran kemih yang disebabkan *E. coli* dan *Proteus mirabilis*. DOC: kontrol terhadap kolibasilosis pada DOC (early chick mortality) **Dosis dan Cara Pemakaian** Harus dilarutkan sebagai berikut. Vial 1 g dilarutkan dengan 20 ml akuades, setiap ml dari pengenceran ini mengandung 50 mg ceftiofur. Vial 4 g dilarutkan dengan 80 ml akuades, setiap ml dari pengenceran ini mengandung 50 mg ceftiofur. Sapi dan sapi perah dalam masa laktasi: 1 mg/kg BB (1 ml/50 kg BB) suntik IM 1x sehari selama 3-5 hari berturut-turut. Kuda: 2 mg/kg BB (2 ml/50 kg BB) suntik IM 1x sehari selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 3 mg/kg BB (1 ml/17 kg BB) suntik IM 1x sehari selama 3 hari berturut-turut. Anjing: 2 mg/kg BB (0,2 ml/5 kg BB) suntik SC 1x sehari selama 3-15 hari. DOC: 0,08-0,20 mg/ekor suntik SC pada daerah leher (1 ml dapat dipakai untuk 250-625 ekor DOC) **Kemasan** Vial 1 g dan 4 g **Deptan RI** No. I. 12072032 PKS. 2. Obat keras

225. EXCENEL STERILE SUSPENSION

Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung ceftiofur sodium 50 mg **Indikasi** Mengatasi semua infeksi pada babi yang disebabkan oleh bakteri g negatif dan positif, kecuali mikoplasma. Kontrol dan pengobatan penyakit pernafasan pada babi yang disebabkan oleh bakteri (*swine bacterial pneumonia*) yang berhubungan dengan *Actinobacillus* (*Haemophilus*) *pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* dan *Streptococcus suis* tipe 2 **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Suntik secara IM dengan disus 3,5 mg/kg BB atau 0,06-0,1 ml/kg BB/hari selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 06062358 PKC. 1. Obat keras

226. EXFO – P Inj.

Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 g mengandung ceftiofur sodium 1.000 mg **Indikasi** Sapi: Bovine Respiratory Disease (BRD), bacterial pneumonia, shipping fever oleh *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, dan acute bovine interdigital necrobacillosis (footrot, pododermatitis) yang berhubungan dengan *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*. Babi: respiratory disease (*swine pleuropneumonia*, *Pasteurella pneumoniae*, bacterial pneumonia) yang berhubungan dengan *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis* type 2. Pada DOC: infeksi oleh *E. Coli*, *Salmonella* spp., dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 0,5-1 mg ceftiofur/kg BB (1-2 ml direkonstitusikan/50g BB) secara IM 1x/hari, selama 3 hari. Babi: 3-5 mg/kg BB (0,6-1 ml/10 kg BB) secara IM 1x/hari selama 3 hari. DOC: 0,08-0,20 mg ceftiofur/DOC secara SC (di daerah leher). 1 ml dari 50 mg/ml larutan rekonstitusi dapat digunakan untuk 250-625 ekor DOC **Waktu Henti Obat** 4 hari,

bersifat sinergis dengan aminoglikosida **Kemasan** 1 g/vial (20 ml vial), 2 g/vial (50 ml vial), 4 g/vial (100 ml vial) **Kementan RI**. No. I. 12064288 PKS. Obat bebas terbatas

227. FATROPRIM LA

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sulfa dimethoxine dan trimethoprim
Indikasi Pengobatan infeksi salmonella saluran pencernaan dan pernafasan **Kontra Indikasi** Untuk hewan yang hipersensitif terhadap sulfonamide atau mengalami insufisiensi hepatic dan ginjal **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara injeksi IM pada semua spesies yang diindikasikan, kecuali pada kelinci yang harus diberikan secara SC. Tempat injeksi IM harus disamping telinga untuk babi dan di daerah leher untuk sapi. Sapi (kecuali sapi laktasi): 40 ml/100 kg BB. Domba dan kambing (kecuali laktasi): 4 ml/10 kg BB. Anak babi dan kelinci: 1 ml/2 kg BB. Babi dewasa: 2,5 ml/10 kg BB. Ayam: 0,3 ml/kg BB **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 03022007 PKC. 1. Obat keras

228. FLOXA M2P

Multi Meditas Pratama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung enrofloxacin 120 g **Indikasi** Unggas: CRD kompleks, coryza, colibacillosis, pullorum, cholera dan omphalitis. Babi: radang paru-paru, diare putih, atropic dan rhinitis. Sapi: radang paru-paru, diare, salmonellosis dan mastitis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml dilarutkan dalam 1-2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Untuk sapi dan babi: 1 ml dilarutkan dalam 1-2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml x 50 botol, 1 L x 12 botol **Deptan RI** No. D. 09093710 PKC. Obat keras

229. FLOXATRIL

PT. Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung enrofloxacin 11.000 mg **Indikasi** Untuk mengobati colibacillosis, salmonellosis, mycoplasmosis (CRD), da infeksi bakteri paracon **Dosis dan Cara Pemakaian** Air minum unggas sekitar 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 1L **Deptan RI** No. D. 08103520 PKC. Obat keras

230. FLOXIDIN 10% INJ.

Intervet India Pvt. Ltd., India/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung 100 mg enrofloxacin **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pernafasan, saluran pencernaan dan urogenital yang disebabkan oleh infeksi bakteri g (+) dan g (-) serta Mycoplasma spp., Pada unggas antara lain CRD kompleks, colibacillosis, coryza, diarrhea, colisepticaemia, salmonellosis, enteritis, infeksi sekunder bakteri yang menyertai infeksi virus **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada sapi, kambing, domba dan babi dengan infeksi ringan-sedang dosis: 2,5 mg enrofloxacin/kg BB atau 1,25 ml/50 kg BB. Untuk infeksi berat, dosis: 5 mg enrofloxacin/kg BB atau 2,5 ml/50 kg BB. Pada unggas: 10 mg/kg BB atau 0,1 ml/kg BB. Anjing: 5 mg/kg BB atau 0,5 ml/kg BB **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. I 06040059 PKC. 1. Obat keras

231. FLOXIDIN 10% ORAL SUSP.

Intervet India Pvt. Ltd., India/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung 100 mg enrofloxacin **Indikasi**

Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri g positif (Staphylococcus, Streptococcus) dan bakteri g negatif (E. coli, salmonella, pasteurella, haemophilus) dan Mycoplasma spp. Mengatasi infeksi sekunder pada kasus penyakit IB, ND dll. Digunakan selama terjadinya reaksi setelah vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 10 mg/kg BB selama 3-5 hari. Untuk pengobatan salmonella enteritidis pada breeder dengan pemberian selama 10 hari dan dilanjutkan dengan pemberian bakteri yang baik pada hari ke-12 dan 14 **Kemasan** Botol 1L **Deptan RI** No. I. 0609851 PKC. 1. Obat keras

232. FLOXINE

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung enrofloxacin 120 mg **Indikasi** Untuk mengobati CRD complex, colibacillosis, pullorum, cholera dan omphalitis. Sangat berguna untuk memberantas infeksi sekunder dari CRD seperti air sacculitis, pericarditis dan perihepatitis **Kontra Indikasi** Hipersensitif terhadap quinolone **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/1-2 L air minum (10 mg enrofloxacin/kg BB) dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** Pada unggas 5 hari sebelum dipotong **Kemasan** Botol 100 ml dan 1L **Deptan RI** No. D. 10013777 PKC. Obat keras

233. FLOXAMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung No.rfloxacin 200 mg **Indikasi** Colibacillosis, CRD, salmonellosis, pasteurellosis dan infeksi staphilococci **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang mengalami insufisiensi ginjal dan hati **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas: 1 ml/2 liter air minum atau 0,1 ml FLOXAMAS/Kg BB selama 3 – 4 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml, 1 Liter **Kementan RI** No. D. 1209082 PKC.1 Obat keras.

234. FLOXAMYCINE

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung enrofloxacin 100 g dan aqua destilata ad 1 L **Indikasi** Sebagai antibiotik untuk infeksi yang peka terhadap enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L dicampur ke dalam air minum. Untuk kasus salmonellosis diberikan selama 5 hari berturut-turut dan bila perlu pengobatan diulang selama 1 minggu **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** Botol plastik 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 03021900 PKC. 1.

235. FLUMISOL 10%

Ceva Sante Animale, Perancis/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung flumequine **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap flumequine pada sapi, domba, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral dicampur melalui air minum, susu atau pakan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kemasan **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 09013549 PKC. Obat keras

236. FLUQUINE

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung Flumequine 240 mg **Indikasi** Colisepsicaemia/Colibacillosis, Fowl Cholera, Pullorum (Berak Kapur) dan Snot **Dosis dan**

Cara Pemakaian Oral; 1 ml/2 L air minum perhari atau 0,1 ml /kg BB selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 07043216 PKC. Obat keras

237. FLOXIVET

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung enrofloxacin 100 g **Indikasi** Untuk pengobatan CRD kompleks dan infeksi bakteri lain yang menyertainya. Untuk pengobatan penyakit kolera unggas baik bentuk pernafasan, pencernaan, ataupun bentuk kronis. Untuk mengatasi infeksi bakteri g positif dan negatif seperti *Mycoplasma* sp., *Chlamydia* sp., baik pada unggas maupun ternak lainnya (sapi, kambing/domba, babi). Untuk pengendalian infeksi bakteri yang peka terhadap antibiotik enrofloxacin **Perhatian** Pengobatan dihentikan 5 hari sebelum ayam dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air minum, diberikan selama 3–5 hari. Untuk unggas: 1 ml/2 L air minum. Untuk sapi, kambing/domba, dan babi: 1 ml/40 kg BB **Kemasan** 100 ml, 1L **Deptan RI** No. D. 0104694 PKC. Obat keras

238. FORTICOAT – NL

Selko BV, Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sorbic acid, formic acid, asetic acid, propionic acid, ammonium formate, L-ascorbic acid, citric acid dan asam lemak mono dan gliserida **Indikasi** Pemeliharaan dan pengasaman pakan basah dan air minum. Mempunyai efek antibakteri yang luas dan daya kerja preservatif yang dapat mencegah perkembangan mikroorganisme patogen pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Jerigen 25 L dan drum 220 L **Deptan RI** No. I. 07073238 FTC. Obat bebas terbatas

239. FOSBAC

Bedson, Argentina/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung kalsium fosfomisin **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap fosfomisin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Ember HDPE 5 kg , kantung 160 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 10033822 PKS. Obat keras

240. FOSBAC PLUS T

Bedson S.A. Argentina/Pakan Serasi

Bentuk Sediaan Powder Komposisi Fosfomycine 20%, tylosin 5%, fructose 1,6 diphosphate 18% **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap Ca fosfomycin dan tylosin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 80-160 mg/kg BB iulang 1 kali setiap hari untuk 2-4 hari bila perlu **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 05062918 PKC. Obat keras

241. FOSTIGRIN

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung fosfomycine 200 g dan tylosin 50 g **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap fosfomycine dan tylosine **Dosis dan Cara Pemakaian** 160 mg/kg BB dulang 1x setiap hari selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg sachet alufoil, dus 10 kg @ sachet alufoil 100 g, drum plastik 20 kg @ sachet alufoil 100 g, dan drum plastik 50 kg @ sachet alufoil 100 g **Kementan RI** No. D. 13044522 PKS. Obat bebas terbatas

242. FOS – T

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Fosfomycine 200 mg, Tylosine Tartrate 50 mg, Sorbitol 100 mg **Indikasi** Untuk infeksi bakteri gram positif, gram negatif dan Mycoplasma seperti CRD, Colibacillosis, infectious Coryza (Snot), Avian Typhoid, Fowl Cholera, Staphylococcosis, Listeriosis dan penyakit yang disebabkan oleh organisme yang sensitif terhadap fosfomycine dan atau tylosin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut (160 mg/kg BB/hari) **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 09053619 PKS. Obat keras.

243. FX PLUS ORAL SOLUTION

**Laboratorio AVIMEX SA, DE, CV, Mexico/
Avindo Perdana Bahtera Mulia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung fosfomycin 100 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi bakteri pada unggas antara lain: Pasteurella spp, Salmonella spp, E. coli, Ornithobacterium rhinotracheale, Actinobacillus spp, Pseudomonas spp, Klebsiella spp dan Proteus sp **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 10 mg/kg BB atau 0,5 ml/L air minum **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 09023555 PKC. Obat keras

244. FX PLUS 20 INJECTABLE SOLUTION

**Laboratorio AVIMEX SADE
CV, Mexico/Avindo Perdana Bahtera Mulia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung fosfomycin 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi bakteri terhadap unggas dan ruminansia antara lain: Pasteurella spp, Haemaphysillus spp, Salmonella spp, E. Coli, Ornithobacterium rhinotracheale, Actinobacillus spp, Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Proteus sp dan Shigella spp **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 10-20 mg/kg BB melalui subcutan atau intramuskular. Ruminansia (sapi, kambing & domba) baru lahir: 20mg/kg BB atau 1 mlject/kg BB. Ruminansia muda dan dewasa: 10 mg/kg BB atau 0,5 ml/kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 09023556 PKC. Obat keras

245. HEMIDOX

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung doxycycline HCl 100 g, erythromycine thiocyanat 135 g **Indikas** Pada unggas: CRD kompleks, colibacillosis, coryza (snot), omphalitis, salmonellosis, fowl-typhoid, fowl cholera, paratyphoid **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 03032537 PKS. Obat keras

246. GANADEXIL ENROFLOXACINA 10%

**Industrial Veterinaria.,SA, Spanyol/
Agro Makmur Sentosa**

Bentuk Sediaan Cairan. **Komposisi** tiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg. **Indikasi** pengobatan Colibacillosis, Salmonellosis dan infeksi yang disebabkan oleh Mycoplasma. **Dosis dan cara Pemakaian** 0,10 ml per kg BB atau 0,5 liter per 1000 liter air minum selama 3 hari berturut-turut. Untuk kasus Salmonellosis sampai 5 hari. **Kemasan** botol 100 ml dan 1L. **Deptan RI** No.I. 04081596 PKC.2. Obat keras.

247. GENTADOX

AVICO/Maju Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung gentamycin sulfat dan doxycycline HCl
Indikasi Sebagai antibakteri yang peka terhadap gentamycin dan doxycycline pada unggas, sapi dan hewan lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 100 g dan 500 g **Kementan RI** No. I. 11064093

248. GENTAJECT 10%

Dopharma Int-Holland/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung gentamycin sulphate **Indikasi** Antibakteri
Kontra Indikasi Hewan yang menderita gagal ginjal **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,05 ml/kg BB secara SC atau IV **Kemasan** Botol kaca 100 ml **Deptan RI** No. I. 03012516 PKC.
Obat keras

249. GENTAMIN

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung gentamycin sulfate 20 mg dan bahan pembantu sampai 1 ml **Indikasi** CRD, korisa, dan omphalitis **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, serta terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 10 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2-0,25 ml tiap kg BB disuntikkan secara IM (tembus daging/otot). Bila perlu, penyuntikan diberikan selama 3 hari berturut-turut atau sesuai dengan petunjuk dokter hewan **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 07043196 PKC. Obat keras

250. GENTAMOX

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Amoxicilline (trihydrate) 150 mg dan Gentamicin (sulphate) 40 mg **Indikasi** Babi pneumonia, colibacillosis, diare, mastitis; domba pneumonia, mastitis, diare, pasteurellosis, colibacillosis; sapi pneumonia, diare, mastitis, metritis, abses kutaneus; Kuda pneumonia, diare, infeksi genito urinary, strangles, abses, foot infeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** IM; Babi, domba, kambing 5–10 ml/dewasa/hari, 1–5 ml/muda/hari; Sapi 30–40 ml/dewasa/hari, 10–15 ml/muda/hari; Kuda 30–50 ml/dewasa/hari, 5–15 ml/muda/hari; Umum 1 ml/10 Kg BB/ hari selama 3 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 03102175 PKC.1 Obat keras.

251. GENTA – 100

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung gentamisin 100 mg **Indikasi** Pengobatan penyakit CRD, infectious coryza, fowl cholera, colibacillosis dan salmonellosis pada ayam serta infeksi saluran pernafasan, pencernaan dan perkencingan yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang peka terhadap gentamisin pada sapi, kuda, kambing, domba, anjing, kucing dan babi. Pencegahan kematian dini pada DOC yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli, salmonella dan pseudomonas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dewasa: 0,2 ml/ekor. DOC: 10 ml + NaCl 90 ml untuk 1.000 ekor (0,1 ml/ekor DOC). Sapi, kuda, kambing dan domba: 1 ml/25 kg BB. Anjing dan kucing: 0,1/2 kg BB. Babi: 1 ml/30 kg BB. Pemakaian 2

kali tiap 12 jam pada hari pertama **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 05062918 PKC.
Obat keras

252. GENTA 100 PANTEX INJECTABLE

Pantex-Holland/

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Gentamycin 100 mg, methyl-4-hydroxybenzoate 0,520 mg, propyl-4-hydroxybenzoate 0,056 mg, sodium citrate dihydrate 14 mg, sodium metabisulphite 3,5 mg, aqua dest untuk injeksi qsp 1 ml **Indikasi** Injeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap gentamicin. Infeksi pada saluran pernafasan, urogenital, jaringan kulit, uterus dan infeksi gastrointestinal pada sapi, kuda, babi, kambing dan domba **Kontra Indikasi** Hipersensitif terhadap antibiotika aminoglikosida, gangguan ginjal, vestibular, telinga atau disfungsi visus, kombinasi dengan obat-obatan yang berpotensi nephrotoxic atau paralisa otot. Hanya boleh diberikan setengah dosis bagi yang memiliki kelemahan fungsi ginjal **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemakaian IM atau IV: kuda, sapi, anak kuda, anak sapi, kambing dan domba: 2 ml/50 kg BB. Anak babi, anjing dan kucing: 0,5 ml/10 kg BB. Dosis ini disarankan diberi 2 kali pada hari pertama dan 1 kali pada hari berikutnya. Untuk pemakaian intra urine: kuda (hanya pada saat estrus), metritis akut: 5 ml/hari selama 3-5 hari. Metritis kronik: 20-25 ml/hari selama 3-5 hari. Sapi: 2 ml 1x diencerkan dengan 18 ml larutan saline isotonik (0,9%) **Waktu Henti Obat** Daging 7 hari, Susu 3 hari **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 12084323 PKC

253. GENTAMYCIN INJECT

Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung gentamisin sulfat **Indikasi** Sebagai antibiotika yang berspektrum luas, sangat efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan positif (termasuk infeksi colibacillosis, cholera, coryza, staphylococosis, streptococcus) **Dosis dan Cara Pemakaian** Hanya diberikan melalui suntikan IM. Untuk sapi dan kuda: 2 mg/kg BB selama 2xsehari (2ml/100 kgBB). Untuk babi: 2 mg/kg BB selama 2xsehari (1ml/50 kgBB) **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 05042262 PKC. 1. Obat keras

254. GENTAVET 50

Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan injeksi. **Komposisi** tiap 1 ml mengandung gentamisin sulfat 85 mg (setara 50 mg gentamisin base). **Indikasi** infeksi urogenital, infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit dan jaringan, infeksi uterus dan infeksi saluran pencernaan. **Dosis dan Cara Pemakaian** suntikan IM atau IV dengan perlahan. Unggas 1 ml/15 Kg BB IM ulangi setelah 48 jam. Kuda, sapi 8 ml/100 kg BB, Anak kuda, pedet, babi 4 ml / 50 kg BB Anak babi, anjing, kucing 0,5 ml/5 kg BB . Pada hari pertama diberikan 2 kali/hari, selanjutnya cukup 1 kali/hari. Pemberian Intra Uterine Kuda (hanya pada masa estrus) Metritis akut : 10 ml/hari selama 3-5 hari Metritis kronis 40-50 ml/hari selama 3-5 hari Sapi 4 ml dilarutkan dalam 16 ml larutan NaCL fisiologis. **Kemasan** 100 ml. **Deptan RI**. No. I. 12072048 PKC.2. Obat keras.

255. GENTICOL – Inj

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap 100 ml mengandung gentamisin 5g, sod. bisolfit 3,2 mg, EDTA 0,1 mg, methyl paraben 1,8 mg, prophyll paraben 0,2 mg, aqua pro inj qs 100 ml **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi penyakit CRD dan SNOT pada unggas. Pengobatan terhadap infeksi gabungan yang sulit disembuhkan dengan pemberian obat melalui air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml/kg BB suntik kedalam otot pada atau dada (IM). Bila diperlukan pengobatan dapat diulang 2-4 hari kemudian **Deptan RI** No. D. 03011545 PKC.1. Obat keras

256. GUMBEX

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung 4-butyl-1-difenil pirazolidon natrium garam, vit B1, vit B2, nikotinamida, menadion bisulfite, vit C, vit PP, kalium sitrat dan natrium sitrat **Indikasi** Pengobatan simptomatis penyakit gumboro, sindroma hepatorenal dan demam yang disebabkan oleh virus pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 4-5 g/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 06052053 PKS. 1. Obat keras

257. GUMBONAL

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung hexamine 900 mg, vitamin B1 1 mg, vit B2 2 mg, vit B6 0,5 mg dan bahan pembantu sampai 1 g **Indikasi** Mengurangi angka kematian pada kasus gumboro akibat pembengkakan ginjal. Pengobatan infeksi sekunder di saluran urin pada kasus gumboro. Antiseptik pada saluran kemih **Perhatian** Jangan diberikan bersamaan dengan antibiotik atau kemoterapeutik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap L air minum atau 0,2 g tiap kg BB, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet almunium 100 g **Deptan RI** No. D. 06083110 PKS. Obat keras

258. HEMIDOX

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung doxycycline HCl 100 g dan erythromycine thiocyanat 135 g **Indikasi** Pada unggas CRD kompleks, colibacillosis, Coryza (Snot) Omphalitis, salmonellosis, fowl typhoid, Fowl Cholera, paratyphoid **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 03032537 PKS. Obat keras

259. HEXAMAS

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg mengandung Hexamin 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran kemih pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; 1g/ 1L air minum selama 3 – 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Deptan RI** No. I. 06103130 PKS. Obat keras.

260. HIPRALONA – NOR S

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung No.rfloxacin 200 mg **Indikasi** Mycoplasma (CRD), Colibacillosis, Fowl cholera, Salmonellosis, Coryza (Snot),

Staphylococcosis **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang mengalami insufisiensi ginjal dan hati **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas 0,25 – 0,5 ml/l air minum equivalent 5 – 10 mg/Kg BB selama 3 – 4 hari berturut-turut. Pada kasus berat diberikan double dosis **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 10101736 PKC.2 Obat keras.

- 261. HIPRAMOX** **HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Amoxicillin (trihydrate) 200 mg **Indikasi** Babi/domba/kambing pneumonia, Colibacillosis, Salmonellosis, Arthritis, diare; Sapi pneumonia, Colibacillosis, Arthritis, mastitis, diare; Anjing/kucing pneumonia, diare, gastroenteritis; Unggas Colibacillosis, Pasteurellosis, Salmonellosis, dan Coryza **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang alergi terhadap antibiotik b-laktam **Dosis dan Cara Pemakaian** SCn/IM; Umum 0,25–0,5 ml/10 Kg BB; Anjing/kucing 0,2–2 ml/ekor; Babi 7–10 ml/dewasa, 2–4 ml/muda, 0,5 ml/hewan menyusui; Domba dan kambing 2–4 ml/dewasa, 0,5 ml/muda, Unggas 0,1–0,2 ml/Kg BB **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 03091716 PKC.1. Obat keras
- 262. IMEQUYL** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 100 g mengandung flumequine 10 g dan anhydrous sodium karbonat 25 g **Indikasi** Antibakteri pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Imequyl 10% berikan bersama-sama air minum, 1 g/L air minum selama 3-5 hari. Ayam pedaging (broiler) umur 0-1 minggu dengan dosis: 0,5 g/L dengan lama pemberian 4-7 hari. Umur 5-6 minggu dengan dosis 0,5 g/L, lama pemberian 3-5 hari. Umur 12–13 minggu dosis 1 g/L, lama pemberian 3-5. Permulaan bertelur: 1 g/L, lama pemberian 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 0502723 PKS. 3. Obat keras
- 263. IMEQUYL SOL 20%** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung 20 g flumequine **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan infeksi saluran pencernaan dan saluran pernafasan (kolibasilosis, salmonellosis, pasteurellosis, haemofilosis/coryza dan stafilokokkosis) **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,25 ml–0,50 ml/L air minum dan diberikan antara 3-5 hari **Kemasan** 500 ml **Deptan RI** No. I. 05061565 PKC. 2. Obat keras
- 264. INOXYL ORAL SOLUTION** **Laboratories Biove, Perancis/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oxolinic acid **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oxolinic acid pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 05021631 PKC. 2. Obat keras
- 265. INTERFLOX – 100** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/ Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap g mengandung enrofloxasin 100 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap enrofloxasin seperti E. coli, haemophilus, pateurella, salmonella dan

campylobacter spp. pada sapi, kambing, domba, babi dan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM pada sapi, kambing, domba dan babi: 1 ml/20-40 kg BB. Ayam: 0,1 ml/kg BB. Anjing dan kucing: 0,1 ml/4 kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 07043217 PKC. Obat keras

266. INTERFLOX ORAL

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung enrofloxasin 100 mg **Indikasi** Pengobatan penyakit CRD kompleks, kolibasilosis, salmonelosis, korisa, kolera dan penyakit lain yang peka terhadap enrofloxasin **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba: 10 ml/75-150 kg BB 2 hari sekali. Ayam dan babi: 1 ml/2 L air minum dan pemberian selama 3-5 hari **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 07073243 PKC. Obat keras

267. INTERSPECTIN – L

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung spektinomisin 100 mg dan linkomisin 50 mg **Indikasi** Infeksi saluran pencernaan dan pernapasan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap linkomisin dan spektinomisin seperti campylobacter, E. coli, mycoplasma, salmonella, staphylococcus, streptococcus, dan Treponema spp., pada anak sapi, kucing, anjing, kambing, unggas, domba, babi, dan kalkun **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara IM atau SC (unggas dan kalkun). Pada anak sapi: 1 ml/10 kg BB selama 4 hari. Kambing dan domba: 1 ml/10 kg BB selama 3 hari. Babi: 1 ml/10 kg BB selama 3-7 hari. Anjing dan kucing: 1 ml/5 kg BB selama maksimal 21 hari. Unggas dan kalkun: 0,5 ml/2,5 kg BB selama 3 hari **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 09063625 PKC. Obat keras

268. INTERTRIM – 500 ORAL

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung sulfadiazin 400 mg dan trimetoprim 100 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan dan pernafasan akibat bakteri yang sensitif terhadap sulfadiazin dan trimetoprim seperti E. coli, haemophilus, pasteurella, salmonella, staphylococcus dan streptococcus spp. pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas dan babi: 1 ml/1,5-2 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 ml, 500 ml dan 1.000 ml **Kementan RI** No. I. 1112513 PKC. 1. Obat keras

269. INTERTRIM LA

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung sulfadoksin 200 mg dan trimetoprim 40 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan dan pernafasan akibat bakteri yang sensitif terhadap sulfadoksin dan trimetoprim seperti E. coli, haemophilus, pasteurella, salmonella, staphylococcus dan streptococcus spp. pada sapi, domba, kambing dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM pada sapi, kambing, domba dan

babi: 1 ml/10-15 kg BB. Ayam: 0,2 ml/kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 1104632 PKC. 1. Obat keras

270. INTRAMOX – 150

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung amoksisilin 150 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap amoksisilin seperti E. coli, erysipeloithrix haemophilus, pasteurella, salmonella, campylobacter, clostridium, corynebacterium, staphylococcus dan streptococcus spp pada sapi, domba, kambing, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC pada sapi, domba, kambing dan babi: 1 ml/10 kg BB. Unggas: 0,2 ml/kg BB. Anjing dan kucing: 0,1 ml/kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 1102637 PKC. 1. Obat keras

271. INTRAMOX – 150 LA

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The
Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung amoksisilin (sebagai tryhidrate) 150 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap amoksisilin seperti E. coli, erysipeloithrix haemophilus, pasteurella, salmonella, campylobacter, clostridium, corynebacterium, staphylococcus dan streptococcus spp pada sapi, domba, kambing, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC pada sapi, domba, kambing dan babi: 1 ml/10 kg BB. Unggas: 0,2 ml/kg BB. Anjing dan kucing: 0,1 ml/kg BB dan dapat diulang setelah 48 jam **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 11013978 PKC. Obat keras

272. INTRAMOX – 200 WS

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung amoksisilin 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap amoksisilin seperti campylobacter, clostridium, corynebacterium, E. coli, erysipeloithrix haemophilus, pasteurella, salmonella, staphylococcus dan streptococcus spp pada sapi, domba, kambing, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak sapi, domba dan kambing: 1 g/20 kg BB selama 3-5 hari. Babi dan unggas: 1 g/2 L air minum atau 1 kg/ton pakan selama 3-5 hari **Perhatian** Pada sapi, domba dan kambing hanya untuk hewan muda **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1.000 g **Kementan RI** No. I. 1102942 PKS. 1. Obat keras

273. KALMOXTIN

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung amoksisilin trihidrat dan kolistin sulfat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoksisilin trihidrat dan kolistin sulfat pada unggas, sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1g/1L air minum selama 3-5 hari atau 1 g/2 L air minum diberikan 2x per hari selama 3-5 hari atau 50 mg/kg BB diberikan 2x

per hari selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet alufoil @100 g, dalam boks 1 kg **Deptan RI** No. D. 09123756 PKS. Obat keras

274. KALOXY – VET

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung oxytetracycline dan lidocaine HCl
Indikasi Antibakteri yang peka terhadap oxytetracycline pada unggas, babi, kerbau, sapi, domba, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC. Unggas <4 minggu: 1 ml di campur dengan 3 ml aquades, kemudian diambil 0,5-1 ml dari campuran tersebut. Umur 4-8 minggu: 0,5 ml. Dewasa: 1-2 ml. Sapi, babi, kambing, domba, kerbau dan kuda: jika BB sampai 10 kg: 0,5-2 ml. BB 10-50 kg: 2-4 ml. BB 50-100 kg: 4-8 ml. BB 100-250 kg: 8-12 ml. BB 250-500 kg: 15-30ml. Penyuntikan dilakukan setiap hari selama 3 hari. Anjing ras kecil: 0,5-2,5 ml. Anjing ras sedang: 3-6 ml. Anjing ras besar: 4-10ml. Kucing: Anak: 0,25 ml. Dewasa: 0,25-1 ml **Perhatian** Jangan digunakan pada hewan yang peka terhadap tetrasiklin **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. D. 0502017 PKC. 2. Obat keras

275. KANA SOLUTION

**Thai PD Chemical Co Ltd, Thailand/
Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Kanamisin sulfat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap kanamisin pada sapi, kuda, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 5mg/kg/hari. Babi: 10mg/kg/hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 09043609 PKC. Obat keras

276. KANAMEX

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Serbuk injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung kanamycin 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi kronis dan akut pada saluran pernafasan, pencernaan dan perkencingan yang disebabkan oleh kuman gram negatif seperti E. coli, salmonella, pasteurella, mycoplasma, dan gram positif seperti Staphylococcus aureus **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui injeksi IM selama 3-5 hari berturut-turut. Sapi, kuda: 1 ml/40 kg BB. Babi: 1 ml/20 kg BB. Anjing, kucing, dan ayam: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** 10 g **Deptan RI** No. D. 0601622 PKS. 1. Obat keras

277. KANAMIN

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk injeksi **Komposisi** Setiap vial mengandung kanamycin acid sulfate setara dengan base 100% **Indikasi** Unggas: korisa, CRD dan infeksi bakteri lainnya (enteritis, dll). Sapi, kuda, domba, dan babi: pneumonia, sinusitis, laryngitis, tonsilitis, tracheobronchitis, terutama terhadap kuman yang telah resisten terhadap antibiotika lain **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 7 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Cara melarutkan aquadest steril digunakan sebagai pelarut, kemudian dikocok sampai larut sempurna. Sehingga diperoleh larutan obat yang mengandung kanamycin acid sulfate yang setara dengan 100 mg tiap ml kanamycin base. Penyuntikan 1x sehari secara IM (tembus daging) dan diulang maksimal selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Vial 2 g, 5 g, 10 g, dan 50 g **Deptan RI** No. D. 0609759 PKS. 2. Obat keras

278. KANIVET

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung kanamisin sulfat 250 mg **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negative seperti septikimia, trakeobronkitis, pneumonia, osteoarthritis, infeksi saluran kencing, saluran pencernaan, kulit dan luka **Perhatian** Jangan dipakai bersamaan dengan obat lain. Simpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Anjing, kucing, unggas: 0,1 ml/kg BB. Babi, domba: 2 ml/40 kg BB. Sapi, kuda: 1 ml/40 kg BB. Pemakaian selama 8 hari dan injeksikan secara IM **Kemasan** Vial 20 ml dan botol 100 ml **Deptan RI** No. D. 0204131 PKC. Obat keras

279. KISA SP

Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Kitasamysin tartrate **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap kitasamysin pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 50 g/100 L selama 1-3 hari **Kemasan** Botol 1 kg **Deptan RI** No. I. 08103502 PKS. Obat keras

280. KITAMOXIN POWDER

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amoksisiklin dan kitasamisin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap kitasamisin pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum. **Withdrawal Time** 7 hari **Kemasan** Sachet 100 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 02081196 PKS. Obat keras

281. KLINORIL

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Soluble powder **Komposisi** Tiap g mengandung klindamisin hidroklorid 113 mg, trimetoprim 48 mg **Indikasi** Pengobatan CRD kompleks, kolibasilosis, stafilokokosis, streptokokosis, NE, dermatitis gangrenosa, dan infeksi karena mikroorganisme anaerob yang peka terhadap klindamisin dan trimetoprim serta efektif untuk mengobati malaria unggas **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang hipersensitif terhadap klindamisin dan trimetoprim **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g **Deptan RI** No. D. 02102297 PKS. 1. Obat keras

282. KLORIVAKS

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfachlorpyridazine 300 g dan aqua destilata ad 1 kg **Indikasi** Sebagai antibiotik untuk infeksi yang peka terhadap sulfachlorpyridazine **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L dicampur ke dalam air minum. Untuk coccidiosis diulang dengan metode 3 – 2 – 3. Untuk kasus infeksi bakterial diberikan 2 g/L air minum selama 5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** 100 g dan 250 g sachet alufoil, 1 kg @ sachet alufoil 250 g dan ember 5 kg @ 250 g sachet alufoil **Deptan RI** No. D. 03022085 PTS. 1.

283. KOLAMOX LA INJECTION

Nutec, Inggis/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung amoksisilin trihidrat 150 mg

Indikasi Membunuh bakteri gram positif dan negative misal *Actinobaccillus lignieresii*, *Actinimycetes bovis*, *Bacillus anthracis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium* spp, *Corynebacterium* spp, *Erysipelothrix rhusiopathie*, *E.coli*, *Fusiformis* spp, *Haemophilus* spp, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella* spp, *Pasteurella* spp, *Proteus mirabilis*, *Salmonella* spp, *Staphylococcus* dan *Streptococcus*. Dapat digunakan untuk sapi, domba, babi, anjing, kucing, unggas, kerbau, unta, rusa, dan hewan eksotik lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 4 ml/50 kg BB. Domba: 1 ml/10 kg BB. Babi: 1 ml/10 kg BB. Anjing, kucing, unggas, dll: 0,1ml/1 kg BB. Untuk injeksi volume besar injeksikan pada 2 tempat yang berbeda untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyerapan. Secara IM. Ulangi 2-4 hari kemudian **Kemasan** 100 ml/botol **Deptan RI** No. I. 03092299 PKC. 1. Obat keras

284. KOLERIDIN

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung oxytetracycline 100 g dan neomycin sulfate 71,5 g **Indikasi** Kolera, CRD dan pullorum **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1g tiap L air minum, diberikan selama 4-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium isi 5 g, dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg dan 10 kg. Ember 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 02071377 PKS. 1. Obat keras

285. KOLERIDIN K

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung oxytetracycline base 20 mg dan neomycin sulfate 14,3 mg **Indikasi** Kolera, CRD dan pullorum **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, serta terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Masukkan kaplet ke mulut unggas dan dorong ke dalam kerongkongan. Ayam BB sampai 1,5 kg: sehari 1x 1 kaplet, diberikan selama 4-5 hari berturut-turut. Ayam BB > 1,5 kg: sehari 1x 2 kaplet, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Bungkus plastik 50 kaplet. Botol 10 kaplet, 100 kaplet, 500 kaplet, 1.000 kaplet dan 5.000 kaplet **Deptan RI** No. D. 06081863 PKM. 1. Obat keras

286. KRISTAPEN

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Serbuk untuk suspensi injeksi **Komposisi** Setiap vial mengandung penisilin g prokain 3.000.000 IU (3 g) dan setiap botol mengandung penisilin g prokain 15.000.000 IU (15 g) **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakteri g positif dan beberapa g negatif yang peka terhadap penisilin, pneumonia, bronkitis, cystitis, pielonephritis, infeksi saluran kencing, infeksi pada susu sapi, mastitis, metritis, endometritis dan infeksi antraks **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap penisilin dan turunannya **Perhatian** Jika timbul gatal-gatal dan kemerahan pada kulit maka pengobatan harus dihentikan. Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis umum 4.000-22.000 IU/kg BB. Setiap 12 jam selama 3 hari berturut-turut. Penyiapan dosis dan cara pakai lihat pada brosur. Injeksikan secara IM **Kemasan** Vial 3 g dan botol 15 g **Deptan RI** No. D. 03072613 PKS. Obat keras

- 287. LAMOXI** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Souble powder **Komposisi** Tiap g mengandung amoxycillin 200 mg **Indikasi** Mengobati penyakit NE, staphylococcus (leg problem), kolibasilosis pada ayam, erysipelosis, enteritis pada babi, dan penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan negatif yang peka terhadap amoxycillin **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 g/2 L air minum atau 100 mg/kg BB dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 100 mg/kg BB, selama 5 hari menggunakan dosis terbagi dengan interval 12 jam **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 04062773 PKS. Obat keras
- 288. LG ACCENT** **LG/CTCBio , Korea/Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap vial mengandung Ceftiofur sodium 1 g. **Indikasi** pengobatan infeksi yang disebabkan baik oleh bakteri Gram positif maupun negatif pada sapi, babi, unggas. Misalnya BRD, infeksi E. coli, foot rot dll. **Dosis dan Cara Pemakaian** larutkan 1 vial Accent 4 g dalam pelarut 80 ml atau vial Accent 1 g dalam pelarut 20 ml. Sapi 1-2 ml / 50 Kg BB, babi 0.6 - 1 ml/ 50 Kg BB , DOC 0.08 - 0.2 mg per ekor atau 1 ml dari 50 mg/ml larutan dapat mengobati 250 – 625 DOC. **Kemasan** Vial 1 g **Deptan RI** No. I. 0510200 PKS. 1. Obat keras
- 289. LEVOCAP** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung levofloxacin **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap levofloxacin pada unggas **Perhatian** Pembedahan bisa dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 08073468 PKS. Obat keras
- 290. LEVOSTA** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Souble powder **Komposisi** Tiap g mengandung levofloxacin 100 mg **Indikasi** Mengobati CRD kompleks, kolibasilosis, fowl cholera, coryza dan penyakit lain yang disebabkan oleh mycoplasma, gram positif dan gram negatif **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg **Deptan RI** No. D. 05022859 PKS. Obat keras
- 291. LIMOXIN – 50** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/ Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oksitetrasiklin 50 mg **Indikasi** Pengobatan artritis, infeksi saluran pencernaan dan pernafasan akibat bakteri yang sensitif terhadap oksitetrasiklin seperti Mycoplasma, E. coli, haemophilus, pasteurella, salmonella, bordetella, campylobacter, chlamydia, rickettsia, staphylococcus dan streptococcus spp pada sapi, kambing, domba dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC. Pada unggas: 0,5-1 ml. Sapi, kerbau dan kuda: 4-8 ml/50-100 kg BB. Tiap kenaikan 50 kg dosis ditambah 4 ml dari dosis sebelumnya. Babi, domba dan kambing: 14 ml/100 kg BB. Anjing dan kucing: 0,5-2 ml/3-10 kg BB **Perhatian** Dalam satu tempat injeksi jangan lebih dari 20

ml pada sapi, 10 ml pada babi dan unggas, serta 5 ml pada pedet dan kambing **Kemasan** Vial 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 07073240 PKC. Obat keras

292. LIMOXIN – 200 LA

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oksitetrasiklin 200 mg
Indikasi Pengobatan artritis, infeksi saluran pencernaan dan pernafasan akibat bakteri yang sensitif terhadap oksitetrasiklin seperti mycoplasma, E. coli, haemophilus, pasteurella, salmonella, bordetella, campylobacter, chlamydia, rickettsia, staphylococcus dan streptococcus spp pada sapi, kambing, domba dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC dengan dosis 1 ml/10 kg BB. Pada ayam: 0,2 ml/kg BB. Pengobatan dapat diulang kembali dalam 48 jam **Perhatian** Dalam satu tempat injeksi jangan lebih dari 20 ml pada sapi, 10 ml pada unggas dan 5 ml pada pedet dan kambing **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 11021077 PKC. Obat keras

293. LIMOXIN – 25 SPRAY

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan semprot **Komposisi** Tiap ml mengandung oksitetrasiklin 25 mg dan gentian violet 5 mg **Indikasi** Pengobatan luka dan mencegah infeksi luar kulit, ambing, kuku dan teracak akibat infeksi bakteri dan jamur yang sensitif seperti staphylococcus, streptococcus, bordetella, campylobacter, chlamydia, E. coli, haemophilus, mycoplasma, pasteurella, salmonella dan rickettsia, spp pada sapi, kambing, domba, babi dan ayam **Kontra Indikasi** Hipersensitif terhadap oksitetrasiklin **Perhatian** Jangan disemprotkan di sekitar mata. Kaleng jangan ditutup serta jangan diletakkan di tempat dengan suhu di atas 50°C **Dosis dan Cara Pemakaian** Semprot kandang dengan jarak 15-20 cm pada tempat luka, dan pemakaian 2x sehari **Kemasan** Kaleng 200 ml **Deptan RI** No. I. 05062921 PKC. Obat keras

294. LINCO SP

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kombinasi linkomisin HCl dan spektinomisin sulfat **Indikasi** Pengobatan terhadap: CRD murni atau yang berkomplikasi dengan E.coli, infeksi coryza dan colibasilosis pada unggas, serta enzootic pneumonia, mikoplasmosis, swine dysentri, porcine proliferative enteritis pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: Melalui air minum 0,5 g/L air minum selama 3-5 hari. Melalui pakan: 10–20 g/Mt pakan. Pada babi: Melalui air minum 0,2 g/L air minum selama 5-7 hari. Melalui pakan: 200–400 g/Mt pakan **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. I. 06123152 PKS. Obat keras

295. LINCO SPECTIN 100 SOLUBLE POWDER

**Pfizer Suzhou Animal Health, China/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 150 g mengandung linkomisin hidroklorida 33,3 g dan spektinomisin sulfat 66,3 g **Indikasi** Ayam: CRD dan CRD komplek. Kalkun: airsacculitis oleh Mycoplasma meleagridis. Babi: swine disentri enteritis bacterial yang disebabkan oleh

E. coli atau Salmonella spp. dan infeksi arthritis **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengobatan pada ayam: 150 mg/kg BB/hari. DOC umur 2 minggu: diberikan selama 3-5 hari dan dengan dosis 50 mg/kg BB/hari. Untuk umur 2 minggu ke atas diberikan selama 3-5 hari. Kalkun: pengobatan airsacculitis 50 mg/kg BB/hari. Babi: pengobatan disentri dan enteritis 10 mg/kg BB/hari selama 4-5 hari **Kemasan** Botol 150 g **Deptan RI** No. I. 0410666 PKS. 3. Obat keras

296. LINCO SPECTIN STERILE SOLUTION

**Pfizer Suzhou Animal Health, China/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung linkomisin hidroklorida 50 g dan spektinomisin sulfat 100 g **Indikasi** Ayam: CRD dan CRD kompleks, E. coli dan Arizona spp. Kalkun: airsacculitis oleh Mycoplasma meleagridis. Babi: pneumonial bacterial dan mikoplasma, disentri babi, enteritis bacterial dan infeksi arthritis. Ternak non ruminansia: pneumo-enteritis. Kambing dan domba: contagious footrot yang disebabkan oleh Bacteroides nodosus, infeksi mikoplasma dan bacterial. Anjing: pneumonia, pharyngitis, tonsilitis, laryngitis, bronchitis, dermatitis, bacterial dan abses. Kucing: cystitis, infeksi saluran pernafasan bagian atas, luka perkelahian dan abses **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengobatan pada ayam dan kalkun: 30 mg/kg BB/hari (0,1 ml/0,5 kg BB) secara SC selama 3 hari berturut-turut. Ternak non ruminansia: 15 mg/kg BB/hari (1 ml/10 kg BB) secara IM 2x suntikan pada hari pertama diikuti dengan 1x sehari selama 2-4 hari. Babi pengobatan: 15 mg/kg BB selama 3-7 hari. Anjing: 30 mg/kg BB (1 ml/5 kg BB) IM dan diulang hingga 21 hari. Kucing: 30 mg/kg BB (1 ml/5 kg BB) secara IM diulang dengan selang 12-24 jam hingga 21 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 03101426 PKC. 2. Obat keras

297. LINCO – S INJECTABLE SOLUTION

**Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/
Lisan Mulia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung lincomycin (as. Hydrochloride) 50 mg, dan spectinomycin (as. Sulfate) 100 mg **Indikasi** Babi: swine dysentery yang disebabkan oleh Treponema hyodysentery. Enzootic pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma hyopneumoniae. Arthritis yang disebabkan oleh Mycoplasma hyosynoviae, Staphylococcus spp dan Streptococcus spp. Erysipelas yang disebabkan oleh Erysipelothrix rhusiopathiae. Sapi, kambing dan domba: Pneumonia yang disebabkan rentan terhadap mikoplasma dan bakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi, domba dan kambing: diberikan secara suntikan IM: 1 ml/10 kg BB, dan dapat diulang setelah 24 jam selama 3-7 hari jika diperlukan. Sapi: diberikan secara suntik IM: 1 ml/10 kg BB. 2x sehari pada hari pertama dan 1x sehari pada hari berikutnya, dan diberikan selama 2-4 hari. **Perhatian** Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Jangan diberikan untuk hewan bunting dan laktasi **Waktu Henti Obat** Daging 12 hari, susu 2 hari **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 08123542 PKC.

298. LINSMYCIN SOLUBLE POWDER

Dong Bang Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Lincomycin HCl setara dengan Lincomycin 222 g/kg dan Spectinomycin sulfat setara dengan Spectinomycin 444 g/kg **Indikasi** pengobatan terhadap penyakit CRD, CCRD, Colibacillosis dan Staphylococcosis pada ayam. Obat keras dan harus

diberikan dengan resep dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan sebanyak 150 gram dalam 200 Liter air minum berikan selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Botol @ 150 gram **Kementan RI** No.I.12034247 PKS. Obat keras

299. LONGAMOX

Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Kandungan per 100 ml Amoxicillin trihydrate 15 g **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing, dan babi 1 ml untuk 10 Kg BB, diberikan 2 kali dengan interval 48 jam **Perhatian** Injeksi maksimum 20 ml untuk tiap tempat suntikan **Waktu Henti Obat** Daging Sapi 35 hari, Domba 21 hari, Babi 27 hari, Susu sapi 5 kali pemerahan **Kemasan** Botol 50 ml, Botol 100 ml, Botol 250 ml **Deptan RI** No. I. 04122842 PKC. Obat keras.

300. LONGICINE

Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Kandungan per 100 ml Oxytetracycline 20 g **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis 20 mg/Kg BB (1 ml/10 Kg BB) satu kali injeksi diberikan pada bagian dalam IM **Perhatian** Injeksi maksimum 20 ml untuk tiap tempat suntikan **Waktu Henti Obat** Daging: 21 hari, Susu: 7 hari (14 kali pemerahan) **Kemasan** 100 ml, 250 ml **Deptan RI** No. I. 06123147 PKC. Obat keras.

301. MACROTIL 250 SOLUTION

KNBP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tilmicosin 250 g/L **Indikasi** Untuk mengobati penyakit pernapasan pada unggas yang disebabkan oleh *Mycoplasma gallisepticum* dan untuk mengobati penyakit pernapasan pada babi yang disebabkan oleh *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumonia* serta *Mycoplasma hyopneumoniae* **Kontra Indikasi** Jangan diberikan secara intra vena karena akan mengakibatkan kematian terutama pada hewan babi **Perhatian** Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan, Simpan di tempat yang kering dan terhindar sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis pemberian pada babi yaitu sebanyak 0,8 ml per liter air minum berikan selama 5 hari, dosis pemberian pada unggas yaitu 0,3 ml per liter air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 60 ml, 240 ml, 480 ml dan 960 ml **Kementan RI** No. I. 12094358 PKC. Obat keras.

302. MARBOCYL 2%

Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Marbofloxacin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap marbofloxacin pada sapi, kambing, dan babi **Perhatian** volume injeksi maksimal 10 ml untuk satu tempat injeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis yang direkomendasikan adalah 2 mg/kg BB (1 ml/10 kg) dosis tunggal. Sapi dan kambing: IV selama 3-5 hari, Babi: IM selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml **Deptan RI** No. D. 09033586 PKC. Obat keras.

303. MARBOCYL 10%

Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Kandungan per 100 ml Marbofloxacin 10 g **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis yang direkomendasikan adalah 2 mg/kg (1 ml/50 kg) dosis tunggal. Sapi, kambing: rute IM, SC, IV selama 3-5 hari. Babi: rute

IM diberikan selama 3 hari **Perhatian** Injeksi maksimum 20 ml untuk tiap tempat suntikan
Waktu Henti Obat Daging: Sapi 6 hari, Domba 6 hari dan Babi 2 hari, Susu sapi 36 jam
Kemasan 100 ml, 250 ml **Deptan RI** No. I. 06123151 PKC. Obat keras.

304. MARBOSTAR 10%

Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung marbofloxacin 10% **Indikasi** Sebagai antibakteri pada sapi dan babi yang peka terhadap marbofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi dengan kasus infeksi pernafasan: 1 ml/50 kg BB (marbofloxacin 2 mg/1 kg BB), 1x sehari. Untuk sapi dengan kasus mastitis: 1 ml/50 kg BB (marbofloxacin 2 mg/1 kg BB), 1x selama 3 hari berturut-turut secara IV atau SC. Untuk babi: suntikan secara IM dengan dosis 1 ml/50 kg BB (marbofloxacin 2 mg/1 kg BB), 1x selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** Babi 2 hari, sapi 6 hari dan susu 36 jam **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 13014440 PKC.

305. MASQUIN

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Mycoplasmosis (CRD/CCRD), Colibacillosis, Pasteurellosis, Haemophilus, Salmonellosis **Kontra Indikasi – Perhatian – Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas : 1 ml/2 liter air minum per hari atau 0,1 ml MASQUIN /kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml, 1 Liter **Deptan RI** No.. D. 07113345 PKC

306. MAXUS 200

Elanco Animal Health/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung avilamycin **Indikasi** Mencegah dan kontrol nekrotik enteritis yang disebabkan oleh clostridium perfringens pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 50 g/1.000 kg **Kemasan** Paper bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09023557 PTS. Obat bebas terbatas

307. MEDITRIL K

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Setiap kapsul mengandung norfloxacin 10 mg **Indikasi** CRD kompleks, colibacillosis dan kolera **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Masukkan kapsul ke mulut ayam dan dorong ke dalam. Anak ayam (BB < 1 kg): sehari 1x 1 kapsul tiap ekor. Ayam dewasa (BB > dari 1 kg): sehari 1x 2 kapsul tiap ekor. Dapat diberikan selama 3-5 hari berturut-turut atau sesuai dengan petunjuk dokter hewan **Kemasan** Botol 10 kapsul, 50 kapsul dan 300 kapsul **Deptan RI** No. D. 01101619 PKM. 1. Obat keras

308. MEDOXY L

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung oxytetracycline 50 mg, lidocaine HCl 2% b/v **Indikasi** Unggas: CRD, korisa, kolera, infeksi bakteri g negatif dan positif yang resisten terhadap penicillin. Hewan besar (sapi, kuda, kerbau, domba, kambing dan babi): pneumonia, septicemia epizootica, leptospirosis, anthrax, foot rot, bacterial enteritis, metritis, mastitis, calf scours, anaplasmosis, erysipelas (diamond skin disease), scours pada anak babi,

infeksi karena luka dan sebagainya. Hewan kecil (anjing, dan kucing): distemper complex, infeksi saluran pencernaan dan pernapasan, leptospirosis dan infeksi karena luka **Perhatian** Penyuntikan pada ternak besar jangan melebihi 10 ml pada satu tempat penyuntikan. Jangan konsumsi susu yang diperah kurang dari 4 hari setelah penyuntikan. Meskipun jarang, hentikan pemakaian jika terdapat reaksi alergi pada ternak yang hipersensitif terhadap oxytetracycline **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat disuntikkan secara IM (tembus daging) atau SC (di bawah kulit) **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml, dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0207450 PKC. 1. Obat keras

309. MEDOXY LA**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung oxytetracycline base 200 mg dan bahan pembantu sampai 1 ml **Indikasi** Unggas: CRD, korisa, kolera, infeksi bakteri g negatif dan positif yang resisten terhadap penicillin. Ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan domba): mastitis, enteritis bakterial, pneumonia, radang sendi, pusar dan kaki. Babi: leptospirosis, erysipelas, scours (mencret), enteritis bakterial dan pneumonia **Perhatian** Meskipun jarang terjadi, hentikan pemakaian jika terdapat reaksi alergi pada ternak yang hipersensitif terhadap oxytetracycline. Jangan disuntikkan ke kuda, anjing dan kucing **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 10 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi. Ternak yang sedang diobati, susunya tidak boleh dikonsumsi selama 7 hari setelah pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat disuntikkan secara IM (tembus daging/otot), pada hewan besar. Secara SC (bawah kulit) pada unggas. Penyuntikan cukup 1x. Pada kasus yang kronis, ulangi penyuntikan setelah 3 hari. Info selengkapnya lihat leaflet **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0011600 PKC. Obat keras

310. MEGACLOX**Cipla, Ltd., India/Paeco Agung**

Bentuk Sediaan Cairan (injeksi intramamari) **Komposisi** Ampicillin dan cloxacillin **Indikasi** Untuk pengobatan mastitis pada sapi perah masa laktasi **Perhatian** Susu tidak boleh dikonsumsi 60 jam setelah pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu siringe untuk satu kuartir yang terinfeksi, diulang 12 jam kemudian selama 3 kali atau menurut petunjuk dokter hewan **Kemasan** 1 pak isi 6 syringe @ 5 g **Deptan RI** No. I. 10103909 PKC.

311. MENOROX LIQUID 20%**Nutec, Inggis/Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap kg mengandung norfloxacin 20% **Indikasi** Untuk mengobati penyakit mikoplasma, kolibasilosis, coryza, kolera, staphylococcosis dan infeksi kuman yang peka terhadap norfloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 25 ml untuk tiap 100 L air minum. Pengobatan 3-5 hari. Dapat ulangi 3-5 hari selang 2 hari dengan pemberian pertama. Anti-stress: selama 2 hari setelah stress, untuk mengurangi efek mikroba atau berikan setelah aplikasi vaksin aktif (terutama vaksin aktif keras) **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 03091327 PKC. 2. Obat keras

312. METRICURE**Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan infus **Komposisi** Setiap ml mengandung 500 mg cephapirin (as

benzathine) Indikasi Pengobatan endometritis sub akut dan kronis pada sapi yang diakibatkan oleh bakteri yang peka terhadap sepafrin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 syringe disuntikkan secara intra uterin dengan menggunakan kateter yang tersedia **Kemasan** Kotak karton berisi 10 syringe @ 19 g, 10 buah kateter dan 10 lembar sarung tangan plastik **Deptan RI No. I. 0602123 PKC. 1. Obat keras**

313. MICOSPECTONE

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung lincomycin hidrochloride dan septinomycin hidrochloride Indikasi Antibakteri yang peka terhadap lincomycine septinomycine **Perhatian** Jangan diberikan pada hewan yang mengalami treatment dengan relaksan otot, kadang-kadang diare ringan teramati pada domba, kambing dan babi setelah treatment. Pada kambing dapat diamati kehilangan nafsu makan dan menurunkan produksi susu. Jangan diberikan pada layer dan jangan diberikan pada kuda atau kelinci. Oral soluble dikontraindikasikan untuk ruminan dengan rumen fungsional **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas 3 minggu pertama: 3 kg/10 kg BB selama 3 hari. Setelah 3 minggu: 1g/ 10 kg BB selama 3 hari **Kemasan** 250 g **Deptan RI No. I. 04110398 PKS. 1. Obat keras**

314. MICOTIL

Elanco Animal Health/SHS International

Bentuk Sediaan Injeksi Komposisi Mengandung tilmicosin Indikasi Kontrol kasus pernafasan (BRD) pada sapi oleh *P. haemolytica* dan *P. multocida* **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 mg/kg BB secara SC **Kemasan** 50 ml, 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Deptan RI No. I. 0402214 PKC. 1. Obat keras**

315. MICOTIL – 300 INJECTION

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung tilmicosin Indikasi Antibakteri yang peka terhadap tilmicosin pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Deptan RI No. I. 04022214 PKC. 1. Obat keras**

316. MISTRAL

Olmix S.A. Perancis/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Clay, free essence pinus dan eucalyptus oil Indikasi Untuk menjaga lingkungan kandang dari kelembaban **Dosis dan Cara Pemakaian** Disebarkan pada alas kandang **Kemasan** Bag 25kg **Kementan RI No. I. 12124403 PTS. Obat bebas terbatas**

317. MITRAFLOX – 12

Mitravet

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap 100 ml mengandung enrofloxacin 12 g **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakteri dan mikoplasma pada ayam: CRD kompleks, coryza, colibacillosis, pullorum, cholera, omphalitis. Pada sapi: radang paru-paru, diare pada pedet, mastitis. Pada babi: radang paru-paru, diare putih, atropic rhinitis **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan untuk ayam: 1 ml/1-2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari. Sapi/babi: 1 ml/1-2 L air minum dan berikan 3-5 hari **Kemasan** 100ml, 1L **Kementan RI No. D. 03072608 PKC. Obat keras**

318. MITRAMET – 240

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfadiazine 200 g trimethoprim 40 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit antara lain colibacillosis, cholera, omphalitis, staphylococcosis dan coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1g dilarutkan ke dalam 2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari. Sapi/babi: 1 g/7 kg BB dan diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg **Deptan RI** No. D. 04012710 PKS. TM. Obat keras

319. MITRAMOX – 280

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung amoksisilin 200 g, colistine 800.000.000 IU **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit antara lain pada ayam: colibacillosis, cholera, coryza (snot), pullorum (berak kapur), omphalitis, CRD kompleks. Pada sapi/babi: diare, colibacillosis, radang paru-paru dan radang persendian **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 g dilarutkan ke dalam 2 L air minum. Sapi/babi: 1 g/7 kg BB dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg **Deptan RI** No. D. 04112840 PKS. TM. Obat keras

320. MOXACOL

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Amoxicillin trihydrate 75.000 mg dan Colistin sulfate 250.000.000 IU **Indikasi** Fowl Cholera, Salmonellosis, Clostridium sp, Staphylococcosis dan Colibacillosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas : 2 g/ 1 L air minum atau 0,3 gr MOXACOL/kg BB per hari selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Deptan RI** No. D. 07043215 PKS Obat keras.

321. MOXACOL PLUS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung amoxicillin trihydrate dan colistin sulfat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap amoxicillin dan colistin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral pada unggas: 1 g/2 L air minum atau 0,1 g/kg BB/hari selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 08063451 PKS.

322. MOXYCOLGRIN HC

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 Kg mengandung Amoxycilline 200 g dan Colistin sulfate 800.000.000 IU **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan infeksi bakteri pada saluran pencernaan Fowl Cholera, Colibacillosis, Salmonellosis, Staphylococcus, Streptococcus dan bakteri lainnya yang peka terhadap Amoxycillin dan Colistin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g Moxycolgrin HC dilarutkan kedalam 2 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut (2kali/hari) pagi dan sore. **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 Kg **Deptan RI** No. D. 080123530 PKS. Obat keras.

323. MULTIFLOX – 11

Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung enrofloxacin 11.000 mg **Indikasi** Untuk mengobati mycoplasmosis, coryza/snot, colibacillosis, salmonellosis, sevelar tractus, digestivus infection dan respiration infection **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 ml/200 L air

minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. D. 07093299
PKC. Obat keras

324. MYCOBACT

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung oxytetracycline dan colistin **Indikasi** Mengobati CRD kompleks, fowl cholera, infectious coryza/snot, colibacillosis, salmonellosis, streptococcosis, staphylococcosis pada unggas serta diarrhoea, pneumonia, rhinitis pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/L air minum. Anak babi: 80-160 mg/kg BB/hari. Induk babi: 100-150 mg/kg BB/hari. Campurkan air secukupnya dan cekokkan ke mulut, berikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 10 g, 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 02061702 PKS. 1. Obat keras

325. MYCOMAS

Univet-Irlandia/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung norfloxacin 10 g **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan oleh mycoplasma spp (CRD), haemophilus paragallinarum (coryza), pasteurella multocida (kolera), salmonella pulorum, E. coli (kolibasilosis) **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/L air minum diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 03022289 PKC. 1. Obat keras

326. MYCOSINDO

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung spiramisin adipate 200 g **Indikasi** Pengebalan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh mycoplasma gallisepticum dan mycoplasma synoviae pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: 1 g/1 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 10 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D. 09083677 PKS. Obat keras

327. MYCOTACK

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Enrofloxacin 100 g **Indikasi** Untuk mengobati CRD, Coryza (Snot), Colibacillosis dan Cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI** No. D. 11041949 PKS. 2. Obat keras.

328. MYCOTACK LIQUID

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung Enrofloxacin 100 g **Indikasi** Untuk mengobati CRD, Coryza (Snot), Colibacillosis dan Cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Kementan RI** No. D. 12092242 PKC. 2. Obat keras.

329. MYCOVET PLUS

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ampicilin trihydrate 125 g dan erythromycin 125 g **Indikasi** Kombinasi antibiotik ampicillin dan erythromycin yang sangat

ampuh membasmi mycoplasma (CRD), CRD complex, infectious coryza, fowl cholera, colibacillosis, infeksi kuman g (+) dan g (-) lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum diberikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 98071466 PKS. 1. Obat keras

330. MYCO – BLOCK

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung tylosin tartrate 100 g, colistin sulfat 150.000.000 IU **Indikasi** Mengobati CRD kompleks dan mengencerkan lendir yang menyumbat pernafasan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 1 g ke dalam 2 L air minum **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg **Kementan RI** No. D. 13014417 PKS. Obat keras

331. NEOAMP

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung ampicilin 120 g dan neomycin 100 g **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibacillosis dan infeksi saluran pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g dalam 1-2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 2 g dalam 1 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** 100 g **Deptan RI** No. D. 10063856 PKS. Obat bebas terbatas

332. NEOCIN SOLUBLE POWDER

Dong Bang Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Neomycin sulfat setara dengan Neomycin 100 g/kg **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit enteritis non spesifik, Salmonellosis, Colibacillosis dan Blue Comb pada ayam dan kalkun serta untuk pengobatan terhadap Colibacillosis, Vibrionic enteritis dan Salmonellosis pada sapi dan babi. Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan, **Waktu Henti Obat** 5 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis pemberian per oral untuk ayam dan kalkun yaitu 1 g/ 1,5 L, untuk babi dan domba yaitu 1g/ 0,5L sapi dan untuk sapi yaitu 1 kg untuk 30 ekor sapi dewasa, diberikan selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium @100 gram, 250 gram, 500 gram dan 1 kg **Kementan RI** No. I. 12034246 PKS. Obat keras.

333. NEOFIL FORTE

PT. Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung neomycine 50 g, ampicillin 100 g **Indikasi** Untuk pengobatan colera, colibacillosis, pulorum, dan stapilokokosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pencegahan: 1 g/2 L air minum, selama 5 hari berturut-turut. Untuk pengobatan: 2 g/2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. D. 06013031 PTS. Obat keras

334. NEOMIX 325

Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung 715 neomycin sulfate (ekivalen dengan neomycin base 500 mg/g) **Indikasi** Efektif untuk mengontrol diare yang disebabkan oleh bakteri enteritis dan infeksi gastrointestinal yang spesifik maupun non spesifik **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mengontrol penyakit: 1 g/10 L air minum untuk sapi, babi,

kuda, domba, kambing, ayam dan unggas lainnya selama 3-4 hari. Untuk unggas: 20 mg/kg BB **Kemasan** 500 g **Deptan RI** No. I. 0707667 PKS. 3. Obat keras

335. NEOPRIDIMET

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sulphadiazine dan trimethoprim **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap sulfadiazine dan trimethoprim pada broiler dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2-0,3 ml/kg BB (equivalent dengan 0,1-1 ml/L air minum selama 3-5 hari) **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI** No. I. 12112465 PKC. 1. Obat keras

336. NEOTETRA – 50

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung neomycine 50 g, oxytetracycline 50 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit saluran pencernaan pada ayam seperti colibacillosis dan cholera, serta saluran pernapasan CRD **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1-2,5 g ke dalam 1 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg **Deptan RI** No. D. 06023047 PTC. TM. Obat keras

337. NEOXIN

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg mengandung Neomycin (sulfat) dan Oxytetracycline (HCl) **Indikasi** Fowl Cholera, Colibacillosis, Salmonellosis, dll, menekan angka kematian anak ayam pada minggu-minggu pertama **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral ; 2 g/L air minum atau 0,5 NEOXIN/kg BB per hari selama 3 - 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Deptan RI** No. D. 05022208 PKS.1 Obat keras.

338. NEO ERYDOVET – 25

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung erythromycin 50 g, doxycycline 20 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit pada ayam CRD kompleks, snot/infectious coryza dan cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 2 g ke dalam 1 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 kg **Deptan RI** No. D. 08093493 PKS. Obat keras.

339. NEO MEDITRIL

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** CRD kompleks, colibacillosis, korisa dan kolera **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml tiap L air minum, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Bila perlu, pemberian diulangi setelah 7-10 hari **Kemasan** Botol 20 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 0102766 PKC. Obat keras

340. NEO MEDITRIL – I

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** CRD complex, colibacillosis, korisa, dan kolera pada unggas. Untuk hewan besar (ruminansia, babi): pneumonia, infeksi Haemophilus sp., AR (atropic rhinitis), pasteurellosis dan gangguan saluran pencernaan **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 7 hari sebelum unggas

dipotong untuk dikonsumsi. Jangan digunakan pada kuda atau anak anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml tiap 10 kg BB/hari sebagai dosis awal disuntikkan secara intramuskuler (tembus daging/otot), kemudian dilanjutkan dengan pemberian 0,25 ml tiap 10 kg BB selama 3-4 hari berturut-turut pada ruminansia dan babi. Pada kasus yang parah 0,5 ml tiap 10 kg BB selama 4-5 hari berturut-turut. Pada unggas: 0,125 ml tiap kg BB disuntikkan secara intramuskular atau subkutan (bawah kulit) **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml, dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 07123364 PKC. Obat keras

341. NEO TERRAMYCIN 25**Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung oksitetrasiklin HCl (teramisin) 27,5 g dan neomycin sulfat 27,5 g **Indikasi** Unggas: fowl cholera, coryza, CRD, enteritis bakterial, salmonellosis, pullorum, kemerosotan produksi pada saat stress, kematian anak ayam pada minggu pertama. Babi: disentri vibrio, enteritis nekrotik, pneumonia, swine plaque, leptospirosis, penyakit pada saat stress, kematian anak babi pada minggu pertama. Sapi dan kerbau: mengobati diare infeksius, bakterial pneumonia, haemorrhagi septicaemia, listeriosis dan leptospirosis, penyakit pada waktu stress, kematian anak sapi/kerbau pada minggu pertama **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 7 g dilarutkan dalam 3,8 L air. Untuk keadaan stress: 3,5 g dilarutkan dalam 7,6 L air. Babi: 3,5 g dicampurkan air secukupnya. Untuk keadaan stress: 3,5 g dilarutkan dalam 3,8 L air. Pada kematian anak babi minggu pertama: 3,5 g dicampurkan dalam 10 L air untuk 2 ekor babi selama 1 minggu. Sapi dan kerbau: 7 g dicampur dengan air secukupnya untuk 1 ekor sapi/kerbau. Untuk keadaan stress: 3,5 g dicampur air secukupnya/ekor sapi/kerbau **Kemasan** Sachet 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 06020717 PKS. 2. Obat keras

342. NEO – MOXY**Hendy Pharmindo Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung neomisin sulfat 145 g, amoksisilin trihidrat 100 g **Indikasi** Pada unggas: CRD, colibacillosis, infectious coryza, staphylococcosis, streptococcosis, salmonelosis. Babi dan ruminansia: colibacillosis, salmonelosis, bakterial pneumonia, atrophic rhinitis, pasteurella **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 1 g dilarutkan dalam 1 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Babi dan ruminansia: 50–100 mg/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D.0462787 PKS. Obat keras

343. NEUMOVIRIC**S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kombinasi doksisisiklin HCl dan neomisin sulfat **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit pneumopathies seperti: CRD dan pneumoenteritis pada bovine, ovine, kambing, babi, unggas dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** Per oral melalui air minum. 0,5 g/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. I. 06053066 PKS. Obat keras

344. NEW COLIPRIM**AVICO/Maju Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Oral solution **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung trimethoprim 40 mg

dan sulphadiazine sodium 200 mg **Indikasi** Digunakan untuk pengobatan infeksi E. coli, salmonella, pasteurella (fowl cholera), klebsiella, haemophilus, staphylococcus, streptococcus pada ayam dan hewan ternak **Perhatian** Hentikan pengobatan 7 hari sebelum dipotong. Simpan ditempat gelap pada temperatur dibawah 350C. Obat hanya untuk hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas (pengobatan): 2-4 ml/5 L air minum selama 3-5 hari. Hewan ternak: 2 ml/15 kg BB setiap hari selama 5 hari secara oral **Kemasan** 100 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 04032740 PKC. Obat keras

345. NEW ERYSULFA

**Choong Ang Biotech, Co. Ld., Korea/
Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung 90 g erythromycin thiocyanate, 75 g sulfadiazine, 15 g trimethoprim **Indikasi** Mencegah dan mengobati penyakit CRD, CCRD, bronchopneumonia, salmonellosis, kolera, septicemia dan enteritis terutama bila telah resisten terhadap antibiotika atau kemothérapeitika lain. Serta mampu mencegah dan mengobati penyakit koksidia **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: larutan 1 g/1 L air minum selama 5 hari berturut-turut. Babi dan sapi: 15 g/50 kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g/sachet **Deptan RI** No. I. 0202099 PKS. Obat keras

346. NEW OX

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung neomycin sulfat 200 mg dan oksitetrasiklin HCl 200 mg **Indikasi** Pengobatan terhadap kolera, kolibasilosis, snot, CRD, salmonellosis, dan berbagai infeksi yang disebabkan bakteri g positif dan negatif pada saluran pencernaan dan pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,5-1 g/L air minum atau 1 g untuk 7,5 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Pot 500 g **Deptan RI** No. 05062942 PKS. TM. Obat keras

347. NEW VERN A

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap gram mengandung erythromycine thiocyanate 200 mg, doxycycline hydrochloride 100 mg. **Indikasi** pengobatan CRD kompleks yang kronis disertai infeksi sekunder oleh kuman E. coli, Salmonella (berak kapur), Shigella dan Pasteurella (berak hijau). **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 gr kedalam 2 liter air minum berikan 3-5 hari berturut-turut, atau 100 gram untuk 1.500 kg berat badan. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. D. 12072506 PKS.1. Obat keras.

348. NORAN – 150

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung norfloksasin 150 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap norfloksasin seperti mycoplasma, E. coli, haemophilus, pasteurella dan salmonella, campylobacter spp pada sapi, kambing, domba, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada sapi, kambing, domba dan babi: 1 ml/30-60 kg BB. Unggas: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 05062922 PKC. Obat keras

349. NORAN – 200 ORAL

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung norfloksasin 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap norfloksasin seperti mycoplasma, E. coli, haemophilus, pasteurella dan salmonella, campylobacter spp pada sapi, kambing, domba, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba: 10 ml/75-150 kg BB. Babi: 1 ml/10-20 kg BB selama 3-5 hari. Unggas: 1 ml/4 L air minum atau 1 ml/10-20 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** 100 ml, 500 ml, 1.000 ml **Kementan RI** No. I. 11021046 PKC. 1. Obat keras

350. NORAN – 200 WS

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap g mengandung norfloksasin 200 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan perkencingan akibat bakteri yang sensitif terhadap norfloksasin seperti campylobacter, E. coli, haemophilus, mycoplasma, pasteurella dan salmonella spp pada babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/4 L air minum atau 1 g/10-20 kg BB. Babi: 1 g/10-20 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g, 500 g, 1.000 g **Kementan RI** No. I. 1102951 PKS. 1. Obat keras

351. NORFLOX 33

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung norfloksasin nikotinat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap norfloksasin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur melalui air minum **Kemasan** Botol 40 g dan 150 g **Kementan RI** No. D. 1202353 PKS. 1. Obat keras

352. NORITACK LIQUID

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung Norfloxacin 200 g **Indikasi** Untuk mengobati CRD, Coryza (Snot), Colibacillosis dan Cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml Noritack Liquid/2 L air minum (20 mg/Kg BB/hari), selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 05022417 PKC. 1. Obat keras.

353. NOROTRYL

Norbrook Laboratories Ltd, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung tylosin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tylosin pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 03112680 PKC. Obat keras

354. NOROTYL LA

Norbrook lab-UK/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung tylosin **Indikasi** Antibakteri **Kontra Indikasi** Jangan diinjeksikan secara IV **Dosis dan Cara Pemakaian** 20 mg/kg BB **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 03112680 PKC. Obat keras

355. NOVAMOX – G INJ

Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Amoxicillin trihidrat dan gentamicin sulfat **Indikasi**

Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan negatif yang rentan terhadap amoxicillin dan gentamicin pada sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat kemasan **Kemasan** 100 ml **Depthan RI** No. I. 07083263 PKC. Obat keras

356. NOVAQUYL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 100 ml mengandung norfloxacin 10 g **Indikasi** Antibakteri spektrum luas untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml dilarutkan dalam 1 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut selama 24 jam **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Depthan RI** No. D. 12112563 PKC.1. Obat keras

357. OCTACIN EN 5% INJECTION

**Octa Memorial, Thailand/
Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap 1 ml mengandung enrofloxacin 50 mg **Indikasi** Mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikoplasma, bakteri gram positif dan negatif pada sapi, kerbau, babi dan unggas seperti diare yang disebabkan oleh *E. coli*, *Salmonella* spp, colenterotoxaemia, atropik rhinitis, broncho-pneumonia, enzootic pneumonia yang disebabkan oleh *Mycoplasma* spp, dan *Pasteurella multocida*, *erysipellae*, *pasteurellosis*, *arthritis* dan infeksi bakteri sekunder pada penyakit viral **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: Pengobatan 1 ml/5 kg BB selama 3 hari. Babi, kerbau dan sapi: 1 ml/20 kg BB selama 3 hari berturut-turut. Pada kasus penyakit berat: dosis 2 ml/20 kg BB selama 3 hari berturut-turut. Untuk salmonellosis: 2 ml/20 kg BB selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml **Depthan RI** No. I. 03012272 PKC. 1. Obat keras

358. OCTACIN EN 10% ORAL SOLUTION

**Octa Memorial, Thailand/
Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung enrofloxacin 10% **Indikasi** Mengobati penyakit menular pada unggas (ayam, itik, angsa dll) disebabkan oleh bakteri gram positif dan negatif, termasuk *mycoplasma* spp. Terutama CRD, colibacillosis, enteritis (colisepticaemia, salmonellosis, dll), kolera unggas, coryza, dan infeksi bakteri lain **Dosis dan Cara Pemakaian** 1ml / 2L air minum atau 10 mg zat aktif/0,1ml/kg BB, selama 3 hari berturut-turut. Untuk salmonellosis dan berak selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Depthan RI** No. I. 04062350 PKC. 1. Obat keras

359. OTAFLOX

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung norfloxacin 200 mg **Indikasi** Mengobati penyakit saluran pernafasan dan pencernaan antara lain colisepticemia, coli enteritis, salmonellosis (berak kapur), pasteurellosis (berak hijau) dan haemophyllus (snot) **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 2 ml/2-3 L air minum atau 100 ml untuk 1.000-1.300 kg BB dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 7 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Depthan RI** No. D. 07093276 PKC. Obat keras

360. OCTAMIX AC **Octa Memorial, Thailand/Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Dalam 1 kg mengandung amoksisilin 100 g, kolistin 400 IU **Indikasi** Mengobati penyakit menular pada unggas (ayam, itik, angsa, dll) disebabkan oleh bakteri gram positif dan negatif, termasuk mycoplasma spp. Terutama CRD, CCRD, colibacillosis, salmonellosis, coryza, dan infeksi bakteri lain yang disebabkan vaksinasi dan kondisi stress **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum atau 0,2 g zat aktif/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI No. I. 0102697 PKS. Obat keras**

361. ORGANIC GREEN CULTURE **HanPoong-Korea/SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung saccharomyces cerevisiae, lactobacillus acidophilus, bacillus subtilis dan aspergillus oryzae **Indikasi** Meningkatkan nafsu makan, meningkatkan kemampuan pencernaan dan penyerapan sari sari makanan pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-3 kg /ton **Kemasan** Kantung 1 kg dan 20 kg **Deptan RI No. I. 03062605 FTS. Obat bebas terbatas**

362. OTAQUINE SOL **Otasindo Prima Satwa**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung flumequine 120 mg **Indikasi** Sangat efektif untuk pengobatan snot/coryza, kolera unggas, kolibacillosis dan pullorum. Sensitif untuk bakteri gram negatif patogen lainnya seperti Serratia, Proteus spp, Shigella dan Neisseria spp **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: larutkan 100 ml dalam 120 L air minum atau 18 mg/kg BB dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 07043204 PKC. Obat keras**

363. OTC SPRAY **Cipla,Ltd.,India/PaecoAgung**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Oxytetracycline **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap oxytetracycline pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian secara spray/semprot pada daerah luka luar **Kemasan** Kaleng @200 ml **Deptan RI No. I. 12074295 PKC.**

364. OXALDIN **Daichii Pharmaceutical/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ofloxacin **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,1-0,2 ml/kg BB **Kemasan** 100 dan 500 ml **Deptan RI No. I. 0011402 PKC. 2. Obat keras**

365. OXALDIN LIQUID **Daichi Pharmaceutical Co. Ltd., Jepang/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ofloxacin **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap ofloxacin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 100 ml, 200 ml dan 500 ml **Kementan RI No. I. 1203402 PKC. 3. Obat keras**

366. OXILEN AD **Vetanco S.A. Argentina/Pakan Serasi**

Bentuk Sediaan Injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung 200 mg oksitetrasiklin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin pada sapi, babi, anjing dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,25 ml/kg BB SC atau IM. Untuk sapi, babi dan domba: 1 ml/10

kg BB secara IM. Anak babi dengan BB < 2 kg: 0,25 ml secara SC **Kemasan** 100 ml/botol
Deptan RI No. I. 03102653 PKC. Obat keras

367. OXIPRA – 20 LA

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** setiap ml mengandung Oxytetracycline (hydrochloride) 200 mg **Indikasi** Unggas Pasteurellosis, CRD, Coryza; Babi hemorrhagi septicemia, diare, enteritis, MMA syndrome; Domba/kambing chlamydiosis, pasteurellosis, diare, enteritis; Sapi pneumoenteritis, mastitis dan metritis **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang sensitif terhadap tetracycline **Dosis dan Cara Pemakaian** IM; Unggas 0,25 ml/Kg BB; Babi/domba/kambing 5–10 ml/ekor/dewasa, 1–5 ml/ekor/muda; Sapi 30–40 ml/ekor/dewasa, 10–15 ml/ekor/muda **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 05071573 PKC. 1 Obat keras.

368. OXOLINAL

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 1.000 ml mengandung oxolinic acid 100 g **Indikasi** Untuk mengobati staphylococcosis, colibacillosis, snot/coryza, salmonellosis, fowl cholera pada unggas dan infeksi bakteri lainnya yang peka terhadap oxolinic acid **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml oxolinal dalam 1 L air minum dan berikan selama 3–5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 05101874 PKC. 1. Obat keras

369. OXTRA EFFERVESCENT PESSARIES

**FATRO S.P.A, Italia/
Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Effervescent **Komposisi** Mengandung oxytetracycline hidroklorida **Indikasi** Terapi dan pencegahan dari infeksi bakterial pada traktus reproduksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap oksitetrasiklin, seperti pada retensio plasenta dan endometritis **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan melalui intrauterina. Pada sapi: 2–4 pessaries/hari pada sekali pemakaian (setara dengan 2–4 g oksitetrasiklin). Ulangi pemakaian apabila perlu setelah 24 jam **Kemasan** Kotak berisi 36 pessaries dan 120 pessaries **Deptan RI** No. I. 03032538 PKM. Obat keras

370. OXTRA LA

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oxytetracycline dihydrate **Indikasi** Antibiotik OTC long acting **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara deep IM. Pada sapi, kerbau, domba dan kambing: 15 ml/100 mg kg BB. Babi: 10 ml/100 kg BB. Anak babi dengan BB dibawah 10 kg: 1 ml/ekor. Ayam: 0,15–0,30 ml/kg BB **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 05081611 PKC. 2. Obat keras

371. OXYLIN INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oxytetracycline HCl **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oxytetracyclin pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi subkutan atau IM ternak besar, sedang: 1 ml/5–10 kg selama 3–5 hari. Jangan disuntikkan lebih dari 10 ml pada satu tempat suntikan. Unggas: 1–2 minggu 0,125 ml/ekor. 2–4 minggu 0,25 ml/ekor.

4–8 minggu 0,5 ml/ekor. 8 minggu 1 ml/ekor. Selanjutnya 2 ml/ekor **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml **Deptan RI** No. D. 05123030 PKC. 1. Obat keras

372. OXYJECT – 100

Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung 100 mg oxytetracycline HCl
Indikasi Antibakteri yang peka terhadap oxytetracycline pada hewan besar (sapi) dan hewan kecil (babi) **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui suntikan intravena, intramuskular atau subkutan. Untuk hewan besar (sapi): 0,75-2 ml/50 kg BB selama 3-5 hari. Untuk hewan kecil (babi): 0,25-0,5 ml/5 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 04112836 PKC. Obat keras

373. OXYTETRAVET AEROSOL

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan semprot **Komposisi** Mengandung oxytetracycline hydrochloride
Indikasi Untuk pengobatan dan kontrol terhadap foot rot, digital dermatitis, udder reat, bibir dan semua jenis infeksi kulit, luka bakar, infeksi setelah operasi dan ekskoriasi akibat organisme yang sensitif terhadap oxytetracycline pada sapi, domba dan semua jenis hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara topical dan kocok sebelum digunakan. Lepaskan jaringan mati dan debris pada lokasi infeksi kemudian semprotkan produk pada lokasi infeksi selama 1-2 detik, pada jarak 15-20 cm sehingga mendapatkan hasil semprotan yang merata pada lokasi infeksi. Lakukan perlakuan ulang selama 12 jam hingga perbaikan jaringan selesai **Kemasan** Botol 200 ml **Kementan RI** No. I. 12074303 PKC. Obat keras

374. OXYTETRAVET 20% LA INJ

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oksitetrasiklin HCl **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin HCl pada sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, pada sapi, domba dan kambing: 1 ml/10 kg BB dan dapat diulangi setelah 3-4 hari jika diperlukan **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 09073666 PKC. Obat keras

375. OXYTRAL

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oxytetrasiklin 50 mg, lidokain 20 mg **Indikasi** Sapi: SE, pneumonia, antraks, leptospirosis, metritis, mastitis, enteritis, foot rot, aktinibasilosis, aktinomikosis. Babi: enteritis, pneumonia, erisipelosis, antraks, streptokokosis, leptospirosis, metritis, SE. Kuda: strangles, pneumonia, antraks, enteritis, infeksi pada saluran urinaria. Domba/kambing: SE, epizootika, pneumonia, antraks, enteritis, infeksi bakteri pada saluran urinaria. Anjing/kucing: pneumonia, leptospirosis, enteritis, otitis. Unggas: CRD, SNOT, kolera, sinusitis, enteritis, kolibasilosis serta penyakit lain pada ternak yang disebabkan oleh infeksi mikroba yang peka terhadap oksitetrasiklin **Kontra Indikasi** Tidak dianjurkan diberikan secara IV **Perhatian** Hewan boleh dipotong 7 hari setelah penyuntikan terakhir **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan IM selama 3 hari berturut turut. Hewan besar: 1 ml/10 kg BB. Hewan kecil: 1 ml/5 kg BB **Kemasan** 50 ml, 100 ml **Deptan RI** No. D. 02042192 PKC. 1. Obat keras

376. OXYTRAL LA

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oxytetrasiklin dihidrat 200 mg **Indikasi** Sapi: SE, pneumonia, antraks, leptospirosis, metritis, mastitis, enteritis, foot rot, aktinibasilosis, aktinomikosis. Babi: enteritis, pneumonia, erisipelosis, antraks, streptokokosis, leptospirosis, metritis, SE. Kuda: strangles, pneumonia, antraks, enteritis, infeksi pada saluran urinaria. Domba/kambing: SE, epizootika, pneumonia, antraks, enteritis, infeksi bakteri pada saluran urinaria. Anjing/kucing: pneumonia, leptospirosis, enteritis, otitis. Unggas: CRD, SNOT, kolera, sinusitis, enteritis, kolibasilosis serta penyakit lain pada ternak yang disebabkan oleh infeksi mikroba yang peka terhadap oksitetrasiklin **Kontra Indikasi** Tidak dianjurkan diberikan secara IV **Perhatian** Hewan boleh dipotong 28 hari setelah penyuntikan terakhir **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan IM dengan dosis tunggal. Hewan besar: 1 ml/10 kg BB. Hewan kecil: 1 ml/2 kg BB **Kemasan** 50 ml, 100 ml **Deptan RI** No. D. 02042185 PKC. 1. Obat keras

377. OXYTETRACYCLINE – 25

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung 250 g oxytetracycline **Indikasi** Pengobatan CRD, coryza, kolera, salmonella, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum diberikan selama 3–5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg **Deptan RI** No. D. 06072323 PKS. 1. Obat keras

378. OXYTETRA 5 COOPHAVET

Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung oxytetracycline 5 g **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada sapi, babi, domba, kambing, unggas, kelinci dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi, babi, kambing, domba dan kuda: 1 ml/10 kg BB. Untuk unggas dan kelinci: 1 ml/5-10 kg BB dan diberikan melalui suntikan secara SC/IM selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 09021367 PKC. 2. Obat keras

379. OXYTETRA 200 LA

Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung oxytetracycline (sebagai dehydrate) 20 g, magnesii oxidum reagen (sebagai reagen) 1,6 g, N-methyl-2-pyrrolidonum (sebagai penstabilitas komposisi) 6 g, 2-pyrrolidonum (sebagai pelarut) 38 g, sodium formaldehyde sulfoxylaat (sebagai antioksidan) 0,5 g, monoethanolaminum sqf pH=8,4 (sebagai alkanilizer), aqua ad injectable s.q.f 100 ml **Indikasi** Infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan terhadap oxytetracycline seperti infeksi saluran pernafasan (pneumonia), infeksi saluran urogenital, enteritis, endometris, mastitis, foot rot, dan bednosiasis pada sapi, kuda, babi, domba, kambing dan unggas **Kontra Indikasi** Hipersensitif terhadap oxytetracycline, gangguan ginjal dan hati, kombinasi dengan penicillin atau cephalosporin. Gunakan 5 hari sebelum sampai 5 hari sesudah vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis umum 20 mg/kg BB (=1 ml/10 kg BB) secara IM untuk 3 hari, hindari pemberian lebih dari 10 ml pada satu tempat. Pada beberapa kasus injeksi dapat diulang setelah 3 hari. Anak babi dengan BB hingga

10 kg juga maksimal 1 ml SC **Waktu Henti Obat** Daging 21 hari dan susu 7 hari **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 11094156 PKC

- 380. OXY – KEL 10%** **Kela Laboratories, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung oksitetrasiklin HCl **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin pada sapi, babi dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 02112465 PKC. Obat keras
- 381. OXY – KEL 20 LA** **Kela Laboratories, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung oksitetrasiklin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin pada sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM kecuali pada babi injeksi secara SC **Kemasan** Botol 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 1208255 PKC. 1. Obat keras
- 382. OXY – SAN 10%** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung oxytetracycline dan lidocaine **Indikasi** Mengobati penyakit saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, infeksi sekunder penyakit viral, septicaemia, MMA syndrome, radang persendian, foot rot, leptospirosis, erysipelas, toxoplasmosis, babesiosis, anaplasmosis dan infeksi bakteri lainnya yang peka terhadap oxytetracycline **Perhatian** Pemotongan hewan dapat dilakukan 20 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kuda: 2,5-5,0 ml/50 kg BB secara IM. Sapi, kerbau, babi, domba dan kambing: 0,25-1 ml/10 kg BB, dosis 0,5-2 ml/20 kg BB, dosis 0,6-0,8 ml/10 kg BB, dosis 2,5-10 ml/100 kg BB secara IM atau SC. Tiap kenaikan BB 25 kg, dosis ditambah 1 ml untuk babi, kambing, domba, sapi, kerbau dan babi dan untuk penggunaan dosis lebih dari 20 ml pada sapi, kerbau, kuda, dan 10 ml pada babi, kambing dan domba dianjurkan pada 2 sisi yang berbeda. Anjing dan kucing: 0,3-0,4 ml/5 kg BB atau 0,6-0,8 ml/kg BB secara IM. Unggas: 0,1-0,2 ml/< 1 kg BB sampai 0,25-0,5/kg BB, 2 kali/hari secara IM **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 07093280 PKC. Obat keras
- 383. O.T.C – LA INJECTION** **Samyang Anipharm Co. Ltd, Korea/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Oxytetracycline dihydrate 200mg/ml **Indikasi** Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Gram positif, bakteri Gram negatif, spirochete, ricketsia dan megalovirus yang sensitif/rentan terhadap oxytetracycline pada sapi domba dan babi. **Waktu Henti Obat** 20 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan 1 ml/10 kg (b.b.) per secara I.M. atau S.C. **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I 07083259 PKC. Obat keras.
- 384. PANTRISUL INJECT** **Pantex-Holland/Sarana Veterinaria Jaya Abadi**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Tiap ml mengandung Sulfamethoxazole 200 mg, trimetoprim 40 mg, benzil alkohol 0,009 ml, gliserol formal 0,49 ml, dimetil asetamida 0,18 ml, dietanolamina 0,003 mg, sodium hidroksida 0,032 mg, aqua dest qsp 1 ml **Indikasi** Infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap trimetoprim dan atau sulfamethoxazole (seperti infeksi pada saluran pernafasan, urogenital, infeksi sekunder (setelah infeksi virus),

foot rot, mastitis, arthritis dan phlegmonosis pada kuda, sapi, babi, anjing dan kucing **Kontra Indikasi** Insufisiensi hati atau ginjal yang serius, aciduria, hipersensitif terhadap sulfonamide. Kombinasi ini tidak cocok dengan asam para-aminobenzoat dan ester (procaine, tetracaine). Jangan diberikan simultan dengan hexamethylene tetramine (methenamine) **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemakaian IM atau IV lambat: Dosis umum: 1 ml/10-15 kg BB 1x sehari selama 5 hari (jika perlu) **Waktu Henti Obat** Daging 8 hari, susu 4 hari **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 12034240 PKC

385. PAMIZOLE PS

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung tetramisole **Indikasi** Obat cacing nematoda gastrointestinal dan infestasi cacing paru-paru pada sapi, domba, kambing, kuda dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur dalam pakan atau dilarutkan dalam air minum. Sapi: 7-30 g/kg pakan atau 1,5 g/10 kg BB. Domba dan kambing: 5-20 g/kg pakan atau 0,1 g/kg BB. Babi: 1,5 g/10 kg BB. Kuda: 2-7,5 g/kg pakan. Unggas: 5-12 g/kg pakan atau 2,5-6 g/L air minum **Kemasan** 1 kg **Deptan RI** No. I. 05101635 PTS. 1. Obat bebas terbatas

386. PARACILLIN SP

Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 g mengandung 800 mg amoxicillin trihydrate **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi bakteri yang peka terhadap amoxicillin trihydrate pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas 20 mg/kg BB). Babi: 20 mg/kg BB. Interval dosis 24 jam dengan lama pengobatan 3-5 hari **Kemasan** 100 g **Deptan RI** No. I. 0506754 PKS. 1. Obat keras

387. PENSTREP – 400

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung procain penicillin G 200.000 IU dan dihydrostreptomycine sulphate 200 mg **Indikasi** Artritis, mastitis, infeksi penisillin dan dihydrostreptomisin seperti compylobacter, clostridium, corynebacterium, E. Coli, erysipelathryx, haemophilus, klebsiella, listeria, pasteurella, salmonella, staphylococcus dan streptococcus spp. pada sapi, domba, kambing dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, pada sapi, domba dan kambing: 1 ml/20 kg BB. Untuk irigasi uterus: 5-15 ml/ekor. Babi: 1 ml/10 kg BB selama 3 hari. Unggas: 0,2 ml/kg BB selama 3 hari **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 11061079 PKC. 1. Obat keras

388. PENSTREP 4 0,5

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung PPG kristal dan streptomycin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap penisilin dan streptomisin pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 25 ml akuades (bisa disesuaikan tergantung pemakaiannya), untuk injeksi SC atau IM. Sapi, kerbau, kuda: 0,03 ml/kg BB. Babi 2-10 ml/ekor. Anak babi: 0,2-1 ml/ekor. Kambing/domba 2-4 ml/ekor. Anjing/kucing 0,2-2 ml/ekor. Unggas 0,5 ml/kg

BB dapat diulang 24-48 jam kemudian **Kemasan** 4,5 g **Deptan RI** No. D. 0510573 PKS. 1.
Obat keras

389. PENSTREP 20/20

Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan injeksi. **Komposisi** tiap ml mengandung procaine penicillin G 200.000 IU, dihydrostreptomycine sulphate 250 mg, methyl hidroksibenzoat 1 mg, propyl hidroksibenzoat 0.1 mg, sodium metabisulfite 0.8 mg dan setrimide 0.25 mg. **Indikasi** infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap penicillin atau dihydrostreptomycine, seperti infeksi saluran pernafasan, uterus dan pencernaan, metritis, mastitis, osteomyelitis, peritonitis, septikemia, sistitis, joint-ill dan infeksi bakteri sekunder, pada kuda, sapi, babi, anak kuda, sapi, kambing, dan domba. **Dosis dan Cara Pemberian** suntikan IM, dosis umum 1 ml/25 Kg BB selama 3-4 hari, sapi dan kuda 10-20 ml, badi, pedet dan anak kuda 3-8 ml, kambing dan domba 3-5 ml **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I.05021686 PKC. 2. Obat keras.

390. PEN – HISTA STREP

Vetoquinol SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Benzylpenicillin procaine, Dihydrostreptomycin, Chlorpheniramine maleat **Indikasi** Pengobatan pada infeksi yang disebabkan mikroorganisme yang sensitive terhadap kombinasi antara Benzyl Penicillin-Dehydrostreptomycin pada sapi, kuda, babi, kambing, domba, anjing dan kucing **Kontra Indikasi** Pada pasien yang hipersensitif terhadap penicillin **Perhatian** Jangan diberikan pada babi umur dibawah 3 minggu, jangan menambahkan dosis harian dengan 250 mg dihydrostreptomycin (1 ml Pen-Hista-Strep) per kucing dewasa **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara intramuskuler dan intraperitoneal dengan dosis harian sebagai berikut: Kuda-ternak dewasa 20-25 ml; Anak kuda-anak sapi 5-10 ml; Babi 2-10 ml; Kambing-domba 5-10 ml; Anjing 1-5 ml; Kucing 0,5-1 ml **Waktu Henti Obat** Daging 60 hari, susu 6 hari **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 08013375 PKC. Obat keras.

391. PEN – O – VET

Duta Kaiser Pharmacy

Bentuk Sediaan Oily injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung penisilin g prokain 300.000 IU **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi g positif dan negatif seperti pneumonia, bronkitis, cystitis, pielonephritis, infeksi saluran kencing, infeksi pada susu sapi dan mastitis, metritis dan endometritis, serta infeksi antraks **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap penisilin dan turunannya **Perhatian** Jika timbul gatal-gatal dan kemerahan pada kulit maka pengobatan harus dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis umum 4.000-22.000 IU/kg BB. Setiap 12 jam selama 3 hari berturut-turut. Injeksikan secara IM **Kemasan** Vial 10 ml dan botol 100 ml **Deptan RI** No. D. 0204297 PKC. Obat keras

392. PEN & STREP

Norbrook Laboratories Limited, Ireland/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung procain penicillin dan dihydrostreptomycin sulphate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap penicillin dan streptomycin pada hewan

Dosis dan Cara Pemakaian 1 ml/25 kg BB Kemasan Vial 50 ml dan 100 ml **Deptan RI**
No. I. 09073662 PKC. Obat keras

393. PENZAVET

Duta Kaiser Pharmacy

Bentuk Sediaan Suspensi injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung penisilin g prokain 150.000 IU dan penisilin g benzatin 150.000 IU **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh staphylococcus, streptococcus, erysipelotheix, anthrax, actinomycosis, infeksi clostridium dan penyakit lain yang disebabkan oleh kuman yang rentan terhadap penisilin **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Hewan besar: 1 ml/20 kg BB. Hewan kecil: 1 ml/10 kg BB. Injeksikan secara IM 2 hari sekali, maksimum pemakaian 6 hari **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml dan botol 100 ml **Deptan RI** No. D. 0204494 PKC. Obat keras

394. PEPEROXIN SOL

Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Pefloxacin methanesulfonat 139,6 g/L **Indikasi** Pengobatan terhadap CRD, CCRD, staphylococcosis, pullorum, Fowl typhoid dan colibacillosis pada ayam. **Perhatian** Obat keras dan harus diberikan dengan resep dokter hewan **Waktu Henti Obat** 5 hari **Dosis dan Cara emakaian** larutkan 5-10 ml dengan 10 L air minum dan berikan secara oral selama 3-4 hari. **Kemasan** Botol 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml dan 1 L **Kementan RI** No. I. 11044068 PKC. Obat keras.

395. PHARMASIN PULVIS

Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tilosin tartate **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap tilosin pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Drum 25 kg dan 1 kg, botol 200 g dan Sachet 200 g **Deptan RI** No. I. 08083473 PKS. Obat keras

396. PHARMASIN 100% WS GRANULES

Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tilosin tartate **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap tilosin tartate pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol HDPE 100 g dan kantong 1 kg **Deptan RI** No. I. 08123540 PKS. Obat keras

397. PHENOXYPEN WSP

Dopharma BV, Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung phenoxymethyl penicillin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap penicillin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum **Kemasan** Pot 100 g, 250 g, 500 g dan 1 kg serta can 1 kg **Kementan RI** No. I. 12014200 PKC. Obat keras

398. PHOSRETIC

Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 g mengandung etanol B amino fosforik asam 10 g dan natrium benzoat 10 g **Indikasi** Hepato-renal tonik (pada nutritional parasitic atau

infeksi enteritis) pada sapi, domba, unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Sapi, kerbau, kambing dan babi: 1 g/10 kg BB **Kemasan** Sachet 100 g, kantung 1 kg dan 2,5 kg **Deptan RI** No. I. 03061721 PTS. 1. Obat bebas terbatas

399. PIRIMYCIN

PyridamVeteriner

Bentuk Sediaan Serbuk injeksi **Komposisi** Tiap vial 5 g mengandung streptomycin sulfate 5 g, tiap vial 10 g mengandung streptomycin sulfate 10 g, tiap vial 100 g mengandung streptomycin 100 g **Indikasi** Membasmi penyakit terutama yang disebabkan oleh infeksi g negatif **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap 5 g obat dilarutkan dalam 15 ml pelarut injeksi. Unggas: 50-100 mg/kg BB secara IM. Sapi, kuda, domba dan babi: 10 mg/kg BB secara IM atau SC, dibagi dalam 2-4 dosis/hari. Anjing: 25-40 mg/Kg BB secara IM atau SC, dibagi dalam 1-2 dosis/hari **Kemasan** 5 g, 10 g dan 100 g **Deptan RI** No. D. 0305175 PKS. 2. Obat keras

400. PIRIPEN Inj.

PyridamVeteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap vial 5,5 g obat mengandung streptomycin sulfate 4g, penicillin G procain 1.500.000 IU, tiap vial 11 g obat mengandung streptomycin sulfate 8g, penicillin G procain 3.000.000 IU. Tiap vial 250 g obat mengandung streptomycin sulfate 182 g, penicillin G procain 68.181.182 IU **Indikasi** Untuk pengobatan yang disebabkan oleh infeksi bakteri g (+) dan g (-) **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap 5,5 g obat/10 ml pelarut injeksi. Ayam: 135,5 mg/kg BB secara IM. Pada sapi, kuda dan domba: 110 mg/10 kg BB secara IM. Anjing: 55 mg/kg BB **Kemasan** 5,5 g, 11 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 0303174 PKS. 2. Obat keras

401. PIRIVET

PyridamVeteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Doxycycline base 1,25%, erythromycin 2,00% **Indikasi** Efektif untuk pengobatan CRD, Snot dan penyakit saluran pernafasan lainnya pada unggas yang disebabkan oleh bakteri. Melindungi ternak terhadap infeksi sampingan dari CRD, snot atau CRD kompleks **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengobatan pada waktu wabah CRD, snot atau adanya gejala gangguan penyakit saluran pernafasan **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 0209416 PKS. 2. Obat keras

402. PNEUMOTOS – I

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Lincomycin (hydrochloride) 75 mg, Spectinomycin (sulfate) 150 mg **Indikasi** Babi colibacillosis, enzootic pneumonia, arthritis, salmonellosis, vibrio disenteri; Domba/kambing/sapi pneumonia, colibacillosis; Unggas mycoplasmosis (CRD), colibacillosis, salmonellosis, fowl cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** IM; Umum 0,6–1,3 ml/10 Kg BB/hari selama 4 hari; Babi induk 15–18 ml/ekor, fattening 2–9 ml/ekor, anak babi 0,3–1,2 ml/ekor; Domba/kambing 4–6 ml/ekor/dewasa, 0,5–2 ml/ekor/muda; Sapi 30–40 ml/ekor/dewasa, 5–15 ml/ekor/muda; Unggas 0,1–0,5 ml/Kg BB/hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 04032168 PKC.1 Obat keras.

403. POWERCILLIN INJECTION

**Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/
Blue Sky Biotech**

Bentuk Sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Setiap Kg mengandung Penicillin G procaine 250.000 IU, Dihydrostreptomycin sulfate 200 mg. **Indikasi** Pneumonia, bronchitis, septicemia, actinobacillosis, salmonellosis, swine erysipelas, bacterial arthritis, metritis, mastitis, nephritis, leptospirosis, CRD (pada ayam) dan otitis externa (pada anjing). **Waktu Henti Obat** 30 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara I.M. setiap 72 jam - Sapi, kuda, babi, domba 3-6ml per 100 Kg BB; Piglet, anak domba, anjing dan kucing 1 ml per 10 Kg BB. **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. I. 05062932 PKC. Obat keras.

404. PRIMADOXIN

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung 20 g doxycyclin dan 40 g erythromycin **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap infeksi bakteri g (+) dan (-) pada saluran pencernaan dan saluran pernapasan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 g dilarutkan dalam 1 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Perhatian** Jangan melarutkan atau mencampur dengan produk-produk lain **Kemasan** Sachet 100 g dan kantong 1 kg **Deptan RI** No. D. 09113749 PKS. Obat keras

405. PRIMA QUINTRIL 10% PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap L mengandung norfloxacin 100 g, excipient qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakteri pada saluran pencernaan seperti fowl cholera, salmonellosis, kolibacillosis dan saluran pernapasan seperti mikoplasmosis dan koriza **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1L **Deptan RI** No. D. 02112451 PKC. Obat keras

406. PRIMATICOL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung 100 g tylosin dan 150.000.000 IU colistin **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap infeksi bakteri g (+) dan (-) pada saluran pencernaan dan saluran pernapasan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 g dilarutkan dalam 1 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Perhatian** Jangan melarutkan atau mencampur dengan produk-produk lain **Kemasan** Sachet 100 g dan kantong 1 kg **Deptan RI** No. D. 09113748 PKS. Obat keras

407. PRIMATRIM

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Trimetoprim dan spiramycin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap trimetoprim dan spiramycin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Sachet 100 g dan kantong 1 kg **Deptan RI** No. D. 09073668 PKS. Obat keras

408. PRIMAVIL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Spiramisin adipat **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap spiramisin pada unggas **Dosis dan Cara**

Pemakaian Lihat pada brosur **Kemasan** Kantung aluminium 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 08103509 PKS. Obat keras

409. PRIMAZINE 808 PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Lincomycine HCl 100 g, trimetoprim 32 g, sulphadiazine sodium 160 g **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pernapasan seperti koriza, CCRD, ORT serta saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi sekunder pada persendian (arthritis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 03032549 PKS. Obat keras

410. PRIMAZOL

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Souble powder **Komposisi** Tiap g mengandung kotrimoxazol 240 mg **Indikasi** Mengobati kolera ayam, snot, kolibasilosis, salmonellosis, serta penyakit lainnya yang disebabkan oleh kuman yang peka terhadap kotrimoxazol **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum (62,5 mg/kg BB) dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg **Deptan RI** No. D. 01072024 PKS. 1. Obat keras

411. PRIMA COLIMIX PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung amoxicillin 120 g dan neomycin 100 g **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi saluran pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g dalam 1-2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 2 g dalam 1 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 03022530 Obat keras

412. PRIMA COLMY PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap L mengandung enrofloxacin 100 g, excipient qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pernapasan seperti mikoplasmosis, koriza, serta saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi parakolon **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 02112452 PKC. Obat keras

413. PRIMA CYPRO PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung cyprofloxacin HCL 100 g, tylosin tartrate 100 g **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pernapasan seperti CCRD, koriza, serta saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi sekunder **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 03032547 PKS. Obat keras

414. PRIMA DOXERY PLUS – 99

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung doxycycline HCL 100 g, erythromycin 100 g **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pernapasan seperti

CCRD, koriza, ORT serta saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan kolera unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 02122503 PKS. Obat keras

415. PRIMA GENTA 5% Injection

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung gentamycine 50 mg, excipient qs
Indikasi Pengobatan infeksi bacterial yang sensitive terhadap gentamycine **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. D. 04032731 PKC. Obat keras

416. PRIMA LINCOSPECT

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung lincomycine 100 g, spectinomycine 100 g **Indikasi** Unggas: pengobatan infeksi bacterial pada saluran pernapasan seperti CCRD, koriza, serta saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi sekunder pada persendian (arthritis). Babi: pengobatan infeksi bacterial seperti mikoplasmosis, atrophic rhinitis, pasteurellosis, swine disentry, erysipelas dan infeksi sekunder pada persendian (arthritis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 04112828 PKS. Obat keras

417. PRIMA NEOERY – 25

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung neomycin sulphate 100 g, dan eritromisin 100 g **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bacterial yang sensitif terhadap neomycin dan eritromisin seperti mikoplasmosis, snot dan kolibasilosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 7-15 mg/kg BB atau 1 g dalam 2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut Waktu Henti Obat 12 hari **Kemasan** 100 g, 250 g, dan 500 g **Deptan RI** No. D. 03112687 PKS. TM. Obat keras

418. PRIMA OXYCOL

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 100 g mengandung oxytetracycline HCl 20 g, colistin sulphate 10 juta IU, carrier qs **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bacterial yang sensitif terhadap colistin dan oksitetrasiklin seperti salmonellosis, pasteurellosis dan snot serta kolibasilosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 04092810 PKS. Obat keras

419. PRIMA OXYMYCINE PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 100 g mengandung oxytetracyclin HCl 20 g, neomycine sulphate 20 g, carrier qs **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bacterial yang sensitif terhadap neomycine dan oksitetrasiklin seperti salmonellosis, pasteurellosis dan snot serta kolibasilosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 04112827 PKC. Obat keras

420. PRIMA QUINTRIL 10% PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung norfloxacin 100 g, excipient qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pencernaan seperti fowl cholera, salmonellosis, kolibasilosis dan saluran pernapasan seperti mikoplasmosis dan koriza **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1L Deptan RI No. D. 02112451 PKC. Obat keras

421. PRIMA QUINCURE – 25

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung flumequine 200 g, excipient qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial seperti fowl cholera, salmonellosis, kolibasilosis, mikoplasmosis dan koriza **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1 L Deptan RI No. D. 02112462 PKC. Obat bebas terbatas

422. PRIMA QUINOL – F

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung cyprofloxacin 100 g, ESF (enhancer sensitivity factor) 100 g, carrier qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis, nekrotik enteritis, infeksi parakolon, fowl kolera dan infeksi pada saluran pernapasan seperti mikoplasmosis, dan koriza **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g Deptan RI No. D. 04062770 PKC. Obat keras

423. PRIMA QUINOL – FL

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung cyprofloxacin 100 g, excipient qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial pada saluran pernapasan seperti CCRD, koriza, serta saluran pencernaan seperti salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi sekunder **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml, 1L Deptan RI No. D. 03022528 PKS. Obat keras

424. PRIMA ZINEOS 808 PLUS

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung sulphadiazine sodium 400 g, trimethoprim 80 g, excipient qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial seperti koriza, CRD, salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi sekunder pada persendian (arthritis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1 L Deptan RI No. D. 03022528 PKC. Obat keras

425. PRIMEQUYL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Flumequin **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap flumequin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Kantong aluminium 100 g dan 1 kg Deptan RI No. D. 081035010 PKS. Obat keras

426. PROXAN – C

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung ciprofloxacin HCl 100 mg
Indikasi CRD kompleks, colibacillosis, kolera, korisa, pullorum pada unggas **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml tiap 2 L air minum atau 0,1 ml tiap kg BB, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Kocok dahulu sebelum digunakan **Kemasan** Botol 250 ml dan Jerigen 1L
Deptan RI No. D. 07113348 PKC. Obat keras

427. PROXAN – S

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ciprofloxacin HCl setara dengan base 100 g **Indikasi** CRD kompleks, colibacillosis, kolera, korisa, pullorum pada unggas **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,1 g tiap kg BB atau 1 g tiap 2 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 250 g **Deptan RI** No. D. 07113347 PKS. Obat keras

428. PULLOXAL

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung neomycin sulfate 32 mg dan oxytetracycline HCl 32 mg **Indikasi** Untuk mengobati penyakit fowl cholera, colibacillosis, salmonellosis, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 2 g/L air minum dan berikan selama 5 hari berturut-turut sampai gejala penyakit hilang **Waktu Henti Obat** 10 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D. 03052586 PKS. Obat keras

429. PULMOTILAC

Elanco Animal Health/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung tilmicosin phosphate **Indikasi** Kontrol dan pengobatan MG/MS pada ayam dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 15-20 mg/kg BB **Kemasan** 60 dan 240 ml **Deptan RI** No. I. 0411343 PKC. 1. Obat keras

430. PUYUH VITAKIT

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung oxytetracycline HCl 100 g, dan amprolium 25 g **Indikasi** CRD, korisa, pullorum dan koksidirosis **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 g tiap 2 L air minum, diberikan selama 2-3 hari berturut-turut. Pengobatan: 1 g tiap L air minum, diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah Plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg, dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 01021393 PKS. 1. Obat keras

431. PYROXY Inj.

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml obat mengandung oxytetracycline hydrochloride 50 mg, lidocaine HCl qs **Indikasi** Antibiotik berspektrum luas membasmi penyakit g (+) dan (-), mycoplasma, rickettsia, spirochaeta, actinomycetes pada saluran

pernafasan, saluran pencernaan dan urogenital seperti bronchopneumonia, pleuropneumoniae, colibacillosis, salmonellosis, pyelonephritis, endometritis, arthritis dan radang tali pusar **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM. Unggas umur 0-2 minggu: 0,5 ml larutan (pengenceran 1:3), umur 2-4 minggu: 1 ml larutan (pengenceran 1:3), umur 4-8 minggu: 0,5 ml tanpa pengenceran, umur 8-12 minggu: 1 ml tanpa pengenceran, umur >12 minggu: 2 ml tanpa pengenceran. Sapi dan anak sapi: 6-8 ml/100 kg BB. Domba, kambing dan babi: 5 ml/50 kg BB, anak babi: 0,3-0,5 ml/2,5 kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 02071290 PKC. 1. Obat keras

432. QUINABIC WSP **AAKO BV, Belanda/SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung norfloxacin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap norfloxacin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 200 g dan 500 g **Deptan RI** No. I. 06123154 PKS. Obat keras

433. QUINABIC 7% INJECTABLE SOLUTION **AAKO BV, Belanda/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung norfloxacin nicotinat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap norfloxacin pada sapi, babi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 03042254 PKC. 1. TML. Obat keras

434. QUINABIC 14% INJECTABLE SOLUTION **AAKO BV, Belanda/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung norfloxacin nicotinat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap norfloxacin pada sapi, babi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 50 ml **Deptan RI** No. I. 04102251 PKC. 1. TML. Obat keras

435. QUINOEX **Ceva Sophavet SA, Maroko & Ceva Sante Animale, Perancis/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enrofloxacin 10% **Indikasi** Antibiotik spectrum luas untuk pengobatan penyakit CRD kompleks dan penyakit saluran pencernaan akibat infeksi bakteri gram negative dan positif **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 ml/100 kg BB dan diberikan melalui air minum **Kemasan** Botol plastik 1 L **Deptan RI** No. I. 1102711 PKC. 1. Obat keras

436. QUINCURE 20 LIQ **Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanguh**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung flumequin **Indikasi** Sangat efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan positif, termasuk E. coli, Haemophilus pasteurilla, staphylococci dan mikro-organisme rentan lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 0,5ml/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 1 L **Kementan RI** No. I. 12114381 PKC. Obat keras

437. QUINOVET F **Laboratorios Ovejero SA. Spanyol/Saka Menara Alam**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung enrofloxacin 10 g **Indikasi** Pencegahan dan mengatasi CRD kompleks, mycoplasma, colisepticemia, infeksi coryza,

staphylococci, pasteurellosis dan salmonellosis serta penyakit lainnya yang sensitif terhadap enrofloxacin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 L/2.000 L air minum selama 3 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 03102649 PKC. Obat keras

- 438. QUINTRIL INJ 5%** **Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung 50 mg norfloksasin **Indikasi** Memiliki spektrum luas untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri g negatif dan positif, rickettsiae, virus, mycoplasma dan terapi infeksi sistemik, gastrointestinal, urinarius, respiratorius, dan infeksi lokal **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 mg norfloksasin/kg BB untuk infeksi pernafasan, intestinal dan infeksi bakteri sekunder. 5,0 mg norfloksasin/kg BB untuk salmonellosis dan infeksi pernafasan yang kuat. Pengobatan dilakukan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 03122265 PKC. 1. Obat keras
- 439. QUINTRIL LIQ 10%** **Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung 100 mg norfloksasin **Indikasi** Sangat efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri g negatif dan positif (termasuk infeksi colibacillosis, cholera, coryza, staphylococcosis, streptococcus) serta mycoplasma (gallisepticum, melegridis, synoviae, IOWA, dll) **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 12 mg/kg BB selama 3-5 hari, atau 1 ml/2 L air minum **Kemasan** 1 L **Kementan RI** No. I. 12091829 PKC. 2. Obat keras
- 440. REMACYCLINE LA** **Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Setiap ml mengandung oksitetrasiklin 0,20 g **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit bakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin **Dosis dan Cara Pemberian** Injeksi secara IM dengan dosis 20 mg/kg BB **Kemasan** 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 04031707 PKC. 1. Obat keras
- 441. RESPIRAC** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung trimethoprim 50 g dan enrofloxacin 120 g **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit CRD, snot/coryza, colibacillosis, pasteurellosis, pullorum dan CCRD **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 7 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D. 08063442 PKS. Obat keras
- 442. RESPIRANT** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk. Komposisi tiap gram mengandung enrofloxacin 125 mg, tylosin tartrate 125 mg. **Indikasi** Efektif menyembuhkan CRD yang disertai dengan infeksi sekunder akibat E.coli, Selain itu juga untuk menyembuhkan SNOT dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh Salmonella sp, Pasteurella sp, Clostridium spp, Streptococcus sp. Staphylococcus. sp. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/ 1-2 L air minum selama 3-5 hari atau 100 g/ 500-750 Kg BB. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg, 30 kg . **Deptan RI** No. D. 12041252 PKS.1 Obat keras.
- 443. RESPIRATREK** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung sulfamethoxazole 80 mg dan trimethoprim 20 mg **Indikasi** CRD kompleks dan colibacillosis **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian**

1 ml tiap 0,5-1 L air minum atau 0,2-0,4 ml tiap kg BB, diberikan selama 4-5 hari berturut-turut. Pemberian maksimum selama 5 hari **Kemasan** Botol 120 ml. Jerigen 1 L, 5 L dan 20L **Deptan RI** No. D. 06061395 PKC. 2. Obat keras

444. RESPIROXAN

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung doxycycline HCl 100 mg dan erythromycine tiocyanate 200 mg **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakteri g positif dan g negatif pada saluran pernafasan seperti bakteri anaerob clostridium, serta snot dan CRD kompleks **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum atau 1 g/15 kg BB dan larutkan obat dalam air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Pot 500 g **Deptan RI** No. D. 02071071 PKS. TM. Obat keras

445. RESPIROXAN 10

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap gram mengandung Doxycycline HCl 50 mg dan Erythromycin tiocyanat 100 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi bakteri gram positif dan gram negatif pada saluran pernafasan seperti bakteri anaerob Clostridium, serta SNOT dan CRD kompleks. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 1 g/ 1-2 liter air minum atau 1 g/ 7,5 kgBB, berikan selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 09033587 PKS TM. Obat keras

446. RISA – KOL

Aves

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung enrofloxacin 10 g **Indikasi** Coryza (snot, kepala bengkak, pilek). CRD (ngorok, hidung berlendir). Kolera (berak hijau, hati rapuh dan kekuningan). Coli (berak berlendir, kuning telur tidak terserap, hati ada selaput keruh) **Perhatian** Hentikan pemakaian 5 hari sebelum ayam disembelih untuk konsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 ml dalam 2 L air minum selama 4-6 hari **Kemasan** 20 ml, 200 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 06083106 PKC. Obat keras

447. RISA – KOL KAPSUL

Aves

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Tiap kapsul mengandung enrofloxacin 15 mg **Indikasi** Coryza (snot, kepala bengkak, pilek). CRD (ngorok, hidung berlendir). Kolera (berak hijau, hati rapuh dan kekuningan). Coli (berak berlendir, kuning telur tidak terserap, hati ada selaput keruh) **Perhatian** Hentikan pemakaian 5 hari sebelum ayam disembelih untuk konsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: BB 1 kg-1,5 kg 1 kapsul/hari selama 4-6 hari. BB di atas 1,5 kg 2 kapsul/hari selama 4-6 hari **Kemasan** 8 kapsul, 40 kapsul, 90 kapsul, 250 kapsul, 450 kapsul, dan 1.000 kapsul **Deptan RI** No. D. 06083107 PKM. Obat keras

448. ROXACIN INJ.

Laboratorios Calier, S.A. -Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung enrofloxacin 10 g **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bacterial pada saluran pencernaan dan pernafasan juga urogenital serta infeksi mycoplasma. Efektif juga untuk mengobati infeksi akibat g negatif dan positif **Perhatian** Jangan berikan suntikan melebihi 5 ml pada satu tempat. Tidak dianjurkan untuk kuda. Tidak dianjurkan untuk anjing dibawah 12 bulan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM. Babi: 0,25 ml/10 kg BB/hari selama 3-5 hari (setara dengan 2,5 mg/kg BB/hari). Sapi: 0,25 ml/10 kg BB/hari selama 5 hari (setara dengan 2,5 mg/kg BB/hari) **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 01121178 PKC. Obat keras

- 449. ROXACIN ORAL** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 100 ml mengandung enrofloxacin 10 g **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi saluran pencernaan, pernafasan dan urogenital yang disebabkan oleh bakteri g negative dan positif serta mycoplasma pada unggas. Serta penyakit lain yang sensitive terhadap enrofloxacin **Waktu Henti Obat** 12 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum 10 mg enrofloxacin/kg BB/hari (setara dengan 0,5 ml/L air minum) selama 3-5 hari berturut-turut. Untuk salmonellosis, pengobatan harus diberikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** 1L **Deptan RI** No. I. 01120198 PKC. Obat keras
- 450. ROXINE** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Mengobati CRD, infeksi bakteri g-positif dan g-negatif **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 g/L air minum atau 0,1 g/kg BB **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 06031825 PKS. 2. Obat keras
- 451. ROXINE 10% ORAL SOLUTION** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Mengobati CRD, infeksi bakteri g-positif dan g-negatif **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/L air minum atau 0,1 ml/kg BB **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 0406344 PKC. 1. Obat keras
- 452. ROXINE 25% ORAL SOLUTION** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Mengobati CRD, infeksi bakteri g-positif dan g-negatif **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml/L air minum **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 02071139 PKC. Obat keras
- 453. ROXINE INJEKSI** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Mengobati penyakit saluran pernafasan, pencernaan dan saluran kemih, septicaemia, arthritis, foot rot, dan infeksi sekunder penyakit viral **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kerbau: 5 ml/200 kg BB. Domba, kambing: 0,75 ml/30 kg BB. Babi: 1,25 ml/50 kg BB. Unggas: 0,1 ml/kg BB. Anjing, kucing: 0,1 ml/4 kg BB. Injeksikan secara IM selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 05101170 PKC. 1. Obat keras
- 454. ROXINE KAPLET** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Mengobati penyakit saluran pernafasan, pencernaan dan saluran kemih **Perhatian** Pematangan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dewasa: 1 kaplet/ekor/hari. Anjing, kucing: 1 kaplet/2-3 kg BB **Kemasan** 10 kaplet dan 300 kaplet **Deptan RI** No. D. 09083694 PKM. Obat keras
- 455. SAMYANG TYLOSIN – 200 INJECTION** **Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Cairan Injeksi Komposisi Tylosin tartrate 200mg/ml **Indikasi** Sapi – pneumonia, endometritis, mastitis, shipping fever, foot-rot. Babi – pneumonia, disenteri, diare, arthritis, infeksi sekunder. Anjing dan kucing – bronchitis, pneumonia, otitis externa,

endometritis. Ayam CRD, Mycoplasmosis. **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada pasien yang hipersensitif dan jangan diberikan pada laying period. **Waktu Henti Obat** pada sapi dan babi 28 hari (susu 28 hari); ayam 3 hari. **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan secara I.M. sehari sekali selama 1-5 hari dengan dosis sebagai berikut. Sapi 0.02-0.05ml/Kg BB, babi 0.01-0.04 ml/Kg BB, anjing dan kucing 0.01-0.05ml/Kg BB, ayam 0.08ml/Kg BB. **Kemasan** Botol 50ml **Deptan RI** No. I. 07053209 PKC. Obat keras.

- 456. SEPTO – SKIN CALIER** **Laboratorios Calier, S.A.–Spainol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Topical spray **Komposisi** Tiap 270 ml mengandung oxytetracycline (HCl) 2 g, patent V blue (E-131) 0,095 g, dan solent propellent q.s. **Indikasi** Untuk mengobati luka, luka operasi, foot rot dan infeksi kuku yang disebabkan oleh bakteri **Kontra Indikasi** Sebaiknya tidak digunakan pada hewan yang sensitive terhadap oxytetracycline **Perhatian** Jangan diberikan bersamaan dengan antibiotik bakterisida lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Semprotkan pada area yang terluka yang telah dibersihkan dari jarak 15-20 cm secara merata. Hindarkan penyemprotan ke atau dekat mata. Hindarkan kontak langsung terhadap area yang telah disemprotkan selama 5 menit **Kemasan** 270 ml **Deptan RI** No. I. 0112999 PKM. Obat keras

- 457. SHOTAPEN LA** **Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Mengandung benzathine benzylpenicillin, procaine benzyl penicillin dan dihydrostreptomycin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap penicillin dan streptomycin pada babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 ml/100 kg BB **Kemasan** Vial 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 05062931 PKC. Obat keras

- 458. SINDOFLOX FORTE** **Otasindo Primasatwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung enrofloxacin 21% **Indikasi** Dapat diberikan pada semua unggas yang terinfeksi oleh bakteri gram positif seperti staphylococcus, streptococcus, corynebacteria, clostridia dan gram negatif seperti E. coli, haemophilus, pasteurella, salmonella, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,024-0,048 ml/kg BB (5-10 mg zat aktif/kg BB) atau 1 ml/2-4 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan botol 1 L **Deptan RI** No. I. 07113350 PKC. Obat keras

- 459. SINDOFLOK SOL** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Pengobatan mycoplasmosis kompleks (CRD & CCRD), serta E. Coli. Untuk memberantas infeksi sekunder dan penyakit CRD, seperti air sacculitis, pericarditis, perihepatitis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/1-2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum ternak dipotong **Kemasan** Botol 100 ml dan botol 1 L **Deptan RI** No. D. 07043205 PKC. Obat keras

- 460. SINDOXAN** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung amoxycillin trihydrate 75 mg dan

colistin 25 mg **Indikasi** Untuk mengobati infeksi pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh *Salmonella* sp, *E. coli*, *Pasteurella* sp, *Clostridium* spp. Pada babi, domba dan kambing untuk mencegah diare **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 2 g/2-3 L air minum. Babi, domba dan kambing: 50 g/100 kg BB **Waktu Henti Obat** 7 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Kementan RI** No. D. 12072473 PKS. 1. Obat keras

461. SIPRO – 10

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Cyprofloxacin 10% **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mycoplasma (CRD), coryza, *E. coli* dan kolera pada unggas **Kontra Indikasi** Tidak ada **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml untuk 2 L air minum diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 1L **Deptan RI** No. D. 09023551 PKC. Obat keras

462. SOGECOLI

Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung kolistin sulfat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap colistin pada unggas, babi, sapi dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,25 ml dalam 1 L air minum (setara dengan 75.000 IU/kg/hari), diberikan selama 3 hari. Sapi, domba/kambing: 0,25 ml/10 kg BB, 2x pemberian dalam sehari (setara dengan 50.000 IU/kg BB/12 jam), selama 3 sampai 4 hari diberikan melalui air minum atau dicampur dalam milk replacer. Babi: 0,5 ml/10 kg BB selama 3-4 hari **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. I. 05022858 PKC. Obat keras\

463. SPECIORLAC

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan injeksi dalam syringe **Komposisi** Setiap syringe 5 g mengandung spiramycin 1.200.000 IU, neomicine sulphate 100.000 IU **Indikasi** Untuk pengobatan mastitis selama periode kering **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara intramammariae: perah air susu sampai habis, cuci dan desinfeksi puting susu. Masukkan speciorlac pada setiap kuartis, ambing dipijat-pijat agar supaya speciorlac cepat menyebar. Umumnya speciorlac berada dalam ambing sampai laktasi berikutnya, tapi dapat juga dikeluarkan setelah 1 bulan **Kemasan** Syringe @ 5 g **Deptan RI** No. I. 04091173 PKC. 2. Obat keras

464. SPECTOLIN

Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** tiap ml mengandung lincomycin hidroklorida 56.7 mg, spectinomycin dihidroklorida 149 mg. **Indikasi** infeksi yang disebabkan oleh *S. aureus*, *P. multocida*, *Streptococcus*, *Mycoplasma*, *Salmonella* dan infeksi silang *Mycoplasma* dan *E. coli*. Pada unggas yang sedang bertumbuh terutama berguna dalam pengobatan kontrol CRD bersama mycoplasma dan infeksi coli. **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan IM, pada unggas secara sc leher 0.5 ml/2.5 Kg BB selama 1-3 hari. Babi 1 ml/10 Kg BB **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 12041728 PKC.2. Obat keras.

465. SPECLIN

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Spectinomycin 445 mg, Lincomycin 225 mg **Indikasi** Untuk mengobati komplikasi CRD, Coryza (Snot), Cholera, Pullorum, Streptococcosis, Staphylococcosis dan Collibacillosis **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut atau 150 mg/kg BB/hari untuk DOC sampai umur 2 minggu, selama 3-5 hari, 50 mg/kg BB/hari untuk ayam yang berumur diatas 2 minggu, selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 dan 250 g **Kementan RI** No. D. 11061994 PKS. 2. Obat keras.

466.

467. SPECTOVET INJ

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung linkomisin hidroklorida monohidrat dan spektinomisin sulfat tetrahidrat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap spektinomisin dan linkomisin pada sapi, domba, kambing, ayam, kalkun, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 1 ml/10 kg BB secara IM dengan dosis 2x sehari pada hari pertama, selanjutnya 1x sehari selama 2-4 hari. Kambing dan domba: 1 ml/10 kg BB secara IM dengan dosis 1x sehari selama 3 hari. Ayam dan kalkun: 1 ml/5 kg BB secara IM dan dapat diulangi pada interval 12 atau 24 jam **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 09073665 PKC. Obat keras

468. SPIRADIN – 20

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Spiramycin 20% **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap spiramycin pada sapi, babi, kambing, domba, kuda, anjing, kucing dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol @ 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. D. 09043603 PKC. Obat keras

469. SPIRA – SAN PLUS

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung spiramisin dan colistin **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap spiramisin dan kolistin pada unggas **Perhatian** Pemetongan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg dan 500 kg **Deptan RI** No. D. 08103506 PKS. Obat keras

470. STOVANOL – SF

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung clindamycine 70 g, ESF (enhancer sensitivity factor) 100 g, carier qs **Indikasi** Pengobatan infeksi bakterial seperti CRD, koriza, salmonellosis, kolibasilosis dan infeksi sekunder pada persendian (arthritis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g, 500 g **Deptan RI** No. D. 04092811 PKS. Obat keras

471. STREPCILLIN

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung procaine penicillin dan dihydrostreptomycin (sulfat) **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap penicillin dan dihydrostreptomycin pada sapi, kuda, domba, anjing dan kucing untuk mengatasi dan mengontrol infeksi saluran pernafasan,

infeksi saluran kemih, infeksi akibat operasi, naval-III dan leptospirosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC, pada sapi dan kuda: 1,0 ml/25 kg BB dalam interval 24 jam selama 3-5 hari. Domba: 1,0 ml/20 kg BB dalam interval 24 jam selama 3-5 hari. Anjing dan kucing: 1,0 ml/10 kg BB dalam interval 24 jam selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 10073873 PKC. Obat keras

472. STREPTOMISINA SULFATE

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** 1g mengandung streptomycin sulfat **Indikasi** Pengobatan coryza, kolera pada ayam. Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh kuman g negative pada semua hewan **Kontra Indikasi** Tidak ada **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan isi botol dengan aquadest sampai 500 ml, suntikkan kedalam urat daging dengan dosis sebagai berikut: Hewan basar, domba, kambing, babi: 10 mg/kg BB. Anjing: 25–40 mg/kg BB. Kucing: 15–20 mg /kg BB. Ayam, itik: 150 mg/kg BB **Kemasan** 100 g **Deptan RI** No. D. 06020982 PKS. 1. Obat keras

473. STREPTOMYCIN Serbuk Injeksi

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Serbuk injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung streptomycin sulfate 250 mg **Indikasi** Mengobati infeksi saluran pernafasan, saluran urinaria, saluran pencernaan, arthritis, infeksi sekunder yang mengikuti infeksi viral, infeksi umum, mastitis, dermatitis, dan penyakit lain yang disebabkan oleh organisme yang sensitif terhadap streptomycin **Kontra Indikasi** Alergi terhadap streptomycin **Dosis dan Cara Pemakaian** Buat larutan injeksi streptomycin dengan menambahkan 15 ml aquadest steril ke dalam vial streptomycin 5 g serbuk steril. Sapi, kuda: 4 ml/100 kg BB. Babi dan kambing: 1 ml/25 kg BB. Anjing dan kucing: 0,5 ml/10-15 kg BB. Poultry: 1 ml/1-2 kg BB. Pengobatan diberikan sekali sehari selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Vial 5 g **Deptan RI** No. D. 04082794 PKS. Obat keras

474. STREPTOMYCIN INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Streptomycin sulphate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap streptomisin pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 4 ml akuades (bisa disesuaikan tergantung pemakaiannya), untuk injeksi SC atau IM. Sapi, kerbau, kuda: 5-10 ml/kg BB. Babi 10-20 ml/kg BB. Kambing, domba: 50-100 ml/kg BB. Anjing, kucing: 50 ml/kg BB. Unggas 30-100 ml/ekor dapat diulang 24-48 jam kemudian **Kemasan** 5 g, 20g, 100 g **Deptan RI** No. D. 0510678 PKS. 1. Obat keras

475. STREPTOVET

Duta Kaiser Pharmacy

Bentuk Sediaan Serbuk untuk suspensi injeksi **Komposisi** Setiap vial 10 ml mengandung streptomisin basa 1,0 mg. Setiap vial 20 ml mengandung streptomisin basa 5,0 mg dan setiap botol 100 ml mengandung streptomisin basa 20,0 mg **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan bakteri g negative. Pengobatan infeksi coryza dan sinusitis pada unggas. Pengobatan septicemia, trakeobronkitis, faringitis, laryngitis, pneumonia, osteoarthritis, endokarditis, mastitis, endometritis aktinomikosis, sistitis, leptospirosis dan infeksi saluran kencing, saluran

cerna, kulit dan luka pada hewan ternak **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap streptomisin **Perhatian** Pemberian bersama dengan obat ototoksik dan nefrotoksik lain dapat memperbesar toksisitas. Simpan di tempat sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Hewan besar: 10 mg/kg BB. Domba, kambing, sapi: 10 mg/kg BB. Anjing: 25-40 mg/kg BB. Kucing: 15-20 mg/kg BB. Unggas: 150 mg/kg BB dan pada ayam tidak boleh lebih dari 200 mg. Injeksikan secara SC dan IM **Kemasan** Vial 1,25 g, 6,25 g, dan botol 25 g **Deptan RI** No. D. 05031044 PKS. Obat keras

476. SUANOVIL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 100 g mengandung spiramycin adipate 20 g **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk flushing: 1 g dilarutkan dalam 1 L air minum dan diberikan selama 3 hari berturut-turut. Untuk pengobatan: 2 g dilarutkan dalam 1 L air minum dan diberikan selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 0502428 PKS. 3. Obat keras

477. SUANOVIL SOL. 20

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung spiramycin 200 mg **Indikasi** Antibakteri penyebab mastitis, pneumonia dan injeksi akibat luka pada organ dalam **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan secara IM dengan dosis pada sapi: 5 ml/40 kg BB. Pada sapi yang terkena mastitis: 5 ml/100 kg BB. Domba: 3 ml/ekor. Babi: 3 ml/40 kg BB **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. I. 0507364 PKC. 3. Obat keras

478. SULDIVIT

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Sulfadimethoxine, vit A, vit K3 **Indikasi** Pengobatan koksidirosis, coryza, salmonellosis dan kolera pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g/L air minum selama 3–6 hari **Kemasan** 1kg, 5kg, 25kg **Deptan RI** No. D. 06101482 PTS. 1. Obat bebas terbtas

479. SULFAMIX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung sulfadimethylpyrimidine 250 mg **Indikasi** Koksidirosis pullorum, korisa, kolera dan CRD **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 3 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 3 ml tiap 1 L air minum atau 0,6 ml tiap kg BB, diberikan mulai ayam umur 2 minggu dengan cara 3-2-3. 3 hari dengan obat, 2 hari air minum biasa, lalu 3 hari berikutnya dengan obat. Pengobatan: 3 ml tiap 0,5 L air minum atau 1,2 ml tiap kg BB, diberikan dengan cara 3-2-3 atau selama 5 hari berturut-turut. Ayam yang sakit parah dengan cara penetesan hati-hati melalui mulut ke lidah, setelah diencerkan lebih dahulu dengan air. Untuk ayam sampai umur 6 minggu: sehari 1x 4-5 tetes dan segera ditetesi air minum yang banyak. Lebih dari 6 minggu: sehari 1x 8-10 tetes **Kemasan** Botol plastik 60 ml, dan 120 ml. Jeriken 1 L, 5 L, 20 L dan 60 L **Deptan RI** No. D. 0604378 PKC. 2. Obat keras

480. SULFATRIM 48% ORAL SUSPENSION Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/
Lisan Mulia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung sulphadiazine 400 mg, dan trimethoprim 80 mg **Indikasi** Unggas: CRD complex (air saccutilis), coliform septicemia, necrotic enteritis, fowl thypoid, enteritis, fowl cholera, pullorum disease, infectious coryza. Infeksi sekunder bakteri dari penyakit viral atau vaksinasi seperti infeksi staphylococcal dan streptococcal. Sapi dan babi: E. coli, coliform septicemia, pneumonia yang disebabkan Pasteurella multocida, Haemophilus suis, Bordetella bronchiseptica, metritis, mastitis, agalactia syndrome dari babi betina. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/ 5 L air atau 0,05 ml/kg BB/hari melalui air minum. Sapi dan babi: 1 ml/2,5 L air minum atau 0,05 ml/kg BB/hari. Dibagi dalam 2 dosis, dan dosis dapat dinaikkan pada kasus yang parah **Perhatian** Kocok dahulu sebelum digunakan. Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari sinar matahari **Waktu Henti Obat** Daging 5 hari, telur 14 hari **Kemasan** Vial 500 ml, dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 09123762 PKC.

481. SULFA STRONG INJEKSI Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sulfadiazin sodium, sulfadimidin sodium, sulfamerazin sodium **Indikasi** Pengobatan pada penyakit infeksi secara umum. Ternak: pneumonia, bronchitis, laryngitis, arthritis, mastitis, metritis, puerperal fever, diarrhea, dysentri. Unggas: coccidiosis, cholera, pullorum, diphtheria, dan penyakit lain yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap sulfa **Perhatian** Jangan diberikan 5 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya. Air susu tidak boleh dikonsumsi selama pengobatan dan 60 jam setelah pengobatan terakhir **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM atau IV. Anak babi 0-8 minggu: 0,5-3 ml. Babi 2-6 bulan: 3-5 ml. Babi > 6 bulan: 5-10 ml. Sapi, kuda: 15-30 ml. Anak kuda/sapi, kambing, domba: 3-10 ml. Anak domba/kambing, anjing, kucing, kelinci: 0,5-3 ml. Ayam/itik: 0,25-1 ml. Angsa, kalkun: 0,5-3 ml. Merpati: 0,03-1 ml **Kemasan** 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml **Deptan RI** No. D. 09103725 PKC. Obat keras

482. SULFIDIN Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sulfadiazin dan trimethoprim **Indikasi** Sebagai antibakterial pada sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Diinjeksikan secara IM dengan dosis harian 12 ml/100 kg BB selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. D. 10103807 PKC.

483. SULPHAPRIM INJ Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sodium sulphadiazine dan trimethoprim **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap sulphadiazine dan trimethoprim pada sapi, kambing, babi, kuda, ayam, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, IV atau SC. Pada sapi, kambing: 1 ml/16 kg BB injeksi secara IM atau IV. Kuda: 1 ml/16 kg BB secara IV/hari. Anjing dan kucing: 1 ml/8 kg BB secara SC/hari. Pada sapi perah tidak boleh diberikan pada masa laktasi **Waktu Henti Obat** 10 hari untuk sapi dan babi, dan 18 hari untuk domba **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 09093707 PKC. Obat keras

484. SULPIG

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung sodium sulfadimethy-pyrimidine 250 mg dan bahan pembantu secukupnya **Indikasi** Bacterial scours, pneumonia dan septicemia **Perhatian** Hentikan penyuntikan apabila terlihat tanda-tanda shock atau stres **Dosis dan Cara pemakaian Penggunaan** pada hari pertama diberikan 0,5 ml tiap kg BB. Selanjutnya diberikan 0,3 ml tiap kg BB selama 3-5 hari berturut-turut diberikan melalui air minum dan suntik. Pemberian melalui air minum harus habis dalam waktu 6-8 jam. Volume penyuntikan maksimal 5 ml tiap satu tempat penyuntikan **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0606610 PKC. 2. Obat keras

485. SULTRIM SUSPENSION

**Y.S.P.Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/
Yung Shin Pharmaceutical Indonesia**

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Sulfadiazine 400 mg, trimethoprim 80 mg **Indikasi** Ayam: infeksius coryza, bronkitis, diare yang disebabkan oleh bakteri coccidiosis. Itik: kolera, bronkitis, diare yang disebabkan oleh bakteri. Babi: pneumonia, enteritis, white scour, diare yang disebabkan oleh bakteri, toxoplasmosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengobatan: larutkan 1 ml obat ke dalam 2 L air minum, maksimum selama 4 hari **Kemasan** Botol 100 ml, 500 ml, dan 1 L **Kementan RI** No. I. 11094145 PKC. Obat keras

486. SUTRIMIX PLUS

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfachloropyridazine 100 g, trimethoprim 20 g dan vitamin K3 2 g **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap sulfachloropyridazine dan trimethoprim pada unggas dan babi **Kontra Indikasi** Tidak disarankan untuk hewan bunting dan unggas pada masa bertelur **Dosis dan Cara Pemakaian** DOC berumur kurang dari 1 minggu 0,5 g/L air minum. Ayam broiler 1-4 minggu 1 g/L air minum. Babi: anak babi < 12 kg, 2-24 g/L air. Prestarter 5-23 kg, 1-2 g/L. Grower **23-105 kg, 2-3 g/L Kemasan** Sachet 100 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 06043072 PKS. Obat keras

487. SULTRIVAKS

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfadiazine sodium (setara sulfadiazine) 200 g, dan trimethoprim 40 g **Indikasi** Antibiotik yang peka terhadap sulfadiazine dan trimethoprim **Dosis dan cara pemakaian** Unggas: larutkan 1 g SULTRIVAKS® dalam 2 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut, Babi: larutkan 1 g SULTRIVAKS® per 10 kg BB selama 5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** 100 g sachet alufoil, 1 kg @ sachet alufoil 250 g, ember 5 kg @ 250 g sachet alufoil, dan dus 10 kg @ 250 g sachet alufoil **Kementan RI** No. D. 12092113 PKS. 2. Obat keras

488. SURAMOX 50% OSP

Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung amoksisilin trihidrat **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap amoksisilin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis pencegahan: 0,15-0,20 g/L air minum selama 3-5 hari. Dosis pengobatan: 0,15-0,20 g/L air

minum selama 5-7 hari **Kemasan** Botol plastik 500 g **Deptan RI** No. I. 11013976 PKS.
Obat keras

- 489. TAVET ENROFLOXACINE 10%** **Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap 100 ml mengandung 10 g zat aktif enrofloxacin
Indikasi Untuk pengobatan dan pencegahan terhadap bakteri g (+), g (-) dan mucoplasma pada unggas antara lain chronic respiratory disease (CRD), CRD complex, colibacillosis/colisepticemia, infectious coryza (snot), pasteurellosis (kolera), salmonellosis terutama penyakit pullorum **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap 0,5 ml/L air minum atau 10 mg zat aktif enrofloxacin/kg BB dan diberikan selama 3 hari berturut-turut. Untuk salmonellosis diberikan 5 hari berturut-turut dan apabila perlu pengobatan dapat diulang setelah 7-10 hari **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 0106822 PKC. Obat keras
- 490. TAVET GST** **Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung zat aktif gentamisin sulfat dan sulfadimethoxine **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis kuman g (-) dan g (+) diantaranya Actinobacillus sp, Actinomyces bovis, Coccidia sp, Corynebacterium pyogenes, Erlichia canios, Escherichia Coli, Fusiformis necrophorus, Haemophilus sp, Klebsiella sp, Pasteurella hemolytica, Pasteurella Mulocida, dan Pnemocystis carinii **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/10 kg BB secara injeksi IM setiap 12-24 jam selama 3-5 hari berturut-turut. Pada kasus penyakit yang berat pengobatan diberikan pada babi, kambing, domba, anjing, kucing dan unggas **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 03012508 PKC. Obat keras
- 491. TAVET OXITETRACYCLINA** **Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung 200 mg oxytetracilin (dihydrate)
Indikasi Sapi, domba dan kambing: actinobacillosis, anaplasmosis, bacterial enteritis, dipthera, foot rot, infeksi luar, mastitis, metritis, pasteurellosis, pnemonia, post-parturient infectious. Babi: bacterial enteritis, erysipelas, leptospirosis, mma syndrome, pneumonia, post parturient infection. Unggas: airsaculitis, chronic resoairatory disease, fowl cholera, infectious sinusitis dan infectious synvitis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,25 ml/kg BB injeksi secara SC. Pada domba, kambing, babi dan sapi: 1 ml/10 kg BB secara IM dan khusus untuk anak domba, kambing dan babi yang BB kurang dari 10 kg dianjurkan penyuntikan di bawah kulit. Untuk kasus penyakit berat, pengobatan ulang pada 48-72 jam post suntikan pertama **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 01071372 PKC. Obat keras
- 492. TAVET SULFA X3** **Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sulfathiazol, sulfamerazin dan sulfadiazine
Indikas Antibakteri yang peka terhadap sulfathiazol, sulfamerazin dan sulfadiazin pada unggas, sapi, babi, kuda, domba dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 5-10 ml/L air minum untuk 3-4 hari. Sapi/kuda: 10 ml/L air minum selama 5 hari pertama dan 5 ml/L air minum selama 5 hari berikutnya. Domba/kambing/kelinci: 5-10 ml/air minum selama 4-5

hari. Babi: 10 ml/air minum selama 5-6 hari **Kemasan** 500 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI No.** I. 0110395 PKC. Obat keras

493. TERRAMYCIN* INJECTABLE SOLUTION

Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung 50 mg oksitetrasiklin **Indikasi** Untuk mengobati beraneka ragam penyakit yang disebabkan oleh bakteri g positif dan g negatif, species mycoplasma tertentu, rickettsiae, protozoa dan golongan psittacosis lymphogranuloma (Chlamydia). Unggas: airsacculitis, CRD, coryza, fowl cholera, infectious sinusitis, infectious synovitis. Anjing dan kucing: mencegah infeksi sekunder pada canine distemper, hepatitis dan feline panleucopenia, leptospirosis, metritis dan otitis media. Kuda: metritis, pneumonia, strangles, joint infections, navel infections, foot infections. Sapi: anaplasmosis, anthrax, diphtheria, bacterial enteritis, foot root, leptospirosis, metritis, pneumonia, shipping fever, luka infeksi. Domba/Kambing: bacterial enteritis, joint infections, pneumonia, foot root, mastitis, metritis, post parturient infections. Babi: bacterial enteritis, erysipelas, leptospirosis, metritis, pneumonia, pencegahan dan pengobatan terhadap infectious enteritis (scours) pada anak-anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam secara SC atau IM selama 3-5 hari. DOC 2 minggu: 6,25 mg, 2-4 minggu: 12,5 mg, 4-8 minggu: 25 mg, 8 minggu: 50 mg. Ayam dewasa: 100 mg. Sapi, kuda, babi, domba/kambing, anjing dan kucing: 5-10 mg/kg BB. Dosis 1 ml/10 kg BB untuk mengatasi infeksi ringan. Dosis 1 ml/5 kg BB untuk mengobati infeksi akut, diberikan selama 3-4 hari. Untuk scours: suntikkan induk babi dengan 20 ml secara IM, 8 jam sebelum melahirkan atau setelah melahirkan **Waktu Henti Obat** Untuk daging 14 hari dan untuk susu 7 hari. Pemberian obat tidak boleh melebihi 25 ml pada satu lokasi **Kemasan** Vial 10 ml dan 100 ml **Kementan RI No. D.** 1105028 PKC. 3. Obat keras

494. TERRAMYCIN* LA INJECTABLE SOLUTION

Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung 200 mg oksitetrasiklin **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap oksitetrasiklin pada sapi, babi, kambing, rusa dan unggas. Unggas: airsacculitis, CRD, coryza, fowl cholera, infectious sinusitis, infectious synovitis. Sapi/kerbau: anaplasmosis, anathrax, diphtheria, bacterial enteritis, footroot, leptospirosis, metritis, pneumonia, shipping fever, infeksi luka. Domba/kambing: bacterial enteritis, joint infection, pneumonia, foot root, mastitis, metritis, post parturient infections. Babi: bacterial enteritis, erysipelas, leptospirosis, metritis, pneumonia, atropic rhinitis, scours/infectious enteritis pada anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IM pada sapi, domba, kambing dan rusa: 20 mg/kg BB (1 ml/10 kg BB) dan secara SC pada anak babi: BB<10 kg. SC pada kelinci dan unggas: 50 mg/kg BB (0,25 ml/kg BB) **Waktu Henti Obat** Untuk daging 14 hari dan untuk susu 7 hari. Jangan menyuntikkan lebih dari 20 ml pada sapi, 10 ml pada babi, dan 5 ml pada domba/kambing/rusa di satu tempat **Kemasan** Vial 10 ml dan 100 ml **Kementan RI No. D.** 1103084 PKC. 3. Obat keras

495. TERREXINE

Univet/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan injeksi dalam syringe **Komposisi** Setiap 10 g mengandung cephalaxine BP 200 mg, kanamycin sulphate BP 100.000 IU **Indikasi** Pengobatan mastitis pada masa

laktasi **Perhatian** Air susu baru dikonsumsi 8 hari setelah pengobatan terakhir **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara intramamaria: perah susu sampai habis, ambung dicuci dan putingnya di desinfeksi. Terrexine dimasukkan kedalam setiap kuartir, lalu ambung dipijat-pijat agar lebih cepat merata **Kemasan** Syringe @ 10 g **Deptan RI** No. I. 12091710 PKM. 2. Obat keras

496. TERROXYVET

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung oksitetrasiklin HCl 50 mg dan lidokain HCl 2% **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bronchopulmonary (bronchitis, bronchopneumonia, pleuritis). Gastrointestinal (calf diphtheria, enteritis, gastritis). Mammary (parenchymal, mastitis akut, mastitis, septic). Urinary (pyelonephritis, infeksi septic pada urinary apparatus). Infeksi kaki (polyarthritis, necrotizing gangrenous, busuk kaki). Infeksi phlegmons, septic wounds, purelent, post traumatic, dan penanganan sebelum dan sesudah operasi. Pengobatan penyakit yang disebabkan mikroba yang sensitif terhadap oksitetrasiklin **Perhatian** Simpan di tempat sejuk dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Hewan besar (sapi, kuda, babi): infeksi berat 2 ml/10 kg BB. Infeksi ringan 1 ml/10 kg BB. Hewan sedang (anjing, domba, kucing): 1 ml/5 kg BB. Ayam: 2 ml. Injeksikan secara IM **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml dan botol 100 ml **Deptan RI** No. D. 02081195 PKC. Obat keras

497. TETRAFEIN MERAH

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Tiap kapsul mengandung oxytetracycline HCl 60 mg, erythromycin thiocyanate 12 mg, vitamin B1 1,5 mg, vit B2 2 mg, vit B6 1 mg, vit B12 4 mcg **Indikasi** Menyembuhkan penyakit snot, CRD, cholera, typhoid pullorum dan penyakit unggas lainnya yang disebabkan oleh bakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dewasa umur > 8 minggu: 2 kapsul/ekor/hari **Kemasan** 10 kapsul, 50 kapsul, 100 kapsul dan 300 kapsul **Deptan RI** No. D. 0209417 PKS. Obat keras

498. TETRAVET AEROSOL

Bayer, New Zealand/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap g mengandung oxytetracycline hydrochloride 40 mg **Indikasi** Pengobatan dan kontrol infeksi topikal pada semua spesies hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Setiap 5 detik semprotan mengandung $\pm$ 1,5-2 g atau 50-70 mg oxytetracycline/5 detik. Hanya untuk topical. Kocok dahulu sebelum digunakan **Kemasan** Tabung 200 g **Kementan RI** No. I. 11124194 PKC. Obat bebas terbatas

499. THERAPY

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung oxytetracycline HCl 100 mg, dan amprolium 50 mg **Indikasi** Kolera, pullorum, CRD, koksidiosis, korisa dan sinovitis **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan untuk mencegah penyakit pada waktu stres: 1 g tiap 2 L, diberikan selama 3 hari berturut-turut. Untuk pencegahan terhadap adanya wabah: 1 g tiap L air minum, diberikan selama 5-7 hari berturut-turut. Pengobatan: 1 g tiap 1 L air minum, diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g, dan 10 g.

Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 0609733 PKS. 1. Obat keras

500. TIAMULIN

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/
Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung tiamulin 100 mg **Indikasi** Pengobatan infeksi saluran pencernaan dan pernafasan akibat bakteri yang sensitif terhadap tiamulin seperti haemophilus, mycoplasma dan treponema spp pada sapi, babi dan unggas **Kontra Indikasi** Hipersensitif terhadap tiamulin **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, dosis umum 1 ml/5-10 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI** No. I. 11061079 PKC. 1. Obat keras

501. TILMOVET 25%

Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung tilmikisin **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap tilmicisin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol HDPE 60 ml, 240 ml dan 960 ml **Deptan RI** No. I. 08123541 PKC. Obat keras

502. TINKANIUM

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Na-sulfamethazine dan trimethoprim **Indikasi** Antibakterial untuk kuda, sapi, domba, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Kuda, sapi dan babi dengan dosis harian yang direkomendasikan: 0,05 ml/kg BB secara IM/IV secara perlahan atau intra peritoneal, terapi dapat diulangi kembali setelah 24 jam. Unggas diberikan per oral dengan dosis minimum 0,5 ml dalam air minum **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 0812337 PKC. 2. Obat keras

503. TI – FLOXAN

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap Kg mengandung norfloxacin 200 g, tylosin tartrate 100 g. **Indikasi** efektif untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum (CRD), E.coli, Salmonella sp, Pasteurella sp, Clostridium spp, Streptococcus sp dan Staphylococcus sp. Disarankan untuk digunakan sebelum vaksinasi agar diperoleh titer antibodi yang optimal. **Dosis dan Cara Pemakaian** unggas 1 g/2 L air minum 3-5 hari atau 100 g/1500 Kg BB, sapi, kambing, domba 15 g/200 Kg BB selama 3-5 hari. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 kg, 30 kg. **Deptan RI** No. D. 120431 PKS. 1. Obat keras.

504. TOPCEF

QILU Animal Health / Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap vial (1 g) mengandung Ceftiofur Sodium 1.0 g, setiap vial (4 g) mengandung Cefotiofur Sodium 4,0 g **Indikasi** Sapi: penyakit pernafasan pada sapi (pneumonia, shipping fever), foot rot, mastitis. Babi: penyakit pernafasan pada babi, kontrol kematian awal pada anak babi (Early Piglet Mortality) yang berhubungan dengan bakteri gram negatif (E.coli) dan bakteri gram positif (Staphylococcus aureus, streptococcus sp). Kambing: penyakit pernafasan pada kambing dan domba. Kuda: penyakit pernafasan pada

kuda. Anjing: infeksi saluran kemih pada anjing. DOC: Kontrol kematian awal pada DOC (Early Chick Mortality) yang berhubungan dengan bakteri gram negatif (*E.coli*) dan bakteri gram positif (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* sp) **Dosis dan Cara Pemakaian Sapi:** 1,1-2,1 mg/kg BB (1-2 ml/kg BB) secara IM disuntikan 1x sehari selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 3-5 mg/kg BB (1 ml/11-18,5 kg BB) secara IM disuntikan 1x sehari selama 3 hari berturut-turut. Kambing: 1,1-2,2 mg/kg BB (1-2 ml/50 kg BB) secara IM disuntikan 1x selama 3-5 hari berturut-turut. Kuda: 2,2-4,4 mg/kg BB (2-4 ml/50 kg BB) secara IM disuntikan 1x sehari selama 3-5 hari berturut-turut. Anjing: 2,2 mg/kg BB (0,1 ml/2,5 kg BB) secara SC disuntikan 1x sehari, selama 5-14 hari berturut-turut. DOC: 0,08-0,2 mg/ekor (1 ml dapat dipakai untuk 250-625 ekor DOC) secara SC disuntikan 1x **Kemasan** Vial 1 g dan 4 g **Kementan RI** No.I.11014003 PKS. Obat keras.

505. TOSAPRIM WS

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfadiazin 200 g, trimetoprim 50 g **Indikasi** Pada unggas: colibacillosis, salmonellosis, cholera, pullorum. Pada babi: colibacillosis, diare, pneumonia **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 2 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 1 g/10 kg BB melalui pakan atau air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100g, 250g, 1Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg. **Deptan RI** No. D.0203050 PKS. Obat keras.

506. TRIALPUCINE

Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung josamycine dan trimethoprim **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap josamycine dan trimethoprim pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pencegahan dan pengobatan menggunakan 50 mg/kg BB atau 100 g/200-500 L air minum diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. I. 03111288 PKS. 2. Obat keras

507. TRIDIAZINE ORAL SUSPENSION

Jurox,Australia/PakanSerasi

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Setiap ml mengandung trimethoprim 80 mg dan sulphadiazine 400 mg **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap trimetoprim dan sulphadiazin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 ml dilarutkan didalam 4,5 L air minum **Kemasan** 500 ml/botol **Deptan RI** No. I. 02102478 PKC. Obat keras

508. TRIDOX LA

Farvet Lab.,Belanda/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** tiap ml mengandung 216 mg Oxytetracycline dihydrate (setara 200 mg Oxytetracycline). **Indikasi** Infeksi saluran pernafasan pada sapi dan babi, infeksi saluran urinaria, endometritis, enteritis dan bednosiasis pada sapi. **Dosis dan Cara Pemakaian** suntikan IM dengan dosis 1 ml/10 kg BB 1 kali pemberian untuk 3 hari. **Deptan RI** No. I. 02041811 PKC.1. Obat keras.

509. TRIMAZINE

Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung trimetoprim dan sulfadiazin **Indikasi**

Pengobatan terhadap bakteri g negatif dan positif (*Corynebacterium*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Streptococcus*, *Bordetella*, *Escherichia*, *Haemophilus* dan *Klebsiella*) **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g/10 L air minum selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Kementan RI** No. I. 12052030 PKS. 2. Obat keras

510. TRIMESULF

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung trimethoprim 40 mg dan sulfadiazine 200 mg **Indikasi** Sangat efektif untuk mengobati snot/coryza, fowl cholera, colibacillosis, pullorum dan CCRD/CRD complex **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D. 03052590 PKS. Obat keras

511. TRIMETH

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Trimethoprim 1,6% b/v, sulfadiazine 8% b/v **Indikasi** Untuk pengobatan snot, CRD kompleks, cholera, pullorum, colibacillosis, staphylococcosis. Bersifat bakterisidal yang mampu membunuh sebagian besar bakteri patogen secara total di dalam saluran pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengobatan ayam 5 ml/5 L air minum **Kemasan** 60 ml, 120 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 0404876 PKC. 3. Obat keras

512. TRIMETHODINE

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung Sulfadiazine 200 mg dan Trimethoprim 40 mg **Indikasi** Untuk mengobati infeksi saluran pernafasan dan pencernaan: Coryza (Snot), Cholera, Colibacillosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI** No. D. 11121895 PKS. 2. Obat keras.

513. TRIMETHODINE BOLUS

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Bolus Komposisi Setiap bolus mengandung Sulfadiazine 1.000 mg, Trimethoprim 200 mg **Indikasi** Secara Oral: sebagai antibakteri pada saluran pernafasan dan pencernaan. Secara Intrauterine: untuk mengobati infeksi saluran kelamin dan peranakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 bolus/40 kg BB (30 mg zat aktif/kg BB/hari) Secara Oral: 2x sehari pada sapi dan kerbau yang masih menyusui **Perhatian** Ternak dalam masa pengobatan dilarang dipotong dalam waktu 3 hari setelah pengobatan terakhir **Kemasan** Botol 10 bolus **Deptan RI** No. D. 07092148 PKM. 1. Obat keras.

514. TRIMETHOSULF

Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan Komposisi Sulfamerazine, sulfadiazine, sulfathiazole, trimethoprim **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakteri yang berat, yang disebabkan oleh bakteri g positif dan g negatif. Untuk mengobati infeksi bakteri yang disebabkan oleh organisme yang telah kebal terhadap antibiotik yang lain. Untuk mengobati infeksi pada saluran pernafasan, ekskresi dan reproduksi. Dapat mengobati infeksi pada usus dan saluran pencernaan, septicaemia dan

infeksi pada luka. Dapat digunakan untuk mengobati infeksi yang tidak diketahui sebabnya. Dapat pula mengobati coccidiosis dan coryza **Perhatian Waktu Henti Obat** daging dan susu 5 hari **Dosis dan Cara pemakaian** Melalui injeksi IM. Unggas: 0,1-0,2 ml/kg BB. Sapi, domba, anak sapi: 3 ml/50 kg BB. Babi: 7 ml/100 kg BB. Hewan kecil, anjing, kucing: 0,1 ml/1 kg BB. Pada infeksi yang berat, pengobatan dapat diulang sekali lagi, tergantung dari gambaran klinis. Melalui pemberian air minum. Unggas: infeksi bakteri 100 ml dalam 250 L air minum. coccidiosis 100 ml dalam 200 L air minum. Anak sapi, babi: 4 ml/50 kg BB. Lama pengobatan untuk semua hewan 4-7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml, 250 ml **Deptan RI** No. I. 0609871 PKC. 2. Obat keras

515. TRIMETOGRIN

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 Kg mengandung Sulfadiazine 200 g, Trimethoprim 40 g **Indikasi** Mengobati penyakit CRD, CRD kompleks, Snot, Colibacillosis, Coryza, Fowl Cholera, Pullorum dan bakteri yang peka terhadap preparat Sulfadiazine dan Trimethoprim **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 Kg @ 100 g, 20 Kg @ 100 g **Deptan RI** No. D. 04022720 PKS. Obat keras.

516. TRIMEZYN BOLUS

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Bolus **Komposisi** Setiap bolus mengandung sulfadiazine 1.200 mg dan trimethoprim 240 mg **Indikasi** Mengobati infeksi saluran pencernaan dan mengobati infeksi saluran pernapasan. Melindungi uterus terhadap infeksi bakteri (endometritis, metritis) **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 10 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 bolus tiap 50-70 kg BB diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet aluminium 2 bolus **Deptan RI** No. D. 08093496 PKM. Obat keras

517. TRIMEZYN K

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung trimethoprim 6,4 mg dan sulfadiazine 32 mg **Indikasi** Unggas: korisa, colibacillosis, CRD, kolera, fowl typhoid dan pullorum. Babi: colibacillosis, pneumonia dan septicemia **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas anak ayam: 1/2 kaplet/ekor tiap hari. Ayam dewasa: 1 kaplet/ekor tiap hari. Anak babi: 2-4 kaplet/ekor tiap hari. Babi dewasa: 4-8 kaplet/ekor tiap hari dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Kantong plastik 50 kaplet. Botol 100 kaplet, 500 kaplet, 1.000 kaplet dan 5.000 kaplet **Deptan RI** No. D. 02041073 PKM. 1. Obat keras

518. TRIMEZYN S

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung sulfadiazine 160 mg dan trimethoprim 32 mg **Indikasi** Korisa, colibacillosis, CRD, kolera dan pullorum **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan**

Cara Pemakaian 1 g tiap 1-2 L air minum atau 0,1-0,2 g tiap kg BB dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 06061263 PKS. 2. Obat keras

519. TRIMIXIN 480 WS **Diasham Resources, Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sulfamethoxazole dan trimetoprim **Indikasi** Antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** 50-100 mg/kg BB **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 05061296 PKS. 3. Obat keras

520. TRIMOXAL PIGLET SUSPENSION **Diasham Resources, Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung trimetoprim dan sulfametoxazol **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap trimetoprim dan sulfamethoxazole pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/2 kg BB **Kemasan** Botol 250 ml **Deptan RI** No. I. 04061135 PKC. 2. Obat keras

521. TRISULMIX LIQUIDE **Coophavet Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung sulfadimethoxin sodium 18,6 g, trimethoprim 4 g, methyl parahydroxybenzoate 0,1 g **Indikasi** Antibakteri pada sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, SC dan IV dengan dosis: 1 ml/10 kg BB/hari selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Box isi 10 botol @ 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 04061815 PKC. 1. Obat keras

522. TRISULMIX INJECTABLE/SULRIJECT **Coophavet Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung sulfadimethoxin sodium 20 g, trimethoprim 4 g, methyl parahydroxybenzoate 0,1 g **Indikasi** Antibakteri pada sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, SC dan IV dengan dosis: 1 ml/10 kg BB/hari selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Box isi 10 botol @ 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 03122693 PKC. Obat keras

523. TYCOTIL **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung tylosin tartrate 500 g dan colistin sulfate 400.000.000 IU **Indikasi** CRD kompleks dan colibacillosis pada unggas **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,1 g tiap kg BB atau 1 g tiap 2 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 250 g **Deptan RI** No. D. 0711346 PKS. Obat keras

524. TYFURAL **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung tylosin 80 g, dan sulphamethoxypyridazine 50 g **Indikasi** CRD dan menghilangkan gejala ngorok akibat

vaksinasi **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 g tiap L air minum, diberikan sehari sesudah vaksinasi selama 3 hari berturut-turut untuk menghilangkan gejala ngorok. Pengobatan: 2 g tiap L air minum, diberikan selama 5 hari berturut-turut Kemasan Sachet aluminium 5 g, dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg dan 10 kg, 15 kg, dan 20 kg. Drum 50 kg **Deptan RI** No. D. 01021262 PKS. Obat keras

525. TYLAN SOLUBLE

Elanco Animal Health/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tylosin tartrat 100% **Indikasi** Kontrol dan pengobatan MG/MS pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 110 mg/kg BB **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 0412490 PKM. 3. Obat keras

526. TYLAPRIM

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung tylosin tartrate 80.000 mg, syraprim (trimethoprim) 16.650 mg, debena (sulfadiazine) 83.350 mg, vitamin A 10.000.000 IU, cevetimic acid (vit C) 30.000 mg **Indikasi** Efektif untuk pengobatan CRD, snot, cholera, colibacillosis, berdaya bunuh kuat pada hampir semua bakteri pathogen yang kebal terhadap antibiotik lain **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g (1 sendok teh)/5 L air minum atau 2-2,5 kg/ton pakan **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 02091378 PKS. Obat keras

527. TYLOCARE

Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung Tylosin tartrate 200 mg, propylenglycol 0,5 ml dan benzylalcohol 0,01 ml **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakteri pada saluran pernafasan (mycoplasma), mastitis, endometritis, disentrideritis arthritis **Kontra Indikasi** Hipersensitif terhadap tylosin dan hipersensitif silang terhadap makrolida **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara intramuscular atau subcutan dengan dosis, Sapi: 0,5-1 ml/kg BB setiap hari selama 3-5 hari. Kambing, domba, anak sapi: 1,5-1,0 ml/10 kg BB setiap hari selama 3-5 hari. Babi: 0,5-0,75 ml/10 kg BB selama 3 hari. Anjing, kucing: 0,5 -2,0 ml/10 kg BB selama 3-5 hari **Waktu Henti Obat** Daging Babi: 4 hari. Sapi, kambing, domba: 8 hari. Unggas: 3 hari **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 11104170 PKC

528. TYLOFLOX

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap Kg mengandung Tylosin (tartrat) dan Norfloxacin **Indikasi** CRD/CCRD, Cholera, Colibacillosis, Mycoplasmosis, Salmonellosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Unggas 1 g/2 L air minum atau 0,1 ml TYLOFLOX/kg BB per hari selama 3 – 5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 100 ml, 1 Liter **Kementan RI** No. D. 121244404 PKC. Obat keras.

529. TYLOJECT 20%

Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Tylosin base (dalam bentuk tartrat) 20% **Indikasi** Sapi, anak sapi: broncho-pneumonia, synovitis, arthritis, metritis, leptospirosis,

dipteri pada anak sapi, foot rot, dan infeksi lainnya yang disebabkan oleh mycoplasma dan bakteri g positif. Babi: broncho-pneumonia, enzootic pneumonia (EP-disebabkan oleh Mycoplasma hyopneumoniae), vibronic dysentery, atrophic rhinitis (AR). Domba, kambing: enzootic pneumonia, exudative pneumonia yang disebabkan oleh mycoplasma terutama oleh ovipneumoniae. Unggas: mycoplasma (infeksi dari PPLO), pencegahan dan pengobatan chronic respiratory diseases (CRD) dan infeksi sinusitis **Waktu Henti Obat** Pada daging dan susu 5 hari dan telur 2 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IM. Sapi, anak sapi, babi: 1,5-2,5 ml/50 kg BB. Domba, kambing: 1-3 ml/50 kg BB. Anak babi: 0,2-0,5 ml/10 kg BB. Anjing, kucing: 0,1-0,5 ml/per 10 kg BB. Secara peroral melalui air minum. Unggas: 100 ml/50 L (10 gallon) air minum. Lama pemakaian 2 hari. Untuk kasus yang hebat, pemakaian dapat diperpanjang untuk 2-3 hari **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 01021292 PKC. 1. Obat keras

530. TYLOMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Tylosin (tartrat) dan Colistin (sufat) **Indikasi** CRD (Mycoplasmosis), mengurangi infeksi sekunder oleh bakteri G negatif (E. coli) **Dosis dan Cara Pemakaian Oral**; Unggas 1 g/1 L air minum atau 0,2 gr TYLOMAS/kg BB per hari selama 3 – 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Kementan RI** No. D. 12082495 PKS. Obat keras.

531. TYLOPRIM

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung tylosin (tartrate) 200 mg **Indikasi** Babi: Arthritis, pneumonia, vibrio disentri, mycoplasmosis, erysipelas. Sapi: bovine respiratory complex, pneumonia, bronchitis, mastitis, leptospirosis, diphteria dan mycoplasmosis. Anjing/kucing: infeksi respirasi. Unggas: CRD (mycoplasmosis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IM. Babi: 0,45-0,5 ml/kg BB setiap 12 jam selama 3 hari. Sapi: 0,5-0,9 ml/10 kg BB setiap 24 jam selama 3 hari. Anjing/kucing: 0,35-0,55 ml/10 kg BB/hari selama 3 hari. Unggas: 0,1-0,2 ml/kg BB setiap 12-24 jam selama 3 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 04032198 PKC.1 Obat keras.

532. TYLORATE INJ

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung tylosin tartrate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tylosin pada sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, pada sapi: 2,5-5 ml/100 kg BB/hari selama 5 hari. Kambing dan domba: 2,5 ml/50 kg BB/hari selama 5 hari **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 09093713 PKC. Obat keras

533. TYLO-SAN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tylosin tartrat dan colistin **Indikasi** Mengobati penyakit yang disebabkan mycoplasma, bakteri g-positif dan g-negatif pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 08073458 PKS. Obat keras

534. TYLOCOL

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung tylosin tartrate 200 g, colistin sulfat 250 juta IU **Indikasi** Antibiotika spektrum luas untuk infeksi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Pada unggas: CRD, colibacillosis, cholera, coryza, salmonellosis, pasteurelosis. Pada babi: pneumonia, swine dysentery. Pada sapi: pneumonia, otitis externa, bronchitis, leptosteuerosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 20-40 mg/kg BB atau 1 g dilarutkan dalam 1-2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Untuk babi/sapi: 50-100 mg/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 03032558 PKS. Obat keras

535. TYLODOX

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung tylosin tartrate 200 kg, doxycycline HCl 100 kg **Indikasi** Antibiotik spektrum luas untuk infeksi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Pada unggas: CRD, colibacillosis, cholera, coryza, salmonellosis, pasteurelosis. Pada babi: pneumonia, swine dysentery. Pada sapi: pneumonia, otitis externa, bronchitis, leptosteuerosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 20-40 mg/kg BB atau 1 g dilarutkan dalam 1-2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Untuk babi/sapi: 50-100 mg/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 03032557 PKS. Obat keras

536. TYLOON

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung tylosin tartrat **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tylosin pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 14 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi subkutan atau IM. Sapi, kerbau, kuda: 2-4 ml/10 kg BB. Babi 2 ml/10 kg BB. Kambing, domba: 2-4 ml/10 kg BB. Anjing, kucing, kelinci: 2 ml/10 kg BB. Unggas: 0,5-0,8 ml/kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml **Deptan RI** No. D. 0501683 PKC. 1. Obat keras

537. TYLOSIN – 50

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tylosin tartrate 50% **Indikasi** Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mycoplasma pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum pada unggas **Kemasan** 1 kg **Deptan RI** No. D. 08073467 PKS. Obat keras

538. TYLOSIVET

Duta Kaiser Pharmacy

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung tilosin tartrat setara dengan 200 mg tilosin basa dalam larutan propilen glikol preservatif **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap tylosin pada sapi, babi, domba, anjing dan kucing. Untuk pengobatan moraxella bovis pada sapi. Infeksi saluran pernafasan, disentri pada babi, pleuropneumonia, dan kolitis pada ayam **Perhatian** Dilarang digunakan pada kuda. Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara umum 0,5-4 ml/50 kg BB/hari. Sapi 1 ml/10 kg BB/hari. Babi 1 ml/25 kg BB/hari. Injeksikan secara IM **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0204220 PKC. Obat keras

539. TYLOTRYL

AVICO/Maju Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung enrofloxacin dan tylosin tartrate
Indikasi Sebagai antibakteri yang peka terhadap enrofloxacin dan tylosin pada unggas, sapi, kambing, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** lihat label kemasan **Kemasan** 500 ml **Kementan RI** No. I. 12054265 PKC.

540. TYLOVA 200 INJECTABLE SOLUTION

Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/

Lisan Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tylosin **Indikasi** Pengobatan arthritis pada babi dan pengobatan pneumonia pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat kemasan **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 08033394 PKC. Obat keras

541. TYLOXACIN

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung tylosin tartrat 200 g enrofloxacin 100 g **Indikasi** Antibiotika spektrum luas untuk infeksi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Pada unggas: CRD, colibacillosis, cholera, coryza, salmonellosis, pasteurelosis. Pada babi: pneumonia, swine dysentery. Pada sapi: pneumonia, otitis externa, bronchitis, leptospirosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 20-40 mg/kg BB atau 1 g dilarutkan dalam 1-2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Untuk babi/sapi: 50-100 mg/kg BB selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 03032556 PKS. Obat keras

542. TYSINOL

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung tylosin tartrate setara dengan base 50 mg, bahan pembantu sampai 1 ml **Indikasi** Babi: bronchopneumonia, swine enzootic pneumonia, swine dysentery. Unggas: CRD **Perhatian** Penyuntikan dapat diulang setelah 12-24 jam selama 2-3 hari berturut-turut. Jangan menyuntikkan obat lebih dari 5 ml pada satu tempat penyuntikan **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 3 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: penyuntikan secara IM. Anak babi: 1-2 ml tiap 10 kg BB. Babi dewasa: 5-10 ml tiap 50 kg BB. Penyuntikan secara SC atau IM. Ayam umur 1-4 minggu: 0,25-0,5 ml tiap ekor. Ayam umur > 4 minggu: 0,5-1 ml tiap ekor **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml, dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 06071347 PKC. 2. Obat keras

543. ULTRALIN 45%

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Tiamulin Hydrogen Fumarate 450 mg **Indikasi** Untuk mengobati penyakit CRD pada unggas, Enzootik Pneumonia dan disentri pada babi **Kontra Indikasi** Tidak boleh diberikan kepada ternak yang makanannya mengandung Polyether Ionophores (seperti monensin, lasalocid, narasin atau salinomycin). Tidak boleh diberikan pada babi dengan berat lebih 113,4 kg (250 pounds) **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 g/4,5-9 air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 07032005 PKS. 1. Obat keras.

544. VETA CORYZEV

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk berwarna putih dan krem **Komposisi** Setiap 1 g mengandung Sulfadiazine 400 g, Trimethoprim 80 g, Laktosa qs **Indikasi** Efektif untuk mengobati Snot/ Coryza yang disertai dengan infeksi sekunder seperti Colibacillosis, cholera dan salmonellosis. Pada babi digunakan untuk mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi E. Coli dan Salmonella **Kontra Indikasi** Sebaiknya jangan diberikan pada anjing dan kuda yang menderita kerusakan fungsi hati, dan hewanyang sedang hamil **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: larutkan 1 g kedalam 2-5 L air minum atau 100 g/1.500 kg BB. Babi, kambing dan domba: 1 g/20 kg BB **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** Sachet 100 g, kaleng 1 kg **Deptan RI** No. D. 12044257 PKS. TM

545. VETA CYPROCIN

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml Veta Cyprocin mengandung zat aktif Cyprofloxacin-HCl 10 g **Indikasi** untuk pengobatan infeksi bacterial, seperti Salmonellosis, Pasteurellosis, Snot dan Kolibasillosis serta CRD **Kontra Indikasi** Pada saat hewan ditreatmen dengan ciprofloxacin, jangan sampai hewan dehidrasi karena adanya laporan terjadi kristaluria. Jangan diberikan pada hewan yang mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1ml/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Pemberian secara oral, babi dan pedet: 2,5 mg/kg BB melalui air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Waktu Henti Obat** 5 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 12054267 PKC. TM

546. VETA FLOXA

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap g mengandung enrofloxacin 100 mg **Indikasi** Sebagai antibakteri yang peka terhadap enrofloxacin pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 0,10 ml/kg BB atau 0,5 L/1000 L air minum selama 3 hari beruturt-turut. Untuk kasus salmonellosis berikan sampai 5 hari **Kemasan** Botol @ 100 ml, 1 L **Deptan RI** No. D. 12094337 PTC. TM

547. VETA MYCOLA

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk warna merah muda **Komposisi** Setiap 1 g mengandung Tylosin 125 mg, Enrofloxacin 125 mg, Lakstosa qs **Indikasi** Sangat efektif untuk menyembuhkan CRD yang disertai dengan infeksi sekunder alibat E. Coli, selain itu efektif juga untuk menyembuhkan Snot dan penyakit lainnya yang disebabkan Salmonella sp., Pasteurella sp., Clostridium sp., Streptococcus sp., dan Staphylococcus sp., **Kontra Indikasi** Tidak boleh digunakan kepada unggas yang sedang memproduksi telur yang akan dikonsumsi manusia **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g VETA MYCOLA dicampurkan ke dalam 1-2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari atau 100 g/1.500 kg BB **Waktu Henti Obat** penggunaan obat harus dihentikan minimal 7 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** Sachet 100 g, dan kaleng 1 kg **Deptan RI** No. D. 11124191 PKS. TM

548. VETA RESPIREX

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap g mengandung Doxycycline 100 mg, Erythromycin 200 mg, Laktosa qs **Indikasi** Untuk pengobatan CRD kompleks yang disertai dengan infeksi sekunder oleh kuman *E. Coli*, *Salmonella* (berak hijau) **Kontra Indikas** Hipersensifitas terhadap salah satu dari senyawa tersebut. Hipersensifitas silang terhadap makrolida, kerusakan saluran pencernaan, kegagalan fungsi ginjal, pemberian bersamaan dengan asam nalidiksik, zoalene (DOT), Sediaan bromehexidine dan karbadox **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: Dosis yang dianjurkan 0,2 g/kg BB (1 g/2 L). Sapi: 1 g/25 kg BB, 2 kali sehari **Kemasan** Sachet 100 g, Kaleng 1 kg **Deptan RI** No. D. 12044254 PKS. TM

549. VETMACOL FORTE

Univetama Dinamika

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung neomisin sulfat 15 mg, doksisisiklin hiklat 12,5 mg **Indikasi** Unggas: untuk pengobatan dan pencegahan CRD kompleks, infeksi *E. coli*, colibacillosis dan coliseptikemia, dan untuk pengobatan infeksi umum saluran pernafasan **Perhatian** Pengobatan dihentikan 5 haari sebelum ayam dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air minum 2 g/L diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 5 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 06031364 PKS. 2. Obat keras

550. VETRIMOXIN LA

Ceva Sante Animale, Perancis/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Amoxicillin trihidrat **Indikasi** Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap amoksisilin pada sapi, babi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis yang digunakan adalah 15 mg Amoxicillin/kg BB setara dengan 1 ml Vetrimoxin LA/10 kg BB. Dosis ini dapat diulang 48 jam selanjutnya jika diperlukan **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 0803670 PKC. 1. Obat keras

551. VETRIMOXIN LA CLAS

**Ceva Sante Animale, Perancis/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Amoxicillin trihidrate **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sensitif terhadap amoxicillin pada babi, sapi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis yang digunakan adalah 15 mg amoxicillin/kg BB setara dengan 1 ml Vetrimoxin LA/10 kg BB. Dosis ini dapat diulang 48 jam selanjutnya jika diperlukan **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 09033583 PKC.

552. VETRIMOXIN 50 WS

**Ceva Sante Animale, Perancis/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Amoxicillin trihidrat **Indikasi** Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap amoksisilin pada ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas dan babi: 2 g/10 L air minum setiap 12 jam selama 5 hari. Sapi: 2 g/100 kg BB setiap 12 jam selama 5 hari **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. I. 08023388 PKS. Obat keras

553. VET – OXY LA

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung oxytetracycline **Indikasi** Sapi, kerbau: pneumonia, arthritis, black leg, foot-rot, anaplasmosis, babesiosis dan scours. Babi: erysipelas, diare, leptospirosis dan atrophic rhinitis. Domba dan kambing: diare dan infeksi bakteri lainnya. Unggas: CCRD, fowl cholera, snot dan colibacillosis **Dosis dan Cara**

Pemakaian Hewan besar: 1 ml/10 kg BB secara IM. Unggas: 0,25 ml/kg BB secara IM
Kemasan 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 01092117 PKC. 1. Obat keras

554. VET – OXY SB

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung oxytetracycline dan lidocaine
Indikasi Mengobati infeksi penyakit bakteri pernafasan dan pencernaan pada unggas, sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, anjing dan kucing **Perhatian** Pemotongan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,5-1 ml/kg BB. Sapi, kerbau dan kuda: 4-8 ml/50-100 kg BB, tiap kenaikan 50 kg dosis ditambah 4 ml dari dosis sebelumnya. Babi, domba dan kambing: 5 ml/50 kg BB, tiap kenaikan 25 kg dosis ditambah 1 ml. Induk babi, domba dan kambing: 14 ml/100 kg BB. Anjing dan kucing: 0,5-2 ml/3-10 kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0403946 PKC. 3. Obat keras

555. VET – PENSTREP 4: ½

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Serbuk untuk suspensi injeksi **Komposisi** Mengandung penisilin g prokain dan streptomycin sulfat **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri g positif atau negatif. Infeksi yang tidak diketahui penyebabnya. Actinomycosis, cystitis, pielonephritis, sakit ginjal pada hewan yang disebabkan coryne-bactrenale dan infeksi lain pada saluran cerna. Infeksi saluran nafas dan infeksi rahim yang menyebabkan kemandulan. Sinusitis, cholera dan typhus pada unggas, burung dan ternak **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap penisilin dan streptomisin **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk dan jauh dari pengaruh cahaya **Dosis dan Cara pemakaian** Sapi, kuda dan kerbau (BB = 600-700 kg): 20-25 ml. Babi 2-10 ml. Anak babi: 0,2-1 ml. Kambing, domba: 2-4 ml. Anjing, kucing: 0,2-2 ml dan ayam 0,5 ml/kg BB **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Vial 1,05 g, 5,25 g dan botol 26,00 g **Deptan RI** No. D. 05101225 PKS. 1. Obat keras

556. VET – PENSTREP 4:1

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Serbuk untuk suspensi injeksi **Komposisi** Mengandung penisilin g prokain dan streptomycin sulfat **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri g positif atau negatif. Infeksi yang tidak diketahui penyebabnya. Actinomycosis, cystitis, pielonephritis, sakit ginjal pada hewan yang disebabkan coryne-bactrenale dan infeksi lain pada saluran cerna. Infeksi saluran nafas dan infeksi rahim yang menyebabkan kemandulan. Sinusitis, cholera dan typhus pada unggas, burung dan ternak **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap penisilin dan streptomisin **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk dan jauh dari pengaruh cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda dan kerbau (BB = 600-700 kg): 20-25 ml. Babi: 2-10 ml. Anak babi: 0,2-1 ml. Kambing, domba: 2-4 ml. Anjing, kucing: 0,2-2 ml dan ayam 0,5 ml/kg BB. Cara pemakaian lihat pada brosur **Kemasan** Vial 1,7 g, 8,5 g dan botol 41,5 g **Deptan RI** No. D. 05101226 PKS. 1. Obat keras

557. VET STREP

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk steril **Komposisi** Setiap g mengandung 50% streptomycin dan 50% dihydrostreptomycin, keduanya sebagai base **Indikasi** Unggas: CRD dan korisa. Sapi: pasteurellosis, pneumonia, mastitis, vibriosis, leptospirosis. Kuda: polysepticemia, septicemia, enteritis, pneumonia. Babi: necrotic, enteritis, leptospirosis, diare. Anjing, kucing: leptospirosis, cystitis, gastroenteritis **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 3 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Cara melarutkan aquadest atau larutan injeksi B kompleks digunakan sebagai pelarut, kemudian dikocok

sampai larut semua sehingga diperoleh larutan obat yang mengandung streptomycin base 125 mg tiap ml dan dihydrostreptomycin base 125 mg tiap ml. Dosis untuk unggas penyuntikan: sehari 1x secara IM dan diulang maksimal selama 5 hari berturut-turut. Dosis sapi, kuda, babi, anjing dan kucing: penyuntikan sehari 2x secara IM dan diulang sampai maksimal selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Vial 5 g, 12,5 g, 25 g, 50 g, 125 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 0609379 PKS. 2. Obat keras

558. VEYXYL LA 20%

Veyx Pharma GmbH – Jerman/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung amoxicillin trihidrat **Indikasi** Pada babi, sapi, domba, anjing dan kucing untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme g (+) dan (-) yang sensitif dengan amoxicillin. Infeksi paru-paru dan sistem pernapasan, infeksi sistem pencernaan, infeksi pada urogenital, infeksi umum dan penyakit septicemia, infeksi bakteri sekunder, dengan infeksi virus, erysipelas. Sensitivitas patogen di determinasi dengan antibiogram menggunakan Veyxyl LA 20%. Derajat resistensi yang sangat tinggi terhadap amoxicillin adalah E. coli dan salmonella, khususnya pada pengobatan infeksi sistem pencernaan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM pada babi, sapi, domba, anjing dan kucing dengan dosis 10 mg amoxicillin/kg BB sehari sekali selama 3 hari (10 mg amoxicillin/kg BB setara dengan 0,5 ml Veyxyl LA 20%/10 kg BB). Jika tidak ada perubahan setelah 3 hari pengobatan, dapat dilakukan terapi lebih lama dengan Sediaan ini jika sensitivitas dari patogen aman pada rata-rata antibiogram. Jika perlu, dilakukan perubahan terapi. Setelah penurunan simptom klinikal pengobatan dapat dilanjutkan selama 2 hari. Untuk injeksi secara IM pada babi dilakukan pada lateral muskular di bagian leher, untuk sapi ke dalam elbow (anconeus) muskulature **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI** No. I. 12074302 PKC. Obat keras

559. VIANO – 10

Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung 10% enrofloxasina base **Indikasi** Untuk pengobatan infeksi bakterial seperti salmonellosis, pasteurellosis, snot, colibacillosis dan CRD **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,5-1,0 ml/L air minum atau 10 mg bahan aktif/kg BB dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol plastik 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 0106838 PKC. Obat keras

560. VITA TETRA CHLOR

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Kapsul Komposisi Setiap kapsul mengandung tetracycline HCl 50 mg dan erythromycin 10 mg **Indikasi** Korisa, CRD, kolera, pullorum Perhatian Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 7 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur sampai 4 minggu: sehari 1 kali ½ kapsul. Umur 4-8 minggu: sehari 2x ½ kapsul. Umur > dari 8 minggu: sehari 2x 1 kapsul **Kemasan** Sachet aluminium 10 kapsul, botol 50 kapsul dan 300 kapsul **Deptan RI** No. D. 0206957 PKM. Obat keras

561. VITA TETRA CHLOR S

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kapsul mengandung tetracycline HCl 135 mg dan erythromycin 25 mg **Indikasi** Korisa, CRD, kolera, dan pullorum Perhatian Simpan obat

di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Waktu Henti Obat** Hentikan pemakaian obat 7 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g tiap L air minum diberikan selama 4-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 02061324 PKS. Obat keras

562. WIDECILLIN FINE GRANULES 10%

Meiji Indonesia Pharmaceutical

Bentuk Sediaan Fine granules **Komposisi** Setiap 1 g fine granules 10% mengandung Amoxicillin 100 mg (potensi) **Indikasi** Bakteri gram positif dan gram negatif seperti: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., E. Coli, Pasteurella sp., aemophilus sp., Actinobacillus plueropneumoniae, dan Clostridium peffringens. Sapi: Diare yang disebabkan oleh kuman-kuman bentuk coli. Unggas: Colibacillosis, Leg–problem (yang disebabkan oleh Staphylococcus sp., Necrotic enteritis, Coryza dan Salmonellosis) Babi: Pneumonia **Dosis dan Cara Pemakaian:** Obat dilarutkan dalam air minum. Untuk Sapi: obat dicampur dan dilarutkan ke dalam susu segar, susu pengganti atau air minum. Sapi: 50–100 mg Widecillin Fine Granules 10%/kg BB/hari. Unggas: 100–500 mg Widecillin Fine Granules 10%/kg BB/hari. Babi: 50–100 mg Widecillin Fine Granules 10%/kg BB/hari. Diberikan selama 3–5 hari. **Perhatian** Penggunaan terus menerus jangan melebihi satu minggu dan Obat hanya untuk hewan **Kemasan** Kantong alufoil @ 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 07102072 PKS. 1. Obat keras

563. WIDECILLIN FINE GRANULES 20%

Meiji Indonesia Pharmaceutical

Bentuk Sediaan Fine granules **Komposisi** Setiap 1 g fine granules 20% mengandung Amoxicillin 200 mg (potensi) **Indikasi** Bakteri gram positif dan gram negatif seperti: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., E. Coli, Pasteurella sp., Haemophilus sp., Actinobacillus plueropneumoniae, dan Clostridium peffringens. Sapi: Diare yang disebabkan oleh kuman-kuman bentuk coli. Unggas: Colibacillosis, Leg–problem (yang disebabkan oleh Staphylococcus sp., Necrotic enteritis, Coryza dan Salmonellosis) Babi: Pneumonia **Dosis dan Cara Pemakaian:** Obat dilarutkan dalam air minum. Untuk Sapi, obat dicampur dan dilarutkan ke dalam susu segar, susu pengganti atau air minum. Sapi: 25–50 mg Widecillin Fine granules 20%/kg BB/hari. Unggas: 50–250 mg Widecillin Fine Granules 20%/kg BB/hari. Babi: 25–50 mg Widecillin Fine Granules 20%/kg BB/hari. Diberikan selama 3–5 hari **Perhatian** Penggunaan terus menerus jangan melebihi satu minggu dan Obat hanya untuk hewan **Kemasan** Kantong alufoil @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 0902889 PKS. 1. Obat keras

564. WONDER AMOXYLIN

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung amoxylin **Indikasi** Sapi, kuda, kerbau, domba, kambing, anjing, kucing unggas: antibakteri terhadap CERD, pneumonia, atrophic rhinitis, endometritis, mastitis, arthritis, enteritis, coryza, diare **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5–5 g dilarutkan 1 L air minum diberikan selama 3–5 hari berturut-turut, bila perlu dapat diulang setelah istirahat 3 hari **Kemasan** 5 g, 10 g, 100 g, 500 g, 1 kg **Kementan RI** No. D. 11094155 PKC. Obat keras

565. WONDER TRIMETHOPRIM

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung trimethoprim, sulphadiazin sodium **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri salmonella, E. coli, pneumonia, dll pada hewan besar. Serta CRD complex, colibacillosis, coryza, pullorum dll pada unggas **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan cara pemakaian** Injeksi IM. Kambing, domba, babi, sapi, kerbau, kuda: 1 ml/ekor. Unggas: encerkan dengan 9 ml akuades dan suntikkan IM dengan dosis penyakit ringan 1 ml/Kg BB, penyakit berat 2 ml/Kg BB **Kemasan** 50 ml, 100 ml, 500 ml **Deptan RI** No. D. 06043062 PKC. Obat keras

566. WONDER QUINOLIN

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Liquid Komposisi Mengandung enrofloxacin **Indikasi** Untuk mengobati infeksi pada sistem pernafasan, dan urinasi seperti pada, Unggas: coryza, CRD complex, kolera, pullorum, colibacillosis, salmonellosis **Perhatian** Jangan diberikan 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml dilarutkan kedalam 2 L air minum **Kemasan** 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L **Kementan RI** No. D. 13024448 PKC. Obat keras

567. X – TRA AMPICOL

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap 1 kg mengandung ampicillin 100 g dan colistin 250.000.000 IU **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap ampicillin dan colistin pada unggas dan babi **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang memiliki sejarah alergi terhadap penicillin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 08093498 PKS. Obat keras

568. X – TRA DOXYTRO

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung erythromycin 150 g dan doxycycline 100 g **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap erythromycin dan doxycycline pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 08073464 PKS. Obat keras

569. X – TRA MOXICOL

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung amoxicillin 200 g dan colistine 800.000.000 IU **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang peka terhadap amoxicillin dan colistine pada unggas, sapi dan babi **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang mempunyai sejarah alergi terhadap penicillin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Sapi: 100 mg/kg BB, 2x sehari. Babi: 1 g/L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 08053423 PKS. Obat keras

570. X – TRA TRISULF

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung trimethoprim 80 g dan sulfadiazine 400 g **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap trimethoprim dan sulfadiazine **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada hewan yang mempunyai sejarah sensitif terhadap sulfonamide **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 08063455 PKS. Obat keras

571. ZADOXYL

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Doxycycline hyclate 10% **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doxycycline pada unggas dan babi **Kontra Indikasi** Hewan yang hipersensitif terhadap doxycycline **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 mg/kg BB **Kemasan** Sachet 100 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 06083112 PKS. Obat keras

572. ZOBIOTIC

Laboratorios Calier, S.A–Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung amoxycillin base 5 g **Indikasi** Mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif dan positif terutama pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran urogenital, kulit dan jaringan lunak serta penyakit bakteri lainnya yang sensitif terhadap amoxycillin **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada kelinci, marmot atau hamster. Jangan diberikan pada hewan yang sensitive terhadap golongan α -laktam **Perhatian** Jangan diberikan bersamaan dengan tetrasiklin, preparat sulfa dan chloramphenicol. Overdosis dapat menimbulkan alergi. Jika terjadi alergi hentikan pengobatan dan berikan adrenalin, dan corticosteroid. Untuk kasus lain berikan pengobatan symptomatic **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC. Dosis umum 0,33-0,66 ml/10 kg BB/hari. Maksimum pemberian 5-7 hari. Pada kasus serius dapat diulang setiap 12 jam, dosis/frekuensi dapat ditambah sesuai dengan petunjuk dokter hewan **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 02102200 PKC. 1. Obat keras.****

ANTI MIKOTIK

01.05

1. **BIOMYTOX PLUS** **Biotek Indonesia**
Bentuk sediaan serbuk kering **Komposisi** setiap Kg Biomytox Plus mengandung Propionic Coumpound, Allumunium Silicate **Indikasi** menghambat pertumbuhan jamur dalam pakan, menetralkan racun yang dihasilkan oleh jamur dalam pakan **Dosis dan cara pemakaian** 100-500 g/ton pakan Kemasan Zak 25 Kg **Deptan RI** No. D. 06123155 PTS. Obat bebas terbatas.
2. **BLUE ROYALE FUNGICIDE** **Anitox, USA/SHS International**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam propionate Kemasan Jerigen 1 galon (3,8 lt), drum 55 galon (208 lt) **Indikasi** Antifungi pada air minum ternak **Deptan RI** No. I.0211630 PTC.1 Obat bebas terbatas
3. **CID-2000** **CID Lines, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam parasetat, hydrogen peroksida dan asam asetat **Indikasi** Antimikroba pada air minum unggas dan babi Kemasan Jerigen 10 liter **Deptan RI** No. I.0206582 PTC Obat bebas terbatas.
4. **DESIFUNG SOLUBLE** **S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/
Ekasapta Wijayatangguh**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam propionat dan **Indikasi** Digunakan pada unggas, ruminansia dan babi sebagai perlindungan dan kontrol terhadap jamur pada nutrisi hewan. Juga digunakan sebagai anti-jamur topikal. **Dosis dan cara pemakaian** Melalui pakan dengan cara disemprotkan maupun pengobatan melalui water-bath dan sebagai desinfektan dengan dosis 10% larutan dalam air. **Kemasan** 1 liter dan 5 liter **Deptan RI** No. I. 06103129 FTC Obat bebas terbatas.
5. **ESB – 3 (30%)** **Shanghai Novartis Animal Health Ltd, China/
Novartis Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Sulfakloropirazin **Indikasi** Antikoksidia dan Anti Leucocytozoon pada unggas. **Dosis dan pemakaian** Pemakaian melalui air minum untuk Koksidiosis dengan dosis 1 gram ESB 3 per liter air minum selama 3 hari berturut-turut. Pada kasus infeksi E. Tenella dan E. Necatrix gunakan dosis : 2 gr ESB 3 per liter air, dengan system pemberian 3-2-3 (3 hari pengobatan, 2 hari istirahat dan 3 hari pengobatan lagi). Untuk Kolrea Unggas dan Thypoid : dosis 1-2 gr ESB 3 per liter air selama 5 hari berturut-turut. Untuk pencegahan Leucocytozoon : dosis 20-30 mg ESB 3 per kg BB atau 1 gr ESB 3/10 L air minum pada umur 11 hari selama 7-10 hari **Kemasan** Kantung plastik 250 g **Deptan RI** No. I. 1211049 PTS. 3 Obat bebas terbatas.
6. **FEED CURB DRY** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Asam Propionat 50% **Indikasi** anti jamur yang ditambahkan dalam pakan ternak **Dosis dan cara pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantong, 25 Kg **Kementan RI** No. I. 13041186 FTS. 3. Obat bebas terbatas

7. **FRA MOULD DRY** **Franklin Products, Belanda/Mitra Karya Sumberarta**
Bentuk Sediaan serbuk **Komposisi** setiap Kg mengandung 48,2% Asam Propionat, 2 % Asam Sitrat, 1 % Asam Sorbat, 3,3 % *Ammonium propionate* **Indikasi** Antifungi pada pakan unggas dan babi **Dosis dan cara pemakaian** 400 g–1000 g/ton pakan pada kelembaban 11–14 % **Kemasan** 25 Kg. **Deptan RI** No. I. 04122845 FTS. Obat bebas terbatas.
8. **FRA MOULD P DRY** **Franklin Products, Belanda/Mitra Karya Sumberarta**
Bentuk Sediaan serbuk **Komposisi** setiap Kg mengandung 50% Asam Propionat **Indikasi** Antifungi pada pakan unggas dan babi **Dosis dan cara pemakaian** 400 g – 1000 g/ton pakan pada kelembaban 11– 14 % **Kemasan** 25 Kg **Deptan RI** No.I. 04122846 FTS. Obat bebas terbatas.
9. **FRA MOULD LIQUID** **Franklin Products, Belanda/Mitra Karya Sumberarta**
Bentuk Sediaan liquid **Komposisi** setiap Kg mengandung 65,1 % Asam Propionat, 3,8 % %Asam Asetat, 1 % Asam Sorbat, 4,4 % Ammoniumpropionate **Indikasi** Antifungi pada pakan unggas dan babi **Dosis dan cara pemakaian** 400 g – 1000 g/ton pakan pada kelembaban 11– 14 % **Kemasan** 25 Kg. **Deptan RI** No.I. 04122844 FTC. Obat bebas terbatas.
10. **FUNGEX** **Anitox Corp-USA/ SHS International**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** As. Propionate dan as butirat **Indikasi** Anti jamur **Dosis dan cara pemakaian** 0.5-1 Kg/ton pakan **Kemasan** 200 L dan 1000 L **Deptan RI** No. I. 05021616 FTC.1. Obat bebas terbatas.
11. **FUNGINAT FP 51** **Norel & Nature, Spanyol/Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan bubuk **Komposisi** setiap Kg mengandung Sodium Propionat, Kalium Formiat, Asam Propionat, dan Kalsium Propionat **Indikasi** antifungi yang tidak korosif dengan spektrum luas untuk pakan ternak dan bahan baku pakan ternak **Dosis dan cara pemakaian** 300-1000 g dicampur merata dalam 1 ton pakan ternak atau bahan baku pakan ternak **Kemasan** kantong @ 25 Kg **Deptan RI** No. I. 03092135 PTS.1. Obat bebas terbatas.
12. **KLINOFEED** **Unipoint AG., Switzerland/Behn Meyer Kimia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Clinoptilolite, Claymineral, Feldspar, dan Mica **Indikasi** Untuk mengikat Mycotoxin dan Ammonia pada pakan ternak, babi dan sapi **Dosis dan cara pemakaian** Ditambahkan kedalam pakan sebesar 1-5 kg/ton pakan. **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11102500 FTS. 1. Obat bebas terbatas
13. **LUCTAMOLD HC 1777Z** **Lucta SA., Spanyol/Agrotech Veterindo Jaya**
Bentuk Sediaan serbuk **Komposisi** mengandung Natrium propionat, Amonium propionat, Asam propionat, Asam asetat **Indikasi** Antifungi pada pakan ternak dan bahan baku pakan ternak **Dosis dan cara pemakaian** tergantung tingkat kontaminasi dari 0.25 sampai 3.0 Kg/ton pakan ternak atau bahan baku pakan ternak **Kemasan** kantong 25 Kg **Deptan RI** No. I. 02102479 PTS. Obat bebas terbatas.
14. **MOLDSTOP ML** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung propionic acid, formic acid, sorbic acid, lactic acid, citric acid dan ortho-phosphoric acid **Indikasi** Anti jamur pada pakan ternak **Kemasan** Drum 20 kg **Deptan RI** No. I.05092990 FTC Obat bebas terbatas

15. LEUCOSTOP

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk larut air **Komposisi** Tiap g mengandung sulfamonomethoxine 200 mg **Indikasi** Untuk mencegah dan mengobati penyakit “malaria-like disease” atau leucocytozoonosis pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pengobatan: 1 g/4-6 L air minum atau 1 kg/ton pakan selama tiga hari berturut-turut. Untuk pengobatan: 1 g/2 L air minum atau 1 kg/1-2 ton pakan diberikan selama 10-14 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Kementan RI No. D. 12124411 PKS.**

16. MOLDSTOP MYCO PLUS

Impextraco, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionate **Indikasi** Antijamur pada pakan hewan **Kemasan** Kantung 25 kg **Keterangan** lain Penggunaan dicampur dalam pakan **Deptan RI No. I.02112463 PKC** Obat bebas terbatas

17. MOLDSTOP SD PLUS

mpextraco, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionate **Indikasi** Antifungi pada pakan ternak **Kemasan** Kantung 25 kg **Keterangan** lain Penggunaannya dicampur dalam pakan **Deptan RI No. I.02112455 FTS** Obat bebas terbatas

18. MYCOCURB

**Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd,
Singapore/Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**

Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** Mengandung asam propionat 65%, asam sorbat, asam benzoat, asam asetat dan BHA **Indikasi** Anti jamur cairan yang ditambahkan dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-1.000 g/ton pakan ternak. Bahan baku pakan (biji-bijian): 1 L/ton (untuk kelembaban 14%), 2 L/ton (kelembaban 14%-16%) **Kemasan** Drum 200 kg **Deptan RI No. I. 06033054 FTC.** Obat bebas terbatas

19. MYCOCURB AW LIQUID

**Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd,
Singapore/Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Megandung asam propionat 55%, asam sorbat, asam fosfat, surfaktan dan antioksidan **Indikasi** Anti jamur yang berguna untuk mempertahankan/meningkatkan kadar air dan kualitas pakan. Memperpanjang masa simpan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan **Kemasan** Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI No. I. 11114177 FTC.** Obat bebas terbatas

20. MYCOCURB EXTEND LIQUID

**Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd,
Singapore/Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Megandung asam propionat dan garamnya, surfaktan dan antioksidan **Indikasi** Sebagai anti jamur pada bahan baku pakan dan pakan ternak unggas dan babi serta memperpanjang masa simpan pakan/pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan **Kemasan** Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI No. I. 13034476 FTC.** Obat bebas terbatas

21. MYCOSTATIN – 20

Novartis (Taiwan) Co. Ltd, Taiwan/Novartis Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Nystatin **Indikasi** Antifungi pada unggas dan babi **Dosis dan cara pemakaian** Pemberian dicampur pakan untuk meningkatkan produktifitas dan mencegah infeksi jamur dengan dosis 0.5- 1.125 Kg/ton pakan terus menerus,

untuk pengobatan crop mycosis 2.25 Kg/ton pakan selama 7-10 hari **Kemasan** Kantung 25Kg
Deptan RI No. I. 0603919 PTS. Obat bebas terbatas.

22. **NOVASIL PLUS** **Impextraco, Beliga/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung CaO, MgO, Fe₂O₃, Na₂O, MnO, Al₂O₃ dan SiO₂ **Indikasi** Anti mikotoksin pada pakan unggas dan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022878 FTS. Obat bebas terbatas
23. **SALSTOP SD** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam format **Indikasi** Antifungi pada pakan jadi atau bahan baku pakan Keterangan lain Penggunaannya dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I.02112456 FTS Obat bebas terbatas.
24. **TERMIN 8 LIQUID** **Corp., USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung formaldehid, asam propionat, terpenes alami **Indikasi** Antifungi pada bahan baku pakan ternak dan pakan ternak **Kemasan** Drum HDPE 200 kg, 1000 kg **Deptan RI** No. I.07116123 FTC 2 Obat bebas terbatas.
25. **YUCOMY – 20 – POWDER** **Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd.,**
Malaysia/Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung nystatin 20 g **Indikasi** Antifungi pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pengobatan infeksi jamur: campurkan 2,250 g obat ke dalam tiap ton pakan. Berikan selama 7–10 hari berturut-turut **Kemasan** Kantong 20 kg **Kementan RI** No. I. 11114179 PTS. Obat keras.****

ANTI PROTOZOA

01.06

1. **AGRICOX-10** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Cairan. Komposisi tiap L mengandung diclazuril 10g. **Indikasi** efektif membunuh semua stadium pertumbuhan *Eimeria* sp. Penyebab koksidiosis pada unggas..
Dosis dan cara pemakaian 1 ml/ 1–2 L air minum selama 2–3 hari berturut-turut. **Kemasan** 100ml dan 1 L. **Deptan RI** No. D. 04032733 PTC. Obat bebas terbatas.
2. **AMERIA** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Serbuk Soluble Komposisi Tiap g mengandung Amprolium HCl 120 mg, Fradiomycin sulfat 68 mg, Papaverin 20 mg **Indikasi** Mengobati koksidiosis dan diare **Dosis dan cara pemakaian** Ayam 1 g per L air minum, selama 5 hari berturut-turut Hewan besar 1g per 8 Kg BB, Hewan kecil 1 g per 4 Kg BB Waktu Henti Obat 1 hari **Kemasan** Sachet 100g, dus 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg **Deptan RI** No. D 06091151 PKS.1. Obat keras.
3. **AMIDURENE** **Laboratories Biove, France/ Primavindo Sejahtera Pratama**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi sulfadimethoxine **Indikasi** antikoksidia **Dosis dan cara pemakaian** 2.5 ml/2 L **Kemasan** botol 50 ml, 200 ml, 1 L. **Deptan RI** No. I. 07073234 PKC. Obat keras.
4. **AMPROL 12 %** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi setiap 100 ml mengandung Amprolium HCl 12 g. **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan Koksidiosis yang disebabkan oleh semua *Eimeria* spp. **Dosis dan cara pemakaian** pada kasus biasa 1 ml per L air minum diberikan selama 5 – 7 hari, pada kasus berat 2 ml per L air minum selama 5 – 7 hari. Untuk pencegahan 0,5 ml per L air minum pada periode rentan. **Kemasan** 1 L, 5 L, 10 L. **Deptan RI** No. I. 03052583 PTC. Obat bebas terbatas.
5. **AMPROL 20%** **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Amprolium HCl **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Koksidiasis ringan 600 g Amprol 20% dalam 1000 L air (120 mg/L) 5-7 hari Koksidiosis berat 600 g Amprol 20% dalam 500 L air (240 mg/L) selama 3 hari. **Kemasan** Sachet 600 gr **Deptan RI** No. D 06073088 PTS. Obat bebas terbatas.
6. **AMPROLIN-300 WS** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi tiap g mengandung Amprolium HCl 300 mg **Indikasi** pengobatan koksidiosis pada unggas dan domba **Kontra Indikasi** penderita gangguan fungsi ginjal dan hati **Dosis dan cara pemakaian** unggas 1 g per 2 L air minum selama 5 hari, domba pencegahan 1 g per 60 Kg BB, pengobatan 1 g per 30 Kg BB selama 21 hari **Kemasan** 100g, 500g, 1000 g, 25 Kg **Kementan RI** No. I 1101945 PKS.1. Obat bebas terbatas.

7. **AMPROLIUM 20 % WS** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amprolium Hydrochloride 20 % **Indikasi** Pengobatan koksidirosis pada unggas **Peringatan** Pemberian obat dihentikan 10 hari sebelum hewan dipotong. **Kontra Indikasi** tidak ada **Dosis dan cara pemakaian** 1,2 gram per liter air minum diberikan selama 5 – 7 hari. **Kemasan** 1 Kilogram **Deptan RI No. D.06041481PTS.1** Obat bebas terbatas.

8. **AMPROMIX 25** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung amprolium **Indikasi** Antikoksidia pada unggas dan kalkun **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan unggas **Kemasan** Dos 25 kg @ 5 kg **Deptan RI No. D. 1204409 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

9. **AMPROSOL 20** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung amprolium HCl 200 g **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan koksidirosis yang disebabkan oleh semua Eimeria spp. secara dini pada generasi I dan II schizont **Dosis dan Cara Pemakaian** 3-20 g dilarutkan dalam 5 L air minum dan diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 1203495 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

10. **AMPUCOCCIN-S** **Korea Thumb Vet/ SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amprolium **Indikasi** treatment koksidirosis **Dosis dan cara pemakaian** 30g/50 L **Kemasan** botol 30 g, 300 g, 500 g, 1 kg **Deptan RI No. I. 07073232 PKS.** Obat keras.

11. **ANCOXIN** **ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung amprolium 166,7 g dan Na sulfakuinoksalin 166,7 g **Indikasi** Anti koksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** **Pencegahan:** 60 g/100 L air minum selama 2-4 hari. **Pengobatan:** 60 g/100 L air minum selama 3 hari, 2 hari istirahat lalu diteruskan pemberiannya selama 2 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 150 g dan kaleng 1 kg **Kementan RI No. I. 1211623 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

12. .

13. **ANTI KOKSI** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Sulfaquinoxaline sodium 36 mg dan Pyrimethamine 9 mg **Indikasi** Koksidirosis pada caecum maupun usus. **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. **Dosis dan cara pemakaian** **Pencegahan** 0,3 ml tiap Kg BB atau 1 tutup kemasan tiap 5 L air minum, diberikan selama 3 hari berturut-turut.. **Pengobatan** 0,3 ml tiap Kg BB atau 1 tutup kemasan tiap 5 L air minum, diberikan secara 3-2-3, yaitu 3 hari dengan obat, 2 hari air minum biasa, lalu 3 hari berikutnya dengan obat. **Kemasan** Botol plastik isi 100 ml, 1.000 ml. dan Jeriken isi 5 L, 20 L. **Deptan RI No. D 0606451 PTC.2.** Obat bebas terbatas.

14. **AVATEC** **Alpharma, Inc, USA/ Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Lasalocid 15% **Indikasi** Untuk pengendalian koksi pada unggas khususnya *E. tenella* dan *E. maxima*, pada ayam broiler, parent stock dan pullet. **Dosis dan cara pemakaian** 500-833 g/ton pakan **Kemasan** Kantong, 25 Kg **Deptan RI** I. 05101981 PTS.1. Obat bebas terbatas.
15. **AVATEC 20%** **Alpharma Inc, USA/ Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Lacosid sodium **Indikasi** Pencegahan coccidiosis pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** **Kemasan** Kantong 25 g **Deptan RI** No. D. 08083477 PKS. Obat keras.
16. **AVICOC** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap gram mengandung Sulfamonomoxaline sodium 180mg, Diaveridine 60 mg, Vitamin A 10.000 IU, Vit K3 250 mg, **Indikasi** Antikoksidia yang bekerja pada generasi kedua Schizonts, efektif untuk pengobatan caecal dan intestinal coccidiosis pada unggas, kalkun dan kelinci **Dosis dan cara pemakaian** 1 g per 2,5 L air minum, atau 100g untuk 1000 kgBB dengan sistem 323 **Kemasan** sachet 100 g, pot 500 g **Deptan RI** No. 02081219 PTS TM. Obat bebas terbatas.
17. **BAYCOX 2,5%** **Bayer Thai Co.Ltd, Thailand /Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan dalam. **Komposisi** 35 mg Toltrazuril. **Indikasi** Untuk pengobatan dan kontrol terhadap tanda – tanda coccidiosis pada babi dan sapi. **Dosis dan cara pemakaian** 28ml/100 kg BB selama 2 hari berturut – turut diberikan dalam air minum selama 8 – 24 jam. **Kemasan** Botol 1 liter. **Kementan RI** No. I. 07111088 PKC.3. Obat keras.
18. **BAYCOX 5%** **OLIC (Thailand) Limited Thailand, Untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand /Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan dalam. **Komposisi** setiap ml mengandung 50 mg Toltrazuril. **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan coccidiosis pada babi muda yang disebabkan oleh Isospora suis dan coccidiosis pada sapi yang disebabkan oleh Eimeria zuernil dan Eimeria alabamensis **Dosis dan cara pemakaian** Babi : 1 ml/babi muda (3-5) hari. Sapi : 3 ml/10 Kg BB. Peringatan: Tidak boleh digunakan pada hewan menyusui yang memproduksi susu untuk konsumsi manusia. **Kemasan** Botol plastik @ 100 ml, 500 ml dan 750 ml. **Deptan RI** No. I. 10023799 PKC Obat keras
19. **BERCOX** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Oral solution **Komposisi** Tiap ml mengandung Toltrazuril 25 mg **Indikasi** Kontrol dan pencegahan koksidirosis **Dosis dan cara pemakaian** Broiler 1 ml per L air minum, berikan selama 2 hari secara terus-menerus atau 3 ml per L air minum selama 8 jam, berikan 2 hari berturut-turut, Layer 2 ml per L air minum selama 8 jam, berikan 2 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L **Deptan RI** No. D 04062784 PKC. Obat keras.

20. **BIAMINTHIC 5%** **Laboratories Biove, France/Primavindo Sejahtera Pratama**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** levamisole Hcl **Indikasi** internal parasitosis. **Dosis dan cara pemakaian** 4 ml/L. **Kemasan** Botol 250 ml. 1 L. **Deptan RI** No. I. 07073235 PTC. Obat bebas terbatas.
21. **BIAPRIM BUVABLE** **Laboratories Biove, Perancis/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sulfadimetoksin dan trimetoprim **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang peka terhadap sulfadimetoksin dan trimetoprim pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol HDPE 125 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 08023387 PKC. Obat keras
22. **BIAVREM** **Laboratories Biove, Perancis/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung levamisol dan niklosamid **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi cacing yang sensitif levamisol dan askaridiosis maupun taeniasis pada anjing dan kucing **Kemasan** Box berisi 2 blister @ 6 tablet **Deptan RI** No. I. 07073237 PKC. Obat bebas terbatas
23. **BIOCOX** **Alpharma, Inc, USA/ Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Salinomycin 12.5% **Indikasi** Untuk pengendalian infeksi koki pada unggas yang disebabkan oleh *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. brunetti* dan *E. mivati* pada ayam pedaging, ayam pejantan, dan ayam pengganti pada bibit dan petelur. **Dosis dan cara pemakaian** 367–550 g per ton pakan **Kemasan** Kantong, 25kg **Deptan RI** I.0507651 FTM.1. Obat bebas terbatas.
24. **BIO LEUCO** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung sulfamonomethoxine 5 g dan pyrimethamine 1 g **Indikasi** Untuk mengobati penyakit malaria (Leucocytozoonosis) **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegaha: broiler: 1 ml/2 L air minum, selama 2 hari setiap minggu sampai 5 minggu. Layer: 1 ml/2 L air minum, selama 2 hari setiap minggu sampai 30 minggu. Pengobatan: broiler: 1 ml/L air minum, selama 2-4 hari. Dilanjutkan dengan dosis pencegahan sampai 4 minggu. Layer: 1 ml/L air minum, selama 2-4 hari. Dilanjutkan dengan dosis pencegahan sampai 29 minggu **Kemasan** Botol 1 L dan 100 ml **Kementan RI** No. D. 12094342 PKC. Obat bebas terbatas
25. **BIO TOLTRA 2.5** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung toltrazuril 25 g **Indikasi** Untuk mengobati coccidiosis pada unggas. Ayam: *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria necatrix* dan *Eimeria tenella*. Kalkun: *Eimeria adenoides*, *Eimeria meleagridis*, dan *Eimeria meleagrimitis* **Dosis dan Cara Pemakaian** 7 mg/kg bb selama 2 hari berturut-turut 24 jam secara terus menerus atau selama 8 jam setiap harinya dalam air minum **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Kementan RI** No. D. 12104370 PKC. Obat bebas terbatas

26. **BIOPROL-20** **Biotech Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** setiap g Bioprol-20 mengandung Amprolium 200 mg
Indikasi untuk mencegah dan mengobati koksidirosis pada unggas **Dosis dan cara pemakaian**
3 g / 5 L air minum, selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan**
RI No. D. 07093290 PKS. Obat keras.
27. **CAPRICOXI®** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Sulfaquinoxaline, Diaveridine, Vitamin K3
Indikasi Mengobati dan mencegah coccidiosis (berak darah) pada ayam/unggas **Peringatan**
Pemotongan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan**
cara pemakaian Larutkan 2 g per 1 L air minum. Berikan dengan sistem 3 : 2 : 3 (3 hari
CAPRICOXI, 2 hari air biasa, 3 hari CAPRICOXI). Bila perlu seminggu kemudian diulang
lagi dengan sistem 3 : 2 : 3 dengan dosis yang sama **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 5 Kg, 50 Kg
Deptan RI No D. 07093296 PKS. Obat keras.
28. **CAPZURIL®** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Toltrazuril **Indikasi** mengobati coccidiosis
pada unggas **Peringatan** pemotongan hewan dapat dilakukan 19 hari setelah pemberian obat
dihentikan **Dosis dan cara pemakaian** larutkan 1 ml per 2 L air minum. Dapat diberikan
selama 2 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No D. 07113340 PKC.
Obat keras.
29. **CEVAZURIL** **Ceva Sophavet, Maroko/ Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Toltrazuril **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan
koksidirosis pada broiler, pullet dan breeder yang disebabkan oleh *Emeria sp* **Dosis dan Cara**
Pemakaian. 7 mg toltrazuril per kg bb diberikan selama dua hari berturut-turut atau sama
dengan 28 mL Cevazuril® per 100 kg bb per hari selama dua hari berturut-turut. Keterangan
lebih lanjut dapat dilihat pada kemasan. **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I.
07103321 PKC. Obat keras.
30. **CIPLOX 10% W/V** **CIPLA Ltd, India/Paeco Agung**
Bentuk Sediaan: Cairan **Komposisi:** Siprofloksasin **Indikasi:** untuk pengobatan Salmonellosis,
Colibacillosis, fowl cholera, infectious coryza, streptococcus, wing rot, CRD dan CRD
kompleks. **Dosis dan Cara Pemakaian:** 10 mg/kg Berat Badan, berikan melalui air minum
selama 5-7 hari. **Kemasan:** Botol 100 ml, 500 ml dan 1 Liter **Kementan RI** No. I. 11084137
PKC
31. **CLINACOX** **Janssen Pharmaceutica, Belgia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Diclazuril 0.5% **Indikasi**
Antikoksidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Pemakaian dicampur pakan
200 g per ton pakan (1 ppm) **Kemasan** Kantung 20 Kg **Deptan RI** No. I. 03051360
FTS.2. Obat bebas terbatas.

32. **COCCICHEM WS** **Dae Sung Microbiological Labs-Korea/Saka Menara Alam**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1000 gr mengandung 166.7 gr Amprolium dan 166.7 Sulfaquinoxalin **Indikasi** Pencegahan dan pengendalian penyakit Coccidiosis **Dosis dan Cara pemakaian** Dicampur 3 gr per 5 Liter air minum selama 2-3 hari. **Kemasan** Sachet 500 gr dan 1000 gr **Deptan RI** No. I. 04052757 FTS. Obat bebas terbatas
33. **COCCIMASTER** **Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri**
Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Setiap kg mengandung amprolium 166,7 g dan sulfaquinoxaline 166,7 g **Indikasi** Coccidiosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lewat air minum 6 g/10 L air minum **Waktu Henti Obat** Unggas 7 hari **Kemasan** Sachet aluminium foil 1 kg **Kementan RI** No. I. 1202435 PTS. 1. Obat bebas terbatas
34. **COCCIN** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung amprolium 200 g, sulfaquinoxaline 150 g, vitamin A 25 g dan vit K3 5 g **Indikasi** Efektif untuk intestinal dan caecal coccidiosis akut dan ironis. Bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan dan perkembangan Eimeria sp. Dilengkapi dengan bitamin A untuk mempercepat persembuhan usus yang rusak dan vitamin K3 untuk mempercepat proses pembekuan darah di usus **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 g/2 L dengan sistem 3-2-3. Pengobatan: 1 g/1 L dengan sistem 3-2-3 atau 100 g/500-1.000 kg BB **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. D. 0704956 PTS. 1. Obat bebas terbatas
35. **COCCIPLUS** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sulfaquinoxaline 160 g, diaveridin 40 g dan vitamin K3 9 g **Indikasi** Sebagai antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 g/2 L air minum. Pengobatan: 1 g/L air minum diberikan selama 2-3 hari berturut-turut, 2 hari dihentikan, dilanjutkan kembali selama 2-3 hari berikutnya **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg @ 100 g, 20 kg @ 100 g dan 50 kg @ 100 g **Deptan RI** No. D 10113939 PTS. Obat bebas terbatas
36. **COCCIREX** **S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung 4,4 g Sodium sulfakuinoksalin dan 1,2 gram Pirimetamin. **Indikasi** Pengobatan penyakit koksidirosis pada unggas. **Dosis dan cara pemakaian** Melalui air minum selama 3 hari, 1,5ml/liter, hentikan pengobatan selama 2 hari lalu dilanjutkan kembali dengan dosis yang sama selama 3 hari berikutnya. **Kemasan** 100 ml, 1 liter & 5 liter. **Kementan RI** No. I. 01021834 PTC.1 Obat bebas terbatas
37. **COCCIROL S** **Choong Ang Biotech, Korea/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap Kg mengandung Amprolium 166.7 g, Sulfakuinoksalin 166.7 g. **Indikasi** Mengobati koksidirosis pada ayam. **Dosis dan cara pemakaian** 3 g dalam 5 L air minum, aduk hingga rata, berikan 3 hari, istirahat 2 hari, berikan lagi selama 3 hari. **Kemasan** 30 gr, 1 Kg, 25 Kg. **Deptan RI** No. I. 01091998 PTS.1. Obat bebas terbatas.

38. COCCISOL

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** setiap g mengandung Amprolium 167 mg, Sulfaquinoxaline 167 mg, Vitamin A 4,5 mg, Vitamin K 1,5 mg **Indikasi** untuk mengobati koksidiosis pada saluran pencernaan unggas, vitamin A dan K yang bersifat mempercepat kesembuhan luka dan menghentikan pendarahan akibat *Eimeria* sp **K Dosis dan cara pemakaian** 3 g / 5 L air minum, selama 3-7 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI** No. D. 08051816 PTS.2. Obat keras.

39. COCCIVAC – D

Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Eimeria acervulina, E. Brunetti, E. Hagani, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, E. praecox dan E. tenella **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit koksidia pada layer dan breeder **Perhatian** Pakan tidak boleh mengandung coccidiostat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis, melalui spray pada pakan umur 3-5 hari **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 5.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0406669 VKC. 2. Obat keras

40. COCCIVET

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Sulfaquinoxaline 50 g. Vitamin A 6 g dan Vitamin K 2 g **Indikasi** Antikoksidia unggas. **Dosis dan cara pakai** Unggas 2 g Coccivet per L air minum selama 3 hari, 2 hari tidak diberikan dan dilanjutkan 3 hari kemudian. **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 Kg **Deptan RI** No. D. 05072956 PTS.TM. Obat bebas terbatas.

41. COCCIVEX

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung 20 g Amprolium HCl dan 1,5 g Etopabate **Indikasi** Pengobatan penyakit koksidiosis pada unggas. **Dosis dan cara pemakaian** Melalui air minum selama 3-4 hari, 1ml/liter dan 3 hari berikutnya dengan dosis 0,5ml/liter. Pada kasus yang akut, pengobatan dapat dilanjutkan dengan dosis 0,3 ml/liter selama 1 minggu. **Kemasan** 1 liter **Deptan RI** No. I. 03122118 PTC.1 Obat bebas terbatas

42. COCCIVIT

SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Sulfaquinoxaline, Diaveridine **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** 20 ml/3.2 L air **Kemasan** Botol 100 ml dan jirigen 1 liter **Deptan RI** No. D 02101958 PTC.1. Obat bebas terbatas.

43. COCOSTOP PLUS

Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Amprolium dan Sodium sulfakuinoksalin **Indikasi** Pengobatan terhadap koksidiosis pada unggas. **Dosis dan cara pemakaian** 60 g./100 liter air minum selama 7 hari berturut-turut. **Kemasan** 100 gram, 500 gram dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 0107657 PTS Obat bebas terbatas

44. COCCOXIN

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Amprolium dan Sulfaquinoxaline **Indikasi** Pengobatan koksidiosis pada ayam. **Peringatan** Simpan di tempat yang kering dan terhindar sinar matahari

langsung dan waktu henti obat – 10 hari. **Dosis dan pemakaian** Berikan secara oral melalui air minum 6 gram/10 L air minum 7 hari. **Kemasan** Bag 1 kg **Deptan RI** No. I. 10103919 PKS. Obat keras.

45. **COCOSTOP PLUS** **Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung amprolium dan sodium sulfakuinoksalin
Indikasi Pengobatan terhadap koksidirosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 g/100 L air minum selama 7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1 kg **Kementan RI** No. I. 1211657 PTS. 1. Obat bebas terbatas
46. **CORITRIME** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap gram mengandung Trimethoprim Sodium 40 mg, Sulfadimethoxine sodium 200 mg **Indikasi** Pada unggas pengobatan Snot, Colibacillosis, Salmonellosis (berak kapur). Pada babi dan anak sapi untuk pengobatan *bacterial pneumoenteritis*, *Pasteurellosis*, *Atropic rhinitis* dan *Colibacillosis*. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 1 g Coritrim per 2 L air minum. Berikan 3-5 hari berturut – turut. Babi dan anak sapi 13 g per kgBB **Kemasan** sachet 100 g **Deptan RI** No D 02102475 PKS TM. Obat keras.
47. **COXABIC** **AAKO BV, Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung gametocyte protein dari eimeria maxima
Indikasi Pencegahan terhadap penyakit koksidirosis pada induk unggas (breeder) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 07033183 VTC. Obat bebas terbatas
48. **COXIXLIN** **WOOGENE B&G, KOREA/Agro Makmur Sentosa**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap kg mengandung toltrazuril 25 g **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan coccidiosis pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/L air minum selama 2 hari dan diberikan lagi setelah 5 hari **Kemasan** 1 L **Kementan RI** No. I. 11124189 PTC
49. **COXY** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Sodium Sulfaquinoxaline. 82,5g, Vit. A 2.500.000 IU, Vit. K3 1,250 g **Indikasi** Koksidirosis, Kolera **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. **Dosis Dan Cara Pemakaian** Pengobatan Koksidirosis 5 g tiap L air minum. Pemberian secara 3-2-3 (3 hari dengan Coxy, 2 hari air minum biasa, lalu 3 hari berikutnya dengan Coxy). Cara ini diteruskan sampai gejala penyakit hilang. Kolera 3,75 g tiap L air minum, diberikan selama 6 hari berturut-turut. Pencegahan 2,5 g tiap 2 L air minum, diberikan mulai ayam berumur 2-3 minggu secara 3-2-3 dan diulang tiap 2 minggu sampai umur 2 bulan. **Kemasan** Sachet aluminium isi 5 g, 10 g. Gelas isi 100 g. Wadah plastik isi 500 g, 1 Kg. Tin isi 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg. Drum isi 50 Kg. **Deptan RI** No. D 0711176 PTS.2. Obat bebas terbatas.

50. COXY FORTE

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Sodium Sulfaquinoxaline. 412,5g, Vit. A 12.500.000 IU, Vit. K3 6,25 g **Indikasi** Koksidiosis, Kolera **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. **Dosis Dan Cara Pemakaian Pencegahan:** 0,1 gram tiap kg berat badan atau 0,5 gram tiap liter air minum. Pemberian secara 3-2-3 yaitu 3 hari dengan **COXY FORTE**, 2 hari air minum biasa, 3 hari lagi dengan **COXY FORTE** **Pengobatan:** Koksidiosis : 0,2 gram tiap kg berat badan atau 1 gram tiap liter air minum diberikan secara 3-2-3, Kolera : 0,15 gram tiap kg berat badan atau 0,75 gram tiap liter air minum diberikan selama 6 hari berturut-turut. **Kemasan** Sachet aluminium isi 100 g, **Deptan RI No. D** 08033396 PKS. Obat Keras

51. COXYMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Per liter mengandung Diclazuril 25 g **Indikasi** Mengobati coccidiosis yang disebabkan *Eimeria* spp pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Oral; unggas 20 ml /50 liter air minum selama 2-3 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. D.** 08013379 PKC. Obat keras.

52. DAIMETON B INJEKSI 20%

SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung sulfamonemethosine **Indikasi** Antikoksidia untuk unggas, hewan kecil, sedang dan besar serta bersifat sebagai antibakteri **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. I.** 05040441 PKC. 1. Obat keras

53. D-NOX[®]

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Sulfaquinoxaline, Diaveridine **Indikasi** Mengatasi Coccidiosis dan malaria pada unggas. **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 g dilarutkan dalam 4 L air minum diberikan dengan sistem 3 : 2 : 3. **Kemasan** 100 g, 1000 g, 5 Kg, 50 Kg. **Deptan RI No. D.** 0403284 PTS.3. Obat bebas terbatas.

54. DIACOX

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** setiap 100 ml mengandung Diclazuril 2,5 g, Monoethanolamin (pembasa) 35 g, Nipagin 1,2 g, Nipasol 0,8 g, Propylene glycol 70,5 g, Air qs 100 ml. **Indikasi** Bekerja efektif membunuh semua spesies *Eimeria* penyebab koksidiosis pada unggas seperti *E. Tenella*, *E. Nicatrix*, *E. Acervulina*, *E. Bruneti*, *E. Mitis*. **Kontra Indikasi** Tidak dianjurkan untuk digunakan pada ayam petelur yang sedang berproduksi. **Dosis dan cara pemakaian** larutkan 2 ml Diacox dalam 5 L air minum. Berikan selama 3-5 hari berturut turut. Waktu henti obat 5 hari sebelum ayam dipotong. **Deptan RI No. D.** 0206992 PTC. Obat bebas terbatas.

55. DIACOXIN 5%

Diasham Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung toltrazuril **Indikasi** Antikoksidia pada anak

babi Dosis dan Cara Pemakaian Per oral Kemasan Botol 100 ml dan 1 L Kementan RI No. I. 12064283 PTC. Obat bebas terbatas

56. **DIACOXIN WS** **Diasham Pte Ltd, Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Toltrazuril **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit koksidirosis pada unggas **Dosis dan cara pemakaian 0.28 ml** **Kemasan** Botol HDPE 100ml, 200 ml, 1 liter dan 5 liter **Deptan RI** No. I. 08093489 PKC. Obat keras.
57. **DICLACEV PREMIX** **Cevasa SA, Argentina/Biotek Sarana Industri**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi mengandung diclazuril 5 g/Kg **Indikasi** antikoksidia non ionophor untuk mengendalikan *Eimeria* penyebab koksidirosis pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** 200 gram untuk 1 ton pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09053615 PTS. Obat bebas terbatas.
58. **DICLACOX** **AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Powder. Komposisi 1 g Diclacox Premix mengandung Diclazuril 2 mg. **Indikasi** Untuk pencegahan terhadap penyakit koksidirosis yang disebabkan oleh E.Tenella, E.Necatrix, E.Acewulina, E.Brumetti, E.Mitis, dan E.Maxima. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas, kalkun dan kelinci campurkan 500 g Diclacox pada 1 ton pakan. Rekomendasi Campur 1 bagian Diclacox pada Intermediate mix dan 9 bagian campur pada pakan jadi. **Kemasan** Aluminium foil untuk 500 g dan 1 kg, Plastik bag untuk 25 kg. **Kementan RI** No: I. 11013982 FTS
59. **DINAPROL** **Univetama Dinamika**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Sulfaquinoksalin, Amprolium HCl, Vitamin A, Vitamin K3 **Indikasi** Pengobatan terhadap koksidirosis pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** lihat kemasan **Kemasan** 100g, 250g, 500g, 1Kg, 5kg, 40kg **Deptan RI** No. D. 08101389 PTS.1. Obat bebas terbatas.
60. **DURACOX HC** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung sulfaquinoxaline 40 g dan diaveridin 20 g **Indikasi** Sebagai antikoksidiosis **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g/1 L air minum atau 400 mg/kg BB dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut Waktu Henti Obat 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** 100 g dan 1 kg sachet alufoil, dus 10 kg @ sachet alufoil 100 g, drum plastik 20 kg @ sachet alufoil 100 g, dan drum plastik 50 kg @ sachet alufoil 100 g **Deptan RI** No. D. 08123531 PKS. Obat keras
61. **EMBACOX** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap g mengandung Sulfaquinoksalina 82,5 mg, Vit. A2.400 UI, Vit. K3 0,5 mg **Indikasi** anti koksidia dan pasteurellosis **Dosis dan cara pemakaian** Pengobatan caecal coccidiosis 5 g/L. Air minum dengan sistim 3233 Pengobatan

Pasteurellosis (Fowl Cholera) 5 g/L air minum selama 6 hari berturut **Kemasan** 100 g, 1 Kg.
Deptan RI No. D. 0411249 PTS.3 Obat bebas terbatas.

62. **ESB – 3 (30%)** **Shanghai Novartis Animal Health Ltd, China/ Novartis Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Sulfakloropirazin **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Pemakaian melalui air minum dengan doisi 20-30 mg ESB-3/Kg BB atau 1 g ESB-3/ 10 L air minum pada umur 11 hari di berikan selama 7-10 hari, melalui pakan dengan dosis 50-100 gr ESB-3 per ton pakan **Kemasan** Kantung Plastik 250 g **Deptan RI** No. I. 0202049 PTS.2. Obat bebas terbatas.
63. **HENCOX** **Hendy Pharmindo Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Amprolium 166,7g Sulfaquinoxaline 166,7 g **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan coccidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Pencegahan 1g Hencox 2 L air minum berikan selama 3 hari berturut-turut Pengobatan 1 g Hencox L air minum dengan systim 323 (3 hari dengan hencox, 2 Hari air biasa, 3 hari dengan Hencox) **Kemasan** 100g, 250g, 1Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25Kg, 50Kg. **Deptan RI** No. D. 04062786 PTS. Obat bebas terbatas.
64. **ENTRACOX ORAL** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** tiap ml mengandung Toltrazuril 25 mg **Indikasi** koksidirosis semua stadium seperti skizogoni dan gametogoni dari *Eimeria spp.* pada anak kambing, anak domba, anak babi dan unggas **Peringatan** berikan pengobatan melalui air minum sebagai satu-satunya sumber air minum. Hanya untuk breeder ayam dan ayam petelur dengan umur maksimum 16 minggu **Dosis dan cara pemakaian** Untuk pemberian per oral. Anak kambing dan anak domba 4,0 ml per 5 kg berat badan melalui air minum atau susu satu hari sekali; Anak babi 2,0 ml per 2,5 kg berat badan selama minggu pertama antara umur 3-5 hari. Hanya satu kali pengobatan bila diperlukan; Unggas 500 – 1500 ml per 500 liter air minum selama 2 hari. (dosis harian 7,0 mg per kg berat badan) **Kemasan** Botol 1000 ml **Deptan RI** No. I. 09033589 PKC. Obat keras.
65. **FLUBENZIM 5%** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Bubuk **Komposisi** Mengandung flubendazole 50 g **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan infeksi cacing pada babi dan unggas. Bersifat vermisidal, larvasidal dan ovisidal Perhatian Hindari kontak langsung dengan kulit, mata dan selaput lendir. Sebaiknya gunakan sarung tangan Dosis dan Cara Pemakaian Diberikan bersama pakan. Babi: 0,6 kg/ton pakan. Unggas: 1,2 kg/ton pakan **Kemasan** 1 kg **Deptan RI** No. I. 0012752 PKS. Obat keras
66. **KATRIWORM** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung piperazine citrat 170 mg **Indikasi** Untuk membasmi cacing *Ascaris spp* pada ayam (*Ascaridia galli* & *Heterakis gallinarum*) dan pada babi (*Ascaris lumbricoides*, *Ascaris suum* dan *Oesophagostomum sp*) **Dosis dan Cara**

Pemakaian Ayam umur 4-6 minggu: 50 ml/2,5 L air minum (untuk 100 ekor). Ayam umur di atas 6 minggu: 100 ml/4-10 L air minum (untuk 100 ekor). Babi: 30 ml/45 kg BB **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 07043203 PTC. Obat bebas terbatas

67. **KEPCOX 2,5 % ORAL** **Kepro bv, Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi per ml larutan mengandung Toltrazuril 25 mg **Indikasi** Koksidirosis pada ayam dan kalkun. **Dosis dan cara pemakaian** Untuk pemberian oral, melalui air minum. Ayam dan kalkun 7 mg / kg BB selama 2 hari berturut – turut; terus menerus selama 24 jam atau selama 8 jam setiap hari. Atau 100 ml / 100 liter air minum selama 2 hari. Obat yang sudah dilarutkan dalam air minum harus digunakan dalam waktu 24 jam. **Kemasan** Botol 100 ml dan jerigen 1000 ml. **Deptan RI** No. I. 07043208 PTC. Obat bebas terbatas.
68. **KEPROMEC INJ.** **Kepro B.V., Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** Untuk pengobatan cacing gelang saluran pencernaan, cacing paru-paru, tempayak, cacing giling, larva lalat, kutu, caplak, tuma, dan tungau pada unta, sapi dan hewan-hewan lain yang sejenis **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk penyuntikan secara SC. Pada sapi, domba dan unta: 1 ml/50 kg BB **Kemasan** Vial 10 ml dan 50 ml **Deptan RI** No. DPS. I. 0403066 PKC. Obat bebas terbatas
69. **KEPROMEC ORAL** **Kepro B.V., Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** Pada unggas: untuk pengobatan parasit internal (nematoda, capillaria dll) dan parasit eksternal (kutu dan tungau). Pada domba: untuk pengobatan cacing saluran pencernaan baik yang dewasa dan yang belum matang (*Cooperia* spp, *Haemonchus* dll), cacing paru-paru baik yang dewasa dan yang belum matang (*Dictyocaulus filaria*), nasal bot semua stadium larva (*Oestrus ovis*). Pada kambing: untuk pengobatan cacing saluran pencernaan baik yang dewasa dan yang belum matang (*Haemonchus contortus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum* dll), cacing paru-paru dewasa (*Dictyocaulus filaria*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemberian oral. Pada unggas: 1 ml/6 L air minum (1 ml/20 ekor). Pada domba, kambing: 0,2 ml/10 kg BB. Untuk kontrol ektoparasit (kutu): ulangi pengobatan pada hari berikutnya **Kemasan** Can 1 L dan botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 07043206 PKC. Obat keras
70. **KLORIVAKS** **Vaksindo Satwa Nusantara**
Bentuk Sediaan Serbuk larut air Komposisi Setiap 100 g mengandung sulfachlorpyridazine 30 gr. **Indikasi** Untuk mengobati penyakit-penyakit *Cholera*, *Coccidiosis* dan *Salmonellosis*. **Peringatan** Hentikan pemberian 14 hari sebelum hewan dipotong. **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis untuk *cholera* dan *salmonellosis* larutkan 2 g dalam 1 L air minum, berikan selama 5 hari berturut-turut, dosis untuk *coccidiosis* larutkan 1 g dalam 1 L air minum dan berikan pengobatan selama 3 hari istirahat 2 hari, pengobatan 3 hari lagi, ayam petelur dan breeder diberikan beberapa minggu sebelum produksi dengan dosis 1 g per L air minum. **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g, kemasan induk 1 Kg dan 5 Kg **Deptan RI** No. D. 03022085 PTS.1 Obat bebas terbatas.

71. **KOKCISAN 120 G** **KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia/Behn Meyer Kimia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Sodium Salinomycin 120 gr/Kg **Indikasi** Sebagai antikoksidia pada unggas. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 500 gr/ton pakan. **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I.11044054 PTS. Obat bebas terbatas
72. **KOKSIDEX** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg mengandung Amprolium 100 g, Sulfaquinoxaline 100 g dan Vitamin K3 2 g **Indikasi** Koksidirosis **Dosis dan cara pemakaian** Pengobatan 1g tiap L air minum atau 0,2 g tiap Kg BB diberikan secara 3-2-3 diberikan secara 3-2-3 (3 hari dengan Koksindex, 2 hari air minum biasa, lalu 3 hari berikutnya dengan Koksindex). Pencegahan 1g tiap L air minum 0,2 g tiap Kg BB diberikan selama 3-4 hari berturut-turut. **Perhatian** Hentikan pemakaian obat 3 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi. **Kemasan** Sachet aluminium isi 5 g, 10 g. Gelas isi 100 g. Wadah plastik isi 500 g, 1 Kg. Tin isi 5 Kg. Ember isi 10 Kg, 15 Kg. Drum isi 20 Kg, 50 Kg. **Deptan RI** No. D 06081336 PTS.2. Obat bebas terbatas.
73. **KOKSINDO** **Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung Sulfaquinoxaline Sodium 170.000mg, Vitamin A 5.000.000 IU, Vitamin K3 2500 mg **Indikasi** Ampuh mengobati penyakit Koksidirosis dan Cholera pada unggas. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 2,5 g/ 2L air minum, berikan selama 5 hari berturut-turut. Untuk pencegahan berikan dengan sistem 3-2-3 yaitu 3 hari diberi 2,5 g/ 2 L air minum, 2 hari tanpa obat, 3 hari diberi 2,5 g/ 2 L air minum. **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI** No. D 03052585 PKS. Obat keras.
74. **LEUCOMAS** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap kg mengandung pyrimethamin dan sulfadimethoxine **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan malaria like (Leucocytozoonosis) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 ml/2,5 L air minum selama 14 hari. Pengobatan: 1 ml/L air minum dan diberikan selama 5 hari **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 09073658 PKC. Obat keras
75. **LEUCOSTOP** **Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Serbuk larut air Komposisi Tiap g mengandung sulfamonomethoxine 200 mg **Indikasi** Untuk mencegah dan mengobati penyakit “malaria-like disease” atau leucocytozoonosis pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pengobatan: 1 g/4-6 L air minum atau 1 kg/ton pakan selama tiga hari berturut-turut. Untuk pengobatan: 1 g/2 L air minum atau 1 kg/1-2 ton pakan diberikan selama 10-14 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Kementan RI** No. D. 12124411 PKS

76. MALADEX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung Pyrimethamine 1 g dan Sulfamonomethoxine 5 g **Indikasi** Mencegah dan mengobati malaria like (*leucocytozoonosis*). **Perhatian** Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum unggas dipotong untuk dikonsumsi. **Dosis dan cara pemakaian** Pencegahan 1 ml tiap 2 L air minum, diberikan selama 2 hari setiap minggu, sampai umur 5 minggu pada ayam daging dan jantan atau sampai umur 30 minggu pada ayam telur dan bibit. Pengobatan 1 ml tiap L air minum, diberikan selama 2-4 hari. Dilanjutkan dengan pencegahan selama 2 hari tiap minggu dengan dosis 1 ml tiap 2 L air minum, sampai umur 4 minggu pada ayam daging dan jantan atau sampai umur 29 minggu pada ayam telur dan bibit. **Kemasan** Botol plastik 1.000 ml **Deptan RI No. D. 0102434 PKC.** Obat keras.

77. MALAKILL

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Sulfadimethoxine 200 gram dan Pyrimethamine 20 gram **Indikasi** Pengobatan terhadap malaria, *leucocytozoonosis*, *coryza*, *snot*, *fowl cholera* dan *coccidiosis*. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas Malaria, leucocytozoonosis 1 g / 5 – 10 liter air minum, berikan selama 5 hari berturut – turut. Coryza/ snot; fowl cholera; coccidiosis 0,1375 – 0,275 g / kg BB atau 1 g / 1 liter air minum, berikan selama 3 – 5 hari berturut – turut. **Kemasan** Can 10 kg (sachet @ 100 g), can 10 kg (sachet @ 250 g), drum 30 kg (sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D. 08103500 PKS.** Obat keras.

78. MEDICOX SOLUTIN

Semu Median Ltd, Korea/Primavindo Sejahtera Pratama

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Toltrazuril **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit koksidiosis pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** 1 ml/L **Kemasan** Botol HDPE 1 L dan jerigen HDPE 5 L **Deptan RI No. I. 08083486 PKC.** Obat keras.

79. MONEVAXE – 20

**Shandong Jinyang Biological pharmaceutical Co. Ltd.,
China untuk Hangzhou Invaxe Medical Technology Co. Ltd., China/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung monensin 20% **Indikasi** Sebagai antikoksidia dan meningkatkan efisiensi pakan pada sapi, kambing, dan unggas **Perhatian** Tidak boleh diberikan pada kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 11-33 mg/kg pakan pada sapi. 5-20 mg/kg pada pakan kambing. 100-120 mg/kg pada pakan unggas **Kemasan** Kantong 10 kg dan 25 kg **Kementan RI No. I. 12074316 FTS.** Obat bebas terbatas

80. MYCOCURBAW LIQUID

Kemin Industries

(Asia) Pte, Ltd, Singapore/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Megandung asam propionat 55%, asam sorbat, asam fosfat, surfaktan dan antioksidan **Indikasi** Anti jamur yang berguna untuk mempertahankan/ meningkatkan kadar air dan kualitas pakan. Memperpanjang masa simpan pakan **Dosis dan**

Cara Pemakaian 1-2 kg/ton pakan **Kemasan** Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 11114177 FTC. Obat bebas terbatas

81. MYCOCURB EXTEND LIQUID

Kemin Industries

(Asia) Pte, Ltd, Singapore/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam propionat dan garamnya, surfaktan dan antioksidan **Indikasi** Sebagai anti jamur pada bahan baku pakan dan pakan ternak unggas dan babi serta memperpanjang masa simpan pakan/pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan **Kemasan** Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 13034476 FTC. Obat bebas terbatas

82. MYCOCURB

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** Mengandung asam propionat 65%, asam sorbat, asam benzoat, asam asetat dan BHA **Indikasi** Anti jamur cairan yang ditambahkan dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-1.000 g/ton pakan ternak. Bahan baku pakan (bijji-bijian): 1 L/ton (untuk kelembaban 14%), 2 L/ton (kelembaban 14%-16%) **Kemasan** Drum 200 kg **Deptan RI** No. I. 06033054 FTC. Obat bebas terbatas

83. NEW SQ-PLUS

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kilogram obat mengandung Sulfaquinoxaline sodium 40.000 mg, Amprolium HCl 40.000 mg. **Indikasi** Menyembuhkan penyakit Coccidiosis, Cholera, Thypoid, Pullorum dan penyakit pada saluran pencernaan lainnya pada unggas yang disebabkan oleh bakteri. **Dosis dan cara pemakaian** Ayam 5 g (1 sendok teh)/2 L air minum. **Kemasan** 10 g, 100 g, 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg dan 50 Kg. **Deptan RI** D. 0211254 PTS.2. Obat bebas terbatas.

84. NICLO – 75

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung niclosamide 75% **Indikasi** Untuk pengobatan cacing pita **Dosis dan Cara Pemakaian** 1.600 g/ton makanan sekali pemberian **Kemasan** 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. D. 09023552 PKS. Obat keras

85. NOROMECTIN INJECTION

Norbrook Laboratories, Inggris/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ivermectin **Indikasi** Antelmintik pada sapi **Kemasan** Vial 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 03102665 PKC. Obat keras

86. PIPERAZINE – 36

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung 1.000 g piperazine citrat **Indikasi** Pengobatan cacing gelang, tambang dan kait pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 200 mg/kg BB 6 kg/ton makanan atau 2,5 g/L air minum selama 1 hari pengobatan. Pengobatan diulang setiap 7–8 minggu sekali **Kemasan** 1 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 0012855 PKS. Obat keras

- 87. POWERMEC SOLUTION** **Cheil Bio Co. Ltd., Korea/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung ivermectin **Indikasi** Anti ektoparasit dan endoparasit pada unggas, sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Per oral **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI** No. I. 12124401 PKC. Obat keras
- 88. PRIMA AMPROFURA-77** **MJPF FFarma Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi tiap kg mengandung Amprolium HCL 200 g, Sulfaquinoxaline sodium 200 g, Carrier q.s. **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan *Coccidiosis* pada unggas. **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100g, 500 g **Deptan RI** No. D.02122504 PTS Obat bebas terbatas.
- 89. PRIMA COCCI PLUS** **MJPF Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi setiap liter mengandung *Sulphaquinoxaline* 4.0 g dan Pyrimethamine 1.2 g **Indikasi** Mencegah dan Pengobatan infestasi koksidiosis (berak darah) pada unggas seperti *E.tenella*, *E.necatrix*, *E. acervulina*, *E.mitis*, *E.maxima*, *E. brunetti* dan malaria unggas. **Dosis dan cara pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml, dan 1 liter. **Deptan RI** No. D.03022527 PTC Obat bebas terbatas.
- 90. PYRISIN-525** **Mitravet**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg Pyrisin-525 mengandung Sulfadimetoksin 250g. **Indikasi** untuk terapi Malaria unggas, *Coccidiosis*, *Cholera*, *Coryza* dan penyakit protozoa lainnya unggas. **Dosis dan cara pakai** Unggas 1 g Pyrisin-525 per 2 L air minum selama 3-5 hari. **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 Kg **Deptan RI** No.D 05062941 PTS.TM. Obat bebas terbatas.
- 91. QUINOXAN** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap Kg mengandung Sulfaquinoxalin 10%, Amprolium 10%, Vit A 2%, Vit K3 0,75% **Indikasi** Pengobatan dan pencegahan *Coccidiosis* pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Oral; Unggas 1 gr/1 lt air minum, diberikan dengan sistem 3 hari Quinoxan 2 hari air biasa 3 hari Quinoxan **Kemasan** Sachet 100 gr, 250 gr **Deptan RI** No. D. 04111531 PTS.2. Obat bebas terbatas.
- 92. SAQUADIL 50** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap g mengandung Sulfaquinoxaline 8 mg, Diaveridin 7mg **Indikasi** Anti koksidia pada unggas. DDCP Larutkan 20 ml dalam 3,2 L air minum, aduk sampai rata, pencegahan berikan dengan sistim 3–23, ulangi 1 minggu kemudian dan seterusnya selama umur 3–9 minggu pengobatan dengan sistim 3–2–3 **Kemasan** 125ml, 1L, 5L **Deptan RI** No. D 0506509 PTC. Obat bebas terbatas. 2 Obat bebas terbatas.
- 93. SAQUADIL 100** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung sulfaquinoxaline 16 g dan diaveridin 14 g **Indikasi** Anti koksidia pada unggas. DDCP larutkan 10 ml dalam 3,2 L air minum, aduk

sampai rata. Pencegahan berikan dengan sistim 3-2-3 dan ulangi 1 minggu kemudian dan seterusnya selama umur 3-9 minggu. Pengobatan dengan sistim 3-2-3 **Kemasan** 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 12091085 PTS. 1. Obat bebas terbatas

94. SULDIVIT

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap Kg mengandung Sulfadimethoxine 250 gram , Vit A 7.500.000 I.U. , Vit K3 3.000 mg **Indikasi** Pengobatan koksidirosis , Coryza , Kolera, Berak kapur pada unggas. **Peringatan** Pemberian obat dihentikan 5 hari sebelum hewan dipotong. **Dosis dan cara pemakaian** 1 gram per liter air minum diberikan selama 5 – 7 hari. **Kemasan** 1 Kg **Deptan RI** No.D.06101482 PTS.1 Obat bebas terbatas

95. SULFADIM

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 25% Sulfadimethoxine sodium **Indikasi** Antikoksidia pada unggas, sapi, domba, kambing dan kelinci. **Dosis dan cara pemakaian** Melalui air minum. Untuk unggas 1-2g/liter air minum selama 6 hari, untuk sapi 2,2g/liter air minum untuk hari pertama lalu diikuti 1g/liter air minum selama 4-5 hari, untuk domba & kambing 0,3g/liter air minum selama 3-5 hari, untuk kelinci 0,3-0,4g/liter air minum selama 7 hari. **Kemasan** 100 gram, 500 gram dan 1 kg. **Deptan RI** No. I. 04112837 PTS. Obat bebas terbatas

96. SULFAXALINE

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kilogram obat mengandung Sulfaquinoxaline sodium 5 %, Sulfadimethoxine sodium 15%, Vitamin K 0,1 %. **Indikasi** Kombinasi dua macam preparat sulfa yang sangat ampuh untuk menyembuhkan Coccidiosis, Cholera, Typhoid, Leucocytozoonosis dan Malaria **Dosis dan cara pemakaian** Ayam 5 g (1 sendok teh) / 2 L air minum. Hewan besar 0,015 g/Kg BB. **Kemasan** 10 g, 100 g, 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg dan 50Kg. **Deptan RI** No. D. 0602879 PKS. 2. Obat keras.

97. SUPERCOC

Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** *Sulfaquinoxalin sodium, Pyrimethamine, Sodium Salicylate* **Indikasi** Untuk pengobatan koksidirosis, malaria pada unggas, dan *leucocytozoon* pada unggas **Peringatan** Dosis untuk hewan selain unggas, hanya dengan pertimbangan khusus. Dosis untuk pengobatan *Leucocytozoon*, harus dibawah pengawasan dokter hewan. **Masa henti obat** 10 hari (daging). **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 1,5ml dalam 1 L air minum. Lama pemakaian 3 hari berturut-turut, kemudian diberikan air minum biasa selama 2 sampai 3 hari, dan pengobatan diteruskan kembali selama 2 - 3 hari berikutnya. **Kemasan** 1.000 L **Deptan RI** No. I. 0604439 PKC.2. Obat keras.

98. SURPIZIN

SHSInternational

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung piperazine heksahidrat **Indikasi** Antelmintik pada ayam, kalkun dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum **Kemasan**

Botol 100 ml dan 1 L serta jerigen 5 L dan 20 L Kementan RI No. D. 11121812 PTC. 2. Obat bebas terbatas

99. TOLCOXIN

KBNP, Inc./Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Toltrazuril 25g/L **Indikasi** Pengobatan koksidirosis pada ayam. **Peringatan** Simpan di tempat yang kering dan terhindar sinar matahari langsung dan waktu henti obat 10 hari. **Dosis dan pemakaian** Berikan secara oral melalui air minum 1ml/L air minum (equivalent dengan 7 mg toltrazuril/Kg.b.w./hari) selama 2 hari berturut-turut. Ulangi pengobatan setelah 5 hari. **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 07063225 PTC. Obat bebas terbatas.

100. TOLTRACOX

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap L mengandung toltrazuril 25 g **Indikasi** Sebagai antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 g/2 L air minum. Pengobatan: 1 g/L air minum diberikan selama 2-3 hari berturut-turut, 2 hari dihentikan, dilanjutkan kembali selama 2-3 hari berikutnya **Waktu Henti Obat** 5 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** Botol plastik 100 ml dan jerigen plastik 1 L **Kementan RI** No. D. 11013984 PKC. Obat keras

101. TOLTRAPAN

Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung toltrazuril 25 mg, triethanolamine 0,3 ml, benzyl alcohol 0,01 ml dan polyethyleneglycol (200) qs **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan coccidiosis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan terhadap toltrazuril pada unggas **Kontra Indikasi** Tidak boleh diberikan pada ayam layer komersial yang sedang produksi **Waktu Henti Obat** 21 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** 7 mg/kg BB setara dengan 300 ml toltrapran/100 L air minum selama 2 hari dengan asumsi kebutuhan air minum sebanyak 100 ml/kg BB. Jika perlu pengobatan diulangi setelah 5 hari **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 11124192 PKC

102. TOLTRARIL S 2,5 %

Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Toltrazuril **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit Coccidiosis pada unggas dan babi **Dosis dan cara pemakaian** 1 ml/L air . **Kemasan** Botol 100ml **Deptan RI** No. I 08103503 PKC. Obat keras.

103. TOLTRARIL S 5%

Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Toltrazuril **Indikasi** Pengobatan terhadap penyakit Coccidiosis pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/ekor. **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I 08103504 PKC. Obat keras.

104. TOLTRAVET 2,5% ORAL SOLUTION

Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/

Lisan Mulia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung toltrazuril 25 mg **Indikasi** Efektif

melawan agen penyakit eimeria pada unggas (*Eimeria tenella*, *Eimeria averculina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria mitis*, *Eimeria maxima*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria maleagris*, *Eimeria adenoids*, *Eimeria maleagrimitis*). Obat ini aman dipakai dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan kekebalan tubuh. Dapat diberikan melalui pakan tambahan maupun sebagai obat yang bisa digunakan pada unggas produksi. Tidak mempunyai efek negatif pada perkembangan BB dan konversi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis air minum adalah 2,8 ml/10 kg BB (setara dengan 7 mg toltrazuril/kg BB), pengobatan selama 2 hari. 5,6 ml/20 kg BB. 14 ml/50 kg BB. 28 ml/100 kg BB. 140 ml/500 kg BB. 280 ml/1.000 kg BB. 1.400 ml/5.000 kg BB. 2.800 ml/10.000 kg BB. Pada kasus penyakit, pengobatan dapat dilakukan selama 3 hari Perhatian Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan kocok dahulu sebelum digunakan. Hindarkan dari sinar matahari langsung. Simpan dibawah suhu 300C **Kemasan** 200 ml, 500 ml dan 1.000 ml **Kementan RI** No. I. 11044045 PKC.

105. TRYPAMIDIUM

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Isometamidum klorida **Indikasi** Obat trypanosomiasis yang menyerang sapi, kerbau, unta, kuda, keledai, dan anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IM yang dalam pada otot tebal sapi 0,25 – 0,050 mg/Kg BB IM atau IV kuda 0,25 – 0,50 mg/Kg BB, unta 1 mg/Kg BB, anjing 1 mg/Kg BB **Kemasan** 1 g, botol 20 g **Deptan RI** No. I 0502351 PKS.2. Obat keras.

106. VETCOX

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung zat aktif amprolium base, sulfaquinoxaline base dan vitamin K3 **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit caecal atau intestinal koksidiosis (berak darah) pada unggas yang disebabkan oleh berbagai spesies *Eimeria* antara lain: *E. acervulina*, *E. hagani*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. praecox* dan *E. tenella* **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pencegahan: 1 g/L air minum dan berikan 3:2:3, 3 hari diberikan VETCOX, 2 hari dihentikan, 3 hari diberikan VETCOX kembali. Ulangi lagi 7-10 hari kemudian dengan sistem 3:2:3 pada umur 8-9 minggu. Untuk pengobatan: 1g/L air minum dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut **Deptan RI** No. D. 9903352 PTS. Obat keras

107. VETQIUN

Cipla, Ltd., India/Paeco Agung

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap vial mengandung quinapyramine sulphate 1,5 g dan quinapyramine chloride 1,0 g **Indikasi** Untuk pengobatan dan pencegahan trypanomiasis (surra) pada sapi, kuda, kerbau, unta, keledai, gajah, kambing/domba, babi, anjing Perhatian Istirahatkan hewan selama 48 jam setelah pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan dalam vial 15 ml pelarut steril dan berikan melalui suntik SC dengan dosis 0,025 ml tiap kg BB **Kemasan** Vial isi 2,5 g obat **Deptan RI** No. I. 10103908 PKS. Obat keras

108. VETRIBAC

Vetanco S.A., Argentina/Pakan Serasi

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung diclazuril 1% **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1,0 mg/kg BB atau 0,25-0,5 ml/L air minum **Kemasan**

1 L/botol **Deptan RI** No. I. 03052582 FTC. Obat bebas terbatas

109. VETRIBAC D

Vetanco S.A., Argentina/Pakan Serasi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung diclazuril **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 200 g/ton pakan **Kemasan** Paper bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 07123357 FTS. Obat bebas terbatas

110. VETA ZURIL

Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap L mengandung bahan aktif diclazuril 10 g, propylenglycol 250 g, nipagin 2 g, nipasol 1 g dan monoethanolamine qs **Indikasi** Efektif mengobati ijeksi gabungan koksidiosis yang disebabkan oleh semua jenis Eimeria sp. pada unggas **Kontra Indikasi** Tidak boleh diberikan pada ayam petelur komersial untuk konsumsi manusia **Waktu Henti Obat** untuk pedaging selama 21 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Dalam 1 ml Veta Zuril mengandung 10 mg, sedang dalam dosis umum Veta Zuril adalah 7-10 mg/kg BB sehingga setara dengan 1 ml toltrapan/1-2 L air minum dengan asumsi kebutuhan minum sebanyak 100ml/kg BB **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 12044256 PTC. TM

111. VETCOX

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung zat aktif amprolium base, sulfaquinoxaline base dan vitamin K3 **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit caecal atau intestinal koksidiosis (berak darah) pada unggas yang disebabkan oleh berbagai spesies Eimeria antara lain: E. acervulina, E. hagani, E. maxima, E. mivati, E. mitis, E. necatrix, E. praecox dan E. tenella **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pencegahan: 1 g/L air minum dan berikan 3:2:3, 3 hari diberikan VETCOX, 2 hari dihentikan, 3 hari diberikan VETCOX kembali. Ulangi lagi 7-10 hari kemudian dengan sistem 3:2:3 pada umur 8-9 minggu. Untuk pengobatan: 1 g/L air minum dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut **Deptan RI** No. D. 9903352 PTS. Obat keras

112. VETQUIN

CIPLA, Ltd., India/ Paeco Agung

Bentuk Sediaan Serbuk, **Komposisi**: Setiap vial mengandung Quinapyramine Sulphate 1,5 gr dan Quinapyramine Chloride 1,0 gr, **Indikasi** Untuk pengobatan dan pencegahan Trypanosomiasis (Surra) pada sapi, kerbau, kuda, unta, keledai, gajah, kambing/domba, babi, anjing dan kucing. Peringatan Istirahatkan hewan selama 48 jam setelah pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan dalam vial 15 ml pelarut steril, berikan melalui suntikan SC dengan dosis 0,025 ml tiap kg BB, **Kemasan** Vial isi 2,5 g obat. **Deptan RI** No. I. 10103908 PKS. Obat keras.

113. VETRIBAC

Vetanco S.A., Argentina/Pakan Serasi

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Diclazuril 1 % **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** 0.5–1.0 mg / Kg BB atau 0.25 – 0.5 ml / L air minum **Kemasan** 1 L/ botol **Deptan RI** No. I. 03052582. FTC. Obat bebas terbatas.

- 114. WORMINEX 10% LIQUID** **Kepro B.V., Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung albendazole 100 mg **Indikasi**
Untuk pencegahan dan pengobatan infeksi cacing saluran pencernaan (Bunostomum, Cooperia,
dll), cacing hati (Fasciola hepatica dewasa), cacing paru-paru (Dictyocaulus viviparus dan D.
Filaria) serta cacing pita (Moniezia spp) pada sapi, anak sapi, domba dan kambing **Dosis dan**
Cara Pemakaian Untuk pemberian oral. Pada kambing dan domba: 1 ml/20 kg BB. Untuk
cacing hati: 1 ml/10 kg BB. Pada anak dan sapi dewasa: 1 ml/12 kg BB. Untuk cacing hati: 1
ml/10 kg BB. Pada unggas: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** Botol PE – pharma 1 L (12 botol/karton
boks) **Deptan RI** No. I. 07043207 PTC. Obat bebas terbatas.
- 115. X-TRAAMPROCOC** **Cakar Mas**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** setiap 1 kg mengandung Amprolium hidroklorida 100
gram **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** berikan 1 gram per
liter air minum selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No.
D. 09033582 PTS. Obat bebas terbatas.
- 116. ZIPIRYN PLUS** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Mengandung praziquantel, pirantel (embonate) dan
febantel **Indikasi** Anthelmintika pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan
Kemasan Bok 250 tablet **Deptan RI** No. I. 05032902 FKM. Obat keras
- 117. ZODALBEN 12,5%** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 100 ml mengandung albendazole 12,5 g **Indikasi**
Merupakan obat cacing berspektrum luas yang juga efektif untuk telur dan larva. Mengobati
infeksi cacing pencernaan, cacing paru dan cacing hati pada hewan ternak seperti sapi, domba,
kambing dan babi. Efektif untuk cacing Haemonchus sp., Otteragia sp., Trichostrongylus sp.,
Dictyocaulus sp., Moniezia sp., Fasciola sp, dll **Waktu Henti Obat Daging** 10-14 hari dan
susu 4 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing, domba dan babi: 0,04 ml/kg BB.
Fasciola: 0,06 ml/kg BB **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 02102206 PKC. 1. Obat keras****

ANTHELMINTIKA

01.07

- 1. AGRIWORM** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** setiap g mengandung Levamisole 200 mg **Indikasi** untuk membasmi cacing *Nematoda* pada saluran pencernaan unggas, babi, kambing dan domba **Dosis dan cara pemakaian** ayam: 1,5 g / L air minum, babi : 1 g / 10 kg bb, kambing dan domba 1g/10 Kg BB **Kemasan** sachet 100 g, 250 g **Deptan RI** No. D. 07091805 PKS.2. Obat keras.
- 2. AGRIWORM BOLUS** **Biotek Indonesia**
Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** setiap bolus mengandung Levamisole 2000 mg **Indikasi** untuk membasmi cacing *nematoda* pada saluran pencernaan dan paru-paru sapi **Dosis dan cara pemakaian** 1 bolus / 150 Kg BB. Untuk ternak dengan berat 300 Kg atau lebih, maksimum pemberian 2 bolus **Kemasan** Botol 10 bolus **Nomor Deptan RI** No. D. 06062172 PKM.1. Obat keras
- 3. AGRIWORM LIQUID** **Biotek Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** setiap ml mengandung Levamisole 200 mg **Indikasi** untuk membasmi cacing *nematoda* pada saluran pencernaan unggas, babi, kambing dan domba **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 1 ml / L air minum atau (25-50 mg/Kg BB), Babi 1 ml /10 Kg BB, Kambing dan Domba 1 ml /10 Kg BB **Kemasan** Botol 100 ml, 1 L. **Kementan RI** No. D. 02062258 PKC.1. Obat keras.
- 4. ALBEN-10** **Sumber Multivita**
Bentuk sediaan Cairan., **Komposisi** setiap L mengandung Albendazol 100 gr Carrier qs 1liter, **Indikasi** Membunuh semua jenis dan stadium cacing pada ternak seperti cacing lambung, *Ostertagia* Sp, *Haemonchus* Sp, *Bunostomum* Sp, *Oesophagostomum* Spdll) cacing paru-2 (*Dictyocaulus viviparus*) cacing hati (*fasciola* Sp) dan cacing giling (*Nematoda*) **Dosis** Unggas 5-7,5 ml per 100 Kg BB Sapi, Kerbau :7,5-10ml per 100 Kg BB Babi, Kambing, Domba 1-1,5ml per 20 Kg BB diberikan dengan cekok atau dicampur air minum. Kocok sebelum digunakan. **Deptan RI** No. D. 0110066 PKC. Obat keras.
- 5. ALBEN 10% ORAL SUSPENSION** **Nova laboratories Sdn, Bhd,**
Malaysia/ Lisan Mulia
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** tiap ml mengandung 100 mg Albendazole. **Indikasi** pengobatan infestasi cacing Gastro-intestinal nematode : *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia omchophora*, *Mena todirus haelvetianus*, *Oesophagostomum radiatum* Cacing paru-paru (nematoda) : *Dictyocaulus viviparus* Cestoda (tapeworm) : *Moniezia expansa* Cacing hati (trematoda) : *Fasciola hepatica* (dewasa). **Dosis dan Cara pemakaian** pengobatan untuk gastro-intestinal nematode, cacing paru-paru dan cestoda adalah: 0,75 / 10 kg bb (single dose) Untuk pengobatan untuk cacing hati (trematoda) : 1,00 ml / 10 kg bb (single dose). **Peringatan** batas keamanan

sampai dengan 5 kali dosis pengobatan. Level toleransi pemberian secara air minum adalah 7,5 ml per kg berat badan. **Kemasan** 1 lt. **Deptan RI** No I. 07013158 PKC.

6. **ALBENDAZOL 10% GANADEXIL** **Industrial Veterinaria SA, - Spanyol/ Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung albendazole 100 mg **Indikasi** Efektif membasmi trematoda, Cestoda dan Nematoda termasuk semua larva Nematoda pada domba, kambing, sapi dan unggas **Perhatian** Jangan melebihi dosis terutama pada hewan bunting. Hanya untuk pemberian oral **Dosis dan Cara Pemakaian** Kambing dan domba: 0,75 ml/10 kg BB. Sapi: 0,1 ml/kg BB. Unggas: 0,075 ml/kg BB. Untuk kasus fasciolosis: 1 ml/10 kg BB **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 12051802 PKC. 2. Obat keras
7. **ALBENDAZOLE 25** **Kela Laboratories, Belgia/SHS International**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung albendazol **Indikasi** Antelmintik pada domba, kambing, sapi dan unta **Kemasan** Jeringan 1 lt dan 5 lt **Deptan RI** No. I04082796 PKC Obat keras.
8. **ALBENDAZOLE 10%** **Industrial Veterinaria SA, - Spanyol/ Agro Makmur Sentosa**
Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** tiap ml mengandung albendazole 100 mg. **Indikasi** efektif membasmi trematoda, *Cestoda* dan *Nematoda*, termasuk semua larva *nematoda* pada domba, kambing, sapi dan unggas. **Dosis dan cara pemakaian** kambing dan domba 1 ml/ 20 Kg BB, sapi 0,1 ml/ Kg BB, unggas 0,075 ml/ Kg BB. **Perhatian** Jangan melebihi dosis terutama pada hewan bunting. Hanya untuk pemberian oral. **Kemasan** 1 L. **Deptan RI** No. I. 02061802 PKC.1. Obat keras.
9. **ALBENDAZOLE 900 MG** **Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk**
Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Albendazole **Indikasi** Membasmi infestasi cacing Gastrointestinal (pencernaan) dan Pulmonary (paru-paru) seperti Nematoda (*Haemonchus*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*, *Dictyocaulus*, *Bunostomum*, *Strongyloides* dan *Trichostrongylus* spp). *Taenia* (*Monienza* spp). *Fasciola hepatica*. *Dicrocoelium* spp. **Kontra Indikasi** Hewan yang sedang laktasi tidak dianjurkan untuk diberikan pengobatan dengan Albendazole **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk cacing hati pada sapi : berat 150 - 300 kg: 3 bolus, untuk cacing saluran pernafasan dan pencernaan sapi berat 300 - 400 kg : 3 1/3 bolus, untuk domba 40 - 80 kg : 2/5 bolus, untuk babi 40 - 80 kg : 2/3 bolus. Pemberian : secara per oral. **Kemasan** Dus, botol @ 10 bolus **Deptan RI** No. D. 09093704 PKM.TM. Obat bebas terbatas.
10. **ALBENDAZOLE® 16%** **Tekad Mandiri Citra**
Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** tiap g mengandung Albendazole 160 mg **Indikasi** pengobatan infestasi cacing gelang (*nematoda*, termasuk cacing paru), cacing pita (*cestoda*) dan cacing hati (*Fasciola sp*/Distomatosis, dalam kelompok cacing trematoda) pada ternak sapi,

kerbau, kambing, domba, babi dan unggas **Kontra Indikasi** hati-hati pengobatan untuk ternak yang sedang bunting kurang dari 45 hari **Dosis dan cara pemakaian** Sapi, kerbau: 25g per 400 Kg BB, kambing, domba: 1 g per 20 Kg BB, babi: 1 g per 30 Kg BB, pengobatan tunggal **Kemasan** Dus 1 Kg isi 40 kotak @ 25 g **Kementan RI** No. D. 03012522 PKS. Obat keras

11. ALBENDAZOLE AVICO **AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**

Bentuk sediaan Cairan Oral Suspension **Komposisi** 1 ml mengandung Albendazole 25 mg **Indikasi** Untuk pengobatan dan eliminasi cacing gastrointestinal seperti cacing gelang, cacing pita dan cacing paru. Juga efektif melawan cacing hati dewasa pada sapi, kerbau domba dan kambing **Peringatan** Hindari pengobatan saat kehamilan pada bulan pertama. Jangan dibekukan dan kocok botol dengan baik sebelum digunakan **Dosis dan cara pemakaian** Sapi dan kerbau secara peroral (*drench*) dosis 7.5 mg/ Kg BB. Untuk pengobatan cacing hati dosis ditambah 10 mg/Kg dan ulangi lagi setelah 6 minggu Domba dan kambing 5 mg/ Kg BB. Untuk pengobatan cacing hati dosis ditambah 7.5 mg/Kg dan ulangi lagi setelah 6 minggu **Kemasan** 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I.04032734 PKC. Obat keras.

12. ALBENMAS **Mensana Aneka Satwa**

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Albendazol 100 mg **Indikasi** Mengurangi infestasi parasit dewasa, larva, dan telur *Nematoda* spp, cacing paru-paru, cacing pita, cacing hati pada sapi, kuda, domba dan unggas **Dosis dan cara pemakaian** Oral; Sapi, kuda, domba 0,75 ml/10 Kg BB; Unggas 0,1- 0,15 ml/Kg BB **Kemasan** Jerigen 1 L **Kementan RI** No. D. 02081339 PKC Obat keras.

13. ALBENMAS – 18% **Mensana Aneka Satwa**

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Albendazol 180 mg **Indikasi** Mengurangi infestasi cacing gelang (*Nematoda*), cacing paru, cacing pita (*Cestoda*), dan cacing hati (*Fasciola spp*) pada sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan babi **Dosis dan cara pemakaian** Oral; Sapi, kerbau, kuda 25 g/400 Kg BB; Domba, kambing 1 g/20 Kg BB, Babi 1 g/30 Kg BB **Kemasan** Kotak 25 g **Deptan RI** No. D. 05123018 PTS. Obat keras.

14. ALBENOL-100 ORAL **Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** tiap ml mengandung Albendazole 100 mg **Indikasi** pengobatan cacing spektrum luas pada sapi, kambing dan domba. Cacing pencernaan: *Bunostomum*, *Cooperia*, *Chabertia*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia*, dan *Trichostrongylus spp*. Cacing paru-paru: *Dictyocaulus viviparus* dan *D. filaria*. Cacing pita: *Moniezia spp*. Cacing hati: *Fasciola hepatica* dan *F. gigantica* **Dosis dan cara pemakaian** kambing dan domba 1 ml per 20 Kg BB, untuk cacing hati 1ml per 12 Kg BB; sapi dan kerbau 1 ml per 12 Kg BB, untuk cacing hati 1 ml per 10 Kg BB; pengobatan tunggal **Kemasan** 100 ml, 500 ml, 1000 ml **Deptan RI** No. I. 05062917 PKC. Obat keras

15. ALBENOL-2500 BOLUS

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Bolus Komposisi tiap bolus mengandung Albendazole 2,500 mg **Indikasi** pengobatan cacing spektrum luas pada sapi. Cacing pencernaan: *Bunostomum*, *Cooperia*, *Chabertia*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia*, dan *Trichostrongylus spp.* Cacing paru-paru: *Dictyocaulus viviparus* dan *D. filaria*. Cacing pita: *Moniezia spp.* Cacing hati: *Fasciola hepatica* dewasa. **Dosis dan cara pemakaian** sapi: 1 bolus per 300 Kg BB. Pengobatan cacing hati: 1 bolus per 250 Kg BB **Kemasan** 5 boli per blister, 10 blister per dus **Deptan RI** No. I. 07013161 PKM. Obat keras.

16. ALBENOL-300 BOLUS

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Bolus Komposisi tiap bolus mengandung Albendazole 300 mg **Indikasi** pengobatan cacing spektrum luas pada sapi. Cacing pencernaan: *Bunostomum*, *Cooperia*, *Chabertia*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia*, dan *Trichostrongylus spp.* Cacing paru-paru: *Dictyocaulus viviparus* dan *D. filaria*. Cacing pita: *Moniezia spp.* Cacing hati: *Fasciola hepatica* dewasa **Dosis dan cara pemakaian** Untuk pemberian per oral. Anak sapi dan sapi: 1 bolus per 40 kg berat badan, untuk cacing hati: 1 bolus per 30 kg berat badan; kambing dan domba: 1 bolus per 40 kg berat badan, untuk cacing hati: 1 bolus per 30 kg berat badan **Kemasan** 5 boli per blister, 10 blister per dus **Deptan RI** No. I. 09023560 PKM. Obat keras.

17. ALBENPAN

Sinar Harapan, UD

Bentuk sediaan Bolus Komposisi Mengandung Albendazole **Indikasi** Untuk membasmi cacing di saluran pencernaan dan pernapasan pada sapi, kerbau dan babi **Dosis dan cara pemakaian** lihat kemasan **Kemasan** pot 10 bolus, dos 10 pot **Deptan RI** No. D. 07023170 PTM. Obat bebas terbatas.

18. ALBENTACK-900

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Bolus Komposisi setiap bolus mengandung Albendazole 900 mg **Indikasi** untuk membasmi tuntas semua stadium cacing di saluran pernafasan dan pencernaan pada hewan ruminansia seperti *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*, *Dictyocaulus*, *Bunostomum*, *Strongyloides* dan *Trichostrongylus spp.*, *Taenia (Moniezia spp.)*, *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium spp* **Dosis dan cara pemakaian** Untuk cacing hati (F.hepatica) pada sapi (10mg/Kg BB) BB <150 Kg 1,5 bolus; BB 150-300 Kg 3 bolus; BB 300-400 Kg 4,5 bolus, BB > 400Kg 6 bolus. Untuk cacing pada pencernaan dan pernafasan pada sapi (7,5 mg/Kg BB) BB < 150Kg 1 1/4 bolus, BB 150-300 Kg 2,5 bolus, BB 300-400 Kg 3 1/3 bolus, BB > 400Kg 4 bolus. Untuk cacing hati pada domba (7,5 mg/Kg BB) BB < 40 Kg 1/3 bolus, BB 40-80Kg 2/3 bolus. Untuk cacing pada pencernaan dan pernafasan domba (5mg/kg BB) BB < 40 Kg 1/3 bolus, BB 40-80 Kg 2/5 bolus. Untuk cacing pada babi (10 mg / Kg BB) **Kemasan** Botol 10 bolus **Deptan RI** No. D. 05123029 PKM. Obat keras.

19. ANCYLOS

Eka Farma

Bentuk sediaan Kapsul **Komposisi** Pirantel **Indikasi** Sebagai anthelmentika pada ayam.
Dosis dan Cara Pemakaian Ditelankan **Kemasan** Kapsul dalam zak foil **Deptan RI No. D. 10013771 PKM**

20. ANIZOLE 100

ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Albendazol 100 mg. **Indikasi** Anthelmintik terhadap cacing gilig, cacing pita dan cacing pipih pada ruminansia **Dosis dan cara pemakaian** 7,5 mg/Kg BB (untuk pengobatan terhadap *nematoda* dan *cestoda*) dan 10mg/Kg BB (untuk pengobatan terhadap *trematoda*), waktu henti obat 5 har **Kemasan** Jerigen 1L dan 2,5 L. **Kementan RI No. I. 0104677 PKC.** Obat keras.

21. ANTIPAR 500

AAKO, Belanda/SHS International

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 1-Nephtyl N-Methyl carbamat (sevin) **Indikasi** Antelmintika pada unggas, sapi, kuda, domba, babi, anjing dan kucing **Kemasan** Kantong plastik 500 gr **Deptan RI No. I.0606587 PKS TML 3** Obat keras

22. ANTIWORM

Eka Farma

Bentuk sediaan Kapsul **Komposisi** Piperazine **Indikasi** Sebagai anthelmentika pada ayam.
Dosis dan Cara Pemakaian Ditelankan **Kemasan** Botol @ 30 ml **Deptan RI No. D. 10013789 PTC**

23. ANTHELMIN ORAL

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 10% Levamisole (HCl) **Indikasi** Pemberantas cacing dengan spectrum luas untuk: unggas, babi dan ruminant **Dosis dan cara pemakaian** Melalui air minum. Untuk unggas 2-2,5g/10kg berat badan, untuk babi, domba & sapi 0,75g/10kg berat badan. **Kemasan** 100 gram, 500 gram dan 1 kg. **Kementan RI No. I. 03072617 PKS.** Obat Keras

24. ASCAREX

Sumber Multivita

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** setiap 100 ml mengandung Piperazine base 18,65 gr **Indikasi:** Untuk pengobatan dan pencegahan penyakit cacing pada ternak unggas, babi dan sapi. Tidak mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas ternak. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas umur 4- 6 minggu 25 ml ASCAREX dilarutkan dalam 2,5 L air minum untuk 100 ekor ayam Umur 6 minggu keatas 50 ml ASCAREX dilarutkan dalam 5-8 L air minum untuk 100 ekor ayam. *sapi, babi, kambing dan domba* 25 ml per 30 Kg BB. Campurkan dengan sedikit ransum atau air minum. **Deptan RI No D. 01041244 PTC.** I. Obat bebas terbatas.

25. ASCARIN

Pyridan Veteriner

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Tiap L mengandung Piperazine citrate 360 g (setara dengan 144 g Piperazine base). **Indikasi** Membasmi cacing Nematoda, seperti *Neoascaris vitulorum*, *Oesophagostomum radiatum* pada sapi, *Ascaris equorum*, *Strongylus*, *Oxyuris equi* pada kuda,

Ascaridia galli pada unggas, *Oesophagostomum* spp pada babi, Large roundworms pada anjing dan kucing. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas umur 4-6 minggu: 30 ml (2 sendok makan) per 2 L air untuk 100 ekor. Unggas umur >6 minggu: 60 ml (4 sendok makan) per 3,5-8,5 L air untuk 100 ekor. Babi, domba, sapi dan kuda: 30 ml (3 sendok makan)/39 Kg BB. Anjing dan kucing: 2,5 ml (1/2 sendok teh) per 6,5 Kg BB. Kemasan 100 ml, 1 L dan 5 L dan 30 L. **Deptan RI** No. D. 03021253 PTC.1. Obat bebas terbatas.

26. AVIMEC INJECTION

AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** 1 ml mengandung *Ivermectin* 10 mg **Indikasi** Efektif untuk memberantas semua tahap kehidupan endoparasit kelompok *nematoda* termasuk cacing jantung pada anjing, juga poten untuk ectoparasit **Peringatan** Hindari pemberian parenteral pada kuda dan harus diberikan peroral. *Ivermectin* tidak boleh diberikan pada anjing jenis colli. **Dosis dan cara pemakaian** Sapi, kerbau dan unta 1 ml/50 Kg BB (100 ug/Kg BB) injeksi SC Domba dan kambing 0.5 ml/25 Kg BB (200 ug/Kg BB injeksi SC Babi 0.3 mg/Kg BB injeksi SC **Kemasan** 10, 20, 50 dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 04032301 PKC.1. obat keras.

27. AVIMEC LIQUID

AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** 1 ml mengandung *Ivermectin* 0.8 mg **Indikasi** Untuk pengobatan dan eliminasi cacing gastrointestinal dari kelompok *nematoda* pada domba dan kambing **Peringatan** Obat hanya diberikan seacar peroral untuk domba dan kambing **Dosis dan cara pemakaian** diberikan secara peroral (*drench*) dosis tunggal 2.5 ml/10 Kg BB **Kemasan** 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 04092808 PKC. Obat keras.

28. AVISOLE

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Niklosamid dan levamisol HCl **Indikasi** Anthelmintika pada unggas, sapi, kambing dan domba **Dosis dan cara pemakaian** : Unggas 0,5 g/ kgBB diberikan lewat pakan, Sapi : 0,2g/ kg BB atau 20 g/ 100 kgBB lewat pakan atau dicekakkan, Kambing dan domba : 0,3 g/ kgBB atau 3 g/ 10 kgBB lewat pakan atau dicekakkan **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. D. 09063638 PKS TM. Obat keras.

29. BAYMEC

Bayer Korea, Ltd/Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Injeksi **Komposisi** Mengandung Ivermectin **Indikasi** Untuk pengobatan dan kontrol endo-ektoparasit pada babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: Suntikan secara IV atau SC pada dosis 1 ml/33 kg BB. Sapi: Suntikan secara intramuskular atau subkutan pada dosis 1 ml/50 kg BB **Perhatian** Jangan gunakan obat ini pada sapi yang memproduksi susu untuk konsumsi manusia. Jangan gunakan obat ini pada sapi petelur yang tidak menyusui termasuk sapi muda bunting selama 60 hari sampai melahirkan. Jika dosis yang diberikan lebih dari 10 ml, dibagi menjadi 2 bagian dan diinjeksikan di 2 tempat berbeda **Kemasan** Dus, vial @ 100 ml **Deptan RI** No.I.09123753 PKC. Obat keras

30. BENVET GR-300

CIPLA, LTD., India/Paeco Agung

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Setiap bolus mengandung Albendazole USP 300 mg,

Indikasi Untuk pengobatan dan kontrol cacing gilig, cacing pita, cacing hati pada kambing, domba, babi, anjing dan kucing. **Peringatan** susu tidak boleh dikonsumsi manusia selama 3 hari setelah pengobatan, hewan tidak boleh disembelih 10 hari dari tanggal pengobatan. **Dosis dan cara pemakaian** Kambing dan Domba: 1 bolus per 30 kg BB, Anjing dan Kucing: 1 bolus per 10 kg BB (diberikan dalam 5 hari), Babi: 1 bolus per 60 kg BB, diberikan lewat mulut (per oral) **Kemasan** 1 Strip isi 5 bolus, 1 Box isi 10 strip. **Deptan RI** No. I 04102823 PKM. Obat keras.

31. BENVET GR-2500

CIPLA, LTD., India/Paeco Agung

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Setiap bolus mengandung Albendazole USP 2500 mg, **Indikasi:** Untuk pengobatan dan kontrol cacing gilig, cacing pita, cacing hati pada sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, unta, rusa dan unggas. **Peringatan** susu tidak boleh dikonsumsi manusia selama 3 hari setelah pengobatan, hewan tidak boleh disembelih 10-14 hari dari tanggal pengobatan **Dosis dan cara pemakaian** Sapi, kerbau, kuda, unta, rusa: 1 bolus per 250 kg BB. Diberikan lewat mulut per oral. Untuk unggas bisa dicampur lewat air minum **Kemasan** 1 Strip isi 5 bolus, 1 Box isi 10 strip. **Deptan RI** No. I 04102822 PKM. Obat keras.

32. BENVET 10%W/V

CIPLA, LTD., India/Paeco Agung

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Albendazole USP mg, **Indikasi:** Untuk pengobatan dan kontrol cacing gilig, cacing pita, cacing hati pada sapi, kambing, domba. Peringatan susu tidak boleh dikonsumsi manusia selama 5 hari setelah pengobatan, hewan tidak boleh disembelih 2 minggu dari tanggal pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** domba dan kambing 0,5ml per 10 kg berat badan, ternak 3,5 ml per 50 kg Berat badan **Kemasan** 500ml, 1 Liter. **Kementan RI** No. I. 11084138 PKC. Obat keras.

33. BERNOME C

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk sediaan Liquid injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung *Ivermectin* 10 mg **Indikasi** Memberantas parasit internal dan eksternal **Peringatan** Dilarang digunakan pada sapi perah yang sedang laktasi **Dosis dan cara pemakaian** Pemberian melalui injeksi IM Sapi: 1 ml per 50 Kg BB, Kambing/domba: 0,5 ml per 25 Kg BB, Babi: 1,5 ml per 50 Kg BB, Anjing: 0,1 ml per 5 Kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml **Deptan RI** No. D. 0010193 PKC. Obat keras.

34. BIAVERM

Laboratories Biove, Perancis/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung levamisol dan niklosamid **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi cacing yang sensitif levamisol dan askaridiosis maupun taeniasis pada anjing dan kucing **Kemasan** Box berisi 2 blister @ 6 tablet **Deptan RI** No. I. 07073237 PKC. Obat bebas terbatas

35. BIO-DEWORMER

Bio-Pharmachemie Co., Lt, Vietnam/Giri Jaya Mandiri

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Albendazole **Indikasi** Pengobatan terhadap cacing pita, cacing oaru-paru, cacing gelang pada sapi, kambing dan domba **Dosis dan cara pemakaian** **Kemasan** Vial 500 ml; jerigen 1 L **Deptan RI** No. I. 08063443 PKS. Obat keras.

36. BIVERMECTIN 1%

Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/

Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi dalam botol Komposisi Setiap ml mengandung ivermectin 10 mg
Indikasi Sebagai antiparasit berspektrum luas untuk endoparasit dan ektoparasit seperti saluran pencernaan cacing bulat, cacing paru, cacing ginjal, cacing hati dan kutu serta kudis tungau
Dosis dan Cara Pemakaian Untuk sapi, kuda dan kerbau: 2 ml/40-50 kg BB. Kambing dan domba: 1 ml/50 kg BB. Babi: 1 ml/30-32 kg BB. Aplikasi pemakaian obat secara injeksi SC. Untuk pencegahan obat dapat diberikan selama 3 bulan, dan untuk pengobatan obat dapat diberikan setiap minggu selama 3 minggu
Kemasan Botol 100 ml
Deptan RI No. I. 08063445
PKC. Obat keras

37. BOMECTIN POUR ON

Bayer, New Zealand/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung ivermectin 10 mg (1% w/v), benzyl alkohol (15% w/v)
Indikasi Endectocide untuk pengobatan dan kontrol cacing gelang pencernaan, cacing paru-paru, kutu penghisap dan penggigit pada semua tipe sapi
Dosis dan Cara Pemakaian 1ml/20 kg BB digunakan secara eksternal. Berikan secara topikal di sepanjang garis tengah punggung (punuk sampai dengan ekor) dengan menggunakan pour on standar
Kemasan Botol 225 ml, dan 1 L
Kementan RI No. I. 11124195
PKC. Obat bebas terbatas

38. CACING EXITOR

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Kapsul
Komposisi Setiap kapsul mengandung: Piperazine citrate 320 mg.
Indikasi Infeksi cacing gilig (*Ascaridia* sp., *Oxyuris* sp.)
Peringatan Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum ayam dipotong untuk dikonsumsi. Untuk memperoleh hasil yang baik, obat diberikan pada pagi hari sebelum ayam diberi makan. Untuk menjaga kesehatan dan supaya produksi telur tetap tinggi pengobatan diulang tiap bulan atau bila terlihat adanya gejala cacangan
Dosis dan cara pemakaian Ayam umur 4 - 6 minggu: 1 kapsul. Ayam umur lebih dari 6 minggu: 2 kapsul sekaligus.
Kemasan Bungkus plastik 10 kapsul, Botol isi 50 kapsul dan 300 kapsul
Deptan RI No. D 0604149
PTM.2. Obat bebas terbatas.

39. CANEX MEDIUM

Pfizer Inc., Venezuela SA., Venezuela/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Tablet
Komposisi Setiap tablet mengandung pyrantel pamoate 143 mg, oxantel pamoate 543 mg dan praziquantel 50 mg
Indikasi Kontrol efektif terhadap infestasi nematode dan Cestoda pada anjing
Dosis dan Cara Pemakaian Berikan 1 tablet untuk setiap 10 kg BB
Kemasan Blister @ 2 tablet
Deptan RI No. I. 09123752
PKM. Obat keras

40. CAPRI-ALBEND®

Caprifarmindo Labs.

Bentuk sediaan Serbuk
Komposisi Mengandung Albendazole.
Indikasi Memberantas infestasi cacing gilig (nematode), cacing pita (cestoda), cacing daun (trematoda) pada unggas, sapi, kambing, domba dan hewan lainnya.
Kontra Indikasi Tidak dianjurkan pemberiannya pada sapi perah sedang laktasi. Produk ini tidak dianjurkan dipakai pada sapi betina selama 45 hari pertama pregnancy atau 45 hari setelah penyapihan. Hal ini dikaitkan dengan efek teratogenik dan embriotoksik pada tikus, kelinci dan domba bila diberikan pada awal pregnancy.

Peringatan Tidak boleh diberikan selama 45 hari pertama kebuntingan pada sapi dan 30 hari pertama kebuntingan pada domba atau kambing. Pemotongan hewan dapat dilakukan 10 hari setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 3 g per 10-40 Kg BB, Sapi: 1 g per 15-20 Kg BB, Domba/kambing : 1 g per 20-30 Kg BB. **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 5 Kg, 50 Kg. **Deptan RI** No. D 07093303 PKS. Obat keras.

41. CAPRINTEL® BOLUS

Caprifarmindo Labs.

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Mengandung Closantel **Indikasi** Mengobati dan mencegah infestasi cacing nematoda (*Haemonchus contortus*, *Bunostomum*, *Strongylus vulgaris*, dll), cacing trematoda (*F. hepatica*, *F. gigantica*, *F. magna*); cacing cestoda (*Moniezia* sp.) dan Arthropoda (caplak, tungau, kutu, dll). **Dosis dan cara pemakaian** Sapi, Kerbau, Kuda: 1-2 bolus per 100-200 Kg BB. Anak sapi, anak kerbau, domba, kambing, babi: 0,5 bolus per 50 Kg BB. **Kemasan** 12 bolus, 42 bolus. **Deptan RI** No. D 09083695 PKM. Obat keras.

42. CAPRIRAZIN®

Caprifarmindo Labs.

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *Piperazine citrate*. **Indikasi** Memberantas infestasi cacing gelang pada unggas, babi, sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, anjing dan kucing. **Peringatan** Pemotongan hewan dapat dilakukan setelah 5 hari pemberian obat dihentikan. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas: 1 g per 5 Kg BB, Sapi: 60 g per 100 Kg BB, Domba/kambing: 2,5 g per 4 Kg BB, Babi: 30 g per 50 Kg BB, Anjing/kucing: 1 g per 7 Kg BB **Kemasan** 10 g, 100 g, 1 Kg, 5 Kg, 50 Kg. **Deptan RI** No. D 07093293 PTS. Obat bebas terbatas.

43. CARISID

Romindo Primavetcom

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Larutan mengandung Piperazina Citrate 40% **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan cacing pada Ayam (*Ascariasis*), Babi (*Ascaris lumbricoides*, *Oesophagostomum spp*), Kuda (*Parascaris equorum*, *Trichonema spp*). **Dosis dan cara pemakaian** Pencegahan / pengobatan Ayam umur 4-6 minggu 30 ml dalam 3 L air minum untuk 100 ekor. Umur di atas 6 minggu 60 ml dalam 6-10 L air minum untuk 100 ekor. Aduk rata, jangan berikan air minum lain sebelum habis. Kuda dan Babi 5 ml per 10 Kg BB, Campurkan dalam sedikit makanan atau air minum **Kemasan** 1 L, 5 L. **Deptan RI** No. No D 0410169 PTC.2 Obat bebas terbatas.

44. CENTRE – ALBEN TABLET 500 MG

Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/CV. Fenzana Putera

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Tiap tablet mengandung albendazole 500 mg **Indikasi** Merupakan tablet anthelmintik berspektrum luas efektif dalam pengobatan cacing gelang saluran pencernaan, cacing paru-paru, cacing pita dan cacing hati **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Untuk pengobatan terhadap cacing gelang pencernaan, cacing pita dan cacing paru-paru pada sapi dan unta: 1 tablet/67 kg BB. Domba dan kambing: 1 tablet/100 kg BB. Untuk pengobatan terhadap cacing hati pada sapi dan unta: 1 tablet/50 kg BB. Domba dan kambing: 1 tablet/67 kg BB **Waktu Henti Obat** Pada ternak potong: 14 hari sebelum

dipotong. Pada ternak perah: 5 hari sebelum diperah **Kemasan** Pot plastik 50 tablet **Kementan RI** No. I. 13054537 PKM.

45. CENTRE – IVERMEC INJECTION 1% Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/CV. Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** Merupakan larutan berspektrum luas untuk mengendalikan endoparasit dan ectoparasit pada sapi, kambing, domba, unta, babi dan unggas seperti cacing saluran pencernaan, cacing paru-paru, belatung pada sapi, larva cacing sekrup, kutu penghisap dan penggigit, kudis tungau serta larva di hidung dan sinus hidung kambing dan domba **KontraIndikasi** Hindarkan injeksi secara IM dan IV. Untuk pemberian pada hewan menyusui, anjing dan kuda hubungi dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi hanya secara SC. Untuk sapi dan unta: 1 ml/50 kg BB. Pada domba dan kambing: 0,5 ml/25 kg BB. Pada babi: 1,0 ml/33 kg BB. Pada kelinci: 0,15 ml/ekor **Waktu Henti Obat** Pada ternak pedaging: 21 hari. Pada ternak perah dan babi: 28 hari **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Kementan RI** No. I. 12074312 PKC

46. CENTRE – IVERMEC POUR ON SOLUTION 1% Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/CV. Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Pour on solution **Komposisi** Tiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** Merupakan larutan berspektrum luas untuk mengendalikan endoparasit dan ectoparasit pada sapi, kambing, domba, unta, babi dan unggas seperti cacing saluran pencernaan, cacing paru-paru, belatung pada sapi, larva cacing sekrup, kutu penghisap dan penggigit, kudis tungau serta larva di hidung dan sinus hidung kambing dan domba **Kontra Indikasi** Tidak untuk pemberian secara oral atau parenteral. Hindarkan pemberian pada kulit, bulu yang basah atau kotor serta kulit yang ada luka karena akan mengurangi efikasinya **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas dan ternak lainnya semprotkan atau oleskan dari bahu kebelakang: 0,05 ml/kg BB **Waktu Henti Obat** Pada semua ternak: 28 hari **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1.000 ml dan 5.000 ml **Kementan RI** No. I. 13024443 PKC.

47. CENTRE – IVERMEC SOLUTION 1% Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/CV. Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Oral solution **Komposisi** Tiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** Merupakan larutan berspektrum luas untuk mengendalikan endoparasit dan ectoparasit pada sapi, kambing, domba, unta, babi dan unggas seperti cacing saluran pencernaan, cacing paru-paru, belatung pada sapi, larva cacing sekrup, kutu penghisap dan penggigit, kudis tungau serta larva di hidung dan sinus hidung kambing dan domba **Kontra Indikasi** Untuk pemberian pada hewan menyusui, anjing dan kuda hubungi dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk domba dan kambing: 0,2 ml/10 kg BB, secara oral. Untuk sapi dan unta: 1 ml/50 kg BB, secara oral. Unggas: 60 ml dicampurkan ke dalam 100 L air minum **Waktu Henti Obat** Pada ternak pedaging: 14 hari dan pada ternak perah: 28 hari **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1.000 ml dan 5.000 ml **Kementan RI** No. I. 12094348 PKC.

48. CONQUER POWDER

**PT. Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/
PT. Yung Shin Pharmaceutical Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mebendazole 50 mg/g **Indikasi** Untuk mengobati infeksi cacing pada babi, unggas, dan hewan ternak lainnya. Aktif terhadap Nematoda, ascaride, round worms, pinworms, Taenia sp **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: BB < 50 kg: 600 g/ton pakan selama 5 hari. BB > 50 kg: 600 g/ton pakan selama 10 hari. Unggas, pengobatan: 1.200 g/ton pakan selama 7 hari. Infeksi berat: 2.400 g/ton pakan selama 14 hari **Kemasan** Kantong 20 kg, Al. pouch 600 g **Kementan RI** No. I. 11094143 PKS. Obat keras

49. CONTRAWORM

Pyridam Veteriner

Bentuk sediaan Serbuk. **Komposisi** Tiap Kg obat mengandung Piperazine citrate 600 g. **Indikasi** Mampu membasmi segala jenis cacing seperti Neoascaris vitulorum, Oesophagostomum spp, Parascaris equorum, Strongylus, Oxyuris equi dan Ascaridia galli. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam 5 g (1 sendok teh)/1 L air minum/10 ekor. **Kemasan** 10 g, 100 g, 1 Kg, 5 Kg, 15 Kg dan 50 Kg. Nomor **Deptan RI** No. D. 04044668 PTS.3. Obat bebas terbatas.

50. CONTRAWORM – KAPSUL

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Piperazine citrate 320 mg **Indikasi** Mengobati ascaridiasis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengobatan untuk ayam umur 4-6 minggu: 1 kapsul. Ayam umur > 6 minggu: 2 kapsul. Pencegahannya pada ayam aduan: 2 kapsul dan diulang setiap bulan. Ayam petelur: 1 kapsul dan diulang setiap bulan **Kemasan** 10 kapsul, 50 kapsul, 100 kapsul dan 300kapsul Obat bebas terbatas **Deptan RI** No. D. 13034493 PTM.

51. DATILAN

Eka Farma

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** *Piperazine citrate* **Indikasi** Untuk memberantas cacing pada anak sapi sampai umur 3 bulan **Dosis dan Cara Pemakaian** **Kemasan** Dus 4 bolus **Deptan RI** No. D. 0812973 PTM.1. Obat bebas terbatas.

52. DAVAINOL®

Tekad Mandiri Citra

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** tiap g mengandung Niklosamid 850 mg **Indikasi** Anthelmintik untuk memberantas cacing pita pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 kg per ton pakan **Kemasan** 100 g, 250 g, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg **Deptan RI** No. D. 08033399 FTS. Obat bebas terbatas.

53. DEXTOMAX

Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** setiap ml mengandung Doramectin 10 mg **Indikasi** pengobatan infestasi parasit eksternal dan internal pada babi, tungau kudis (*Sarcoptes scabiei*), kutu (*Haematopinus suis*), cacing gelang termasuk *Ascaris* dan *Trichuris*, cacing paru-paru (*Metastrongylus spp.*), cacing ginjal (*Stephanurus dentatus*). Pada Sapi, *Oesophagostomum radiatum*, cacing paru-paru, *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Dermatobia hominis*, tungau kudis (*Psoroptes bovis*), kutu berumah satu (*Boophilus microplus*).

Perlindungan lebih lama terhadap infestasi ulang. **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: 1 ml/33 kg BB secara IM diberikan pada induk sebelum melahirkan, pada babi dara sebelum dikawinkan dan melahirkan, untuk pejantan minimal 2x / tahun. Sapi: 1 ml/50 kg BB secara IM atau SC. **Kemasan** 50 ml **Deptan RI** No. I. 01021785 PKC.1. Obat keras.

54. DIGESTON ANTHELMINTIC

Univetama Dinamika

Bentuk sediaan Cair **Komposisi** *Piperazine citrate* **Indikasi** Pengobatan infestasi cacing yang disebabkan oleh *Ascaridia galli*, *Neoscaris vitulorum*, *Oesophagostomum sp*, *Paraascaris equorum*, *Strongylus sp*, *Oxyuris equi* pada unggas **Kontra Indikasi-Peringatan-Dosis dan Cara Pemakaian** **Kemasan** 100 ml, 1 liter **Deptan RI** No. D. 08011363 PTC.2. Obat bebas terbatas.

55. DIMEDRYL

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung difenhidramin HCl 10 mg **Indikasi** Pengobatan reaksi alergi seperti urtikaria, reaksi anafilaktik, dermatitis alergi, rhinitis alergi, pruritis, asma bronchial dan kegatalan pada peradangan **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui IM. Hewan besar: 1 ml/20 kg BB. Hewan kecil: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 02042189 PKC. 1. Obat keras

56. DOVENIX

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung 250 mg nitroksinil **Indikasi** Distomatosis (Fasciolasis), Haemonchiasis esophagostomiasis, Oestrosis pada domba serta Ancylostomiasis pada anjing **KontraIndikasi** Jangan mencampur dovenix dengan obat lain pada alat suntik yang sama **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan SC di bagian leher belakang telinga. Dosis untuk ruminansia: 1 ml/20 kg BB. Anjing: 0,5 ml/kg BB, larutan dovenix 2,5%. Untuk infeksi berat dilakukan pengobatan ulang 3 minggu kemudian sedangkan untuk hewan yang kurus (cachexia) dosis awal diturunkan menjadi 1/3 bagian. Warna kuning yang mencemari rambut sewaktu pengobatan dapat dihilangkan dengan larutan natrium hydrosulfid **Kemasan** Botol @ 50 ml **Deptan RI** No. I. 1207036 PKC. 3. Obat keras

57. DRONTAL CAT

KVP Pharma + Veterinar produkte GmbH, Jerman

dikemas ulang oleh OLIC (Thailand)

Limited untuk Bayer Thai Co, Ltd/Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan: Tablet **Komposisi:** Pyrantel embonate/pamoate 230 mg dan Praziquantel 20 mg. **Indikasi:** Pengobatan cacing pita dan cacing gelang pada kucing. **Dosis dan Cara Pemakaian:** Rekomendasi dosis rata-rata 57,5 mg/Kg Pyrantel embonate dan 5 mg/Kg Praziquantel. Setara dengan 1 tablet per 4 Kg BB(9 lbs). Diberikan secara oral dan jika perlu dapat diselipkan pada makanan. **Kemasan:** Dus, 6 blister @ 10 tablet **Deptan RI** No.I.10023798 PKM. Obat keras.

58. DRONTAL PLUS FLAVOUR

**KVP Pharma+Veteriner Produkte GmbH,
Jerman/ Bayer Indonesia**

Bentuk Sediaan: Tablet. **Komposisi:** 150 mg Fabantel, 144 mg Pyrantel embonate, dan 50 mg Praziquantel. **Indikasi:** Pengobatan terhadap cacing gelang (*ascaris*), cacing tambang, cacing cambuk, dan cacing pita pada anjing. **Peringatan:** Jangan melebihi dosis yang dianjurkan pada saat mengobati anjing betina yang sedang bunting (konsultasikan dengan dokter hewan). Jangan digunakan bersamaan dengan obat yang mengandung Piperazin. Infeksi cacing pita kadangkala dapat terjadi kembali kecuali dilakukan pembasmian pada inang pembawannya seperti kutu, tikus dan yang lainnya. **Dosis Cara Pemakaian:** Satu tablet per 10 kg BB. Tablet salut sebaiknya diberikan secara langsung tetapi jika perlu dapat diselipkan pada makanan. Tablet dapat dibagi menjadi setengah untuk mendapat rentang berat yang diobati. **Kemasan:** Dus, 13 blister @ 8 tablet. **Deptan RI** No. I. 0903595 PKM. Obat keras.

59. ECOMECTIN 1% INJECTION

**Eco Animal Health Ltd, Inggris/
Agrotech Veterindo Jaya**

Bentuk sediaan: Cairan. **Komposisi:** setiap ml mengandung *Ivermectin* 1% w/v. **Indikasi:** Pengobatan terhadap endoparasit (*gastro-intestinal nematodes*, *lungworms*, *eyeworms*) dan ectoparasit (kutu, tungau, caplak, dll). **Peringatan:** Daging tidak boleh dikonsumsi dalam 21 hari setelah pengobatan. Tidak dianjurkan diberikan pada sapi yang sedang laktasi. Hentikan pengobatan 28 hari sebelum hewan melahirkan. Jangan diberikan secara IM atau IV. **Dosis dan cara pemakaian:** Sapi 1 ml/50 Kg BB, Kambing 1 ml/50 Kg BB, Babi 1 ml/33 Kg BB, diberikan melalui suntikan SC. **Kemasan:** Botol 50 ml. **Deptan RI** No. I. 0206745 PKC. Obat keras.

60. ENVACLOS

Romindo Primavetcom

Bentuk sediaan: Serbuk. **Komposisi:** Niklosamide dan levamisole. **Indikasi:** Anthelmintik pada sapi, babi, kambing, domba, kuda dan unggas. **Dosis dan cara pemakaian:** **Kemasan:** Sachet 100 g dan kantung aluminium 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg dan 25 Kg. **Deptan RI** No. D. 09063632 PTS. Obat bebas terbatas.

61. FASINEX 900

Novartis (Bangladesh) Limited, Bangladesh/Novartis Indonesia

Bentuk sediaan: Bolus. **Komposisi:** Mengandung Triclabendazole. **Indikasi:** Anthelmintika pada hewan ruminansia. **Dosis dan cara pemakaian:** 1 bolus untuk 75 Kg BB hewan. **Kemasan:** Box isi 10 x 4 bolus. **Deptan RI** No. I. 03061304 PKM.2. Obat keras.

62. FASTON BOLUS

Univetama Dinamika

Bentuk sediaan: Bolus. **Komposisi:** Setiap bolus mengandung Albendazol 600 mg. **Indikasi:** membasmi infestasi seperti *Nematodoses*, *Taeniosis* dan *Fasciolosis* pada sapi, kambing, domba dan babi. **Peringatan:** pengobatan dihentikan 10 hari sebelum hewan dipotong. **Dosis dan cara pemakaian:** Pemberian secara per oral. Sapi, kerbau 1 bolus/ 80-90 Kg BB, Kambing, domba, babi: ½ bolus / 60 Kg BB. **Kemasan:** 1 botol berisi 10 bolus atau 40 bolus. **Deptan RI** No. D. 0104698 PKM. Obat keras.

63. FLUBENOL 5%

**Janssen Pharmaceutica, BV, Belgia/
Novindo Agritech Utama**

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Flubendazol 50 mg **Indikasi** Anthelmentika terhadap cacing *nematoda* saluran pencernaan pada unggas **Peringatan** Withdrawal time untuk babi 14 hari, unggas 7 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui pakan, pada unggas untuk cacing *nematoda* dengan dosis 30 ppm selama 7 hari, untuk cacing pita (*Raillietina spp.*) dengan dosis 60 ppm selama 7 hari. Pada babi diberikan dengan dosis 30 ppm selama 10 hari **Kemasan** Zak 25 Kg **Deptan RI** No. I. 03032052 PTS.1. Obat bebas terbatas.

64. FLUBENZIM 5%

Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk sediaan Bubuk **Komposisi** Flubendazole 50 g **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan infeksi cacing pada babi dan unggas. Bersifat vermisisidal, larvasidal dan ovisidal **Peringatan** Hindari kontak langsung dengan kulit, mata dan selaput lender, sebaiknya gunakan sarung tangan **Dosis dan cara pemakaian** Diberikan bersama pakan. Babi 0,6 Kg per 1 ton pakan; Unggas 1,2 Kg per 1 ton pakan **Kemasan** 1 Kg **Deptan RI** No. I. 0012752 PKS. Obat keras

65. FLUCONIX-250

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** tiap ml mengandung Nitroksinil 250 mg **Indikasi** pengobatan fasciolosis (infestasi *Fasciola hepatica* dan *Fasciola gigantica* mature dan immature) pada domba dan sapi juga efektif dalam melawan infestasi *Haemonchus contortus* stadium larva dan dewasa pada domba dan sapi serta *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, dan *Bunostomum phlebotomum* pada sapi sesuai dosis anjuran **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi sub kutan. Umum: 1 ml per 25 kg berat badan **Kemasan** vial 50 ml **Deptan RI** No. I. 09033591 PKC. Obat keras.

66. FLUKICIDE® 12,5%

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Mengandung Albendazole. **Indikasi** Memberantas infestasi cacing pada sapi, domba kambing dan kuda yang disebabkan oleh *nematoda* di saluran pencernaan dan paru-paru, trematoda (cacing hati) dan cestoda. **Peringatan** Tidak diberikan selama 45 hari pertama kebuntingan pada sapi dan 30 hari pertama kebuntingan pada domba atau kambing. Pemotongan hewan dapat dilakukan 14 hari pada sapi dan 10 hari pada domba, setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi 6 ml per 100 Kg BB (cacing gilig dan pita), dan 8 ml per 100 Kg BB (cacing hati). Kuda 4 ml per 100 Kg BB (cacing gilig dan pita). Domba, kambing 2 ml per 50 Kg BB (cacing gilig dan pita) dan 3 ml per 50 Kg BB (cacing hati). **Kemasan** 100 ml, 1 L **Deptan RI** No. D 0206521 PKC. Obat keras.

67. FLUKICIDE® Bolus

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Mengandung Albendazole. **Indikasi** Memberantas infestasi cacing pada sapi, domba kambing dan kuda yang disebabkan oleh *nematoda* di saluran pencernaan dan paru-paru, trematoda (cacing hati) dan cestoda. **Peringatan** Tidak diberikan selama 45 hari pertama kebuntingan pada sapi dan 30 hari pertama kebuntingan pada domba

atau kambing. Pemotongan hewan dapat dilakukan 14 hari pada sapi dan 10 hari pada domba, setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian Sapi** 1 bolus per 300 Kg BB, *kuda* 1 bolus per 450 Kg BB (cacing gilig dan pita). *Sapi* 1 bolus per 200 Kg BB (cacing hati). **Kemasan** Pot 12 boli, 42 boli. **Deptan RI** No. D 02092460 PKM. Obat keras.

68. HEARTGARD PLUS CHEWABLE

MSD-Merial/RomindoPrimavetcom

Bentuk sediaan Tablet kunyah (chewable) **Komposisi** Mengandung *Ivermectin* dan pyrantel pamoat. **Indikasi** untuk pencegahan penyakit cacing jantung, dan untuk pengobatan dan pengendalian askaris dan infeksi cacing kait pada anjing. **Dosis dan cara pemakaian** 1 tablet kunyah (chewable) / bulan. **Kemasan** box isi 6 chewable. **Deptan RI** No. I. 04062760 PKM. Obat keras

69. HEMISIN

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Piperazin Sitrat 800 g **Indikasi** Anthelmintika pada unggas seperti cacing gelang (ascaris) dan cacing kremi (Oxyuris) **Dosis dan cara pemakaian** Unggas 32 mg / Kg bobot badan dalam air minum atau 5 – 10 g/ L air minum untuk 25 ekor ayam Babi 4 g /10 Kg bobot badan Kambing/domba 6 g/ 10 Kg bobot badan Sapi / kuda: 12 g / 50 Kg bobot badan **Kemasan** 100g, 250g, 1kg, 5 Kg, 10 Kg, 25Kg, 50 Kg. **Deptan RI** No. D. 04062787 PTS Obat bebas terbatas

70. HEMISOL

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Levamisol HCl 100 g **Indikasi** Unggas *Ascaridia Spp*, *Heterakis Spp*, *Syngamus Tracea*, *Capillaris Spp*. Babi *Ascaris Suum* *Metastrongylus Spp*, *Hyostongylus Rubidus*, *Trichuris Trichiura*. Ruminansia: *Bunostomum*, *Cooperia Spp*, *Dictycaulus Spp*, *stongyloide Spp* *Nematodirus Spp*, *Neoascaris Vitulorum* *Trichostrongylus Spp*. **Dosis dan cara pemakaian** Unggas: 150 mg/ Kg bobot badan atau 1 – 1,5 g/ L air minum Babi dan Ruminansia: 1 g/10 Kg bobot badan **Kemasan** 100g, 250g, 1kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg. **Deptan RI** No. D. 04062785 PKS Obat keras

71. INTERMECTIN

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Cairan. injeksi **Komposisi** tiap ml mengandung *Ivermectin* 10 mg **Indikasi** pengobatan cacing saluran pencernaan, cacing paru dan cacing hidung pada sapi, kambing, domba, babi, anjing dan kucing **Dosis dan cara pemakaian** injeksi SC, sapi 1 ml per 50 Kg BB, kambing dan domba 0.5 ml per 25 Kg BB, babi 1 ml per 33 Kg BB, anjing dan kucing 0.02 ml per Kg BB; Pengobatan bisa diulang tiap 2 minggu **Kemasan** vial 10 ml, 50 ml **Deptan RI** No. I. 05062919 PKC, obat keras.

72. INTERMECTIN SUPER

**Interchemie Werken “De Adelaar”
BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** tiap ml mengandung *Ivermectin* 10 mg dan

Clorsulon 100 mg **Indikasi** pengobatan terhadap ektoparasit dan endoparasit seperti cacing pada saluran pencernaan, cacing paru-paru, cacing mata, cacing hati, miasis (Screw worm fly), Oestriasis, kutu, tungau dan caplak pada sapi, kerbau, kambing dan domba **Dosis dan cara pemakaian** Injeksi subcutan 1 ml per 50 kg BB Kemasan vial 50 ml **Deptan RI** No. I 09123757 PKC. Obat keras

73. **IVERVET** **Vetanco S.A. Argentina/Pakan Serasi**
Bentuk sediaan Injeksi **Komposisi** *Ivermectin* 1 % **Indikasi** Pemberantas ekto dan endo parasit pada sapi dan babi **Dosis dan cara pemakaian** Sapi 1 ml / 50 kg BB, Babi 1 ml/33 kg BB **Kemasan** 50 ml/botol **Deptan RI** No. I. 03052581 PKC Obat Keras.

74. **IVOCIP PASTE** **Cipla, Ltd., India/Paeco Agung**
Bentuk Sediaan Pasta **Komposisi** Setiap syringe mengandung ivermectin **Indikasi** Untuk pengobatan parasit internal dan larva *Gastrophilus* spp pada kuda **Perhatian** Jika kuda dikonsumsi dagingnya, jangan gunakan obat kurang dari 14 hari sebelum hewan dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara oral dengan dosis setiap tanda strip pada syringe untuk 24 kg BB. Isi dalam 1 syringe dapat diberikan pada kuda dengan BB 600 kg **Kemasan** 1 kotak isi 1 syringe **Deptan RI** No. I. 11034017 PKM. Obat keras

75. **IVOCIP PLUS** **Agrinusa Jaya Sentosa**
Bentuk sediaan Cair **Komposisi** *Ivermectin* dan *Clorsulon* **Indikasi** Anthelmintik pada sapi dan kambing **Peringatan** jangan diberikan pada kuda umur kurang dari 4 bulan dan anjing umur kurang dari 6 minggu **Dosis dan cara pemakaian** Sapi: 1 ml/50 kg BB; Kambing 0.5 ml/kg BB disuntikkan pada kulit yang longgar **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 09033585 PKC. Obat keras.

76. **IVOMEK INJECTION** **Merial Saude Animal, Ltda, Brasil/Paeco Agung**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** ivermectin 1 % (10 mg / ml) **Indikasi** Mengendalikan dan Mengobati endo dan ektoparasit pada sapi, domba / kambing, kerbau, babi, kelinci dan anjing (kecuali ras collie) dan sangat efektif terhadap cacing gastrointestinal (dewasa dan muda), cacing paru – paru (dewasa dan muda), larva insekta, lalat screw worm, kutu, tungau, caplak dan scabies / kudis pada anjing, kelinci dan kambing **Kontra Indikasi** Hentikan pengobatan 21 hari sebelum hewan disembelih. Jangan diberikan, jika air susunya digunakan untuk konsumsi manusia dalam waktu 28 hari setelah melahirkan atau selama laktasi. **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC dengan dosis sapi (1ml / 50 Kg BB), kambing / domba (1 ml /50 Kg BB) dan babi (1 ml / 33 Kg BB) **Kemasan** botol berisi 50ml. **Kementan RI** No. I. 11081269 PKC.3 Obat Keras

77. **IVOMEK F INJECTION** **MSD-Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung *Ivermectin* 1 % dan *Clorsulon* 10% . **Indikasi** Anthelmentik (endoparasit dan ektoparasit) pada sapi dan domba **Peringatan**

withdrawal time untuk daging 28 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml / 50 Kg BB. **Kemasan** botol 50 dan 200 ml. **Deptan RI** No. No 1 04022717 PKC. Obat keras.

78. IVOMEC FOR SWINE

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ivermectin **Indikasi** Sebagai anthelmintika pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan ke dalam pakan babi **Kemasan** Kantung @ 333 g dan 5 kg **Deptan RI** No. I. 11114176 PKS.

79. KALBAZEN C

Kalbe Farma Tbk.

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Mengandung Albendazole **Indikasi** Anthelmintika pada sapi dan kerbau **Kontra indikasi** Tidak boleh diberikan pada induk bunting dibawah 2 bulan **Peringatan** Masa henti obat 10 hari **Dosis dan cara pemakaian** 6.5 mL / 100 Kg BB (tanpa cacing hati). 9 mL / 100 Kg BB (dengan cacing hati). Pemberian dilakukan dengan pencekokkan (per oral) **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 0606714 PKC.1 Obat keras

80. KALBAZEN KAPLET

Kalbe Farma Tbk.

Bentuk sediaan Kaplet **Komposisi** Mengandung Albendazole **Indikasi** Anthelmintika pada sapi, kerbau, kambing dan domba **Kontra indikasi** Tidak boleh diberikan pada induk bunting dibawah 2 bulan **Peringatan** Masa henti obat 10 hari **Dosis dan cara pemakaian** 1 kaplet / 200 Kg BB (tanpa cacing hati). 1 kaplet/100 Kg BB (dengan cacing hati). Pemberian dilakukan dengan pencekokkan (per oral) **Kemasan** Botol plastik berisi 50 kaplet **Deptan RI** No. D. 04102188 PKM.1 Obat keras

81. KALBAZEN – SG

Kalbe Farma Tbk.

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Albendazole **Indikasi** Anthelmintika pada kambing dan domba **Kontra indikasi** Tidak boleh diberikan pada induk bunting dibawah 2 bulan **Peringatan** Masa henti obat 10 hari **Dosis dan cara pemakaian** 6 ml / 30 Kg BB (tanpa cacing hati), 7.5 ml / 30 Kg BB (dengan cacing hati). Pemberian dilakukan dengan pencekokkan (per oral) **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 0601937 PKC.1 Obat keras

82. KATRIWORM

Otasindo Prima Satwa

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Piperazine Citrat 170 mg **Indikasi** Untuk membasmi cacing *Ascaris* spp pada ayam (*Ascaridia galli* & *Heterakis gallinarum*) dan pada babi (*Ascaris lumbricoides*, *Ascaris suum* & *Oesophagostomum* sp) **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur 4 – 6 minggu: 50 ml / 2,5 liter air minum (untuk 100 ekor). Ayam umur di atas 6 minggu: 100 ml / 4 – 10 liter air minum (untuk 100 ekor). Babi: 30 ml/ 45 kg berat badan **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 liter **Deptan RI** No. D. 07043203 PTC. Obat bebas terbatas.

83. KEPROMEK INJ.

Kepro B.V., Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung *Ivermectin* 10 mg **Indikasi** Untuk pengobatan cacing gelang saluran pencernaan, cacing paru – paru, tempayak, cacing giling,

larva lalat, kutu, caplak, tuma, dan tungau pada unta, sapi dan hewan – hewan lain yang sejenis. **Dosis dan cara pemakaian** Untuk penyuntikan secara subkutan. Pada sapi, domba dan unta : 1 ml / 50 kg BB. **Kemasan** vial 10 ml dan 50 ml. **Deptan RI** No.DPS. I. 0403066 PKC. Obat bebas terbatas.

84. KEPROMEK ORAL

Kepro B.V., Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa

Bentuk sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung *Ivermectin* 10 mg **Indikasi** Pada Unggas : Untuk pengobatan parasit internal (*Nematoda*, *Capillaria* dll) dan parasit eksternal (kutu dan tungau). Pada Domba : Pengobatan cacing saluran pencernaan baik yang dewasa dan yang belum matang (*Cooperia* spp, *Haemonchus* dll), cacing paru – paru baik yang dewasa dan yang belum matang (*Dictyocaulus filaria*), Nasal bot semua stadium larva (*Oestrus ovis*). Pada Kambing : Pengobatan cacing saluran pencernaan baik yang dewasa dan yang belum matang (*Haemonchus contortus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum* dll), cacing paru-paru dewasa (*Dictyocaulus filaria*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk Pemberian Oral. Pada Unggas : 1 ml / 6 liter air minum (1 ml / 20 ekor). Pada Domba, kambing : 0,2 ml / 10 kg berat badan. Untuk kontrol ektoparasit (kutu) : ulangi pengobatan pada hari berikutnya. **Kemasan** Can 1 liter dan botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 07043206 PKC. Obat keras.

85. KILLWORM

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan. Komposisi setiap ml mengandung Piperazine Citrate 170 mg **Indikasi** untuk membasmi cacing *Ascaris* sp pada ayam dan babi **Dosis dan cara pemakaian** Ayam umur 4 - 6 minggu : 30 ml / 2,5 L air minum untuk 100 ekor, Ayam umur 6 minggu ke atas 60 ml / 4-10 L air minum untuk 100 ekor, Babi 30 ml / 45 Kg BB **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Kementan RI** No. D. 02012084 PTC.1. Obat bebas terbatas.

86. KLOSAN® 200

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Cairan. injeksi Komposisi Mengandung Closantel. **Indikasi** Pengobatan dan pencegahan penyakit parasit internal (cacing gilig, cacing hati, cacing pita) dan eksternal (caplak, tungau, kutu) pada sapi, kerbau, kuda, kambing serta anjing. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kerbau, kuda 2,5-5 ml per 100-200 Kg BB. Anak (sapi, kerbau) 1-2 ml per 40-80 Kg BB. Domba, kambing 1-2 ml per 40-80 Kg BB. Anjing 0,15-0,25 ml per 5-10 Kg BB. Injeksikan secara IM atau SC. Pengobatan dapat diulang 5 bulan kemudian. **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml. **Deptan RI** No. D 0502257 PKC.1. Obat keras.

87. KLOSAN® BOLUS

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Bolus Komposisi Mengandung Closantel. **Indikasi** Mengobati dan mencegah infestasi cacing *nematoda* (*Haemonchus contortus*, *Bunostomum*, *Strongylus vulgaris*, dll), cacing trematoda (*Fasciola hepatica*, *F. gigantica*, *F. magna*); cacing *cestoda* (*Moniezia* sp.) dan *Arthropoda* (caplak, tungau, kutu, dll) pada sapi. **Peringatan** Pemotongan hewan dapat dilakukan 28 hari setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 bolus per 200 Kg BB **Kemasan** 12 bolus, 42 bolus **Deptan RI** No. D 07063227 PKM. Obat keras.

88. KLOSAN[®] KAPLET

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Kaplet **Komposisi** Mengandung Closantel **Indikasi** mengobati dan mencegah infeksi cacing *nematoda* (*Haemonchus contortus*, *Bunostomum*, *Strongylus vulgaris*, dll), cacing trematoda (*Fasciola hepatica*, *F. Gigantica*, *F. Magna*), cacing *cestoda* (*Moniezia sp*) dan arthropoda (caplak, tungau, kutu, dll) pada sapi, domba, kambing dan babi **Peringatan** pemotongan hewan dapat dilakukan 28 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kaplet per 20 Kg BB diberikan per oral pada anak sapi, domba, kambing, babi **Kemasan** pot plastik isi 125 kaplet **Deptan RI** No. D 07083265 PKM. Obat keras.

89. LAGANTOR BSA

Kalbe Farma

Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Albendazole **Indikasi** Pengobatan terhadap infestasi cacing spektrum luas pada sapi dan kerbau **Dosis dan cara pemakaian** **Kemasan** Jerigen 1 L **Deptan RI** No. D. 08013384 PKC. Obat keras.

90. LAGANTOR BSA BOLUS

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Bolus **Komposisi** Albendazole **Indikasi** Pengobatan terhadap infestasi cacing spektrum luas pada sapi dan kerbau **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol isi 40 bolus **Kementan RI** No. D. 12044251 PKM. Obat keras

91. LEVAGRIN

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung levamisole 120 g dan niclosamide 320 g **Indikasi** Sebagai anthelmintika pada unggas, sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 0,3 g/kg BB dicampur pada pakan atau 1,5 g/L air minum dan diberikan dalam waktu 2-4 jam. Sapi: 0,2 g/kg BB (20 g/100 kg BB) lewat pakan. Kambing/domba: 0,3 g/kg BB lewat pakan Waktu Henti Obat 2 hari sebelum hewan dipotong **Kemasan** 100 g dan 1 kg sachet alufoil, dus 10 kg @ sachet alufoil 100 g, drum plastik 20 kg @ sachet alufoil 100 g, dan drum plastik 50 kg @ sachet alufoil 100 g **Kementan RI** No. D. 12064293 PKS. Obat keras

92. LEVA-200 ORAL

**Interchemie Werken “De Adelaar” BV,
The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** tiap ml mengandung Levamisole 200 mg **Indikasi** pengobatan cacing pada saluran pencernaan dan cacing pada paru-paru pada babi *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Metastrongylus elongatus*, *Oesophagostomum spp.* dan *Trichuris suis*, sapi *Bunostomum*, *Chabertia*, *Cooperia*, *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Ostertagia*, *Protostrongylus* dan *Trichostrongylus spp.*, unggas *Ascandia* dan *Capillaria spp* **Dosis dan cara pemakaian** babi dan unggas 1 g per 2 L air minum, sapi 7.5 g per 200 Kg BB, pengobatan tunggal **Kemasan** 100 ml, 500 ml, 1000 ml **Kementan RI** No. I 1102970 PKC.1. obat keras.

93. LEVA-PLUS PREMIX[®]

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Levamisole, Niclosamide. **Indikasi** Memberantas tuntas cacing gilig (*nematode*) dan cacing pita (*cestoda*) dari stadium larva,

immature dan mature pada ayam layer dan breeder, seperti *Ascaridia galli*, *Capillaria obsignata*, *Heterakis gallinarum*, *Raillietina spp*, *Davainera spp*, *Syngamus trachea* dan *Oxyuris mansoni*. **Dosis dan Cara Pemakaian Layer/Breeder** 1 g per 4 Kg BB atau 3 g per Kg pakan **Kemasan** 100 g, 5 Kg, 20 Kg. **Deptan RI** No. D 06013042 PKS. Obat keras.

94. LEVA-SAN® BL

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Mengandung Levamisole HCl **Indikasi** Memberantas infestasi cacing gilig (nematoda) pada sapi, domba, kambing, kuda dan babi. **Peringatan** Pemotongan hewan dapat dilakukan 2 – 3 hari setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing/domba, kuda, babi 1 bolus per 125 Kg BB. **Kemasan** 30 bolus. **Deptan RI** No. D 07023175 PTM. Obat bebas terbatas.

95. LEVAMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Levamisol 100 g **Indikasi** Membunuh cacing *Ascaris sp.*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria obsignata*, dll **Dosis dan cara pemakaian** Oral; Unggas 36–48 mg/Kg BB lewat air minum atau 2,5 g/L air minum **Kemasan** Sachet 100 g, 250 g **Kementan RI** No. D. 09073658 PKC. Obat keras.

96. LEVAMID

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap gram mengandung: Niclosamide 500 mg, Levamisole HCl setara dengan base 150 g **Indikasi** Membasmi cacing pita (*Raillietina sp.*, *Davainea sp.* dan *Hymenolepis sp.*), Membasmi cacing gilig bentuk larva dan dewasa pada: Saluran pencernaan/usus (*Ascaridia sp.*, *Heterakis sp.*, *Capillaria sp.*), Saluran pernapasan (*Syngamus trachea*), Mata (*Oxyuris mansoni*) **Peringatan** Hentikan pemakaian obat 2 hari sebelum ayam dipotong untuk dikonsumsi. **Dosis dan cara pemakaian** 0,2 gram tiap Kg BB ayam, dicampur dengan ransum dan diberikan dalam waktu 2-4 jam. Pemberian obat cukup 1 kali dan dapat diulang setiap 1-2 bulan kemudian. **Kemasan** Bungkus plastik 100 gram, standing pouch 1 Kg **Deptan RI** No. D. 05092999 PKS. Obat Keras.

97. LEVAMISOLE 2000 MG

Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Levamisole **Indikasi** Membasmi cacing Nematoda pada saluran pencernaan dan paru-paru sapi **Kontra Indikasi** Levamisole kontraindikasi pada hewan yang sedang laktasi. Dimana tidak ada informasi tentang keamanan obat ini pada hewan bunting. Meskipun levamisole relatif aman untuk digunakan pada hewan besar yang bunting, sebaiknya penggunaannya hanya pada keuntungan potensial dan tidak beresiko **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 bolus Levamisole 2000 mg / 150 kg bb. Untuk ternak dengan berat 300 kg atau lebih, maksimum pemberian 2 bolus **Kemasan** Dus, botol @ 10 bolus **Deptan RI** No. D. 09093705 PTM.TM. Obat bebas terbatas.

98. LEVAMISOLE POWDER Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk sediaan Serbuk. **Komposisi** Mengandung Levamisole HCl 10% **Indikasi:** Membasmi cacing pada Babi cacing gilig gastrointestinal, cacing nodul, cacing paru-paru,

cacing ginjal. Sapi, domba cacing gilig gastrointestinal, cacing paru-paru. Unggas cacing gilig gastrointestinal, cacing caecum (*Heterakis gallinarum*), cacing hati. **Dosis dan cara pemakaian** Dapat dicampurkan dalam pakan atau air minum yang diberikan pada pagi hari Babi 1 g/15-20 Kg BB. Sapi, domba 7.5 g/100 Kg BB. Unggas 0.2 -0.3 g/Kg BB **Kemasan** 1 Kg **Deptan RI** No. I. 00111858 PKS.1. Obat bebas terbatas.

99. LEVAMIT-125

Mitravet

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Setiap L mengandung Levamisol 125 g. **Indikasi** untuk membasmi cacing pada saluran pencernaan unggas, sapi, kambing, domba dan babi. **Dosis dan cara pakai** Unggas 0.2 ml per Kg BB. Hewan besar: 1 ml per 30 Kg BB. **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. D 05062940 PKC.TM.Obat keras

100. LEVAMOL

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** setiap 1000 g mengandung 200 g Levamisol **Indikasi** Anthelmintik pada unggas, sapi, kambing, domba dan babi **Kontra Indikasi** tidak boleh diberikan pada sapi dalam masa produksi untuk konsumsi manusia **Dosis dan cara pemakaian** pada ayam campur dalam pakan 150 mg / kg atau melalui air minum 1 g / 2 L, Sapi, kambing, Domba dan Babi campur dalam pakan 1 g Levamol / 25 kg **Kemasan** Sachet 250 g **Deptan RI** No. D 08053456 PTS. Obat bebas terbatas.

101. LEVANUM®

Tekad Mandiri Citra

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** tiap g mengandung Levamisole HCl 237.5 mg **Indikasi** pengobatan cacing pada saluran pencernaan dan cacing pada paru-paru pada pada babi : *Ascaris spp.*, *Hyoststrongylus rubidus*, *Metastrongylus elongatus*, *Strongyloides spp.* dan *Oesophagostomum spp.*, sapi, kambing, domba : *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Cooperia*, *Bunostomum*, *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum*, *Dictyocaulus spp.*, unggas : *Ascaridia* < *Heterakis* dan *Capillaria spp* **Kontra Indikasi** penderita gangguan fungsi hati, pemberian bersama pirantel, morantel dan organofosfat **Dosis dan cara pemakaian** unggas umur 6-10 minggu: 125 g per 1000 ekor, umur 11-16 minggu: 200 g per 1000 ekor, umur > 17 minggu: 250 g per 1000 ekor, sapi, kambing dan domba: 1 g per 25 Kg BB, babi 1 g per 25 Kg BB, pengobatan tunggal **Kemasan** 100 g, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg **Kementan RI** No. D. 03062602 PKS. Obat keras.

102. LEVASOL

SHS International, Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung levamisol hidroklorid **Indikasi** Antelmintika pada hewan ternak **Kemasan** Botol 5 lt dan 18 lt Keterangan lain Pemberian peroral **Kementan RI** No. ID.11024009 PKC Obat keras

103. LEVAVERM 10%

Dopharma BV-Belanda/ SHS International

Bentuk Sediaan Cairan. **Komposisi** Levamisole HCl **Indikasi** Obat cacing **Dosis dan cara pemakaian**: 0.3/kg bb - **Kemasan** 500 ml, 1 L **Deptan RI** No. I. 04032737 PKC. Obat keras.

104. LEVIWORM 200

ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung levamisole HCl (setara dengan 200 mg levamisole base) 236 mg **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan infeksi Nematoda pada saluran pencernaan dan pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, domba, dan kambing: 7,5 mg levamisole/kg BB (7,50 g Leviworm 200/200 kg BB). Babi dan ayam: 25 mg levamisole/kg BB (50 g Leviworm 200/100 L air minum). Air yang mengandung levamisole diberikan selama 24 jam. Ulangi 2-5 minggu kemudian jika hewan terlihat mengalami re-infeksi **Kemasan** Sachet 100 g, 1 kg **Kementan RI. No. I. 12034230 PKS. Obat keras**

105. L.E~435

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung 100 g zat aktif levamisole base **Indikasi** Mengobati dan mencegah penyakit pada unggas: *Ascaridia* spp., *Capillaria* spp., *Heterakis* spp., *Syngamus trachea*. b. pada babi: *Ascaris* suum dan larvanya, *Hyostrogylus rubidus*, *Metastrongylus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Trichuris trichiura*. Pada ruminansia (domba, kambing dan sapi): *Neoascaris vitulorum*, *Oesophagostomum* spp., *Ostertagia* spp., *Strongyloides* spp., *Trichostrongylus* spp **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum atau dicampur dalam pakan dan hewan tidak perlu dipuasakan dan obat diberikan baik lewat air minum maupun pakan harus dihabiskan dulu sebelum ditambah dengan yang baru. Unggas: 0,2 g/kg BB atau 5 g/2 L air minum untuk 50 ekor ayam dengan berat rata-rata 0,5 kg/ekor. Domba, kambing, sapi dan babi: 0,75 g/10 kg BB diberikan melalui air minum atau pakan **Deptan RI No. D. 99061574 PTS. 1. Obat bebas terbatas**

106. LMS 200®

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Levamisole. **Indikasi** Mengatasi cacingan pada unggas, sapi, kambing, domba dan babi yang disebabkan oleh infestasi *nematoda* seperti *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Haemonchus* spp, *Ostertagia* spp, *Cooperia* spp, *Toxocara* spp, *Stephanurus dentatus*, *Oesophagostomum* spp, *Ascaris suum*. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 150 mg per Kg BB. Kambing, domba, babi dan sapi 1 g per 25 Kg BB. **Kemasan** 1000 g, 5 Kg, 15 Kg, 50 Kg. **Deptan RI No. D 05101859 PKS.2. Obat keras.**

107. MARUKI CAIR

Degepharm

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** setiap ml mengandung Piperazin sitrat 250 mg **Indikasi** Untuk pengobatan penyakit karena infeksi cacing *Ascaridia galli*, *Neoascaris vitulorum*, *Oesophagostomum* sp, *Paraascaris equorum*, *Strongylus* sp, *Oxyuris* sp. **Peringatan** Waktu henti obat 5 hari (Unggas) dan 28 hari (Sapi) sebelum hewan dipotong. Simpan sisa obat dalam wadah tertutup rapat dan terlindung sinar matahari. **Dosis dan cara pemakaian** Diminumkan langsung sesuai dosis atau dicampurkan dalam pakan. Unggas 1,2 ml/kgBB, Kuda 1,2 ml/kgBB, Anjing dan Kucing 0,6 - 1,2 ml/kgBB, Babi dan Sapi 1,5 – 1,7 ml/kgBB. Sebelum diobati, hewan dipuasakan 1 malam **Kemasan** 500 ml. **Deptan RI No. D. 03102644 PTC. Obat bebas terbatas.**

108. MARUKI SERBUK

Degepharm

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** setiap Kg mengandung Piperazin sitrat 700.000 mg
Indikasi Untuk pengobatan penyakit karena infeksi cacing *Ascaridia galli*, *Neoascaris vitulorum*, *Oesophagostomum sp*, *Paraascaris equorum*, *Strongylus sp*, *Oxyuris sp*. **Peringatan** Waktu henti obat 5 hari (Unggas) dan 28 hari (Sapi) sebelum hewan dipotong. Simpan dalam wadah tertutup rapat. **Dosis dan cara pemakaian** Dilarutkan dalam air minum atau dicampurkan dalam pakan. Unggas 280 mg/kgBB, Kuda 280 mg/kgBB, Anjing dan Kucing 150 -315 mg/kgBB, Babi dan Sapi 350 - 420 mg/kgBB. Sebelum diobati, hewan dipuasakan 1 malam **Kemasan** 1 Kg. **Deptan RI** No. D. 03102643 PTS. Obat bebas terbatas.

109. MECTISAN®

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung *Ivermectin*. **Indikasi** Memberantas infestasi cacing gilig/*nematoda* dan ektoparasit pada sapi, domba, kambing, babi dan anjing. **Peringatan** Tidak boleh diberikan pada hewan bunting dan sapi laktasi. Pemotongan hewan dapat dilakukan 21 hari setelah pemberian obat dihentikan. Anjing jenis collie sangat peka terhadap *Ivermectin*. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi 2 ml per 100 Kg BB. Domba, kambing 1 ml per 50 Kg BB. Babi 1 ml per 33 Kg BB. Anjing 0,05 – 1,0 ml per 10 Kg BB. **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml. **Deptan RI** No. D 02102489 PKC. Obat keras.

110. MIXBRO

Kalbe

Farma Tbk.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung virginiamisin, vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasinamid, Ca-d-panthotenat, kolin klorida, asam folat, methionin dan arginin **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan nekrotik enteritis serta memicu pertumbuhan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g/10-13 L air minum **Kemasan** Ember plastik 12,5 kg @ 250 g **Deptan RI** No. D. 0403760 FTS. 3. Obat bebas terbatas

111. MONIL BOLUS

Pyridam Veteriner

Bentuk sediaan Bolus. **Komposisi** Tiap bolus mengandung Albendazole 1.125 mg. **Indikasi** Membasmi semua stadium cacing di saluran pencernaan dan pernafasan pada hewan ruminansia seperti *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Cooperia*, *Stroglyoides*, *Oesophagostomum*, *Dictyocaulus*, *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium lanceatum*, *Moniezia*. **Dosis dan cara pemakaian** Diberikan secara oral. Untuk membasmi cacing hati, *Nematoda*, *Cestoda* di lambung usus dan paru-paru sapi sebagai berikut <150 Kg BB 1,5 bolus; 150-300 Kg BB 3 bolus; 300-400 Kg BB 4 bolus; >400 Kg BB 5,5 bolus. Untuk membasmi cacing *nematoda*, *cestoda* di lambung, usus dan paru-paru sapi: >75 Kg BB 0,5 bolus; 75-150 Kg BB 1 bolus; 150-450 Kg BB 2 bolus; 450-600 BB 4 bolus. **Kemasan** 1 dus = 24 bolus (12 strip). **Deptan RI** No. L. 03031809 PKM.1. Obat keras.

112. MULTIDOSE – FW

Univet/Romindo Primavetcom

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** tiap ml mengandung Levamisole Hcl 15,0 mg, Rafoxanide 22,5 mg. **Indikasi** untuk pengobatan penyakit – penyakit cacing pada sapi dan domba/kambing

yang disebabkan oleh *Fasciola* Sp, *Nematodirus* Sp, *Dictiocaulus* Sp, dan *Ostertagia* Sp. **Kontra Indikasi** Jangan melakukan pengobatan secara bersamaan dengan Organophosphate dan atau dengan drethylcarbazine. **Peringatan** Tidak diberikan pada sapi, domba, kambing yang sedang laktasi dimana susunya dikonsumsi manusia. Waktu henti obat untuk daging 30 hari **Dosis dan cara pemakaian** diberikan dengan alat drenching, pada sapi 1 ml per 2 Kg BB (dosis maximum 150 ml/ ekor). Pada domba/kambing 1 ml per 3 Kg BB (dosis maksimum 20 ml/ekor). **Kemasan** jerigen @ 1 l, @ 2,5 l. **Deptan RI** No. No I 04031532 PKC.2. Obat keras

113. NEMASOL K

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung: Levamisole HCl setara base 375 mg **Indikasi** Membasmi cacing gilig pada hewan besar (sapi, kerbau, kambing dan domba), membasmi: saluran pencernaan (*Haemonchus* sp., *Cooperia* sp., *Oesophagostomum* sp., *Strongyloides* sp., dll), Saluran pernapasan (*Dictyocaulus* sp.), Pada babi : saluran pencernaan (*Ascaris suum*) dan saluran pernapasan (*Metastrongylus* sp.). Pada unggas : saluran pencernaan (*Ascaridia* sp., *Heterakis* sp., *Capillaria* sp.), saluran pernapasan (*Syngamus trachea*) dan mata (*Oxyspirura mansonii*) **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. Hentikan pemakaian obat 2 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat dicampur ke dalam air minum atau ransum. Obat umumnya diberikan satu kali. Pemberian dapat diulang sekali lagi setelah 1 minggu bila digunakan untuk membasmi larva cacing dalam jaringan. Hewan besar (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi): 1 kaplet tiap 50 kg berat badan. Unggas: 1 kaplet tiap 10 kg berat badan **Kemasan** Botol isi 10 kaplet, 50 kaplet, 100 kaplet, 300 kaplet dan 1.000 kaplet. **Deptan RI** No. D 06041394 PKM.2. Obat Keras.

114. NICLOMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Niclosamide 500 gr **Indikasi** Mengurangi infestasi cacing pita pada unggas **Dosis dan cara pemakaian** Dicampur dalam pakan; 3 kg NICLOMAS dicampur dalam 1 ton pakan **Kemasan** Kantong 1 Kg **Kementan RI** No. D. 12011345 PTS. 1. Obat keras.

115. NICLO-75

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Niclosamide 75 % **Indikasi** Untuk pengobatan cacing pita **Kontra indikasi** tidak ada **Dosis dan cara pemakaian** 1600 gram per ton makanan sekali pemberian **Kemasan** 1 Kg , 5 Kg **Deptan RI** No. D 09023552 PKS Obat keras.

116. NICLOMIX – L®

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung niclosamide BP 500 g dan levamisole HCl 150 g **Indikasi** Membasmi cacing pita (cestoda) dari stadium larva hingga dewasa pada layer dan breeder (*Railletina* sp., *Davainera* sp.). Membasmi cacing gilig (nematoda) dari stadium larva hingga dewasa pada layer dan breeder (*Ascaridia galli*, *Heterakis* sp, *Capillaria* sp, *Syngamus trachea*) **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 g NICLOMIX-L®/kg BB ayam dengan cara dicampur pada pakan dan diberikan dalam 2-4 jam. Diulang setiap 1-2 bulan

Waktu Henti Obat 2 hari sebelum ayam dipotong untuk dikonsumsi **Kemasan** 100 g, 250 g dan 5 kg **Kementan RI** No. D. 12104367 PKS. Obat keras

- 117. NOROMECTIN INJECTION** **Norbrook Laboratories, Inggris/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ivermectin **Indikasi** Antelmintik pada sapi
Kemasan Vial 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 03102665 PKC.
Obat keras
- 118. NYCLOSOL** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap gram mengandung niclosamid 200 mg, levamisol 40 mg. **Indikasi** efektif membasmi semua jenis cacing pita dan cacing gelang pada unggas seperti : *Raelitina* sp, *Ascaridia galli*, dll. **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 g/Kg BB melalui makanan (dosis sekali pakai pada pemberian pakan pertama). Kasus cacing pita, pemberian diulangi 3-4 minggu kemudian (untuk hewan muda) dan hewan dewasa pemberian diulangi setiap 3 bulan. **Kemasan** 1 Kg **Deptan RI** No. D. 03022533 PKS. Obat keras.
- 119. NYCLOSOL-50** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk sediaan Serbuk. **Komposisi** tiap gram mengandung niclosamid 500 mg. **Indikasi** efektif membasmi semua jenis cacing pita pada unggas seperti *Raellitina cesticilus*, *R. tetragona*, *R. echinobothrida*, *Davainea proglottina*. **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 3 kg / ton pakan berikan pada umur 14 dan 40 minggu sehari penuh ad libitum. Atau 0.2/ 1 Kg BB. **Kemasan** 1 kg, **Deptan RI** No. D. 04062780 PKS. Obat keras.
- 120. OXIBENDAZOLE-100** **Kalbe Farma**
Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Oxybendazole **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan terhadap infeksi cacing Nematoda pada sapi, kerbau, kuda kambing, domba, babi dan unggas
Dosis dan cara pemakaian lihat kemasan **Kemasan** Tabung plastik 250 g **Deptan RI** No. D. 07113344 PTS. Obat bebas terbatas.
- 121. PAMIZOLE PS** **Fatro S.p.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk sediaan Powder **Komposisi** Mengandung Tetramisole **Indikasi** Obat cacing *Nematoda* gastrointestinal dan infestasi cacing paru-paru pada sapi, domba, kambing, kuda dan babi
Dosis dan cara pemakaian Campur dalam pakan atau dilarutkan dalam air minum; sapi 7-30g/Kg pakan atau 1,5 g/10 ke BB; domba dan kambing 5-20 g/Kg pakan atau 0,1 g/Kg BB; babi 1,5g/10 Kg BB; kuda 2-7,5 g/Kg pakan; unggas 5-12 g/Kg pakan 2,5-6 g per liter air minum
Kemasan 1 Kg **Deptan RI** No. I. 05101635 PTS.1. Obat bebas terbatas.
- 122. PANACUR 10% SUSP.** **Intervet Intl. GmbH, Jerman/Intervet Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan. Suspensi **Komposisi** Setiap ml mengandung Fenbendazole 100mg
Indikasi Obat cacing, efektif terhadap *nematoda*, juga efektif terhadap berbagai stadium perkembangan cacing Peringatan Hentikan penggunaan obat 5 hari sebelum dipotong **Dosis**

dan cara pemakaian Penggunaan dicampur dengan air **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 0602515 PKC Obat keras.

123. PANHELMIN

Nutec, Inggris/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Tiap 1 ml mengandung Levamisol HCl 5 g, Prazikuantel 3.5g. **Indikasi** Membasmi cacing pada unggas yaitu cacing gilig, dan kandungan prazikuantel lebih efektif untuk cacing pita. **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 ml / 100 L air minum selama 2 hari. Ulangi dalam 6-10 minggu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 01091735 PKC.1. Obat keras.

124. PIGWORM S

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap gram mengandung Fenbendazole 40 mg. **Indikasi** Membasmi semua cacing bentuk larva dan dewasa pada babi di : Saluran pencernaan (*Ascaris suum*, *Oesophagostomum spp.*, *Trichuris suis*, *Strongyloides ransomi*, *Hyoststrongylus rubidus*), Paru-paru (*Metastrongylus aprii*) dan Ginjal (*Stephanurus dentatus*). **Perhatian** Hentikan pemberian obat 7 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi. Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 gram tiap 20 kg berat badan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. **Kemasan** Wadah plastik: 10 sachet @ 100 gram, Sachet 250 gram. **Deptan RI** No D 07093287 PTS. Obat bebas terbatas

125. PIPEDON BOLUS

Wonderindo Pharmatama

Bentuk sediaan bolus **Komposisi** mengandung Piperazine sitrat **Indikasi** membasmi cacing ascaris, oephagostomum, haemonchus, nematodirus, oxyuris pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** melalui oral, tiap bolus untuk setiap 50 – 75 Kg BB, lebih efektif jika diberikan pada saat pencernaan dalam keadaan kosong, 2 jam sebelum diberi pakan **Kemasan** Pot 12 bolus, 25 bolus, 50 bolus **Deptan RI** No. D. 0510460 PTM.1 Obat bebas terbatas.

126. PIPEDON- X LIQUID

Wonderindo Pharmatama

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** mengandung Piperazine base **Indikasi** anthelmintika pada ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** melalui oral, ayam umur 4 – 6 minggu 30 ml/2,5 L air minum, umur 6 minggu lebih 60 ml/10 L air minum diulang setiap 1 – 2 bulan sekali. Babi 30 ml/3 L air minum/45 Kg BB. Babi dipuaskan 1 malam sebelum obat cacing diberikan **Kemasan** 60 ml, 120 ml, 1 L, 5 L, 20 L **Deptan RI** No. D. 0512078 PTC.1 Obat bebas terbatas.

127. PIPERA-SAN[®]

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Mengandung Piperazine citrate **Indikasi** Memberantas infestasi cacing pada unggas, babi, sapi, kuda, kambing, domba, anjing, kucing, kelinci dan kera. **Peringatan** Pematangan hewan dapat dilakukan 5 hari setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** *Unggas* 1 ml per Kg BB. *Sapi, kuda, kambing, domba dan babi* 1,1 ml per Kg BB. *Kelinci* 2 ml per Kg BB. *Anjing dan kucing* 0,2 - 0,3 ml per Kg

BB. Kera 0,7 ml per Kg BB. **Kemasan** 100 ml, 1 L **Kementan RI** No. D 02092449 PTC.
Obat bebas terbatas.

128. PIPERAMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung Piperazine citrat 400 gr **Indikasi** Mengurangi infestasi cacing *Nematoda* pada unggas, seperti *Ascaridia galli* (*Ascaris* sp), dll
Dosis dan Cara Pemakaian Oral; 32 mg/Kg BB atau 1,5 – 2 g/L air minum sekali pemberian
Kemasan Sachet 100 g, 250 g **Deptan RI** D. 12011345 PTS. 1. Obat keras.

129. PIPERAVAKS-S

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Setiap 100 ml mengandung piperazine HCl 40 gr. **Indikasi** Pada unggas untuk mengobati infestasi cacing gelang dan cacing kremi, untuk Kuda/sapi untuk mengobati infestasi cacing *Parascaris equi*, *Trichonema* spp *Oxyuris* spp dan *Strongilus vulgaris*, untuk babi mengobati infestasi cacing *Ascaris* Suis dan *Oesophagostomum duodenale*.
Dosis dan Cara Pemakaian Pada ayam campur dalam air minum 30 ml per 200 Kg BB atau umur 4 – 6 minggu 15 ml piperavaks-s dilarutkan dlm 3 L air minum untuk 100 ekor, umur > 6 minggu 30 ml piperavaks-s dilarutkan dalam 3 – 6 L air minum untuk 100 ekor. Pada kuda/sapi 20 ml piperavaks per 50 Kg BB, pada babi 10 ml piperavaks-s per 50 Kg BB. **Kemasan** 1L dan 5 L **Deptan RI** No. D. 05022294 PTC. 1 Obat bebas terbatas.

130. PIPERAZINE – 36

Katraco Santika

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap Kg mengandung 1000 Gram Piperazine Citrat
Indikasi Pengobatan Cacing gelang, tambang dan kait pada ayam **Dosis dan cara pemakaian** 200 mg/Kg berat badan, 6 Kg per Ton makanan atau 2,5 gram per liter air minum selama 1 hari pengobatan. Pengobatan diulang setiap 7–8 minggu sekali **Kemasan** 1 Kg, 25 Kg **Deptan RI** No. D. 0012855 PKS. Obat keras.

131. PITACID

Kalbe Farma Tbk

Bentuk sediaan Serbuk. **Komposisi** Niclosamide. **Indikasi** Antelmintikum khususnya untuk cacing pita. **Dosis dan Cara Pemakaian** diberikan 100mg/kg BB (dosis tunggal) atau 20-30mg/kg BB diberikan 5hari. **Kemasan** Box 6,25kg. **Deptan RI** No.. D. 08043410 PKS. Obat keras.

132. POWERMEC SOLUTION

Cheil Bio Co. Ltd., Korea/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ivermectin **Indikasi** Anti ektoparasit dan endoparasit pada unggas, sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Per oral
Kemasan Botol 1 L **Kementan RI** No. I. 12124401 PKC. Obat keras

133. PRAMISOLE

Han Poong Indutry Co., Ltd, Korea/SHS International

Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Levamisole **Indikasi** Anthelmentik **Dosis dan cara pemakaian** 0.2 ml/kg BB **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI** No. I. 07073233 PTC. Obat bebas terbatas.

134. PRIMA ALBENS.- 10

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan cair **Komposisi** tiap L mengandung Albendazol 100g, Excipient qs **Indikasi** Pengobatan hewan yang terkena cacing dewasa, telur dan larva seperti *fasciola sp*, *tape worm*, *lung worm*, *Haemonchus sp*, *Oxyuris sp*, *Heterakis sp*, *Syngamus sp*, *Oesophagostomum sp*, *Strongylus sp* dan *Uncinaria sp* serta *Taenia sp*. **Dosis dan cara pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml. dan 1 Liter **Deptan RI** No. D. 03112686 PKC Obat bebas terbatas.

135. PRIMA VAM – 200

MJPF Farma Indonesia

Bentuk sediaan serbuk **Komposisi** tiap kg mengandung : Levamisol 100 g, Carrier q.s **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan cacingan yang disebabkan oleh *Ascaris sp*, *Oxiurys sp*, *Heterakis sp*, *Syngamus sp*, *Oesophagostomum sp*, *Strongyllus sp* dan *Uncinaria sp*. **Dosis dan cara pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 500 g **Deptan RI** No. D.03032548 PKS Obat keras.

136. PROHEART SR-12

Fort Dodge Australia Pty, Ltd., Australia/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering. **Komposisi** Moxidectin. **Indikasi** pencegahan terhadap cacing jantung *Dirofilaria immitis* pada anjing selama 12 bulan, mengontrol larva dan *Ancylostomum caninum* dewasa, serta mencegah infeksi *Uncinaria stenocephala*. **Dosis dan Cara Pemakaian** Disarankan untuk anjing umur ≥ 6 bulan, berikan suspensi 1 ml/20 kg berat badan secara subkutan (eq. 0, 5 mg Moxidectin/kg berat badan). Suntikan secara subkutan pada daerah di atas punggung, sisi leher atau bagian depan scapula. Untuk perlindungan penuh, ulangi perlakuan setiap 12 bulan. **Kemasan** 1 unit: 1 vial microsphere, 1 vial diluents & 1 alat injeksi. **Deptan RI** No. I. 08123537 PKC. Obat keras.

137. PROMECTINE ORAL

Invesa Int., Spanyol/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** setiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** sebagai anti endoparasit dan anti ektoparasit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Endoparasit 1 ml/ 25 kg BB dicampur ke air minum dan diulangi setelah 15 hari ektoparasit ml/ 25 kg BB selama 2 hari dan diulangi setelah 15 hari **Kemasan** 250 ml dan 1 L **Kementan RI** No. I. 12024219 PKC

138. PROMERIS DUO SPOT ON FOR DOGS

Fort Dodge Italy/Pfizer Indonesia

Bentuk Cairan. **Komposisi** Metaflumizone dan amitraz. **Indikasi** digunakan sebagai pencegahan terhadap infestasi kutu (*Ctenocephalides canis* dan *C. Felis*) dan caplak (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguinus*, *Dermacentor reticulatus* dan *Dermacentor variabilis*) dan pengobatan demodicosis (yang disebabkan oleh *Demodex spp*) dan kutu (*Trichodectes canis*) pada anjing. Produk obat hewan ini dapat digunakan sebagai bagian dari strategi alergi dermatitis karena kutu (FAD/Flea Allergy Dermatitis). **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada anak anjing umur dibawah 8 minggu, kucing, anjing sakit atau lemah atau menggigil karena stres panas dan jangan diberikan pada hewan bunting dan menyusui. **Peringatan** Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan pipet selalu dalam kemasan foil. Produk ini jangan diaplikasikan oleh anak-anak. Jauhkan orang dan anak-anak

dari kontak langsung dengan hewan yang diberi perlakuan hingga aplikasi kering. Sangat direkomendasikan untuk memberikan produk pada waktu sore dan tidak mengijinkan tidur dengan pemilik terutama anak-anak. Hindarkan kontak dengan kulit manusia. Gunakan sarung tangan pada waktu penanganan. Produk jangan dibuang pada saluran air karena dapat menyebabkan ikan dan organisme air lainnya mati. **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis minimal yang direkomendasikan adalah 20mg/kgBB untuk masing-masing metaflumizone dan amitraz, equivalent dengan 0.133ml/kgBB. Untuk anjing lebih dari 50kg gunakan kombinasi 2 pipet yang cocok dengan berat badannya. Hanya digunakan untuk bagian luar saja. Pemakaian spot-on. Aplikasi isi pipet dengan satu tetesan pada kulit anjing pada dasar tengkuk. Jangan aplikasikan pada permukaan tubuh anjing yang lapisan rambut. **Kemasan** Pipet thermoformed 0.67 ml, 1.33 ml, 3.33 ml, 5.33 ml, 6.66 ml. Tersedia dalam **kemasan** box dengan 3 atau 6 pipet thermoformed. **Deptan RI**. No. I. 09103716 PKC. Obat Keras.

139. PYRONIL

Pyridam Veteriner

Bentuk sediaan Kaplet. **Komposisi** Tiap kaplet mengandung Albendazole 1.000 mg. **Indikasi** Membasmi semua cacing pada hewan ruminansia. **Dosis dan cara pemakaian** Untuk membasmi cacing hati 1 kaplet (1.000 mg) per 100 Kg BB, per oral. Untuk membasmi selain cacing hati 1 kaplet (1.000 mg) untuk 150 Kg BB. **Kemasan** 1 dus=24 kaplet (6 strip) **Deptan RI** No. D. 04112838 PKM. Obat keras.

140. PYRONIL Suspensi

Pyridam Veteriner

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Tiap liter mengandung Albendazole 125 gram. **Indikasi** mencegah dan mengobati infeksi cacing pada sapi, kambing, domba, kuda, babi dan unggas. **Dosis dan cara pemakaian** Diberikan secara oral. Sapi: cacing gilig dan pita 6 ml/100 kg bb, cacing hati 8 ml/100 kg bb. Kambing dan Domba: cacing gilig dan pita 2 ml/50 kg bb, cacing hati 3 ml/50 kg bb. Kuda: cacing gilig dan pita 4 ml/100 kg bb. Babi: 2-4 ml/kg bb. Unggas: 0,2 ml/kg bb. **Kemasan** 100 ml dan 1 liter **Deptan RI** No. D. 09083693 PKC. Obat keras.

141. PYRONIL – 300 KAPLET

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Kaplet **Komposisi** Mengandung albendazole 300 mg **Indikasi** Membasmi semua stadium cacing di saluran pencernaan dan pernafasan pada hewan, seperti Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Strongyloides, Oesophagostomum, Bunostomum, Dictyocaulus, Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum dan Moniezia **Dosis dan Cara Pemakaian** Kambing/domba dengan BB < 40 kg: 1 kaplet, BB > 40-80 kg: 2 kaplet. Babi dengan BB 60 kg: 2 kaplet. Anjing dengan BB 10 kg: 1 kaplet. Kucing dengan BB 2 kg: ¼ kaplet **Kemasan** 5 kaplet, 10 kaplet, 15 kaplet, 24 kaplet dan 34 kaplet **Kementan RI** No. D. 12034239 PKM. Obat keras

142. PYRONIL – 1000 BOLUS

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Bolus **Komposisi** Albendazole 1.000 mg **Indikasi** Membasmi semua stadium cacing di saluran pencernaan dan pernafasan pada hewan ruminansia seperti: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Strongyloides, Oesophagostomum,

Bunostomum, Dictyocaulus, Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum dan Moniezia **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk cacing hati setiap bolus digunakan untuk 100 kg BB. Untuk cacing pernafasan dan pencernaan setiap bolus digunakan untuk BB > 100-150 kg **Kemasan** 5 bolus, 10 bolus, 15 bolus, 24 bolus dan 34 bolus **Kementan RI No. D. 12054270 PKM.** Obat keras

143. PYRONIL – 2500 BOLUS

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Bolus Komposisi Albendazole 2.500 mg **Indikasi** Membasmi semua stadium cacing di saluran pencernaan dan pernafasan pada hewan ruminansia seperti Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Strongyloides, Oesophagostomum, Bunostomum, Dictyocaulus, Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum dan Moniezia **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk cacing hati setiap bolus digunakan untuk 250 kg BB. Untuk cacing lambung dan paru-paru setiap bolus digunakan untuk 300 kg BB **Kemasan** 5 bolus, 10 bolus, 15 bolus, 24 bolus dan 34 bolus **Kementan RI No. D. 12054271 PKM.** Obat keras

144. RAMECTIN INJECTION

AVICO / Maju Farma Indonesia

Bentuk sediaan Injection Komposisi 1 ml mengandung Rafoxanide 125 mg dan *Ivermectin* 10 mg **Indikasi** Efektif untuk pengobatan dan kontrol endoktoparasit pada sapi dan domba seperti nematode usus dan lambung, cacing paru, cacing hati, kutu penghisap, caplak dan tungau **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi 1 ml/50 Kg BB dan Domba 0.5 ml/25 Kg BB Ramectin hanya diberikan secara SC **Peringatan** Hindari pemberian parenteral pada kuda dan harus diberikan peroral. *Ivermectin* tidak boleh diberikan pada anjing jenis colli. Simpan di tempat gelap pada 25°C, terhindar dari cahaya dan panas **Kemasan** 10 ml, 20 ml, 50 ml dan 100ml **Deptan RI No. I. 06073087 PKC.** Obat keras.

145. REVOLUTION 6%

Pfizer Inc. USA/ Kalbe Farma TBK

Bentuk sediaan cair Komposisi dalam 1 ml mengandung Selamectin 60 mg **Indikasi** pengobatan infestasi parasit eksternal dan internal pada anjing, kutu (*Ctenocephalides spp.*), caplak (*Otodectes cynotis*), tungau (*Sarcoptes scabiei*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*). Kucing, kutu (*Ctenocephalides spp.*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*), caplak pada telinga (*Otodectes cynotis*). Cacing gilig (*Toxocara cati*), cacing kait (*Ancylostoma tubaeforme*) **Dosis dan Cara Pemakaian** diberikan untuk hewan di atas umur 6 minggu dan diberikan 1 bulan sekali dengan dosis sesuai BB sebagai berikut: Anjing/kucing 2,5 kg (lembayung muda) 1 tube/bulan; anjing 2,6-5 kg (biru muda) 1 tube/bulan; kucing 2,6-7,5 kg (biru) 1 tube/bulan; anjing 5,1- 10 kg (coklat muda) 1 tube/bulan; anjing 10,1-20 kg (merah muda) 1 tube/bulan; anjing 20,1-40 kg (hijau muda) 1 tube/bulan. Pemakaian secara topikal pada dasar kulit leher antara kedua bahu. **Kemasan** 1 pack berisi 3 tube **Deptan RI No. I. 0202785 PKC.** Obat keras.

146. REVOLUTION 12%

Pfizer Inc. USA/ Kalbe Farma TBK

Bentuk sediaan cair Komposisi dalam 1 ml mengandung Selamectin 120 mg **Indikasi** pengobatan infestasi parasit eksternal dan internal pada anjing, kutu (*Ctenocephalides spp.*), caplak (*Otodectes cynotis*), tungau (*Sarcoptes scabiei*), cacing pada jantung (*Dirofilaria*

immitis). Kucing, kutu (*Ctenocephalides spp.*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*), caplak pada telinga (*Otodectes cynotis*). Cacing gilig (*Toxocara cati*), cacing kait (*Ancylostoma tubaeforme*) **Dosis dan Cara Pemakaian** diberikan untuk hewan di atas umur 6 minggu dan diberikan 1 bulan sekali dengan dosis sesuai BB sebagai berikut: Anjing/kucing 2,5 kg (lembayung muda) 1 tube/bulan; anjing 2,6-5 kg (biru muda) 1 tube/bulan; kucing 2,6-7,5 kg (biru) 1 tube/bulan; anjing 5,1- 10 kg (coklat muda) 1 tube/bulan; anjing 10,1-20 kg (merah muda) 1 tube/bulan; anjing 20,1-40 kg (hijau muda) 1 tube/bulan. Pemakaian secara topikal pada dasar kulit leher antara kedua bahu. **Kemasan** 1 pack berisi 3 tube **Deptan RI** No. I. 0112692 PKM. Obat Keras.

- 147. RINTAL BOLUS** **Bayer Thai Co. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan: Bolus. **Komposisi:** 600 mg Fabel. **Indikasi:** Anthelmentik untuk semua jenis *nematoda* gastrointestinal dan cacing di paru – paru. Rintal juga dapat membunuh telur cacing dan cacing pita pada unggas. **Dosis dan Cara Pemakaian:** Sapi 1 bolus/120Kg BB, kambing/domba $\frac{1}{3}$ bolus/40 kg BB, kuda 1 bolus/100 kg BB. **Kemasan:** Botol plastik 50 bolus 3600 mg. **Kementan RI** No. I. 09071750 PKM 1. Obat keras.

- 148. RINTAL GRANUL 10%** **OLIC (Thailand) Limited, Thailand untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung Febantel **Indikasi** Anthelmintik untuk mengontrol cacing gastrointestinal, cacing paru, semua tingkat larva dan cacing pada sapi, kambing, domba, babi, unggas dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan bersama makanan atau dengan air, gunakan hanya 1x. Sapi: 7,5 g/150 kg BB, Kuda: 7,5 g/125 kg BB. Kambing dan Domba: 7,5 g/150 kg BB atau 15 g/150 kg BB tergantung parasit yang menginfeksi. Babi: 7,5 g/150 kg BB atau 15 g/75 kg BB tergantung parasit yang menginfeksi. Unggas: 200 g/800 kg BB. Pada kasus infeksi berat 15 g/100 kg BB untuk 2 hari berturut-turut **Kemasan** Ember plastik @ 5 kantung aluminium foil @ 1 Kg **Kementan RI** No. I. 1106117 PKS. 3. Obat keras

- 149. SAN-ALBEND®** **Sanbe Farma**
Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Mengandung Albendazole. **Indikasi** Memberantas infestasi cacing pada sapi, domba, kambing dan kuda. **Kontra Indikasi** Tidak dianjurkan pemberiannya pada sapi perah sedang laktasi. **Peringatan** Tidak diberikan selam 45 hari pertama kebuntingan pada sapi dan 30 hari pertama pada domba dan kambing. **Dosis dan Cara Pemakaian** *Cacing gilig* - Sapi 3 ml per 10 Kg BB, kuda, domba, kambing 2 ml per 10 Kg BB. *Cacing hati* - Sapi 4 ml per 10 Kg BB, domba, kambing 3 ml per 10 Kg BB. **Kemasan** 100 ml, 500 ml, 1 L. **Deptan RI** No. D 07023174 PTC. Obat bebas terbatas.

- 150. SIRNASET®** **Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung cyromazine 200 mg **Indikasi** Larvasida lalat pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 25 g/ton pakan selama 4-6 minggu dan

diulang 4 minggu kemudian Kemasan 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg Deptan RI No. D. 04102821 PKS. Obat keras

151. SOLUBENOL 100 MG/G

**Janssen Animal Health BV, Belgia/
Novindo Agritech Utama**

Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Flubendazole 100 mg, propyl parahydroxybenzoate 4 mg, methyl parahydroxybenzoate 4 mg, propylen glycol 50 mg **Indikasi** : Pengobatan Helminthiasis yang disebabkan oleh cacing *Ascaridia galii*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria sp* dan *Railletina spp* pada ayam dan pengobatan helminthiasis yang disebabkan oleh *Ascariss suum* pada babi. **Dosis dan Cara Pemakaian** : Pemberian melalui air minum pada ayam untuk cacing *nematoda*: 14,3 mg/kgbb/hari selama 7 hari, untuk cacing pita (*Railletina spp*) dengan dosis : 28,6 mg/kgbb/hari selama 7 hari. Pada babi diberikan dengan dosis 10 mg/ kgbb/hari selama 5 hari **Kemasan** Sachet 500 g **Deptan RI** No. I. 09033574 PKC

152. STOP WORM (BLUE TABLETS)

Vetafarm, Australia/Harapan Maju Indah

Bentuk sediaan Tablet Biru **Komposisi** Parazigvante 150 mg dan Oxfendazole 300 mg **Indikasi** Anthelmintik untuk semua jenis cacing dan telur cacing pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Anjing Dewasa diberikan peroral 1 tablet untuk 20 Kg BB, anak anjing peroral ¼ tablet untuk 5 Kg BB pada umur 4, 6, 8 minggu. Dan setelah itu setiap bulan. Sesuai dengan rekomendasi dokter hewan **Kemasan** botol plastik isi 20 tablet **Deptan RI** No. I. 0302530 PKM. Obat keras.

153. STOP WORM (PINK TABLETS)

Vetafarm, Australia/Harapan Maju Indah

Bentuk sediaan Tablet Merah Muda **Komposisi** Parazigvante 75 mg dan Oxfendazole 150 mg **Indikasi** untuk semua jenis cacing dan telur cacing pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Anjing Dewasa diberikan peroral 1 tablet untuk 10 Kg BB, anak anjing peroral 1/2 tablet untuk 5 Kg BB pada umur 4, 6, 8 minggu. Dan setelah itu setiap bulan. Sesuai dengan rekomendasi dokter hewan **Kemasan** botol plastik isi 20 tablet **Deptan RI** No. I. 030392631 PKM Obat keras

154. SURPIZIN

SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung piperazine heksahidrat **Indikasi** Antelmintik pada ayam, kalkun dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L serta jerigen 5 L dan 20 L **Kementan RI** No. D. 11121812 PTC. 2. Obat bebas terbatas

155. TAPINEX POWDER

Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Niclosamide 75% **Indikasi** Untuk membasmi cacing, khususnya cacing pita pada ternak sapi, kambing, domba dan ayam. Spesies cacing pita yang peka yaitu Ruminansia: *Moniezia spp*, *Paramastomum cervi* ;Ayam: *Railletina Davainea*; Itik: *Echinostoma spp* **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada angsa dan merpati karena akan menunjukkan efek samping setelah pemberian per oral. **Peringatan** Waktu henti obat pada susu dan daging adalah 2 hari Jangan diberikan pada angsa dan merpati karena akan menunjukkan

efek samping setelah pemberian per oral. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 100-200 mg per Kg BB (75 – 150 mg niclosamide per Kg BB) atau 100 g per 100 L air minum. Bubuk Tapinex dapat diberikan melalui air minum atau dicampurkan pada pakan ; Itik 80 mg per ekor (60 mg niclosamide per ekor); Sapi:5 g per 75 Kg BB (50 mg niclosamide per 1 Kg BB);Domba, kambing: 1 g per 10 Kg BB (75 - 100 mg niclosamide per 1 Kg BB) **Kemasan** 1 Kg **Deptan RI** No. I.0602100 PKS.2. Obat keras.

156. TETRAMISON INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** mengandung Tetramisole HCl **Indikasi** membasmi cacing pada sapi, domba *Mecistocirrus digitatus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Ascaris vitulorum*, *Dictyocaulus viviparus*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Haemonchus contortus*, *Oesophagostomum columbianum*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Ostertagia ostertagi*; Kuda *Ascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongylus equines*; Babi *Hyoststrongylus rubidus*, *Ascaris lumbricoides*, *Metastrongylus apri*, *Strongyloides ransomi*, *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*, *Stephanurus dentatus*; Unggas *Heterakis gallinae*, *Capillaria annulata*, *Railletina tetragona*, *Ascaridia galli* **Dosis dan cara pemakaian** Suntikan secara SC atau IM, Sapi, kuda 1-1,5ml/10 Kg BB, domba, rusa 0,75–1 ml/10 Kg BB, babi 0,75-1 ml/10 Kg BB, Unggas 0,05 ml/Kg BB. Pada umumnya diberikan 2 – 10 mg Tetramisol/Kg BB **Kemasan** 50 ml, 100 ml **Deptan RI** No. D. 0510075 PKC.1. Obat keras.

157. TM – PERAZINE

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Tiap ml mengandung piperazine citrate 400 mg **Indikasi** Memberantas seluruh cacing gelang pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Ascaris suum*, *Oesophagostomum* spp., *Neoascaris vitulorum*, *Strongylus* spp., *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum* Pada ayam, sapi, kambing, domba, babi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas umur 4-6 minggu: 30 ml/3 L air untuk 100 ekor. Umur > 6 minggu: 60 ml/6-10 L air minum untuk 100 ekor. Sapi: 10 ml/15 kg BB. Kambing/domba: 10 ml/15 kg BB. Babi: 5 ml/10 kg BB dan kuda: 5 ml/10 kg BB **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Kementan RI** No. D. 12124410 PTC. Obat keras

158. TOLOXAN

Fatro S.p.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Mengandung Levamisole hydrochloride **Indikasi** Mengobati infeksi cacing berspektrum luas, *Nematoda* gastrointestinal paru-paru dan infestasi *Fasciola hepatica* pada ruminansia **Peringatan** (bila ada) Kocok sebelum digunakan, jangan diberikan pada hewan bunting tua, pada beberapa kasus treatment dengan obat ini mungkin menyebabkan diare ringan selama 24-36 jam, tidak boleh digunakan selama hewan laktasi **Dosis dan cara pemakaian** Diberikan secara oral menggunakan individual syringe, dengan dosis untuk domba dan kambing diatas 15 Kg 5 ml, lebih dari 45 Kg 25 ml ; sapi berat 50 Kg 25 ml , 300 Kg ke atas 150 ml **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 02091876 PKC.1. Obat Keras.

159. TRIPLE CAPS

Eka Farma

Bentuk sediaan Kapsul **Komposisi** Piperazine **Indikasi** Sebagai anthelmintika pada ayam.
Dosis dan Cara Pemakaian Ditelankan **Kemasan** Sachet @10 kapsul **Deptan RI No. D. 10013788 PTM**

160. TRIWORM

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung: Piperazine citrate 570 mg, Phenothiazine 230 mg **Indikasi** Efektif terhadap: Cacing gelang (*Ascaridia galli*), Cacing caecum (*Heterakis gallinea*) **Perhatian** Hasil terbaik diperoleh jika pengobatan dilakukan pada malam hari setelah sorenya unggas dipuaskan makan selama ± 2 jam. **Dosis dan cara pemakaian** Ayam dan itik: Umur 4 - 6 minggu: $\frac{1}{2}$ kaplet. Lebih dari 6 minggu: 1 kaplet. Obat dimasukkan melalui kerongkongan lalu didorong ke dalam. Pengobatan dapat diulangi setiap bulan atau bila mana perlu. Pada keadaan yang berat pengobatan dilakukan setiap 2 minggu. **Kemasan** Botol isi 10 kaplet, 50 kaplet, 100 kaplet, 300 kaplet dan 1.000 kaplet **Deptan RI No. D. 0607203 PTM..2.** Obat bebas terbatas.

161. TRYPONIL

Interchemie Werken "De Adelaar" BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra

Bentuk sediaan serbuk injeksi **Komposisi** tiap 2,36 g mengandung Diminazine acetate 1,05g dan Phenozone 1,31 g **Indikasi** pengobatan babesiosis, piroplasmosis dan trypanosomiasis pada sapi, kucing, anjing, kambing, kuda, domba dan babi. **Kemasan** kotak 10 sachet @ 2,36 gram **Kementan RI No. I 10123964 PKS.** Obat keras.

162. VALBAZEN 11.25% SUSPENSION

Interphill Laboratories Inc, Philipina/
Pfizer Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Albendazole **Indikasi** Anthelmintik pada sapi, kerbau dan kambing Efektif terhadap cacing gelang larva dan dewasa (termasuk larva *Ostertagia* tipe II), cacing paru, cacing pita dan infeksi *fluke* kronis pada sapi, kerbau dan kambing. Dapat mengurangi jumlah cacing dan telur *fluke* yang diekskresikan. **Kontra Indikasi** Pemakaian obat ini tidak dianjurkan untuk hewan yang sensitif terhadap albendazole ataupun golongan benzimidazole. Tidak disarankan untuk digunakan pada hewan dengan gangguan fungsi hati, bunting dan sapi perah laktasi **Dosis dan cara pemakaian** Oral. Sapi dan kerbau : 4 ml / 45 kg berat badan; Kambing: 1 ml / 20 kg berat badan **Kemasan** Jerigen 1 liter **Deptan RI No. I. 09083684 PKC.** Obat keras.

163. VERM-O® BOLUS

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Mengandung Oxfendazole. **Indikasi** Memberantas cacing dan mencegah cacingan pada sapi, kerbau dan kuda yang disebabkan oleh cacing gelang saluran pencernaan, cacing paru-paru dan cacing pita. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kerbau 1 bolus per 200 Kg BB. Kuda 1 bolus per 90 Kg BB. **Kemasan** Pot 12 boli dan 24 boli. **Deptan RI No. D 01061356 PKM.2.** Obat keras.

164. VERM-O[®] KAPLET

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Kaplet **Komposisi** Mengandung Oxfendazole. **Indikasi** Memberantas cacing dan mencegah cacingan pada sapi, kerbau dan kuda yang disebabkan oleh cacing gelang saluran pencernaan, cacing paru-paru dan cacing pita. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kaplet per 45 Kg BB. **Kemasan** Strip @ 10 kaplet. **Deptan RI** No. D 03121483 PKM.2. Obat keras.

165. VERMICID

Eka Farma

Bentuk sediaan Kapsul **Komposisi** Piperazine **Indikasi** Sebagai anthelmintika pada babi. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditelankan **Kemasan** Sachet @100 gram **Deptan RI** No. D. 10013786 PTS

166. VERMIPRAZOL – 10%

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Albendazol 100 mg **Indikasi** Sapi/domba: gastrointestinal nematodiasis, pulmonary nematodiasis, hepatic distomatosis/trematodiasis, taeniasis/cestodiasis; Unggas Cestodiasis, Ascariasis, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral; Domba/kambing Nematodiasis/Taeniasis 2 – 3 ml/dewasa, 1 – 2 ml/muda, Sapi 25 ml/dewasa dan 15 ml/muda Umum 1 ml/10 Kg BB **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI** No. D. 09073658 PKC. Obat keras.

167. VERMIXON SIROP

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Sirup **Komposisi** Piperazine hexahydrate 38 % b/v **Indikasi** Ascariasis **Perhatian** Sebelum pemberian obat, ayam dipuasakan makan selama $\pm$ 2 jam. Pengulangan diberikan setelah 30 hari atau bila perlu. Hentikan pemakaian obat 5 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur 4-6 minggu 15 ml tiap 3 L air minum untuk 50 ekor ayam. Ayam umur lebih dari 6 minggu 30 ml tiap 4-5 L air minum untuk 50 ekor ayam **Kemasan** Botol isi 20 ml, 60 ml, 120 ml, 1 L dan Jeriken isi 5 L, 20 L **Deptan RI** No. D 02060150 PTC.2 Obat bebas terbatas.

168. VERMIZYN

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap gram mengandung Piperazine citrate 99,6% **Indikasi** Oxyuriasis, ascariasis **Perhatian** Obat diberikan pada pagi hari sebelum ayam diberi makan atau sore hari, setelah siang harinya ayam dipuasakan makan selama $\pm$ 2 jam. Setelah 4-6 jam kemudian, kandang dibersihkan dari cacing. Pengobatan dapat diulang tiap 1-2 bulan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur 4 - 6 minggu 10 gram untuk 30 ekor ayam. Ayam umur lebih dari 6 minggu: 20 gram untuk 30 ekor ayam **Kemasan** Bungkus plastik isi 10 g. **Deptan RI** No. D. 0607146 PTS.2. Obat bebas terbatas.

169. VIRBAMEC LA

Virbac S.A., Perancis / Kalbe Farma Tbk

Bentuk sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Mengandung Ivermectin **Indikasi** Antelmintika pada sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba 1 mL/50 Kg BB, injeksi (SC) Babi 1 mL/33 Kg BB, injeksi (SC/IM.) **Kemasan** Botol 50mL, 200 mL, 500 mL dan 1000 mL **Deptan RI** No. I. 04042751 PKC Obat keras

170. WONDER IVERMEC INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** mengandung Ivermectin **Indikasi** Sebagai antiparasit pada sapi, kambing, domba, babi dan kuda. **Dosis dan cara pemakaian** Suntikan secara subkutan pada kulit longgar di bagian depan atau belakang bahu. Sapi 1 ml/50 kg BB, Kuda 1 ml/50 kg BB, Kambing/domba 0,5 ml/25 kg BB, Babi 1 ml/33 kg BB. Volume pemakaian maksimum adalah 10 ml per lokasi injeksi. Pemakaian melebihi 10 ml sebaiknya agar disuntikkan di bagian lain yang sesuai. **Kemasan** 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml. **Deptan RI No.** D.100838888 PKC. Obat keras.

171. WORMECTIN INJEKSI

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Cairan. Injeksi **Komposisi** 22, 23-dihydroavermectin B1a dan 22, 23-dihydroavermectin B1b 1 % **Indikasi** Mengobati penyakit cacingan. parasit luar (larva insekta, kutu, caplak dan tungau) **Perhatian** Jangan diberikan pada anjing dengan ras Collie. Hentikan pemakaian obat 28 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan cara pemakaian** Disuntikkan di bawah kulit (subkutan) pada Sapi & kerbau: 1 ml tiap 50 kg berat badan tiap hari. Kambing & domba: 0,5 ml tiap 25 kg berat badan tiap hari. Babi: 1 ml tiap 33 kg berat badan tiap hari. Anjing & kucing 0,02 ml tiap kg berat badan tiap hari **Kemasan** Ampul/botol isi 2 ml, 5 ml dan 20 ml. **Deptan RI No.** D. 0202938 PKC. Obat Keras.

172. WORMINEX 10% LIQUID

**Kepro B.V., Holland, Belanda/
Otasindo Prima Satwa**

Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Setiap ml mengandung Albendazole 100 mg **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan infeksi cacing saluran pencernaan (Bunostomum, Cooperia, dll), cacing hati (Fasciola hepatica dewasa), cacing paru – paru (dictyocaulus viviparus dan D. Filaria) serta cacing pita (Moniezia spp) pada sapi, anak sapi, domba dan kambing. **Dosis dan cara pemakaian** Untuk Pemberian Oral. Pada kambing dan domba : 1 ml / 20 kg BB. Untuk cacing hati : 1 ml / 10 kg BB. Pada anak dan sapi dewasa : 1 ml / 12 kg BB. Untuk cacing hati: 1 ml / 10 kg BB. Pada unggas : 0,1 ml / kg BB. **Kemasan** Botol PE – pharma 1 liter (12 botol per karton boks). **Deptan RI No.** I. 07043207 PTC. Obat bebas terbatas.

173. WORMNIL

CIPLA, Ltd., India/Paeco Agung

Bentuk sediaan Pasta **Komposisi** Setiap syringe mengandung Abamectin dan Praziquantel, **Indikasi** Untuk pengobatan dan kontrol cacing pita, cacing strongylus besar&kecil, cacing kremi, ascaris, cacing rambut, cacing gastrointestinal (*Bonustomum sp*) cacing paru-paru (*Dictyocaulus sp*) dan cacing gilig pada usus (*Oxyuris equi*), Larva Bots (*Gasterophilus sp*, larva lalat). **Peringatan** Jika kuda dikonsumsi dagingnya, jangan gunakan obat kurang dari 28 hari sebelum dipotong. **Dosis dan cara pemakaian** diberikan secara oral dengan dosis 1 ml/20 kg BB. Isi dalam 1 syringe dapat diberikan pada kuda dengan berat badan 600 kg, tiap tanda strip pada syringe memberikan 5,4 gr obat untuk berat badan 100 kg. **Kemasan** 1 kotak isi 1 syringe **Deptan RI No.** I 04092814 PKM. Obat keras.

174. WORMZOL B

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** Setiap bolus mengandung Albendazole 1.500 mg **Indikasi** Membasmi semua stadium cacing di saluran pencernaan dan pernapasan pada sapi dan kerbau. Cacing gilik (nematoda) bentuk telur, larva dan dewasa Cacing paru (*Dyctiocaulus sp.*, *Muellerius sp.*), larva dan dewasa, Cacing pita (*Moniezia sp.*) bentuk dewasa, Cacing hati (*Fasciola sp.*) bentuk dewasa **Perhatian** Jangan berikan obat pada 45 hari awal kebuntingan. Jangan konsumsi susu yang diperah kurang dari 4 hari setelah pengobatan. Hentikan pemberian obat 12 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan cara pemakaian** Sapi dan kerbau: Untuk membasmi cacing gilik, cacing paru dan cacing pita: 1 bolus tiap 200 Kg BB. Untuk membasmi cacing hati 2 bolus tiap 200 Kg BB **Kemasan** Pot isi 10 bolus dan 50 bolus **Deptan RI** No. D 02071084 PKM. Obat keras.

175. WORMZOL K

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Kaplet obat cacing berspektrum luas **Komposisi** Setiap kaplet mengandung albendazole 300 mg **Indikasi** Membasmi cacing gilik bentuk larva dan dewasa, cacing paru-paru bentuk larva dan dewasa, cacing pita (*Moniezia sp.*) bentuk dewasa, cacing hati (*Fasciola gigantica*) bentuk dewasa **Perhatian** Jangan berikan obat pada 45 hari awal kebuntingan **Waktu Henti Obat** Jangan konsumsi susu yang diperah kurang dari 4 hari setelah pengobatan. Hentikan pemberian obat 12 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Domba dan kambing: 1 kaplet tiap 60 kg BB **Kemasan** Pot 10 kaplet, 50 kaplet dan 100 kaplet **Deptan RI** No. D. 0202111 PKM. Obat keras

176. WORMZOLE-100 SOL

Shinil Biogen Co, Ltd, Korea/Agrotech Veterindo Jaya

Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Albendazole **Indikasi** Pengobatan terhadap infestasi cacing spektrum luas pada sapi, kuda, domba dan ayam **Dosis dan cara pemakaian** **Kemasan** Botol/ Jerigen 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 08013385 P

177. X-TRA ALBENDAZ

Cakar Mas

Bentuk sediaan Bolus **Komposisi** setiap bolus mengandung 750 mg Albendazole **Indikasi** untuk mengobati infestasi penyakit yang disebabkan oleh cacing diantaranya yaitu *Ostertagia ostertagi*, *Haemonchus contortus* dan *Fasciola hepatica* pada sapi dan kambing. **Peringatan** jangan diberikan pada hewan pada masa kebuntingan awal **Dosis dan cara pemakaian** sapi : 10 mg/ kg bb, kambing 7,5 mg/kg bb. **Kemasan** Botol @ 15 bolus **Deptan RI** No. D 08103518 PKM. Obat keras.

178. ZIPYRAN PLUS

Laboratorios Calier SA, Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk sediaan Tablet **Komposisi** Mengandung Praziquantel, Pirantel (embonate) dan Febantel **Indikasi** Anthelmintika pada anjing **Dosis dan cara pemakaian** lihat kemasan **Kemasan** Bok 250 tablet **Deptan RI** No. I. 05032902 FKM. Obat keras.

179. ZODALBEN 12,5%

Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol /Megan Galus Kinantan

Bentuk sediaan Cairan. **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung Albendazole 12,5 gr **Indikasi**

Merupakan obat cacing berspektrum luas yang juga efektif untuk telur dan larva ; Mengobati infeksi cacing pencernaan, cacing paru dan cacing hati pada hewan ternak seperti sapi, domba, kambing dan babi; Efektif untuk cacing a.l. *haemonchus* sp., *ostertagia* sp., *trichostrongylus* sp., *dictyocaulus* sp., *moniezia* sp., *fasciola* sp, dll **Peringatan** Waktu henti obat Daging=10-14 hari, Susu=4 hari **Dosis dan cara pemakaian** Sapi, kambing, domba dan babi=0,04 ml/Kg BB; *Fasciola*= 0,06 ml/Kg BB **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 02102206 PKC.1. Obat keras. ****

ANTI EKTO PARASIT

01.08

1. ADVANTIX

**Kvp Pharma + Veterinar Produkte GmbH,
Jerman/Bayer Indonesia**

Bentuk Sediaan: cairan luar. **Komposisi:** setiap ml mengandung Imidacloprid 100mg, Permethrin 500 mg. **Indikasi:** Untuk pencegahan dan pengobatan kutu (*Ixodes ricinus*, *Rhipicepalus sanguineus*, *Dermacentor* spp) dan flea (*Ctenocephalides* spp), infestasi dan repulsi nyamuk dan sand flies pada anjing. **Peringatan:** Hati-hati jangan sampai isi pipet menyentuh mata atau mulut dari hewan yang diobati, sangat beracun bagi kucing. **Dosis dan Cara Pemakaian:** Totolkan cairan Advantix dipermukaan kulit. Anjing dengan berat badan < dari 4 kg: 0.4 ml. Anjing dengan berat badan 4-10 Kg: 1 ml. Anjing dengan berat badan 10-25 Kg: 2,5 ml. Anjing dengan berat badan 25-40 Kg: 4 ml. Anjing dengan berat > 40 Kg: gunakan kombinasi pipet. **Kemasan:** Dus, 4 pipet @ 0,4 ml ; 1 ml ; 2,5 ml dan 4 ml **Deptan RI** No.I.10113941 PTC. Obat bebas terbatas.

2. ADVOCATE

**KVP Pharma + Veterinar produkte GmbH,
Jerman/Bayer Indonesia**

Bentuk Sediaan: cairan luar. **Komposisi:** setiap ml mengandung Imidacloprid 100mg, Moxidectin 25 mg. **Indikasi:** Untuk anjing yang menderita, atau berisiko menderita, infeksi parasit campuran: Untuk pengobatan dan pencegahan gangguan kutu (*Ctenocephalides felis*), pengobatan gangguan kutu telinga *Otodectes cynotis*, kudis sarkoptis (disebabkan oleh *Sarcoptes scabiei* var. *canis*), demodekosis (disebabkan oleh *Demodex canis*), mencegah penyakit heartworm (larva L3 dan L4 dari *Dirofilaria immitis*), dan pengobatan nematoda gastrointestinal (larvae L4, bentuk dewasa muda dan dewasa dari *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* dan *Uncinaria stenocephala*, *Toxocara leonina* dan *Trichuris vulpis* dewasa). Obat dapat digunakan sebagai bagian dari strategi pengobatan untuk dermatitis alergi kutu. **Peringatan:** Hati-hati jangan sampai isi pipet menyentuh mata atau mulut hewan. Jangan digunakan pada anak anjing berumur 7 minggu. **Dosis dan Cara Pemakaian:** Totolkan cairan Advocate dipermukaan kulit. Anjing dengan berat badan < dari 4 kg: 0.4 ml. Anjing dengan berat badan 4-10 Kg: 1 ml. Anjing dengan berat badan 10-25 Kg: 2,5 ml. Anjing dengan berat badan 25-40 Kg: 4 ml. Anjing dengan berat > 40 Kg: gunakan kombinasi pipet yang sesuai. **Kemasan:** Dus, 3 pipet @ 0,4 ml ; 1 ml ; 2,5 ml dan 4 ml **Deptan RI** No.I.10073866 PTC. Obat bebas terbatas

3. AMBIFLUD TRIAZIN

Vetanco S.A., Argentina /Pakan Serasi

Bentuk sediaan Powder **Komposisi** Ciromacine 1 % **Indikasi** Insect inhibitor pada pakan unggas **Dosis dan cara pemakaian** 500 g / ton pakan **Kemasan** 20 kg / bag **Deptan RI** No. I. 03052580 FTS. Obat bebas terbatas

4. ANTIGALE

Laboratories Biove, Perancis/SHS Internasional

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Carbaryl **Indikasi** Pengobatan otitis **Dosis dan Cara Pemakaian:** semprot pada bagian yang sakit **Kemasan:** botol 60 ml **Deptan RI** No. I. 07113339 PKC. Obat keras.

5. **BAYMEC** **Bayer Korea, Ltd/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan: Injeksi **Komposisi:** setiap ml mengandung Ivermectin 10 mg. **Indikasi:** Untuk pengobatan dan kontrol endo-ektoparasit pada babi dan sapi. **Dosis dan cara pemakaian: Babi :** Suntikan secara intravena atau subkutan pada dosis 1 ml/ 33 Kg BB. **Sapi :** Suntikan secara intramuskular atau subkutan pada dosis 1 ml / 50 Kg BB. Perhatian: Jika dosis yang diberikan lebih dari 10 ml, dibagi menjadi 2 bagian dan diinjeksikan di 2 tempat. Produk ini toksik untuk organisme akuatik. Terkadang dapat terjadi pembengkakan pada daerah suntikan, namun akan segera hilang. Cuci tangan setelah melakukan pengobatan. **Kemasan:** Dus, vial @ 100 ml **Deptan RI** No.I.09123753 PKC. Obat keras.
6. **BAYTICOL 60 EC** **KVP Pharma + Veteriner GmbH, Jerman dan dikemas ulang oleh Bayer ThaiCo, Ltd Thailand/Bayer Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan luar. **Komposisi** Flumethrin 6%. **Indikasi** Gangguan kutu anjing, kutu loncat dan tunggal dari semua jenis dan tingkat pertumbuhan kutu rambut pada anjing. **Kontraindikasi** Jangan gunakan pada hewan dengan luka kulit yang lebar. Jangan gunakan bersamaan dengan produk antiparasit lain. **Dosis dan Cara Pemakaian** Bayticol 60 EC harus diencerkan dengan air sebelum dipakai untuk kutu anjing , kutu loncat, dan tungau: 5 ml/10 liter air, untuk kutu rambut : 10 ml/10 liter air. Mandikan dan keramasi anjing terlebih dahulu kemudian ratakan larutan yang sudah diencerkan pada permukaan tubuh anjing kemudian gosok dengan arah berlawanan pada rambut tanpa dibilas. **Kemasan** Botol 10 ml. **Deptan RI** No. 1.08051376 PTC. 2.Obat bebas terbatas.
7. **BERNOMECE** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Liquid injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung ivermectin 10 mg **Indikasi** Memberantas parasit internal dan eksternal Perhatian Dilarang digunakan pada sapi perah yang sedang laktasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui injeksi IM. Sapi: 1 ml/50 kg BB. Kambing/domba: 0,5 ml/25 kg BB. Babi: 1,5 ml/50 kg BB. Anjing: 0,1 ml/5 kg BB **Kemasan** 20 ml dan 50 ml **Deptan RI** No. D. 0010193 PKC. Obat keras
8. **BIVERMECTIN 1%** **Bio-Pharmachemie Co., Lt, Vietnam/Giri Jaya Mandiri**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Ivermectin **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan parasit internal maupun eksternal pada sapi, babi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** **Kemasan** Vial 10 ml, 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. I. 08063445 PKC. Obat keras.
9. **BUTOX 50** **Intervet Intl. GmbH, Jerman/Intervet Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Per ml mengandung 50 mg Deltamethrin **Indikasi** Pengobatan ektoparasit kutu, pinjal, nyamuk, caplak, lalat dan tungau pada sapi, domba dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Spray atau dipping dengan dosis 12,5 ppm - 50 ppm **Kemasan** Botol 1000 ml **Deptan RI** No. I 05062068 PTC.1 Obat bebas terbatas.
10. **CERTIFECT L SPOT ON** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung fipronil, S-methoprene dan amitraz **Indikasi** Untuk pengobatan dan pengendalian kutu (pinjal) dan investasi caplak pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk anjing dengan BB 20-40 kg menggunakan dosis 4,28 ml. Cara pemakaian dengan ditetaskan pada daerah tengkuk anjing **Kemasan** Box @ 1 blister isi 1 pipet @ 4,28 ml dan box @ 1 blister isi 3 pipet @ 4,28 ml **Deptan RI** No. I. 12044260 PTS.

11. **CERTIFECT M SPOT ON** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung fipronil, S-methoprene dan amitraz **Indikasi** Untuk pengobatan dan pengendalian kutu (pinjal) dan investasi caplak pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk anjing dengan BB 10-20 kg menggunakan dosis 2,14 ml. Cara pemakaian dengan diteteskan pada daerah tengkuk anjing **Kemasan** Box @ 1 blister isi 1 pipet @ 2,14 ml dan box @ 1 blister isi 3 pipet @ 2,14 ml **Deptan RI** No. I. 12044259 PTS.
12. **CERTIFECT S SPOT ON** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung fipronil, S-methoprene dan amitraz **Indikasi** Untuk pengobatan dan pengendalian kutu (pinjal) dan investasi caplak pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk anjing dengan BB 2-10 kg menggunakan dosis 1,07 ml. Cara pemakaian dengan diteteskan pada daerah tengkuk anjing **Kemasan** Box @ 1 blister isi 3 pipet @ 1,07 ml **Deptan RI** No. I. 12034232 PKC.
13. **CERTIFECT XL SPOT ON** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung fipronil, S-methoprene dan amitraz **Indikasi** Untuk pengobatan dan pengendalian kutu (pinjal) dan investasi caplak pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk anjing dengan BB > 40 kg menggunakan dosis 6,42 ml. Cara pemakaian dengan diteteskan pada daerah tengkuk anjing **Kemasan** Box @ 1 blister isi 1 pipet @ 6,42 ml dan box @ 1 blister isi 3 pipet @ 6,42 ml **Deptan RI** No. I. 12044261 PTS.
14. **CEVAMEC 1%** **Ceva Sante Animale/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan Komposisi *Ivermectin* 1 g **Indikasi** untuk pencegahan dan pengobatan gastrointestinal nematoda, lungworm, eyeworm, myiasis (warble, screw worm), tungau, caplak, nasal worm dan kutu. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, Domba, Kambing 0.2 mg/kg berat badan (200 mg/kg) *Ivermectin*, misalnya 1 ml per 50 kg LBW atau 0.5 ml/25 kg LBW. Disuntikan secara sub kutan di bagian depan atau bahu. Babi 0.3 mg/kg LBW (300 mg/kg) *Ivermectin*, contohnya 1.5 ml per 50 kg LBW. Disuntikan secara sub kutan di bagian leher. **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 0902173 PKC.1 Obat keras.
15. **CEVAZURIL** **Ceva Sophavet, Maroko/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung toltrazuril **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan koksidirosis pada broiler, pullet dan breeder yang disebabkan oleh *Eimeria* sp **Dosis dan Cara Pemakaian** 7 mg toltrazuril/kg BB diberikan selama dua hari berturut-turut atau sama dengan 28 ml Cevazuril®/100 kg BB/hari selama dua hari berturut-turut. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada kemasan **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI** No. I. 07103321 PKC. Obat keras
16. **CIPERGEN** **Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa**
Bentuk sediaan Cairan Komposisi mengandung Cypermethrin 10% (v/v) **Indikasi** Insektisida pyrethroid sintetis dan efisien karena berspektrum luas. Digunakan dipeternakan sapi dan ayam, kennel, dan fasilitas untuk tempat-tempat hewan lainnya. Efektif terhadap lalat, kutu dan tungau. Dicirikan oleh adanya efek menghancurkan yang terlihat nyata dan memiliki daya kerja yang tinggi pada dosis rendah, sehingga efektif terhadap larva dan bentuk dewasanya dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap larva dan bentuk dewasanya dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap telur. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebelum digunakan, kandang dibersihkan dari residu organik (feses, urin). Aplikasi dilakukan saat hewan berada diluar

kandang. **Dosis** Larutkan 10 ml kedalam 1 liter air. Aplikasikan 5 liter campuran untuk tiap 100 m² permukaan **Kemasan** 1 liter **Deptan RI** No. I. 07073254 PKC. Obat keras.

17. **CYDECTIN 1 %** **Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/ PT. Pfizer Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan. Komposisi mengandung Moxidectin **Indikasi** Cydectin sangat efektif untuk pengobatan dan pengendalian endo dan ekto parasit pada sapi, domba dan kambing, seperti cacing gastrointestinal (stadium larva IV dan dewasa), cacing paru-paru (larva stadium IV dan dewasa), kutu (semua stadium), tungau (semua stadium) dan caplak (semua stadium). Kontra Indikasi Hentikan pengobatan 28 hari sebelum hewan disembelih. Air susu tidak boleh dikonsumsi dalam 60 hari setelah melahirkan. Peringatan Jangan diberikan melalui suntikan IM atau IV. Jangan diberikan kurang dari dosis atau melebihi dosis **Dosis dan cara pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC dengan dosis 0,5 ml/25 Kg BB atau 1 ml / 50 Kg BB. **Kemasan** Botol 50 dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 0109935 PKC. Obat keras.

18. **CYPER KILLER 25 WP** **Choong Ang Biotech, Korea/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Dalam 1 kg mengandung Cipermethrin 250 gr. **Indikasi** Membasmi lalat, kutu ayam, kutu itik, kutu sapi, kutu anjing, scabies, caplak, semut, rayap, laba-laba, tungau, nyamuk, kecoa, kutu busuk, kutu buku. **Dosis dan Cara Pemakaian** Serangga terbang 30 g/L air untuk luas bidang semprot 180 m². Serangga merayap 60 g/L air untuk luas bidang semprot 180-300 m². Kutu dan Caplak 30 g / 50 L air dan tubuh hewan / ayam. Scabies 30 g/100 L air, untuk dipping. **Kemasan** 30 g/pack. **Deptan RI** No. I.07061160 PTS.3. Obat keras.

19. **CYROMAS- 1%** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Cyromazine **Indikasi** Anti lalat pada kandang unggas dan kotoran ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 gram CYROMAS-1% dicampur dalam 1 ton pakan **Kemasan** Sachet 1 Kg **Deptan RI** No. D. 08063452 FTS. Obat bebas terbatas.

20. **CYROMAS- 10%** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Cyromazine **Indikasi** Anti lalat pada kandang unggas dan kotoran ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 50 gram CYROMAS-10% dicampur dalam 1 ton pakan **Kemasan** Sachet 1 Kg **Kementan RI** No. D. 11074116 FTS. Obat bebas terbatas.

21. **CYROMAZIN – 10** **Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung cyromazine 10 g **Indikasi** Membasmi lalat dan kontrol metamorphosis **Dosis dan Cara Pemakaian** 300-500 g/ton pakan dan dicampur dengan pakan **Waktu henti obat** 3 hari sebelum hewan dipotong. Hindari kontak langsung dengan mata atau kulit **Kemasan** Dalam kantong kertas 10 kg/kantong **Kementan RI** No. I. 1206583 PTS. 1. Obat bebas terbatas

22. **CYROZINE-10** **KBNP, Inc. / Blue Sky Biotech**
Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Cyromazine 1% **Indikasi** Mengendalikan larva dan memutuskan siklus lalat di peternakan unggas **Peringatan** Waktu henti obat 3 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 100-500g/ton pakan **Kemasan** Sak 20kg **Deptan RI** No. I. 04042746 PTS. Obat bebas terbatas

23. ECOFLEECE

**Bimeda Veterinary Pharmaceuticals, Irlandia/
Vetindo Citrapersada**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi setiap L mengandung Sipermetrin (High-Cis) (Cis Isomer 80 %, Trans-Isomer 20%) **Indikasi** sangat efektif membasmis berbagai jenis ektoparasit pada ternak antara lain lalat dan larvanya (*flies*), caplak (*ticks*), lice, mites **Kontra Indikasi** jangan diberikan pada ternak jika sedang lemah, payah, kehausan, jangan diberikan pada lebah dan ikan. **Peringatan** jangan dicampur dengan bahan kimia lain, simpanlah wadah yang masih ada isinya dalam keadaan tertutup rapat, jauhkan dari jangkauan anak dan makanan hindarkan kontak dengan kulit dan mata. Hindari menghirup obat ini gunakan pelindung kepala, badan, tangan, hidung-mulut, kaki **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi semprotkan seluruh tubuh 1 1000 untuk ektoparasit sedangkan untuk lalat 5 1000, kandang, domba, unggas semprot 1 1000. Kandang ternak semprot 100 ml (per 5-10 l) air untuk tiap 100m² **Kemasan** 1 l **Deptan RI** No. 02082029 PKC.1. Obat Keras.

24. ECOMECTIN 1% INJECTION

**Eco Animal Health Ltd, Inggris /
Agrotech Veterindo Jaya**

Bentuk sediaan Cairan Komposisi setiap ml mengandung *Ivermectin* 1% w/v **Indikasi** Pengobatan terhadap endoparasit (*gastro-intestinal nematodes, lungworms, eyeworms*) dan ektoparasit (kutu, tungau, caplak, dll) **Peringatan** Daging tidak boleh dikonsumsi dalam 21 hari setelah pengobatan. Tidak dianjurkan diberikan pada sapi yang sedang laktasi. Hentikan pengobatan 28 hari sebelum melahirkan. Jangan diberikan secara IM atau IV. **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi 1 ml/50 kg BB, Kambing 1 ml/50 kg BB, Babi 1 ml/33 kg BB, diberikan melalui suntikan SC **Kemasan** Botol 50 ml **Deptan RI** No. I. 0206745 PKC. Obat keras.

25. FINIGEN

Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa

Bentuk sediaan Cair Komposisi Imidacloprid 10% (v/v) **Indikasi** merupakan insektisida golongan (*neonicotinoid*) yang bekerja secara sistemik. Efektif terhadap serangga penghisap, lalat putih, kutu tanaman, thrips, kumbang, nyamuk dan *tropinota sp.* **Dosis dan Cara Pemakaian** larutkan 10 ml kedalam 1 liter air. Aplikasikan 5 liter campuran untuk tiap-tiap 100m² permukaan dimana serangga biasa hinggap. Setelah dicampur dengan air semprotkan keatas permukaan, disarankan untuk membersihkan terlebih dahulu permukaan dari zat-zat organik (feses, urin) sebelum diaplikasi dilakukan. **Kemasan** 1 liter **Deptan RI** No. I. 07113335 PTC. Obat bebas terbatas.

26. FLY ZERO GRANULE

**Samyang Anipharm Co, Ltd, Korea/
Blue Sky Biotech**

Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Imidaclopid, z-9-tricosene **Indikasi** Pengendali lalat **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebarkan dan umpankan secara langsung pada permukaan atau letakkan pada wadah berbentuk piring di fasilitas produksi hewan ternak di mana lalat berkerumun, dosis yang dianjurkan adalah 20-25 g per 10m² dan dapat dikurangi atau ditambah sesuai luas area atau keadaan **Kemasan** Box isi 5 sachet @ 100 g **Deptan RI** No. I. 09063627 PTS. Obat bebas terbatas.

27. FRONTLINE PLUS FOR CATS

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung fipronil dan S-methoprene **Indikasi** Anti ektoparasit pada kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Pegang botol bagian atas dengan tangan kanan. Balikkan ujung karet pegangan sehingga airnya tertahan di pipet. Sibak bulu hewan bagian belakang dan bagian pangkal leher di depan pundak sampai terlihat kulitnya. Tempatkan

ujung pipet pada bagian kulit dan tekan pegangan pipet, semprotkan ke satu titik pada kulit tersebut Kemasan Box 1 blister isi 3 pipet @ 0,5 ml dan Box 1 blister isi 6 pipet @ 0,5 ml Deptan RI No. I. 05062945 PKC. Obat keras

28. FRONTLINE PLUS FOR DOGS

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung fipronil dan S-methoprene Indikasi Anti ektoparasit pada anjing Dosis dan Cara Pemakaian Pegang botol bagian atas dengan tangan kanan. Balikkan ujung karet pegangan sehingga airnya tertahan di pipet. Sibak bulu hewan bagian belakang dan bagian pangkal leher di depan pundak sampai terlihat kulitnya. Tempatkan ujung pipet pada bagian kulit dan tekan pegangan pipet semprotkan ke satu titik pada kulit tersebut Kemasan Box 1 blister isi 3 pipet @ 0,67 ml @ 1,34 ml @ 2,68 ml @ 4,02 ml dan Box 1 blister isi 6 pipet @ 0,67 ml @ 1,34 ml @ 2,68 ml @ 4,02 ml Deptan RI No. I. 05062944 PKC. Obat keras

29. FRONTLINE SPOT ON

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung fipronil 10% Indikasi Untuk pengobatan dan pengendalian kutu (pinjal) pada anjing dan kucing serta investasi caplak pada anjing Dosis dan Cara Pemakaian Pada kucing: 0,5 ml. Pada anjing dengan BB < 10 kg: 0,67 ml (S). Pada anjing dengan BB 11-20 kg: 1,34 ml (M). Pada anjing dengan BB > 20 kg: 2,68 ml (L). Cara pemakaian dengan diteteskan pada daerah tengkuk anjing Kemasan 1 kotak berisi 3 pipet @ ukuran S 0,67 ml, M 1,34 ml, L 2,68 ml untuk anjing. Ukuran 0,5 ml untuk kucing Deptan RI No. I. 1108816 PKC. 1. Obat keras

30. FRONTLINE SPRAY

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan spray Komposisi Tiap 100 ml mengandung fipronil 0,25 g Indikasi Untuk pengobatan dan pengendalian kutu (pinjal) pada anjing dan kucing, serta investasi caplak pada anjing Dosis dan Cara Pemakaian Pada kucing: 3 ml/kg BB (6 kali penyemprotan). Pada anjing dengan BB < 10 kg: 3 ml/kg BB (6 kali penyemprotan) dengan frontline kemasan 100 ml. Pada Anjing dengan BB > 10 kg: 3-6 ml/kg BB (12 kali penyemprotan) dengan frontline kemasan 250 ml Kemasan Botol spray @ 100 ml dan 250 ml Deptan RI No. I. 12041899 PTC. 2. Obat bebas terbatas

31. HEXIPRA METRIN

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung Cypermethrin 50 mg Indikasi Unggas parasit eksternal; Babi/domba/kambing/sapi scabies, parasit eksternal Dosis dan Cara Pemakaian Spray/dimandikan; Unggas spray 5 ml/L air; Babi spray 1 – 2 ml/L air; Domba/kambing dimandikan 1 ml/L air, Spray 5 ml/L air; Sapi 3 – 10 ml/L air; Umum kontrol serangga dan lalat 10 ml/L air Kemasan Botol 250 ml, 1 Liter Deptan RI No. I. 03102656 PTC Obat keras.

32. IVERVET

Vetanco S.A. Argentina /Pakan Serasi

Bentuk sediaan Injeksi Komposisi Ivermectin 1 % Indikasi Pemberantas ekto dan endo parasit pada sapi dan babi Dosis dan Cara Pemakaian Sapi 1 ml/50 kg BB, Babi 1 ml/33kg BB Kemasan 50 ml/botol Deptan RI No. I. 03052581 PKC Obat keras.

33. IVOCIP

Pyridam Veteriner

Bentuk sediaan Cairan.. injeksi. Komposisi Mengandung Ivermectin 1 % b/v. Indikasi Efektif mengobati dan mengontrol berbagai macam infeksi parasit baik internal (berbagai

jenis cacing) dan eksternal (caplak, kutu, tungau, lalat, dsb.). **Dosis dan cara pemakaian** Untuk sapi, kerbau, kambing dan domba 1 ml (10 mg *Ivermectin*) per 50 Kg BB; Babi 1 ml per 33 Kg BB, disuntikkan sub kutan. **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml. **Deptan RI** No. I. 05032904 PKC. Obat keras.

- 34. IVOMEC INJECTION** **Merial Saude Animal, Ltda, Brasil/Paeco Agung**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** ivermectin 1 % (10 mg / ml) **Indikasi** Mengendalikan dan Mengobati endo dan ektoparasit pada sapi, domba / kambing, kerbau, babi, kelinci dan anjing (kecuali ras collie) dan sangat efektif terhadap cacing gastrointestinal (dewasa dan muda), cacing paru – paru (dewasa dan muda), larva insekta, lalat screw worm, kutu, tungau, caplak dan scabies / kudis pada anjing, kelinci dan kambing **Kontra Indikasi** Hentikan pengobatan 21 hari sebelum hewan disembelih. Jangan diberikan, jika air susunya digunakan untuk konsumsi manusia dalam waktu 28 hari setelah melahirkan atau selama laktasi. **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC dengan dosis sapi (1ml / 50 Kg BB), kambing / domba (1 ml /50 Kg BB) dan babi (1 ml / 33 Kg BB) **Kemasan** botol berisi 50ml. **Kementan RI** No. I. 11081269 PKC.3 Obat Keras
- 35. IVOMEC F INJECTION** **MSD-Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung *Ivermectin* 1 % dan Clorsulon 10%. **Indikasi** Anthelmintik (endoparasit dan ektoparasit) pada sapi dan domba **Peringatan** withdrawal time untuk daging 28 hari **Dosis dan cara pemakaian** 1 ml / 50 Kg BB. **Kemasan** botol 50 dan 200 ml. **Deptan RI** No. No I 04022717 PKC. Obat keras.
- 36. KILTIX** **KVP Pharma + Veterinar produkte GmbH, Jerman.**
Dikemas ulang oleh Bayer Thai, Co., Ltd, Thailand/Bayer Indonesia
Bentuk Sediaan: Collar. **Komposisi:** Propoxur 10% dan Flumethrin 2,25%. **Indikasi:** Obat antiparasit untuk mengendalikan kutu pada anjing dan melindungi terhadap re-infestasi. **Peringatan:** Iritasi pada anjing dapat terjadi jika collar dipakai terlalu ketat, kendurkan ikatannya. Jika iritasi menetap, lepaskan collarnya. Tidak boleh digunakan pada anjing dengan lesi kulit yang luas, sakit atau anjing yang lemah atau pada anak anjing. Hindari anjing menggigit atau mengunyah collar. **Dosis dan cara pemakaian:** Pasang collar di sekitar leher anjing. Collar harus dipakai secara berkelanjutan. Lepaskan collar ketika memandikan anjing atau sebelum anjing berenang & pasang kembali kalau sudah kering. Ganti collar setiap 6 bulan sekali. **Kemasan:** Dus, 1 pouch isi 1 collar large dan Dus, 1 pouch isi 1 collar medium **Kementan RI** No.I.11014002 PTM. Obat bebas terbatas
- 37. K.O-MEX EC** **Samyang Anipharm Co., Ltd. /Blue Sky Biotech**
Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Fenitrothion dan tetramethrin **Indikasi** Pengendalian populasi lalat, nyamuk dan parasit eksternal pada hewan, kandang hewan dan sekitarnya. **Peringatan** Jangan disemprotkan pada pakan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengendalian populasi lalat, nyamuk, kecoa, kutu, pinjal dan semut – Encerkan 1 botol (100 ml) dengan 5-10 L air lalu semprotkan pada dinding, atap dan lantai seluas 100-200 m²; Pengendalian parasit eksternal – Encerkan 1 botol (100 ml) dengan 20-80 L air lalu semprotkan pada tubuh hewan. **Kemasan** Botol kaleng 100 mL **Deptan RI** No. I. 07063224 PTC. Obat bebas terbatas.

38. KUTUTOX

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Permethrin 1%, Piperonyl butoxide 2%. **Indikasi** Efektif untuk membasmi : Kutu, Caplak, Tinggi (bangsat), Parasit lain. **Perhatian** Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Jangan membuang sisa obat ke dalam kolam ikan, sumber dan saluran air. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Simpan di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. **Dosis dan Cara Pemakaian** Taburkan pada permukaan dan lipatan-lipatan tubuh hewan, lantai kandang, sela-sela dan dinding kandang. Agar pembasmian kutu berlangsung sempurna, pemberian obat diulang setelah 10 hari. **Kemasan** Dus : 12 botol @ 100 gram. **Deptan RI No.** D 09093706 PKS **Obat Keras**

39. LARVADEX 10% PREMIX

**Shanghai Novartis Animal Health Ltd, China/
Novartis Indonesia**

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Siromazin **Indikasi** Anti lalat pada kandang dan kotoran ternak (*Insect growth regulator*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur dalam pakan unggas 50 g/ton pakan, gunakan campuran pakan ini pada saat lalat merajalela selama 4-6 minggu. Hentikan bila pemakaiannya bila populasi lalat telah dapat ditekan dan di ulangi lagi jika lalat mulai aktif berkembang biak. **Kemasan** Kantung 1 Kg, 5 Kg dan drum 20 Kg **Kementan RI No.** I. 11051801 PTS. **Obat bebas terbatas.**

40. LARVAKILL® 2%

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cyromazine **Indikasi** Mengontrol populasi lalat di dalam dan di sekitar kandang peternakan ayam, baik ayam pembibit maupun ayam petelur. **Peringatan** Pemotongan hewan dapat dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 50-250 g per ton pakan ayam. Berikan setiap hari sebagai ransum selama 4-6 minggu pada saat populasi lalat mulai meningkat. **Kemasan** 100 g, 5 kg, 25 kg. **Deptan RI No.** D. 0110116 FTS. **Obat bebas terbatas.**

41. LARVAKILL® 10%

Sanbe Farma

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cyromazine **Indikasi** Mengontrol populasi lalat di dalam dan di sekitar kandang peternakan ayam, baik ayam pembibit maupun ayam petelur. **Peringatan** Pemotongan hewan dapat dilakukan 3 hari setelah pemberian obat dihentikan. **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 10-50 g per ton pakan ayam. Berikan setiap hari sebagai ransum selama 4-6 minggu pada saat populasi lalat mulai meningkat. **Kemasan** 100 g, 5 kg, 25 kg. **Deptan RI No.** D. 0110390 FTS. **Obat bebas terbatas**

42. LARVASID-10

Mitravet

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Cyromazine 10%. **Indikasi** serbuk campuran pakan yang efektif untuk mengendalikan lalat di kandang unggas. **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 50 g Larvasid-10 per ton pakan pada musim lalat selama 4-6 minggu. **Kemasan** 250 g **Deptan RI No.** D 05103003 FTS.TM. **Obat bebas terbatas.**

43. LARVATOX

Medion Farma Jaya

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung Cyromazine 5%. **Indikasi** Membunuh larva lalat *Lucillia sp.* dan *Musca domestica*. **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 g Larvatox dicampur dengan 5 Kg ransum secara bertahap, kemudian dicampur dengan 1 ton

ransum sampai homogen, diberikan selama 4-6 minggu berturut-turut. Hentikan pemakaian Larvatox selama 4-8 minggu berikutnya dan gunakan kembali jika lalat terlihat mulai berkembang biak. **Kemasan** 1 kg. **Deptan RI No. D 07083264 FTS.** Obat bebas terbatas.

44. LE 435

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi tiap kg mengandung 100 g zat aktif Levamisole base. **Indikasi** Obat cacing dengan spectrum kerja luas termasuk membunuh larva cacing untuk berbagai jenis ternak. Aman diberikan pada ayam-ayam yang sedang berproduksi. **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 0,2 gram per kg berat badan diberikan lewat air minum atau pakan, Babi, Kambing, Sapi 0,75 gram per 10 kg berat badan, diberikan lewat air minum atau pakan. **Kemasan** 100gr, 1kg dan 25x1 kg. **Deptan RI No. D. 99061574. FTS. 1.** Obat bebas terbatas.

45. MI – LAT

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Azamethipos 250 gram **Indikasi** Efektif untuk membunuh lalat **Peringatan** Hati hati dalam pemakaian , obat bersifat racun **Dosis dan cara pemakaian** 50 gram campur dengan 1 Kg gula pasir. Dipakai sebagai umpan tabur untuk lalat. **Kemasan** 1 Box isi 5 sachet @ 100 Gram. **Deptan RI No.D.09033576 PTS.** Obat bebas terbatas.

46. MUSCASID 10%

Kalbe Farma

Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cyromazine **Indikasi** Mengendalikan populasi lalat (*Musca domestica*) di dalam kandang dan lingkungan peternakan **Dosis dan Cara Pemakaian** lihat kemasan **Kemasan** Kantung alufoil 250 gram **Deptan RI No. D. 07083267 FTS.** Obat bebas terbatas.

47. NEGUUVON

Bayer Thai Co. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia

Bentuk sediaan: Serbuk. **Komposisi** Trichlorfon. **Indikasi** Antiektoparasit pada sapi, babi, kuda, domba, kambing, ayam, ikan dan larva. **Peringatan** Jauhkan dari anak dan orang yang kurang informasi. Simpan jauh dari makanan, pakan, dan air minum. Jangan berikan penghambat Cholinesterase 10 hari sebelum dan setelah pengobatan dengan Néguvon. **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis bervariasi tergantung pada parasit yang akan dikendalikan – serbuk neguvon dapat dilarutkan dalam air (air hangat dengan suhu tidak lebih dari 40 °C) untuk pemanasan luar. Larutan harus selalu disiapkan baru. **Kemasan:** Kaleng plastik 1 kg. **Deptan RI No. I. 08093492 PTS.** Obat bebas terbatas.

48. NEPOREX 2 WSG

**Novartis Animal Health Inc, Swiss/
Novindo Agritech Utama**

Bentuk sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cyromazine **Indikasi** Larvacide lalat pada kotoran ternak **Peringatan** Penyemrotan sebaiknya dilakukan pada kotoran yang tertimbun setebal 10 cm. **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk kotoran ternak penyemprotan diberikan dengan dosis 25 g/100-400ml/m², dengan penyiraman dosis 25 g/m², untuk kotoran yang basah dengan penaburan 25 g/m² **Kemasan** Kantung 5 Kg **Deptan RI No. I. 05071578 FTM.2.** Obat bebas terbatas.

49. NOFLI LOTION

Yupharin Pharmaceuticals

Bentuk sediaan Lotion **komposisi** Permetrine 1%, **indikasi** Ektoparasit terhadap kutu pada anjing, **Dosis dan Cara Pemakaian** Sisir bulu anjing ke arah yang berlawanan, oleskan Nofli-

Tick Formula secara merata. Hindari mata atau bagian sensitive lainnya. Bila perlu, pemakaian dapat diulangi setiap dua hari, **kemasan** Botol 200 ml **Deptan RI** No. D. 03042565 PTC. TM Obat bebas terbatas.

50. NOFLI SHAMPOO**Yupharin Pharmaceuticals**

Bentuk sediaan Cairan kental, **komposisi** Permetrine 1%, **indikasi** Ektoparasit terhadap kutu pada anjing, **Dosis dan Cara Pemakaian** Basahi bulu anjing, gosokkan Nofli Shampoo secukupnya mulai dari bagian kepala, diamkan 5-10 menit. Bilas dengan air sampai bersih. Keringkan dengan handuk lalu sikat bersih agar kutu-kutu yang mati rontok. Gunakan 3 kali seminggu, **kemasan** Botol 200 ml **Deptan RI** No.D.03042566 PBC. TM obat bebas terbatas.

51. PANMECTIN – 10**Pantex-Holland/Sarana Veterinaria Jaya Abadi**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap ml mengandung ivermectin 10 mg, glycerol 0,4 ml dan propylenglycol ad 1 ml **Indikasi** Pengendalian dan pengobatan cacing gastrointestinal, cacing paru dan parasit eksternal pada sapi, babi, kambing dan domba **KontraIndikasi** Tidak boleh diberikan pada hewan yang hipersensitif terhadap ivermectin, seperti anjing collie, hewan hamil dan sedang menyusui **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk injeksi secara SC, dosis umum: 1 ml/50 kg BB. Anjing dan babi: 1 ml/33 kg BB Waktu henti obat Daging: Sapi, domba dan unta: 21 hari. Babi: 28 hari. Hewan produksi susu: 28 hari dari awal laktasi **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. I. 11104169 PKC

52. PARAMECTIN RV Pour-On for CATLTE**Jurox Pty Ltd, Australia/****Sumber Hewan**

Bentuk sediaan Cair. **Komposisi** setiap ml mengandung Abamectin 10 mg. **Indikasi** Paramectin RV sangat efektif untuk pengobatan dan pengendalian internal dan eksternal parasit pada Sapi Perah dan Sapi Potong, seperti Larva dan Cacing Dewasa di Saluran Pencernaan (*Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Trichuris spp.*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum venulosum*), Larva dan Cacing Dewasa Di Paru-Paru (*Dictyocaulus viviparus*); kutu dan tungau (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurystemus*, *Solenopotes capillatus*, *Bovicola bovis*); Caplak (*Boophilus micropus*); Lalat (*Haematobia irritans exigua*,). **Kontra Indikasi** Hentikan pengobatan 35 hari sebelum hewan disembelih. **Peringatan:** Jangan digunakan untuk pengobatan pada sapi dengan berat badan kurang dari 50 kg. Pengobatan ulang minimum dilakukan 35 hari setelah pengobatan pertama. Jangan diberikan melalui suntikan dan minum. Jangan diberikan kurang dari dosis yang ditentukan. Tidak direkomendasi untuk pengobatan dengan cara dipping. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 mL/20 kg berat badan, bila berat badan lebih dari 650 kg dosis 5 mL/100 kg. Diberikan dengan cara topikal yaitu dengan meneteskan dikulit daerah punggung dari tengkuk sampai dengan pangkal ekor sapi. **Kemasan** Botol isi 1 Liter dan jerigen isi 10 Liter. **Deptan RI** No. I. 08063441 PKC. Obat keras.

53. PREVENTIC**Virbac Animal Health Inc., Perancis/Emvi Indonesia**

Bentuk Sediaan Collar Komposisi Mengandung amitraz **Indikasi** Sebagai antiektoparasit pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Collar dipakai pada leher anjing selama 8 minggu untuk usia diatas 3 bulan **Kemasan** Collar 27,5 g/box **Kementan RI** No. I. 12054272 PTM. Obat bebas terbatas

54. PROMERIS DUO SPOT ON FOR DOGS

**Fort Dodge Animal Health,
Catania, Italy/PT. Pfizer Indonesia**

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** mengandung Metaflumizone dan Amitraz. **Indikasi** Anti ektoparasit pada anjing, untuk perawatan dan kontrol terhadap infestasi pinjal (*Ctenocephalides canis* & *C. felis*) & kutu (*Ixodes ricinus*, *I. hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus* & *D. variabilis*) & perawatan terhadap demodekosis yang disebabkan oleh *Demodex* spp., dan (*Trichodectes canis*) pada anjing. Merupakan bagian dari perawatan strategis untuk Flea Allergy Dermatitis (FAD). **Dosis dan cara pemakaian** dosis minimum yang direkomendasikan 20 mg/kg berat badan yang ekuivalen dengan 0,133 ml/kg berat badan. Spot on. **Kemasan** Blister 3 dan 6 pipet. **Deptan RI** No. I. 09103716 PKC. Obat keras.

55. QUICKBAYT 10 WG

**Bayer Environmental Science SAS Perancis/
Bayer Indonesia**

Bentuk Sediaan Insektisida racun perut berbentuk butiran halus berwarna putih kecoklatan **Komposisi** Mengandung imidakloprid 10% **Indikasi** Untuk mengendalikan lalat dewasa *Musca domestica* dengan cara aplikasi pelaburan dan penyemprotan **Dosis dan Cara Penggunaan** Dengan mencampurkan QuickBayt 10 WG sebanyak 20 g/L air, aduk hingga tercampur lalu semprotkan pada permukaan yang biasanya lalat hinggap. Jika mengering, basailah dengan air supaya QuickBayt 10 WG yang menempel pada permukaan kembali aktif untuk mengendalikan lalat dewasa **Kemasan** 20 x 250 g **Deptan RI** No. I. 0809120103679

56. RACUMIN 0,0375 BB

Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Rodentisida antikoagulan umpan siap pakai berbentuk blok kebiruan **Komposisi** Mengandung kumatetralil 0,0375% **Indikasi** Untuk mengendalikan tikus sawah (*Rattus argentiventer*), tikus semak (*R. tiomanicus*), dan tikus atap (*R. rattus*) di kandang ternak. **Dosis dan Cara Pemakaian** Letakkan umpan blok di dekat sarang tikus dan tempat yang dilaluinya. Umpan blok yang dimakan tikus, diganti dengan umpan baru hingga tidak dimakan tikus lagi **Kemasan** 4 x 5 kg **Deptan RI** No. I. 01120120124381

57. REVOLUTION 6%

Pfizer Inc. USA/ Kalbe Farma Tbk

Bentuk sediaan cair **Komposisi** dalam 1 ml mengandung Selamectin 60 mg **Indikasi** pengobatan infestasi parasit eksternal dan internal pada anjing, kutu (*Ctenocephalides spp.*), caplak (*Otodectes cynotis*), tungau (*Sarcoptes scabiei*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*). Kucing, kutu (*Ctenocephalides spp.*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*), caplak pada telinga (*Otodectes cynotis*). Cacing gilig (*Toxocara cati*), cacing kait (*Ancylostoma tubaeforme*) **Dosis dan cara pemakaian** diberikan untuk hewan di atas umur 6 minggu dan diberikan 1 bulan sekali dengan dosis sesuai BB sebagai berikut: Anjing/kucing 2,5 kg (lembayung muda) 1 tube/bulan; anjing 2,6-5 kg (biru muda) 1 tube/bulan; kucing 2,6-7,5 kg (biru) 1 tube/bulan; anjing 5,1- 10 kg (coklat muda) 1 tube/bulan; anjing 10,1-20 kg (merah muda) 1 tube/bulan; anjing 20,1-40 kg (hijau muda) 1 tube/bulan. Pemakaian secara topikal pada dasar kulit leher antara kedua bahu. **Kemasan** 1 pack berisi 3 tube **Deptan RI** No. I. 0202785 PKC. Obat keras.

58. REVOLUTION 12 %

Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** dalam 1 ml mengandung Selamectin 120 mg **Indikasi**

Pengobatan infestasi parasit ekteternal dan internal pada anjing: kutu (*Ctenocephalides spp.*), caplak (*Otodectes cynotis*), tungau (*Sarcoptes scabiei*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*). Kucing: kutu (*Ctenocephalides spp.*), cacing pada jantung (*Dirofilaria immitis*), caplak pada telinga (*Otodectes cynotis*). Cacing gilig (*Toxocara cati*), cacing kait (*Ancylostoma tubaeforme*). **Dosis dan Cara Pemakaian** diberikan untuk hewan di atas umur 6 minggu dan diberikan 1 bulan sekali dengan dosis sesuai BB sebagai berikut: Anjing/kucing 2,5 kg (lembayung muda) 1 tube/bulan; anjing 2,6-5 kg (biru muda) 1 tube/bulan; kucing 2,6-5 kg (biru) 1 tube/bulan; anjing 5,1-10 kg (coklat muda) 1 tube/bulan; anjing 10,1-20 kg (merah muda) 1 tube/bulan; 20,1-40 kg (hijau muda) 1 tube/bulan. Pemakaian secara topical pada dasar kulit leher antara kedua bahu. **Kemasan** 1 pack berisi 3 tube. **Deptan RI** No. I. 0112692 PKM. Obat keras.

59. **SIRNASET[®]** **Tekad Mandiri Citra**
Bentuk sediaan serbuk **Komposisi** tiap g mengandung Cyromazine 200 mg **Indikasi** larvasida lalat pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 25 g per ton pakan selama 4 - 6 minggu. Diulang 4 minggu kemudian **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D. 04102821 PKS. Obat keras.
60. **SOLFAC 10 WP** **Bayer Environmental Science SAS Perancis/Bayer Indonesia**
Bentuk Sediaan Insektisida racun kontak berbentuk tepung putih kecoklatan **Komposisi** Mengandung siflutrin 10% **Indikasi** Untuk mengendalikan kecoa, lalat dan kumbang frangky dengan cara penyemprotan residual pada permukaan kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan dengan cara mencampur Solfac 10 WP sebanyak 2-4 g/L air, aduk hingga tercampur lalu semprotkan pada tempat perkembangbiakan dan persembunyian serangga sasaran **Kemasan** 20 x 5 x 20 g **Deptan RI** No. 565/12-2008/T
61. **STAFLEX** **Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk.**
Bentuk sediaan Granul **Komposisi** Mengandung Methomyl dan Tricosene (feromon) **Indikasi** Insektisida untuk lalat **Dosis dan Cara Pemakaian** Dalam bentuk granul dengan bantuan perangkat lalat atau wadah biasa, tuangkan granul Staflex ke dalam wadah, dengan dosis 100 gram Staflex untuk 40 m2 setiap 15 hari sekali. Dalam bentuk cat larutkan granul Staflex ke dalam air dengan suhu 40o C, dengan dosis 100 gr Staflex dalam 100 ml air. Ratakan dengan kuas atau diulaskan pada permukaan dinding, dengan dosis; 25 g/10 m2 (efektif selama beberapa minggu). Dengan cara spraying larutkan granul Staflex ke dalam air dengan suhu 40oC, dengan dosis 400 gram Staflex untuk 5 L air kemudian tuang ke dalam alat penyemprot dan diaplikasikan (kemudian bilas/cuci alat penyemprot) dengan benar. **Kemasan** Jerigen 1L, 5L, 10 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 05032903 PTC Obat bebas terbatas
62. **SY IVERMECTIN INJECTION** **Samyang Anipharm Co.,Ltd./Blue Sky Biotech**
Bentuk sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** Ivermectin 1% **Indikasi** Antiparasit (endoparasit dan ektoparasit) pada sapi, kambing, domba, babi, kelinci dan anjing **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada anjing ras collie **Peringatan** Waktu henti obat 28 hari **Dosis dan pemakaian** Diberikan secara SC dengan dosis: Sapi, kambing dan domba (1ml/kg BB) Babi (1ml/kg BB) **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI** No. I. 09083698 PKC. Obat keras.
63. **TAKTIC** **MSD Animal Health, Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Amitraz **Indikasi** Pengobatan dan kontrol ektoparasit pada

babi, sapi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian Kemasan Botol 100 ml Deptan RI No. I. 08083481 PTC.** Obat bebas terbatas.

- 64. TECTIN INJ** **Mobedco-Vet-Jordania/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk sediaan Cair Komposisi Ivermectin Indikasi Mengatasi dan mengontrol parasit internal maupun eksternal pada sapi, domba dan kambing. **Dosis dan Cara Pemakaian** – Sapi, domba dan kambing: 1ml/50 kg BB. Injeksi secara subkutan dan tidak dianjurkan secara intravena atau intramuskular. **Kemasan Botol 50 ml dan 100 ml Deptan RI No. I. 09043607 PKC.** Obat keras.
- 65. TETRAMISON TABLET** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Tablet Komposisi Mengandung tetramisole HCl **Indikasi** Membasmi infestasi cacing pada sapi, kambing, domba: cacing abomasum, cacing usus kecil, cacing usus besar. Babi: cacing paru, cacing ginjal. Kuda: Parascaris equorum. Anjing: Toxocara canis, Ancylostoma spp **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui oral. Sapi: 1 tablet/20 kg BB. Domba, kambing dan babi: 1 tablet/25 kg BB **Kemasan** 20 tablet, 50 tablet dan 100 tablet **Kementan RI No. D. 12014212 PTM.** Obat bebas terbatas
- 66. TOLACOX LIQUID** **Pharma Swede, Egypt/ Farmadika Sejahtera Indonesia**
Bentuk sediaan Cairan bening kekuningan Komposisi Toltrazuril **Indikasi** Tolacox diindikasikan untuk mengobati coccidiosis pada ayam, kalkun dan angsa. Toltrazuril adalah triazone simetris yang berkhasiat melawan Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix dan E. tenella pada ayam. E. adenoids, E. meleagridimitis pada kalkun, E. anseris, E. truncata pada angsa. **Kontra Indikasi – Peringatan** Sebaiknya tidak diberikan pada unggas yang dalam 14 hari akan memasuki masa awal bertelur atau pada unggas yang menghasilkan telur untuk konsumsi manusia. **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam, kalkun dan angsa: 1 ml per 1 liter air minum (25 ppm) untuk dua hari, atau 3 ml per 1 liter air minum (75 ppm) untuk 8 jam/hari untuk pengobatan selama 2 hari. Jika diperlukan pengobatan tambahan, maka harus diulangi lima hari setelah pengobatan pertama. **Kemasan Botol 1 L Deptan RI No. I. 11064103 PKC**
- 67. TRIPLE WORMER BOLUS** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Bolus Komposisi Mengandung oxibendazole **Indikasi** Pencegahan dan pemberantasan cacing gelang (round worm), cacing paru (lung worm), cacing pita (tape worm) **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui oral. Sapi, kerbau: ¼ bolus/200-250 kg BB. Kuda: ¼ bolus/90-100 kg BB. Kambing, domba, babi, anjing: ¼ bolus/50 kg BB **Kemasan** 12 bolus, 25 bolus dan 50 bolus **Kementan RI No. D. 12024222 PTM.** Obat bebas terbatas
- 68. VETCOX** **Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi tiap kg mengandung 100 g zat aktif Amprolium base 100gr, Sulfaquinoxaline 100 gr, Vitamin K3 1,5 gr. **Indikasi** Kombinasi dua jenis antikoksi yang bekerja secara sinergis dari awal untuk pemberantasan caecal dan intestinal koksidirosis pada unggas. **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 gram per liter air minum berikan dengan aturan 3:2:3. Pengobatan :1gram per liter berikan VETCOX selama 5 sd 7 hari berturut-turut. **Kemasan** 100gr, 1kg. **Deptan RI No. D 9903352 PTS.** Obat bebas terbatas.

69. **VIRBAMEC L** **Virbac Lab, Brazil untuk Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Mengandung ivermectin **Indikasi** Antiparasit pada sapi, kucing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing, dan domba: 1 ml/50 kg BB secara SC. Babi: 1 ml/33 kg BB **Kemasan** Botol 50 ml, 200 ml, 500 ml dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 04042751 PKC. Obat keras
70. **WONDER IVERMEC INJEKSI** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung ivermectin **Indikasi** Pada sapi, kambing, domba, babi dan kuda untuk memberantas cacing gilik gastrointestinal, cacing hati, dan cacing pita, kutu scabies, caplak dan tungau **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC. Sapi: 1 ml/50 kg BB. Kuda: 1 ml/50 kg BB. Kambing/domba: 0,5 ml/25 kg BB. Babi: 1 ml/33 kg BB. Volume pemakaian maksimum adalah 10 ml/lokasi injeksi **Kemasan** 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Kementan RI** No. D. 10083888 PKC. Obat keras
71. **WORMECTIN INJEKSI** **Medion Farma Jaya**
Bentuk sediaan Cairan Injeksi **Komposisi** 22, 23-dihydroavermectin B1a dan 22, 23-dihydroavermectin B1b 1 % **Indikasi** Mengobati penyakit cacingan. parasit luar (larva insekta, kutu, caplak dan tungau) **Perhatian** Jangan diberikan pada anjing dengan ras Collie. Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung. Hentikan pemakaian obat 28 hari sebelum ternak dipotong untuk dikonsumsi **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikkan di bawah kulit (subkutan) pada : Sapi & kerbau: 1 ml tiap 50 kg berat badan tiap hari. Kambing & domba: 0,5 ml tiap 25 kg berat badan tiap hari. Babi: 1 ml tiap 33 kg berat badan tiap hari. Anjing & kucing : 0,02 ml tiap kg berat badan tiap hari **Kemasan** Ampul/botol : isi 2 ml, 5 ml dan 20 ml. **Deptan RI** No. D 0202938 PKC. Obat Keras. ****

ANTI HISTAMINIKA

01.09

1. **DIMEDRYL** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung difenhidramin HCl 10 mg
Indikasi Pengobatan reaksi alergi seperti urtikaria, reaksi anafilaktik, dermatitis alergi, rhinitis alergi, pruritis, asma bronchial dan kegatalan pada peradangan **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui IM. Hewan besar: 1 ml/20 kg BB. Hewan kecil: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 02042189 PKC. 1. Obat keras
2. **GLUCORTIN-20** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**
Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** tiap ml mengandung Dexamethasone 2 mg **Indikasi** Sebagai glukokortikosteroid dengan daya antiflogistik kuat, anti alergi dan bekerja sebagai glukoneogenetik untuk mengobati anemia, alergi, arthritis, bursitis, shock dan tendovaginitis pada sapi, kambing, domba, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi intramuskular, intravena atau subkutan, Sapi 5-15 ml; Pedet, kambing, domba dan babi 1-2,5 ml; anjing 0,25-1 ml : pengobatan reaksi alergi 0,05-0,25 ml per Kg berat badan, pruritus 0,06 ml per Kg BB, shock 1,5-2,25 ml per Kg BB (IV); kucing 0,25 ml : pengobatan reaksi alergi 0,05-0,25 ml per Kg BB, pruritus 0,1 ml per Kg BB, shock 1,5-2,25 ml per Kg BB (IV) **Kemasan** vial 50 ml **Deptan RI** No. I. 07073239 PKC. Obat keras.
3. **PARAGIN** **Tekad Mandiri Citra**
Bentuk sediaan serbuk larut air **Komposisi** tiap gram mengandung Paracetamol 400 mg, Vitamin B2 0,5 mg, Vitamin C 12, Vitamin K3 2,4 mg, Nicotinamid 8 mg, Sorbitol sampai 1000 mg **Indikasi** Mencegah peradangan yang disebabkan oleh virus gumboro maupun virus dan bakteri lainnya, penurun panas dan rasa nyeri, menurunkan reaksi post vasinasi **Dosis dan Para Pemakaian** Unggas melalui air minum 1 gram per liter air minum **Kemasan** 100 gram, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg **Deptan RI** No. D 10033808 PTS
4. **PHENYLJECT** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung fenilbutason 200 mg **Indikasi** Sebagai antipirektik, analgesik dan anti inflamasi pada sapi, babi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara IM atau perlahan secara IV. Sapi: 1 ml/20 kg BB. Pedet, kambing, domba dan babi: 1 ml/10 kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI** No. I. 09033590 PTC. Obat bebas terbatas
5. **VETADRYL® Injeksi** **Sanbe Farma**
Bentuk sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung Diphenhydramine HCl. **Indikasi** Mengatasi alergi pada hewan **Peringatan** Diphenydramine HCl dapat menimbulkan efek mengantuk **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda, kerbau: 1,25 – 2,50 ml per 100 Kg BB.

Domba, kambing : 0,75 ml per 30 Kg BB. *Babi* : 1,25 ml per 50 Kg BB. *Anjing* : 0,25ml per 5 Kg BB. *Kucing* : 0,1 ml per 2 Kg BB. **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml. **Deptan RI** No. D 1104598 PKC. 1 Obat keras.****

DIURETIKA

01.10

1. **CAPRINIL** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung hexamine **Indikasi** Pengobatan infeksi sekunder dari gumboro, radang saluran kemih, mengurangi mortalitas pada kasus gumboro dan waterbelly/ascites pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/L air minum. Berikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D.** 09033578 PKS. Obat keras
2. **HEXADIN** **Mitravet**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung hexamine 500 g **Indikasi** Diuretika dan antiseptika saluran kemih pada unggas dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 2 g ke dalam 1 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g dan 5 kg **Deptan RI No. D.** 06023046 PKS. TM. Obat keras
3. **NEPHRYL** **Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung methenamin, vitamin B1, vit B2 dan vit K3 **Indikasi** Sebagai diuretikum dan antiseptik saluran kemih pada unggas. Pencegahan pembengkakan ginjal dan deposit asam urat pada ginjal **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum **Kemasan** Sachet 100 g dan botol 1 kg **Deptan RI No. I.** 05021120 PKS. 2. Obat keras
3. **NEPTIK** **Vaksindo Satwa Nusantara**
Bentuk Sediaan Serbuk larut air **Komposisi** Setiap kg mengandung methenamine 950 g, vitamin B1 8.000 mg, vit B2 10.000 mg, vit K3 2.000 mg **Indikasi** Sebagai diuretika dan antiseptika pada saluran kemih. Pengobatan infeksi sekunder pada gumboro, menurunkan angka kematian karena kasus ascites pada unggas serta meningkatkan konsumsi air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 1 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 1 kg dan 5 kg **Deptan RI No. D.** 06033053 PKS. TM. Obat bebas terbatas
4. **RENNIL** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung hexamine, vitamin B1, vit B2 dan vit K3 **Indikasi** Antiseptik saluran kemih Perhatian Tidak boleh diberikan secara bersamaan dengan antibiotika/kemoterapeutika lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/L air minum atau 1 g/2 L air minum (untuk meningkatkan konsumsi air minum dan feed intake) serta berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 1000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D.** 01102110 PTS. 1. Obat bebas terbatas
5. **REN – CLEAR** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung heksamin 950 g, vitamin B1 8 g, vit B2 9 g dan vit K3 2 g **Indikasi** Sebagai antiseptik saluran kemih dan diuretika pada unggas **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada pasien dengan kondisi insufisiensi hepatic **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 1 L air minum, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 1 kg, 25 kg @ 1 kg **Deptan RI No. D** 10103910 PKS. Obat keras.****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

OBAT PENCERNAAN LAIN

01.11

1. **ACIDAL ML** **Impextraco NV, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Mencegah kekurangan asam organik **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/L **Kemasan** PE 25 kg, 200 kg dan 1.000 kg **Deptan RI No.** I. 07083266 PTC. Obat bebas terbatas
2. **ACTICOLI 2 MUI/ML** **Laboratorium Biove, Perancis/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung colistin sulfat **Indikasi** Untuk pengobatan diare pada pedet yang disebabkan oleh kuman yang sensitif terhadap colistin **Kemasan** Botol HDPE 100 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI No.** I. 07113338 PKC. Obat keras
3. **ACTILIVER I** **Laboratorium Biove, Perancis/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung genabilic acid dan sorbitol **Indikasi** Sebagai koleritik pada sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **kemasan Kemasan Vial** 100 ml **Deptan RI No.** I. 08083471 PKC. Obat keras
4. **ANILOX P 10** **Norel & Nature, Spanyol/Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan Bubuk **Komposisi** Setiap kg mengandung etoksikuin, BHT, BHA, propil galat dan asam sitrat **Indikasi** Menghambat proses oksidasi pada pakan ternak, bahan baku pakan ternak dan premix vitamin serta suplemen sehingga nilai gizinya tetap optimal **Dosis dan Cara Pemakaian** 200-500 g dicampur merata dalam 1 ton pakan ternak atau bahan baku pakan ternak dan 1.000-2.500 g dicampur merata dalam 1 ton premix vitamin dan suplemen **Kemasan** kantong @ 25 kg **Deptan RI No.** I. 03072132 PTS. 1. Obat bebas terbatas
5. **ANTIBLOAT** **Pyridam Veteriner**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung dimethicone 1% **Indikasi** Untuk pengobatan tympani akut yang disebabkan oleh pembentukan gas yang berlebihan dalam rumen sapi, kerbau, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kerbau: 100 ml/500 ml air, diberikan melalui stomach atau drench atau dapat juga dengan 100 ml obat intra rumen. Kambing dan domba: 25 ml/250 ml air, diberikan melalui drench atau dapat juga dengan 25 ml obat intra rumen. Pada kasus yang berat dosis dapat ditingkatkan dengan penambahan 50% dari dosis yang dianjurkan **Kemasan** 100 ml/botol **Deptan RI No.** D. 04051307 PTC.
2. Obat bebas terbatas

6. **BIOGREEN** **Laboratorium Biove, Perancis/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung L-lysin HCl, sorbitol dan ekstrak tanaman
Indikasi Untuk pemeliharaan sistem hati, pencernaan dan urinaria pada unggas, burung, sapi, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 500 L, 800 L dan 1.000 L **Kementan RI No. I. 12092082 PTC. 2.** Obat bebas terbatas
7. **BIOMIN C – Ex** **Biomin/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap 1.000 g mengandung fructooligosacharides (soluble inulin) 900 g, organic cell wall polymers extracted 100 g dan stabilized lactic acid bacteria (strain Enterococcus faecium biomin IMB 52) 1 x 10¹³CFU/kg 20 g **Indikasi** Sebagai probiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** Lewat air minum dengan dosis 20 g untuk setiap 1.000 ekor ayam **Kemasan** 300 g dan 600 g **Deptan RI No. I. 05092992 FTS.** Obat bebas terbatas
8. **BLOATEX** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung simethicone 1% b/v **Indikasi** Mengobati kembung (bloat, timpani) yang disebabkan oleh pembentukan gas yang berlebihan dalam rumen sapi, kambing dan domba **Perhatian** Jangan diberikan pada ternak dengan kasus kembung (bloat, timpani) yang disebabkan oleh penyumbatan oesophagus, dislokasio, torsio lambung dan usus **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kerbau: 100 ml tiap 500 ml air dicekakkan langsung ke dalam mulut. Kambing dan domba: 25 ml tiap 250 ml air dicekakkan langsung ke dalam mulut. Pada kasus yang berat, dosis dapat ditingkatkan dengan penambahan 50% dari dosis yang dianjurkan atau menurut petunjuk dokter hewan **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. D. 0203043 PTC.** Obat bebas terbatas
9. **DHUDHUT** **Degepharm**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung simetikon (dimetilpolisiloksan) **Indikasi** Anti kembung pada sapi, kerbau, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol plastik 500 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 06123146 PTC.** Obat bebas terbatas
10. **INDIGEST INJECTABLE** **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinanatan**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Tiap 1 ml mengandung 100 mg menbuton (genabilic acid) **Indikasi** Obat normalisasi lambung, toxemia, anorexia, ketosis, hepatic dan pakreatic pada sapi, babi, domba, kuda dan anjing **Perhatian** Obat hanya untuk hewan. Durasi pengobatan harus ditentukan oleh dokter hewan. Tidak dianjurkan untuk disuntikan secara IM lebih dari 20 ml pada tempat yang sama. Tidak dianjurkan untuk diberikan bersamaan dengan larutan injeksi lainnya. Tidak dianjurkan diberikan pada kucing **Waktu Henti Obat** 2 hari setelah diberikan secara IM atau IV **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis normal: 1 ml/10 kg BB. Sapi dewasa: 20-40 ml/ekor/hari secara IM atau IV. Anak sapi: 5-15 ml/ekor/hari secara IM atau IV. Domba/kambing: 5-10 ml/ekor/hari secara IM. Babi: 1 ml/ekor/hari secara IV. Kuda:

20-30 ml/ekor/hari secara IV. Anjing: 0,1 ml/kg BB/hari secara IM atau IV **Kemasan** 100 ml
Deptan RI No. I. 02112469 PKC. Obat keras

11. NOBLOAT

Cipla, Ltd., India/Paeco Agung

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung simethicone USP **Indikasi** Untuk pengobatan segala macam bloat dan timpany serta mengatasi keadaan darurat pada kasus-kasus bloat yang serius **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat diberikan secara oral (dicekok) atau intraruminal menggunakan kanula atau jarum panjang. Dosis pada sapi/kerbau: 100 ml/ekor. Kambing/domba: 20 ml/ekor **Kemasan Botol** 100 ml **Deptan RI No. I. 08043419 PTC.** Obat bebas terbatas

12. OBAT TEMBOLOK

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung sodium bicarbonate 9% **Indikasi** Mengobati gangguan tembolok yang keras karena benda asing. Protozoa, jamur, cacing, dan parasit Perhatian Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dewasa: sehari 3x30 ml dicekikkan langsung ke dalam mulut. Anak ayam: sehari 3x10 ml dicekikkan langsung ke dalam mulut. Tembolok dipijat sampai lunak, diusahakan isinya dimuntahkan, kalau perlu kepala diarahkan ke bawah **Kemasan Botol** 60 ml **Deptan RI No. D. 0604619 PTC. 2.** Obat bebas terbatas

13. PERMETHYL 5%

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan oral Komposisi Tiap ml mengandung permethylpolysiloxane (dimetikon) 50 mg **Indikasi** Pengobatan timpani/bloat/kembung pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kerbau: per oral dengan dosis 25 ml dilarutkan dalam 500 ml air minum. Kambing dan domba: per oral dengan dosis 5 ml dilarutkan dalam 200 ml air minum **Kemasan Botol** 25 ml dan 100 ml **Kementan RI No. D. 11044058 PTC.**

14. TYMPANOL – SB

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung dimethicone **Indikasi** Untuk mengobati kembung akut pada ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kerbau: 200-400 kg BB dan larutkan 100 ml dalam 500 ml air minum kemudian dicekok. Kambing dan domba: 30-60 kg BB dan larutkan 25 ml dalam 250 ml air minum kemudian dicekok **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. D. 0010210 PKC.** Obat keras. ****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

HEMATINIK, RUBORANSIA DAN TONIKA

01.12

- BIOSOLAMINE** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung magnesium aspartat 1,5 mg, cyanokobalamin 500 mcg, natrium selenit 1 mg, adenosin trifosfat 1 mg, asam deoksiribonukleat 100 mg dan kalium aspartat 10 mg **Indikasi** Gangguan otot/muskulus pada anak sapi serta sebelum dan sesudah transport **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IV atau IM. Pada kuda dan sapi dewasa: 20 ml. Anak sapi/anak kuda: 10 ml. Kambing, domba, babi dan anjing: 2-5 ml. Kucing: 1 ml. Pemberian suntikan tidak boleh lebih dari 3-4 kali berturut-turut dengan interval 24-48 jam pada kuda pacu. Dapat diberikan sampai dengan 5 kali dengan interval 4-5 hari **Kemasan** Vial 50 ml **Deptan RI No.** I. 0506023 PKC. 2. Obat keras
- BUFHOSOLAMIN** **Pyridam Veteriner**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung butaphosphan 100 mg dan cyanocobalamin 50 µg **Indikasi** Paralisi ringan, nafsu makan hilang, penurunan laktasi serta kelelahan akibat transportasi. Menambah tenaga induk setelah melahirkan. Untuk pertumbuhan terhambat, kelelahan dan defisiensi nutrisi. Infertilitas, anemia sekunder karena infestasi parasit serta perbaikan libido yang jelek dan memodulasi sistem kekebalan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda dewasa: 5-25 ml. Anak sapi dan kuda: 5-12 ml. Kambing dan domba dewasa: 2,5-5 ml. Anak kambing dan domba: 1,5-2,5 ml. Babi dewasa: 2,5-10 ml. Anak babi: 1-2,5 ml. Anjing: 0,5-5 ml. Kucing: 0,5-2,5 ml **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No.** D. 10103922 PKC. Obat keras
- BUTAPHOS – B INJECTION** **Samyang Anipharm C Ltd, Korea/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung butaphosphan 100 mg **Indikasi** Kelainan metabolisme terutama pada hewan yang masih muda. Membantu pengobatan infertilitas, tetany dan paresis sebagai tambahan terapi kalsium dan magnesium. Meningkatkan utilisasi pakan, vitalitas, pertumbuhan yang pesat dan resistensi terhadap stress **Kontra Indikasi** Jangan gunakan pada hewan yang hipersensitif Perhatian Simpan pada tempat yang kering, sejuk dan terhindar dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Berikan secara IV, IM atau SC. Pada kasus penyakit kronis atau untuk hewan yang sehat, kurangi dosis menjadi setengah tiap selang waktu 1-2 minggu. Sapi dan kuda: 5-25 ml. Anak sapi dan anak kuda: 5-12 ml. Kambing dan rusa: 2,5-5 ml. Anjing: 0,5-5 ml. Biri-biri muda: 1,5-2,5 ml. Piglet: 1-2,5 ml. Kucing: 0,5-2,5 ml. Ayam: (berikan melalui air minum), breeder: 0,5 ml/ekor/hari selama 2-7 hari, broiler: 0,3 ml/ekor/hari selama 5 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No.** I.07123359 PKC. Obat keras
- CHEIL TONOCOMP** **Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung tonophosphan 200 mg, cobalt chloride 0.04 mg, ammonium molybdate 0,092 mg, sodium selenite 0.333 mg dan nicotinic acid 5mg **Indikasi** Kelainan metabolisme sistemik, defisiensi nutrisi, terapi pendukung pada ricketsia dan osteomalacia serta tetany dan paresis **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara

IM atau SC. Kasus akut: setiap 3-4 hari. Pada sapi, babi dan kuda: 5-20ml/ekor. Anjing dan kucing: 1-3ml/ekor. Kasus kronik: Setiap 4 hari. Pada sapi, babi dan kuda: 2.5-5ml/ekor. Anjing dan kucing: 1-2 ml/ekor. Gangguan metabolisme pada sapi dan babi 20 ml/ekor 4 kali setiap 4 hari **Kemasan Botol 100 ml Deptan RI No. I. 05042927 PKS. Obat keras**

5. **CHICKOFIT**

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung adenosin-5-triphosphoric acid (ATP) sodium salt 1 g, cyanocobalamin (vitamin B12) 0,5 g, sodium selenite 1 g, potassium dl-acid aspartat 10 g, magnesium dl-acid aspartat 15 g dan glycine 50 g **Indikasi** Untuk meningkatkan kondisi dan daya tahan tubuh ayam pada semua umur serta pada ayam yang mengalami kelelahan karena transportasi, sedang sakit atau baru sembuh dari penyakitnya, nafsu makan menurun serta stress **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml dilarutkan dalam 2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan Botol 100 ml dan 1 L Deptan RI No. D. 1207998 PTC. 1. Obat keras**

6. **CHOLARAINOL**

Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 100 ml mengandung sorbitol 35 g, acetyl methionine 10 g, choline chloride 7,5 g, betaine 6 g, lysine HCl 2 g dan extract tanaman sebagai aroma **Indikasi** Memperbaiki gangguan metabolisme terutama pencegahan terhadap kerusakan hati (hepatoprotektor) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dalam pakan atau air minum. Unggas: 1-2 ml/L air minum selama 5-10 hari berturut-turut **Kemasan 1 L dan 5 L Deptan RI No. I. 03012518 PTC. Obat bebas terbatas**

7. **DUFADEX 10% INJ.**

Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V/Saka Menara Alam

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung iron dextran 100 mg/ml **Indikasi** Mengatasi anemia yang disebabkan kekurangan zat besi (Fe) pada anak sapi dan anak babi **KontraIndikasi** Defisiensi vitamin E **Perhatian** Dapat terjadi reaksi inflamasi dan rasa sakit atau perubahan warna pada tempat suntikan. Pada pemberian berlebihan dapat menyebabkan kematian **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak sapi: 4-8 ml secara SC di daerah leher, pada usia minggu pertama setelah kelahiran. Anak babi: 2 ml secara IM, pada usia 2-4 hari dan jika perlu diulang pada hari ke-10 **Kemasan Botol 100 ml Deptan RI No. I. 03102650 PKC. Obat keras**

8. **ENDOFER 20 INJECTABLE SOLUTION**

FATRO S.P.A, Italia/

Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung iron dekstran **Indikasi** Hematinik pada sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IV atau IM dengan dosis 1 ml larutan/ekor. Jika diperlukan dosis dapat diberikan double atau diberikan ulang setelah 10-14 hari **Kemasan Vial 100 ml Deptan RI No. I. 02061807 PKS. 1. Obat keras**

9. **FERDEX 100**

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung Fe (zat besi) 100 mg dan phenol 0,5% **Indikasi** Mencegah anemia (kurang darah) pada anak babi, sehingga menjadi lebih sehat

dan mengurangi angka kematian. Memperbaiki pertumbuhan dan penambahan berat badan. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian dengan penyuntikan secara IM pada daerah paha atau leher. Pencegahan: 1,5-2 ml tiap ekor pada babi umur 1-3 hari. Jika perlu diulang pada umur 2-3 minggu sebanyak 2 ml tiap ekor. Pengobatan: 2 ml tiap ekor babi dewasa **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 0608907 PKC. 2. Obat keras**

10. **FERDEX PLUS**

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung Fe 100 mg, vitamin B6 1 mg, vit B12 50 mg dan phenol 0,5% **Indikasi** Mengatasi anemia akibat kekurangan suplai zat besi (Fe) dari induknya pada anak babi yang sedang menyusu. Memperbaiki pertumbuhan dan mengurangi angka kematian pada anak babi serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM di daerah paha. Dosis: 2 ml tiap ekor anak babi umur 2-4 hari. Penyuntikan dapat diulang sebanyak 2 ml tiap ekor, bila masih ada gejala kekurangan Fe **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 05071733 PKC. 1. Obat keras**

11. **HEMATODIN**

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung besi (III) amonium sitrat 2 g, vitamin B12 0,001 g, metionin 1 g, histidin 0,5 g, triptopan 0,25 g, cobalt 0,05 g dan taurin 0,2 g **Indikasi** Semua gangguan kekurangan darah **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IV, IM atau SC. Pada kuda dan sapi: 10-20 ml tiap hari. Anak sapi/kuda: 5-10 ml selama 4 hari. Domba dan kambing: 5 ml tiap 2 hari sekali. Anjing: 1 ml/5 kg BB tiap hari. Kucing: 0,5-2 ml tergantung dari BB. Unggas: 1-5 ml. Babi 2-10 kg: 1ml, BB 10-20 kg: 2 ml, BB 21-50 kg: 5 ml, BB > 50 kg: 10 ml tiap 2 hari sekali **Kemasan** Vial @ 50 ml **Deptan RI No. D. 09103715 PKC. Obat keras**

12. **HEMATOPAN B12**

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung natrium kakodilat 30 mg, besi (III) amonium sitrat 20 mg, metionin 10 mg, histidin 5 mg, triptopan 2,5 mg dan vitamin B12 10 mcg **Indikasi** Semua gangguan kekurangan darah **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IV, IM atau SC. Pada kuda dan sapi: 10-20 ml tiap hari. Anak sapi/kuda: 5-10 ml selama 4 hari. Domba dan kambing: 5 ml tiap 2 hari sekali. Anjing: 1 ml/5 kg BB tiap hari. Kucing: 0,5-2 ml tergantung BB. Unggas: 1-5 ml. Babi 2-10 kg: 1 ml, 10-20 kg: 2 ml, 21-50 kg: 5 ml, BB > 50 kg: 10 ml tiap 2 hari sekali **Kemasan** Vial @ 50 ml **Deptan RI No. I. 1209039 PKC. 4. Obat keras**

13. **HEPARENOL**

Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung sorbitol 35 g, acetyl methionin 10 g, choline chloride 7,5 g, betain 6 g dan lysine HCl 2 g **Indikasi** Memperbaiki gangguan metabolisme terutama pencegahan terhadap kerusakan hati (hepatoprotektor) pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dalam pakan atau air minum dengan dosis 1-2 ml/kg

BB. Pada kuda, sapi: 20-50 ml/hari. Kambing, domba dan sapi bunting: 5-15 ml/hari. Babi: 10-30/hari. Kelinci dan unggas: 1-2 ml/L air minum selama 5-10 hari berturut-turut **Kemasan** 1 L dan 5 L **Deptan RI No. 1.** 1204397 PTC. 1. Obat bebas, terbatas

14. **IRON – E INJEKSI**

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung iron dextran **Indikasi** Mencegah dan mengatasi anemia, mencegah dan mengatasi defisiensi zat besi, dan meningkatkan ketahanan tubuh terutama pada anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM. Untuk pencegahan: umur 2-5 hari 1 ml. Diulang pada umur 2 minggu. Untuk pengobatan umur 5-28 hari: 1-2 ml **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. D.** 11074122 PKC. Obat keras

15. **LISOVIT**

Biomim/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lysozyme, vitamin E, vitamin C dan ekstrak tanaman Echinacea **Indikasi** Untuk mengoptimalkan fungsi kekebalan **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 30-100 g/1.000 ekor, layer: 100 g/1.000 ekor dan diberikan selama 3 hari berturut-turut melalui air minum **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. 1.** 05022872 FTS. Obat bebas terbatas

16. **LIVER EXTRACT INJEKSI**

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung vitamin B12 Mencegah dan mengatasi anemia, membantu pertumbuhan, menambah kekuatan karena penyakit infeksi, mengatasi komplikasi syaraf dan meningkatkan kondisi setelah pengobatan dengan antibiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM. Kuda, sapi: 10-20 ml setiap hari. Anak sapi: 5-10 ml selama 4 kali setiap 5 hari. Domba, kambing: 5 ml setiap 2 hari sekali. Anak domba: 2-5 ml setiap 2 hari sekali. Babi 2-10 kg: 1 ml setiap 2 atau 3 hari sekali. Untuk BB 10-20 kg: 2 ml setiap 2 atau 3 hari sekali. Untuk berat 20-50 kg: 5 ml setiap 2 atau 3 hari sekali. Untuk berat 50-100 kg: 10 ml setiap 2 atau 3 hari sekali. Anjing: 1 ml/5 kg BB setiap hari. Kucing: 0,5-2 ml setiap hari. Unggas: 1-5 ml setiap hari **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Kementan RI No. D.** 11104168 PKC. Obat keras

17. **ROBORANTE CALIER**

Laboratorios S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung casein peptide dan calcium fosforil cholinchloride **Indikasi** Memulihkan kondisi dan defisiensi pada hewan terutama yang berkaitan dengan gangguan metabolisme antara lain kurang nafsu makan dan indigesti kronis. Selanjutnya untuk pemulihan kondisi setelah penyakit infeksi, anemia sekunder, terapi kalsium pada tetani, kelelahan (setelah melahirkan) atau akibat transportasi/perjalanan Perhatian Jangan dicampur dengan produk injeksi lain dalam satu suntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC. Sapi dewasa: 10-15 ml. Anak sapi: 5-15 ml. Domba/kambing: 3-5 ml. Babi: 5-10 ml. Anak babi: 1-3 ml. Anjing: 0,5-5 ml. Kucing: 0,5-2 ml **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. 1.** 01112997 PKC. Obat keras

18. **VIGOSINE**

Ceva Sante Animale/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung carnitine HCl 5 g, sorbitol 25 g, magnesium sulfat 25 g dan ekstrak tanaman qs. 100 ml **Indikasi** Meningkatkan sistem metabolik tubuh dan keseimbangan energi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/2 L air **Kemasan** 1 L, 5 L dan 200 L **Deptan RI No.** I. 11081634 PTC. 2. Obat bebas terbatas.****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

ANTI DEFISIENSI VITAMIN, MINERAL DAN ASAM AMINO

1.13

1. **ADEMIN LIQUID** **AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3 dan vit E **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin pada unggas dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 500 ml **Kementan RI No. I. 11013983**
2. **AD3E INJECTION** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap ml mengandung vitamin A 100.000 IU, vit D3 10.000 IU, vit E 300 IU dan bahan tambahan sampai 1 ml **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan akibat defisiensi vitamin A, vit D3 dan vit E. Gangguan pertumbuhan, radang mata, enteritis, rachitis dan masalah kulit **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi 4-10 kg: 1-2 ml, 10-50 kg: 2-3 ml dan 50-100 kg: 4-6 ml. Sapi/Kuda 30-40 kg: 4-5 ml dan 500-700 kg: 4-6 ml. Kambing/domba < 10 kg: 2-3 ml dan 10-50 kg: 4-5 ml **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung **Kemasan** Boks: 12 vial @ 50 ml dan 12 vial @ 100 ml **Deptan RI No. D. 07123362 PKC**. Obat keras
3. **ADETROVIT** **Caprifarmindo Labs.**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vit A, vit D3 dan vit E **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum dan berikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 09063629 PTS**. Obat bebas terbatas
4. **ADEVIT OS** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3 dan vit E **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin A, vit D3 dan vit E pada unggas, sapi, kambing, domba dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 25 ml/100 L air. Kelinci: 25 ml/100 L air. Anak sapi: 10 ml/ekor. Sapi: 10 ml/ekor. Domba dan kambing: 2,5 ml/ekor **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 05022898 PTC**. Obat bebas terbatas
5. **AGRICARIVIT** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung carnitin 10.000 mg, vitamin A 12.500.000 IU, vit D3 1.500.000 IU, vit E 2.000 mg, vit B12 10 mg, vit B6 1.500 mg, vit C 15.000 mg, vit K3 3.500 mg, asam folat 170 mg, NaCl 2.500 mg, KCl 2.500 mg, CaCO3 20.000 mg dan MgSO4 125.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1-2 g/L air minum selama 3-5 hari. Sapi: 10 g/L air minum selama 3-5 hari. Babi: 5 g/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg @ 100 g dan 20 kg @ 100 g **Deptan RI No. D. 07123356 PTS**. Obat bebas terbatas

6. AGRIMINOVIT

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 10.000 mg, vit B1 3.000 mg, vit B2 4.000 mg, Ca-d-pantothenate 10.000 mg, vit B6 1.500 mg, vit C 25.000 mg, vit K3 1.500 mg, nicotinamide 5.000 mg, methionine 50.000 mg, lysine 50.000 mg dan glycine 8.000 mg **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi stress, meningkatkan kualitas produksi dan mempercepat pertumbuhan serta mengoptimalkan produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 1 g untuk 4 L air minum selama 4-8 hari, sapi domba kambing kuda 1 g untuk 1 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 Kg @ 100 g, 20 Kg @ 100 g **Deptan RI No.** D. 02112464 PTS. Obat bebas terbatas

7. AGRISELVIT

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 1.500.000 IU, vit E 4,50 g, vit B2 0,21 g, vit B12 0,001 g, vit K3 2 g, asam folat 0,050 g, vit B1 1 g, vit B6 0,25 g, vit C 0,25 g, calcium pantotenat 1 g, nicotinamide 2 g, selenium 0,036 g, Na 5 g, Ca 4 g, K 5 g dan Mg 4 g **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: 1-2 g/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg Sachet alufoil, kardus 10 kg @ 100 g, kardus 20 kg @ 100 g, ember 10 kg @ 100 g, ember 20 kg @ 100 g dan ember 50 kg @ 100 g **Kementan RI No.** D. 13024463 PTS. Obat bebas terbatas

8. AGRITOP

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit B2 240.000 mg, vit B1 1.200 mg, vit B6 4.200 mg, vit B12 42 mg, vit K3 6.000 mg, Ca-D-pantothenate 30.000 mg, folic acid 3.000 mg, biotin 105 mg dan vit C 150.000 mg **Indikasi** Meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ternak. Meningkatkan produksi susu dan daging serta mengatasi stress **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dan itik untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan: 1 g dilarutkan dalam 12 L air minum dan diberikan setiap hari. Mengatasi stress rutin dan kekurangan vitamin: 1 g dilarutkan dalam 6 L air minum. Babi dan sapi: 10 g diberikan cukup sekali setiap hari dalam makanan/air minum sesuai dengan jumlah ternak **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No.** D. 0203054 PTS. Obat bebas terbatas

9. AGRIVIT POWER

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung ATP sodium 1.000 mg, inositol 300 mg, vitamin A 2.500.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit B1 1.000 mg, vit B2 1.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 2 mg, vit K3 100 mg, calpan 1.000 mg dan asam amino konsentrat 15.450 mg **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan meningkatkan stamina ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: 1-2 g/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg Sachet foil, kardus 10 kg @ 100 g, kardus 20 kg @ 100 g, ember 10 kg @ 100 g, ember 20 kg @ 100 g dan ember 50 kg @ 100 g **Kementan RI No.** D. 13024474 PTS. Obat bebas terbatas

10. AGRIVITERAL**Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap 1 kg mengandung vitamin A 15.290.000 IU, vit D3 3.525.000 IU, vit E 4.700 IU, vit B12 14.700 mcg, riboflavin 1.470 mg, d-Panthenic acid 8.800 mg, niacin 11.760 mg, menadione sodium bisulfite complex, folic acid 440 mg, pyridoxine hydrochloride 1.470 mg, potassium chloride 3.000 mg, magnesium sulfate 1.000 mg, calcium gluconate 3.000 mg, sodium bicarbonate, manganese sulfate, zinc sulfate, cooper sulfate, ethylene diamine, dihydriodide dan cobalt **Indikasi** Anti defisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 2 L air minum atau 10 mg/kg BB selama 3 hari. Untuk pengobatan salmonellosis harus diberikan selama 5 hari berturut -turut, bila perlu diulang selama 1 minggu **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 02081409 PTS.** Obat bebas terbatas

11. AMINOLIFE POULTRY WS**FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit B6, vit C, vit B3, vit E, vit K3, folic acid, aspartic acid, glutamic acid, nikotinamide, alanine, arginine, glycine, hystidine, isoleusine, lysine, leusine, methionine, phenylalanine, proline, serin, threonine, tyrosine, valine dan ethoxiquine **Indikasi** Vitamin dan asam amino untuk meningkatkan daging dan produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 10-20 g kedalam 200 L air minum untuk pengobatan 7.500 ekor ayam umur 1 minggu atau 2.000 ekor ayam umur 4 minggu atau 1.000 ekor ayam umur 8 minggu atau 1.000 ekor ayam Layer **Kemasan** Sachet 100 g dan botol 1 kg **Kementan RI No. I. 1212044 FTS. 1.** Obat bebas terbatas

12. AMINOSOL**Kilco International, Scotlandia/Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan berwarna oranye tua **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, niacin, vit B3, lysine, methionine, threonine, arginine, glycine, serine, histidine, leucine, isoluesine, phenylalanine, tyrosine, valine, cystrine, cystine, glutamic, glutamine, hydroxyproline, proline, zinc, manganesse, copper, potassium, kalsium dan sodium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin, asam amino dan mineral pada unggas sehat, sakit atau baru pulih dari sakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum: tambahkan 1 L ke dalam 2.000 L air minum selama 2-3 hari. Melalui pakan tambahkan 1 L ke dalam 1.000 kg pakan selama 2-3 hari atau sesuai kebutuhan **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 08083482 PTC.** Obat bebas terbatas

13. AMINOVIT**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung methionine 375 mg, lysine 62,5 mg, vitamin A 6.250 IU, vit D3 1.250 IU, vit E 6,25 IU, vit B1 625 mg, vit B2 1,25 mg, vit B6 2,5 mg, vit B12 6,25 mg, calcium D-pantothenate 2,5 mg, nicotinamide 7,5 mg, folic acid 125 mg, vit C 12,5 mg, elektrolit berupa natrium, kalium, kalsium dan magnesium 500 mg **Indikasi** Menambah produksi telur dan memperpanjang masa bertelur pada ayam. Memperbesar telur, menguatkan kerabang telur dan menambah kesuburan (fertilitas). Memperbaiki konversi ransum. Mencegah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan mempertinggi

daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Mencegah lelah kandang pada ayam telur yang dipelihara di kandang baterai **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap 2 L air minum **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g, 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0609644 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

14. AMINOVITAL SOLUTION

Bimeda Chemicals Export, Irelandia/

15. Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung vitamin A 12.000.000 IU, vit D3 3.200.00 IU, vit E 3.200 mg, calsium pantothenate 4.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B6 1.200 mg, vit K 800 mg, vit C 4.000 mg, amino acid dan mineral 21.000 mg (tryptophan, lysine, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, cystine, methionine, phenylalanine, proline, serine, theonine, tyrosine, istidine, arginine, glutamic acid, aspartic acid, calcium, magnesium, phosphorus, zinc) dan gelatin **Indikasi** Untuk memacu dan mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi, meningkatkan fertilitas dan daya tetas serta meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat proses kesembuhan. Mengatasi stress dengan cepat dan FCR menjadi lebih baik **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml dilarutkan dalam 5 L air minum (1:5) dan diberikan melalui selama 5-10 hari berturut-turut **Kemasan** 1 L dan 5 L **Deptan RI No. I. 05102330 PTC. 1.** Obat bebas terbatas

16. AMINOVITAMIN

Vetoquinol S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung multivitamin (vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K) dan asam amino **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,7-1 ml/4 L air minum, selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 02061904 PTC. 1.** Obat bebas terbatas

17. AQUADEX B SOLUTION

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B6, d-panthothenic acid, vit K, vit H, nicotinamide, vit B12 dan choline **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada unggas, babi, kambing, sapi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan dalam air minum dan untuk anak sapi, kambing, domba, unggas dan kuda dengan dosis 2 ml/L air minum. Untuk babi: 2-4 ml/L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 02112460 PTC.** Obat bebas terbatas

18. AQUADEX C FORTE II

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E dan vit C **Indikasi** Antidefisiensi vitamin A, vit D3, vit E dan vit C pada unggas, babi, kambing, sapi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan dalam air minum dan untuk unggas 2,5-5 ml/L air minum. Pada sapi, kambing, babi dan kuda: 5-6 ml/10 L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 05042930 PTC.** Obat bebas terbatas

19. ASTRESVIT

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1 kg mengandung vitamin A 8.000.000 IU, vit

D3 1.600.000 IU, vit E 8.000 IU, vit B 128.000 mcg, vit B6 1.600 mg, vit C 28.000 mg, vit K3 2.400 mg, vit B1 1.200 mg, vit B2 1.800 mg, NaCl 1.000 mg, KCl 1.000 mg, Ca-d-panthothenate 6.000 mg, nicotinamide 16.000 mg dan folic Acid 120.000 **Indikasi** Mengatasi stress akibat perubahan cuaca atau perlakuan vaksinasi, pindah kandang, transportasi, potong paruh. Menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memenuhi kebutuhan vitamin yang optimal. Meningkatkan nafsu makan, memelihara kesehatan dan produksi yang optimal **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum diberikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg @ 100 g dan 20 kg @ 100 g **Deptan RI No. D. 02061003 PTS.** Obat bebas terbatas

20. AVIDEGG**Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 2.500.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 3.000 mg, vit K3 500 mg, vit C 20.000 mg, vit B1 1.250 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.500 mg, vit B12 1.500 mg, Ca-d-panthothenate 6.000 mg, niacine 7.000 mg adn folic acid 150 mg **Indikasi** Untuk pengobatan defisiensi vitamin, memperkuat daya tahan rubuh serta membantu mempercepat kesembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g dilarutkan dalam 10 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Kantung aluminium foil 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 0106821 PTS. TM.** Obat bebas terbatas

21. AVILITE**Avindo Perdana Bahtera Mulia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 20.000.000 IU, vit D 4.000.000 IU, vit E 15.000 mg, vit K3 3.500 mg, vit B2 8.000 mg, vit B6 12.000 mg, vit B12 5.000 mg, Ca-d-panthotenate 30.000 mg, vit C 60.000 mg, nicotinic acid 60.000 mg, lysine 150.000 mg, sodium acetate 125.000 mg, potassium acetate 150.000 mg, magnesium oxide 6.000 mg dan sodium chloride 100.000 mg **Indikasi** Mencegah stress. Mengganti cairan elektrolite yang hilang akibat stress berat dan diare. Mencegah avitaminosis, mengoptimalkan metabolisme pakan serta meningkatkan produktifitas ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/5 L air minum. Babi: 1 g/3 kg BB **Kemasan** 500 g **Deptan RI No. D. 03012512 PTS. TM.** Obat bebas terbatas

22. AVISTRESS**Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit B1 500 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit C 25.000 mg, vit K3 1.750 mg, vit B12 10 mg, calcium D-pantothenate 6.000 mg, biotin 100 mg, folic acid 250 mg dan nicotinic acid 8.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada sapi, babi, domba, kambing dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum. Pada unggas dengan dosis: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 1 kg **Deptan RI No. I. 03122696 PKC.** Obat bebas terbatas

23. AVIT**Aves**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit C, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, Ca-d-panthotenate, nicotinic acid dan elektrolit (Na, K, Ca, Cl,

Mg) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 1-2 L air minum **Kemasan** 50 g, 200 g dan 1 kg
Deptan RI No. D. 07093275 PTS. Obat bebas terbatas

24. AVITONIC – WSP

Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 4.000.000 IU, vit D3 800.000 IU, vit E 8.000 mg, vit K3 800 mg, vit C 16.000 mg, vit B1 800 mg, vit B2 1.600 mg, vit B6 1.600 mg, vit B12 3.200 mg, Ca-d-panthothenate 2.400 mg, niacine 8.000 mg, folic acid 200 mg, natrium 100 mg, kalium 100 mg dan magnesium sulphat 50 mg **Indikasi** Pengobatan defisiensi vitamin, memperkuat daya tahan tubuh serta membantu mempercepat kesembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 1-2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Kantong aluminium foil 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 0106807 PTS. TM.** Obat bebas terbatas

25. AVITROL

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Soluble powder **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin A 10.000 IU, vit D3 2.000 IU, vit E 3 mg, vit K3 2,2 mg, vit B1 0,8 mg, vit B2 1,8 mg, vit B6 2,4 mg, vit B12 10 mcg, vit C 25 mg, asam folat 200 mcg, K-aspartat, Mg-aspartat, Na, Ca dan Cl **Indikasi** Mencegah dan mengobati kekurangan vitamin terutama pada masa sesudah sakit, gangguan pertumbuhan, sebelum dan sesudah vaksinasi. Infeksi bakteri dan infeksi usus, seperti misalnya koksidirosis, dan infestasi cacing yang menimbulkan gangguan absorpsi pakan, kualitas pakan kurang baik dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 g/2 L air minum, berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg dan 25 kg **Deptan RI No. D. 1102028 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

26. B – COM

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit B3 dan vit B5 **Indikasi** Untuk membantu mengurangi defisiensi vitamin, dan memperkuat daya tahan tubuh. Membantu mempercepat kesembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 1-2 L air minum **Kemasan** 50 g, 200 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 07083262 PTS.** Obat bebas terbatas

27. B – COMPLEX

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, nikotinamid dan D-panthenol **Indikasi** Antidefisiensi vitamin B kompleks pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM. Hewan besar: 5-10 ml/hari. Hewan kecil: 1-2 ml/hari **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No. D. 0507682 PKC. 1.** Obat keras

28. BERNOVIT

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 7.500 IU, vit D3 1.000 IU, vit E 2,8 mg, vit K3 1,5 mg, vit B2 2 mg, vit B6 0,3 mg, vit B12 4 mcg, vit C 12 mg, asam folat 180 mcg, Ca-d-pantotenat 2,4 mg, Na, K dan Cl **Indikasi** Mengatasi kelelahan, mencegah dan mengatasi stress pada hewan akibat pindah kandang, vaksinasi, cuaca buruk dan lain-lain. Mencegah dan mengobati defisiensi vitamin. Meningkatkan daya tahan tubuh

terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 1 kg, 5 kg, 10 kg dan 25 kg **Deptan RI No. D. 02102377 FTS. 1.** Obat bebas terbatas

- 29. BESTLYTES** **China Bestar Laboratories, Taiwan/Ekasapta Wijayatangguh**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung potasium klorida, tembaga sulfat, seng sulfat dan sodium klorida **Indikasi** Mengurangi stress dan meningkatkan nafsu makan pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk stress: tambahkan 10 g/10 L air minum selama 3-7 hari atau campurkan 500 g dengan 250-500 kg pakan selama 5-7 hari. Untuk meningkatkan nafsu makan: tambahkan 10 g/10-20 L air minum selama 3-7 hari atau campurkan 500 g dengan 500-1.000 kg pakan selama 5-7 hari **Kemasan** 150 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI No. I. 09063626 PTS.** Obat bebas terbatas
- 30. BETAMINT** **Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung betaine 250 g, vitamin C 90 g, potassium chloride 2 g, magnesium chloride hexahydrated 4 g, calcium chloride dehydrate 40 g, sodium chloride 20 g dan sweetening mentholated expient q.s 1 L **Indikasi** Mengatasi gejala heat stress karena suhu lingkungan yang tinggi dan kelembaban relative yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan: 1 L/1.000 L air selama 3-5 hari, dimulai 2 hari sebelum periode musim panas. Kontrol: tambahkan 2 L ke dalam 1.000 L air minum selama 3-5 hari. Penggunaan dapat dilanjutkan jika terjadi heat stress. Perbaharui larutan setiap 24 jam. Secara oral melalui air minum **Kemasan** 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 12072048 PKC.** Obat bebas terbatas
- 31. BIO – ATP PLUS** **Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung adenosine triphosphate (ATP) 1.000 mcg, cyanocobalamin 500 mcg dan sodium selenite 1.000 mcg **Indikasi** Kombinasi ATP dengan cyanocobalamin dan sodium selenite efektif untuk pengobatan myasthenia, myathrophy dan necrotic muscle. Khusus membantu aktifitas obat pada kasus kerja keras seperti perlombaan, membajak sawah dan lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada sapi, kuda dan unta: 5-10 ml/ekor. Pedet: 4-6 ml/ekor. Anjing: 0,5 ml/ekor. Diberikan sekali sehari selama 3-4 hari sesuai kebutuhan dan dilakukan melalui injeksi secara IM **Kemasan Botol 100 ml Kementan RI No. I. 12074310 PKC.** Obat keras
- 32. BIO – CALCIMAX** **Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi dalam botol **Komposisi** Setiap ml mengandung kalsium glukonat 450 mg, kalsium glukheptonat 45 mg, kalsium D-saccharate 10 mg dan boric acid 87,5 mg **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan calcium, seperti: demam karena susu berlebihan, parturisi paresis, rakhtitis, kejang, edema, dan pendarahan pada sapi, babi, kambing, domba, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis ini untuk semua jenis dengan cara injeksi secara IV atau IM.

Pencegahan dan demam susu dan parturient: 1 ml/5 kg BB, dan gunakan hanya 1 dosis setelah nifas. Pengobatan demam susu paresis: 1 ml/4-5 kg BB/hari sampai sembuh. Pengobatan pendarahan, edema: 1 ml/10 kg BB/hari sampai sembuh **Kemasan Botol 100 ml Kementan RI No. I. 13014439 PKC.** Obat keras

33. BIO – SELEVIT E

Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/

Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi dalam botol **Komposisi** Setiap ml mengandung dl- α -tocopheryl acetate 50 mg dan sodium selenite 0,5 mg **Indikasi** Untuk pengobatan defisiensi selenium dan vitamin E. Tambahan nutrisi untuk kasus berikut: exudative diathesis, encephalomalacia dan muscular dystrophy pada unggas. Pencegahan defisiensi vitamin E dan selenium pada babi. Meningkatkan respon immune dan fertilitas **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi baru lahir: 1 ml/ekor dengan injeksi IM. Babi sehabis sapih: 2 ml/ekor dengan injeksi IM. Babi dalam masa pertumbuhan, kambing dan domba: 3-4 ml/ekor dengan injeksi IM. Babi bibit dan sapi: 10 ml/ekor dengan injeksi IM. Unggas: larutkan 1 ml ke dalam 2 L air minum. Untuk pencegahan: 1 dosis untuk setiap 2 minggu dan untuk pengobatan: sekali/hari selama 3 hari **Kemasan Botol 100 ml Kementan RI No. I. 13034469 PKC.** Obat keras

34. BIO – VITAMIN AD3E

Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/

Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi dalam botol **Komposisi** Setiap ml mengandung vitamin A 80.000 IU, vit D3 40.000 IU dan vit E 20 mg **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan kekurangan vitamin A, vit D dan vit E. Meningkatkan daya tahan tubuh dalam kondisi stress, infeksi parasit, virus atau infeksi bakteri. Meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan/reproduksi ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Penggunaan dengan cara injeksi secara IM. Pada sapi: 1 ml/20-25 kg BB. Babi dan anak sapi: 1 ml/15 kg BB. Anjing dan kucing: 1 ml/10 kg BB. Unggas: 0,5 ml/ekor **Kemasan Botol 100 ml Kementan RI No. I. 08063444 PKC.** Obat keras

35. BIODIN

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung ATP, Mg aspartate, K aspartate, Na selenit dan vitamin B12 **Indikasi** Penguat otot dan meningkatkan daya tahan tubuh pada unggas, sapi, domba, kuda, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan Botol @ 50 ml dan 100 ml Deptan RI No. D. 08103507 PKC.** Obat keras

36. BIOMAX – 12

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung ATP (growth factor) 27,80 mg, vit A 5.000.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 5.000 mg, vit K3 800 mg, vit B2 (5 Na-phosphate) 5.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit C (monophosphate) 5.000 mg, folic acid 40 mg, biotin 250 mg, sodium bicarbonate 10.000 mg, methionine 16.000 mg, ferrous sulfate 2.200 mg, zinc sulfate 150 mg, manganese sulfate 200 mg **Indikasi** Dianjurkan untuk diberikan pada DOC anak babi serta sapi yang kecil karena defisiensi nutrisi dari induknya. Meningkatkan BB secara alamiah. Mencegah defisiensi vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas, anak

babi dan anak sapi: larutkan 20 cc untuk 40-50 kg BB dan diberikan selama 7-12 hari berturut turut **Deptan RI No. D. 0206971 PTS**. Obat bebas terbatas

37. BIOMINOVIT**Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** setiap kg mengandung vitamin A 6.000.000 IU, vit D3 1.200.000 IU, vit E 5.000 mg, vit B1 1.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 15 mg, choline bitartrat 50.000 mg, nicotinamide 5.000 mg, inositol 500 mg, Ca-d-pantothenate 3.000 mg dan asam amino konsentrat 20.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** larutkan BIOMINOVIT® dalam air minum: Unggas: 1 g/2,5 L air minum selama 3-5 hari, Hewan lain: 1 g/10 kg BB Kemasan 100 g dan 1 kg, 10 kg @ 100 g, 20 kg @ 100 g, 50 kg @ 100 g **KEMENTAN RI No. D. 12102086 PTS.2** Obat bebas terbatas.

38. BIOSAN – TP INJ**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung ATP, Mg aspartat, K aspartat, Na selenit dan vitamin B12 **Indikasi** Menjaga stamina tubuh dan menguatkan otot pada hewan akibat transportasi, melahirkan, kerja keras, serta kekurangan makanan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 20 ml. Anak sapi: 5-10 ml. Domba, babi dan anjing: 2-5 ml **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 08063459 PKC**. Obat keras

39. BIOSAN – TP ORAL**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung ATP, Mg aspartat, K aspartat, Na selenit, vitamin B12 dan glycine **Indikasi** Meningkatkan kondisi dan daya tahan tubuh ayam serta menjaga stamina tubuh ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/2 L air minum **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 08053428 PTC**. Obat bebas terbatas

40. BIOSOLAVET**Duta Kaisar Pharmacy**

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung adenosin triphosphoric acid (ATP) 1 mg, Mg aspartate 15 mg, potassium aspartate 10 mg, sodium selenite 1 mg dan cyanocobalamin 0,5 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas, sapi, kuda, babi domba, anjing dan kucing. Mengatasi kelemahan otot karena transportasi, melahirkan, menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mengobati miositis akut, myopathy-dyspnoea syndrome. Mengatasi kekakuan pada anak domba Perhatian Pada kuda dengan suntikan IM akan timbul reaksi lokal tapi hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan secara IM 3-4 kali sehari untuk kuda. Sapi: 20 ml. Anak kuda, anak sapi: 5-10 ml. Domba, babi, anjing: 2-5 ml. Kucing, ayam 1 ml **Kemasan** Vial 20 ml dan botol 100 ml **Deptan RI No. D. 05103002 PKC**. Obat keras

41. BIOSTRESS**Vaksindo Satwa Nusantara**

Bentuk Sediaan Serbuk larut air **Komposisi** Setiap 1.000 g mengandung vitamin A 6.500.000 IU, vit D3 1.200.000 IU, vit E 2.000 IU, vit B6 1.250 mg, vit B12 6 mg, folic acid 200 mg,

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

ascorbic acid 15 g, menadion bisulfida (vit. K3) 3.000 mg, NaCl 1.500 mg, KCl 15.00 mg MgCl₂ 2.500 mg dan CaCl₂ 2.000 mg **Indikasi** Untuk mengatasi keadaan stress akibat pengobatan dengan khemoterapeutika. Untuk mempertahankan tingkat produksi yang tinggi, memperkuat daya tahan tubuh serta membantu mempercepat penyembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan dalam air minum. Unggas: 1 g dalam 1,5 L air minum A: untuk stress biasa berikan selama 3 hari berturut-turut. B: 2 hari sebelum vaksinasi. Pada hari vaksinasi kemudian diteruskan 2 hari sesudah vaksinasi. Hewan lain: 1 g/10 kg BB **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g, **kemasan** induk 1 kg dan 15 kg **Deptan RI No. D. 03042074 PTS. 1. TM.** Obat bebas terbatas

42. BIO – STRONG

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinamide dan Ca-d-pantothenate **Indikasi** Mempercepat pemulihan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh serta menghilangkan stress karena pergantian musim, cuaca buruk, pindah kandang, dll **Perhatian** Air minum ditaruh ditempat teduh dan terhindar dari sinar matahari serta diganti setiap harinya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum dan diberikan selama 5-7 hari **Kemasan** 1.000 g, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0312943 PTS. 3.** Obat bebas terbatas

43. BIOVIT

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinamide, Ca-d-pantothenate, folic acid dan biotin **Indikasi** Membantu pertumbuhan dan mengatasi stress serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g dilarutkan dalam 12 L air minum dan diberikan selama 5-7 hari. Anak babi: untuk 120-240 ekor. Anak sapi: untuk 80-160 ekor. Sapi perah: untuk 10-20 ekor dan diberikan 10 g dalam pakan atau air minum selama 7 hari **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0312940 PTS. 3.** Obat bebas terbatas

44. BIOVITON

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Tablet **Komposisi** Setiap tablet mengandung vitamin A 220.000 IU, vit D3 31.000 IU, vit E 55 mg, vit K3 9 mg, vit B1 7 mg, vit B2 23 mg, vit B12 0,11 mcg, vit C 1.000 mg, folid acid 1,2 mg, pantothenate acid 111 mg, nicotinamide 277 mg, biotin 1,6 mg, elektrolit K, Na, Mg dan Cl **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan elektrolit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 tablet dilarutkan dalam 50 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Tube =10 tablet **Kementan RI No. D. 12092255 PTM. 2.** Obat bebas terbatas

45. BIOVITON POWDER EFFERVESCENT

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B12, vit C, folid acid, pantothenate acid, nicotinamide, biotin, K, Na, Mg dan Cl **Indikasi** Memacu pertumbuhan pada ayam muda: starter, grower dan broiler. Memperbaiki efisiensi produksi dan daya tetas telur. Mencegah stress akibat vaksinasi, perlakuan manajemen, perubahan cuaca dan transportasi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 bungkus (5 g) dilarutkan

dalam 50-75 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 5 g **Deptan RI No. D. 09083682 PTS.** Obat bebas terbatas

46. BLOOM & GROW**Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, asam pantotenat, asam folat, niacin, KCl, NaCl, MgSO₄, MnSO₄, NaSO₄, CuSO₄, ZnSO₄, lisin dan metionin **Indikasi** Digunakan pada periode stress dan atau dehidrasi seperti selama periode temperatur tinggi. Untuk kesembuhan dari penyakit, sesudah vaksinasi dan pada waktu pemindahan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas: 1 g/2 L air minum selama 5-7 hari atau diberikan pada pakan dengan perbandingan 1:1.000. Untuk babi dan ternak sapi: 100 g/30 kg BB selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 10 kg **Deptan RI No. I. 03092629 PTS.** Obat bebas terbatas

47. B – PLEX INJ**Pyridam Veteriner**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml obat mengandung vitamin B1 2,00 mg, vit B2 1,50 mg, vit B6 1,25 mg, vit B12 5,00 mcg, D-panthenol 5,00 mg dan nicotinamide 12,50 mg **Indikasi** Menambah nafsu makan dan memperbaiki kekurangan vitamin. Meningkatkan daya tahan tubuh dan juga berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM sehari 1 kali atau bilamana perlu. Ayam petelur umur 1-2 bulan/ ayam broiler dengan BB 0,2-0,6 kg: 0,2-0,4 ml. Ayam petelur umur 2-3 bulan/ayam broiler dengan BB 0,6-1 kg: 0,4-0,7 ml. Ayam petelur umur 3-4 bulan/ayam broiler dengan BB 1-1,5 kg: 0,7-1 ml. Ayam petelur umur > 4 bulan/ayam broiler dengan BB > 1,5 kg: 1 ml. Anak sapi: 0,05 ml/kg BB. Sapi dewasa: 0,03 ml/kg BB. Babi dengan BB 40 kg: 1-2 ml, BB 40-75 kg: 2-3 ml, BB > 75 kg: 3-5 ml. Anjing dan kucing: 0,1-0,5 ml/kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml/botol **Deptan RI No. D. 03021320 PKC.** 1. Obat keras

48. BROVITGRIN**Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung vitamin A 12.000.000 IU, vit. D3 2.400.000 IU, vit. E 3.000 IU, vit. K3 1.200 IU, vit. B1 400 mg, vit. B2 5.000 mg, vit. B6 800 mg, vit. B12 8 mg, vit. C 30.000 mg, niacinamid 12.000 mg, asam folat 600 mg, Ca-d-Panthothenat 6.000 mg, D-l-Methionine 10.000 mg dan L-Lysine 30.000 mg **Indikasi** Memacu pertumbuhan dan produktivitas yang optimal, memperbaiki konversi pakan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, mengatasi stress dan mempercepat proses penyembuhan **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas 1 g untuk 2 L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg @ 100 g, 20 kg @ 1 kg **Deptan RI No. D. 04062776 PTS** Obat bebas terbatas

49. BRO – GESAT**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantotenat, methionine, lysine, arginine, glycine, zinc, magnesium dan manganese **Indikasi** Untuk pertumbuhan dan produksi optimal **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum atau 1 kg dicampurkan dalam 1 ton

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

pakan dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut setiap periode pemberian **Kemasan** 10 g, 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0102972 FTS. 1.** Obat bebas terbatas

50. BROILER FASGROW

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 3.000 mg, vit K3 1.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 3.000 mcg, vit C 20.000 mg, nicotinamide 5.000 mg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, L-Lysine 20.000 mg, DL-Methionine 200.000 mg, glycine 25.000 mg, zinc 4.000 mg, manganese 8.000 mg, natrium silikat 10.000 mg, cobalt 2.000 mg dan copper 1.200 mg
Indikasi Diformulasikan khusus untuk mempercepat pertumbuhan broiler, menambah nafsu makan, meningkatkan feed efisiensi serta mengatasi defisiensi vitamin, asam amino dan mineral
Dosis dan Cara Pemakaian Unggas: 10 g/20 L air minum dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D. 03052587 PTS.** Obat bebas terbatas

51. BROILER VITA

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung vitamin A 12.000 IU, vit D3 2.400 IU, vit E 3 IU, vit K 1,2 mg, vit B1 0,4 mg, vit B2 5 mg, vit B6 0,8 mg, vit B12 8 mg, vit C 30 mg, niacinamide 12 mg, calcium D-pantothenate 6 mg, folic acid 0,6 mg, methionine 10 mg dan lysine 20 mg
Indikasi Membantu pertumbuhan broiler dan memperbaiki konversi ransum serta mengatasi stres
Dosis dan Cara Pemakaian 1 g tiap 2 L air minum atau 1 g tiap kg ransum **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 06091496 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

52. BROTIGAN

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung polimiksin E 2,3 mg, asam nicotinat 11 mg, Ca-d-pantotenat 2,8 mg, vit K3 1 mg, sodium hidrogen karbonat 64 mg, triptophan 1,8 mg dan metionin 12 mg
Indikasi Meningkatkan pertumbuhan ayam. Meningkatkan produksi dan berat telur. Meningkatkan kualitas daging dan telur
Dosis dan Cara Pemakaian Layer: 5 g/7 L air minum, diberikan selama 3-5 hari berturut turut. Broiler: 5 g/5 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg dan 25 kg **Deptan RI No. D. 02042274 FTS. 1.** Obat bebas terbatas

53. B – SANPLEX

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, nicotinamide dan d-Panthenol
Indikasi Mencegah dan mengatasi defisiensi vitamin B-kompleks dan memperbaiki metabolisme tubuh dalam masa pertumbuhan dan masa penyembuhan setelah sakit
Dosis dan Cara Pemakaian Sapi dan kuda: 5-10 ml/200 kg BB. Domba dan kambing: 2-4 ml/40 kg BB. Babi: 1-2 ml/40 kg BB. Anjing dan kucing: 0,25-0,5

ml/5-10 kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No.** D. 02092451 PTC. Obat bebas terbatas

54. CALBRO INJECTION**Cipla, Ltd., India/Paeco Agung**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung calcium borogluconate 32,8% w/v **Indikasi** Pengobatan terhadap kondisi hypocalcemia kronis dan akut (parturien paresis, milk fever) pada sapi, kerbau, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Sesuai petunjuk dokter hewan **Kemasan** Botol 450 ml **Deptan RI No.** I. 07103310 PKC. Obat keras

55. CALCIDEX ORAL**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung calcium chloride, Mg chloride dan vitamin D3 **Indikasi** Suplemen calcium dan magnesium **Dosis dan Cara Pemakaian** 200-400 ml/ekor sapi **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No.** D. 07093307 PTC. Obat bebas terbatas

56. CALCIJECT 40 CM**Norbrook Laboratories Ltd., Inggris/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Ca borogluconat dan Mg hypophosphite hexahydrate **Indikasi** Pengobatan terhadap hipokalsemia pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 400 ml **Deptan RI No.** I. 03112681 PKC. Obat keras

57. CALGOPHOS**Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung phosphorus total sebagai P2O5, calcium phosphate monobasic, magnesium phosphate monobasic, sodium phosphate monobasic, Fe phosphate monobasic, manganese phosphate monobasic dan cobalt phosphate monobasic **Indikasi** Antidefisiensi mineral pada unggas dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas diet supplement: 1 L/200 L air minum. Defisiensi: 1 L/100 L air minum, sore hari. Hewan besar diet supplement: 1 L/hari/30 ekor, selama 7 hari dan pemberian diulang setiap 2 bulan. Defisiensi dewasa: 75-100 ml/ekor dan pemberian selama 3-5 hari. Defisiensi muda: 25-50 ml/ekor dan pemberian selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No.** I. 05061024 PTC. 3. Obat bebas terbatas

58. CALVITA**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Setiap kapsul mengandung vitamin A 1.500 IU, vit D3 300 IU, vit E 0,5 IU, vit B1 1,5 mg, vit B2 1 mg, vit B6 0,4 mg, vit B12 1,5 mg, folic acid 0,2 mg, niacinamide 3 mg, Ca D-pantothenate 1 mg, Ca 30 mg dan P 5 mg **Indikasi** Mencegah kelumpuhan pada ayam, itik dan unggas lain. Memperkuat tubuh unggas dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengatasi "cage layer fatigue" (lumpuh akibat kekurangan kalsium pada ayam telur yang dipelihara langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam, itik, unggas lain: pencegahan 1 kapsul tiap ekor. Pengobatan: 2 kapsul tiap ekor **Kemasan** 10 kapsul, 50 kapsul dan 300 kapsul **Deptan RI No.** D. 02021751 PKM. 1. Obat bebas terbatas

59. CAPRI – CHICKS

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung virginiamycin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B2, vit B12, nicotinic acid, Ca-d-pantothenate, folic acid **Indikasi** Merangsang pertumbuhan dan membantu meningkatkan BB. Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Mengatasi stress karena perubahan iklim/cuaca, vaksinasi, pindah kandang, transportasi serta mencegah defisiensi vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 g/2 L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 07093294 PTS. Obat bebas terbatas

60. CAPRI B – PLEX INJ

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, nikotinamida dan d-panthenol **Indikasi** Mencegah dan mengobati defisiensi vitamin B kompleks pada sapi, kambing, domba, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda: 5-10 ml/200 kg BB. Domba, kambing: 2-4 ml/40 kg BB. Babi: 1-2 ml/40 kg BB. Anjing dan kucing: 0,25-0,5 ml/5-10 kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No.** 08053431 PKC. Obat keras

61. CAPRIBRO

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, Ca-d-pantothenate, methionine, lysine, arginine, glycine, magnesium, manganese, zinc, copper dan cobalt **Indikasi** Melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino esensial **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum atau 1 g/1 kg pakan **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** 07093291 PTS. Obat bebas terbatas

62. CAPRIMUN – E

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin E dan selenium **Indikasi** Imunostimulator, menjaga keutuhan membran sel, meningkatkan fertilitas dan antidefisiensi vitamin E **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/8 L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 09073653 PTS. Obat bebas terbatas

63. CAPRIPROVIT

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, nicotinic acid, folic acid dan elektrolit (Na, K, Ca, Mg) **Indikasi** Mengatasi stress pada hewan. Meningkatkan nafsu makan dan mempertahankan produktivitas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum atau 1 g/1 kg pakan. Berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 07123358 PTS. Obat bebas terbatas

64. CAPRIVIT B12 Inj.

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B12 **Indikasi** Pencegahan anemia sebelum dan sesudah melahirkan, post operasi dan serangan parasit **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda, induk babi: 4 ml/ekor. Domba, kambing: 1 ml/ekor, Babi, anak babi,

anjing, kucing: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 09013548 PTC.** Obat bebas terbatas

65. CAPRIVIT Inj.**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, nicotinic acid, d-panthenol **Indikasi** Mencegah dan mengobati defisiensi vitamin pada hewan seperti: gangguan pertumbuhan, gangguan pencernaan (bukan infeksi bakteri), gangguan reproduksi dan otot, proses penyembuhan penyakit karena infestasi bakteri atau infestasi parasit. Kelemahan pada hewan yang baru dilahirkan dan anemia. Kelemahan secara umum karena perubahan iklim, transportasi, setelah melahirkan, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda, kerbau: 2,5-5 ml/ekor. Domba, kambing, babi, anak sapi, anak kuda, anak kerbau: 1-2 ml/ekor. Anak babi, anjing: 0,5-1 ml/ekor. Kucing, unggas: 0,1-0,2 ml/ekor **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 07093292 PKC.** Obat bebas terbatas

66. CAPRIVIT**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, biotin, Ca-d-pantothenate, nicotinic acid dan folic acid **Indikasi** Membantu pertumbuhan. Mengatasi stress. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Meningkatkan fertilitas, produksi telur dan susu. Meningkatkan kualitas telur dan daging. Memperbaiki keseimbangan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/12 L air minum. Babi dan sapi: 10 g dicampurkan dalam pakan **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 07093279 FTS.** Obat bebas terbatas

67. 63. CARMAVIT**Mensana Aneka Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung carnitin 50 g, vitamin C 40 g dan vit E 1 g **Indikasi** Mencegah stres karena cuaca panas, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan produksi telur agar optimal **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral: 1 g/1-2 L air minum selama 3-5 hari, diberikan 10 hari sekali **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No.D.07063230 PTS** Obat bebas terbatas.

68. CARNIBROVIT**Agro Makmur Sentosa**

Bentuk Sediaan Serbuk. Komposisi Tiap kg mengandung carnitine 20.000 mg, inositol 250.000 mg, vitamin A 12.500.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit E 2.000 mg, vit K3 10.000 mg, vit B2 3.500 mg, vit B6 1.500 mg, vit B12 60 mg, vitC 15.000 mg, asam folat 170 mg dan elektrolit 2.500 mg. **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan, memperbaiki konversi pakan dan mempercepat proses penyembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/ 1 L air minum berikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI No. D. 02071083 PTS.** Obat bebas terbatas

69. CARNIFAST**Otasindo Prima Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung L-carnitin fumarate 100 g, L-lysine 50 g, inositol 12 g, vitamin B1 0,5 g, vit B2 2,2 g, Mg sulfat 30 g dan sorbiol 500 g

Indikasi Meningkatkan survivability, meningkatkan feed efisiensi, BB harian, kualitas telur serta meningkatkan hatchability/daya tetas telur pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut Kemasan Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D. 09023563 PTS.** Obat bebas terbatas

70. CARNYVIT

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung carnitine HCl 10 g, vitamin A 12.500.000 IU, vit D3 1.500.000 IU, vit E 2000 mg, vit B12 10 mg, vit B6 1.500 mg, vit C 15.000 mg, menadion sodium bisulfat 3.500 mg, folic Acid 170 mg, NaCl 2,5 g, KCl 2,5 g, calsium asetat 2,5 g dan magnesium sulfat 125 g **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan CARNYVIT® dalam air minum. Untuk ayam dan burung puyuh: 1-2 g/L air minum selama 3-5 hari, berikan 2 minggu sekali. Untuk sapi: 10 g/L air minum selama 3-5 hari, berikan 2 minggu sekali. Untuk babi: 5 g/L air minum selama 3-5 hari, berikan 2 minggu sekali **Kemasan** 100 g dan 1 kg, 10 kg @ 100 g, 20 kg @ 100 g dan 50 kg @ 100 g **Kementan RI No. D. 12101870 PTS.2** Obat bebas terbatas

71. CATOSAL INJEKSI

OLIC (Thailand) Limited untuk Bayer Thai, Co., Ltd Thailand/Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Injeksi **Komposisi** Mengandung butafosfan dan vitamin B12 **Indikasi** Merangsang metabolisme pada babi, sapi, anak sapi, kambing, domba, kuda, bebek, ayam, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: Suntikan secara IV, IM atau SC lewat air minum. Sapi, kambing, domba, dan kuda: pencegahan infertilitas dikarenakan keseimbangan fosfor: 20 cc 4x/hari; hewan bunting: 30 cc IM 4-6 minggu sebelum melahirkan dan ulangi 1-2 minggu setelah melahirkan; kondisi fisik lemah sebelum atau sesudah melahirkan: larutan kalsium secara IV bersamaan dengan Catosal 30 cc. Babi: pengobatan supportif untuk meningkatkan produksi susu dan cegah mastitis: 10-20 cc selama 10-14 hari sebelum melahirkan. Meningkatkan pertumbuhan anak babi kerdil: 2,5-10 cc; tail biting: 0,5 cc/kg BB selama 2 hari dan ulangi setelah 8 hari. Pengobatan suportif pada penjantan selama perkawinan: 15-20cc 1x/minggu **Kemasan** Botol @ 20ml, 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. I. 1112363 PKC.3.** Obat keras

72. C – FRESH

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin C 1 g **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan akibat defisiensi vitamin C dan mengatasi stress yang diakibatkan oleh panas dari serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** 20-30 mg tiap kg BB atau 2-3 g tiap 20 L air minum **Kemasan** Sachet 5 g dan 10 g **Deptan RI No. D. 07093298 PTS.** Obat bebas terbatas

73. CHICKTONIC

Industrial Veterinaria., SA-Spanyol/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap L mengandung vitamin A 2.500.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 3.75 g, vit K3 250 mg, pyrodoxine 2 g, riboflavin 4 g, thiamin 3.5 g, dexpantenol 15 g, vit B12 10 mg, metionin 5 g, cholin 400 mg, lisin 2.5 g, histidin 900

mg, arginin 490 mg, asam aspartat 1.45 g, treonin 500 mg, serin 680 mg, asam glutamat 1.16 g, prolin 510 mg, glisin 575 mg, alanin 975 mg, cystin 150 mg, valine 1.1 g, leusin 1.5 g, isoleusin 125 mg, tirosin 340 mg, fenilalanin 810 mg, triptopan 75 mg, biotin 2 mg dan inositol 2.5 mg **Indikasi** sebagai pengobatan kekurangan vitamin, malnutrisi, periode stres saat kebuntingan, untuk mengurangi kematian unggas dan pada periode laktasi. **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 ml/L air minum selama 5-7 hari Kemasan 1 L **Deptan RI No. I. 0603207** PTC.1 Obat bebas terbatas.

74. COFACALCIUM**Coophavet – Merial, Perancis/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung calcium gluconate dan magnesium hypophosphite **Indikasi** Mengatasi defisiensi kalsium dan magnesium pada sapi, babi, kambing domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Botol 500 ml **Deptan RI No. I. 08101720** PKC. 1. Obat keras

75. COFALYSOR INJECTION**Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap 100 g mengandung fish hydrolysate, potassium metabisulphite, iron, mangan, vitamin B1, vit B2, vit B6 dan vit B12 **Indikasi** Sebagai stimulan untuk sapi, domba, kambing, kelinci dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi dewasa: 1 ml/10 kg BB. Induk sapi: 4 ml/10 kg BB. Anak babi: 10 ml. Babi dewasa: 2 ml/kg BB. Kambing: 4 ml/10 kg BB. Kelinci: 1 ml/kg BB. Unggas dewasa: 1 ml/kg BB. Lama pengobatan antara 2-3 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml kg **Deptan RI No. I. 09051922** PKC. 1. Obat keras

76. COFAVIT 500**Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Setiap 100 ml mengandung vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU dan vit E acetate 2 g **Indikasi** Defisiensi vitamin A, vit D dan vit E **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/100 kg BB untuk hewan dewasa. 1 ml/50 kg BB untuk hewan muda **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. I. 03122696** PKC. Obat keras

77. CONTRA – STRESS**PT. Multifarma Satwa Maju**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vitamin A 3.000.000 IU, vit D3 500.000, vit K3 1.000 mg, vit C 25.000 mg, vit B1 1.000 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 5.000 mcg, Ca-d-pantothenate 3.000 mg, niacine 10.000 mg, folic acid 250 mg dan elektrolite (Ca, Mg, Na, K, Cl) 250 g **Indikasi** Anti defisiensi mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian rutin mengatasi stress dan meningkatkan daya tahan tubuh 1 g/2 L air minum selama 5 hari berturut-turut. Meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan penyakit: 1 g/1 L air minum selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI No. D. 06103139** PTS. Obat bebas terbatas

78. C – SAN**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin C **Indikasi** Mengatasi defisiensi vitamin C **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: larutkan 1 g/10 L air minum atau 1 g/5 kg

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

pakan dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut. Anak sapi: pencegahan: 1 g/100 kg BB dan pengobatan: 1 g/50 kg BB. Anak babi: 1 g/6 kg BB. Induk babi: 2 g/ekor dan berikan sekali sehari selama 8-10 hari sebelum melahirkan **Kemasan** 10 g, 100 g, 1 kg, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 07063228 PTS.** Obat bebas terbatas

79. CUSTOM ANTISTRESS

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin lengkap dan elektrolit **Indikasi** Mencegah stress dan kekurangan vitamin serta elektrolit pada unggas dan **Cara Pemakaian** 1 g untuk 5-10 L air minum selama 5 hari **Kemasan** 1 kg **Deptan RI No. D. 09023553 PTS.** Obat bebas terbatas

80. CUSTOM VITAMIN

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin konsentrat lengkap **Indikasi** Anti defisiensi vitamin pada unggas dan mencegah stress **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 5-10 L air minum selama 5 hari **Kemasan** 1 kg **Deptan RI No. D. 09033593 PKS.** Obat keras

81. 77. D.I.R.P.D

Thai P.D. Chemicals, Co. Ltd/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung iron dextran complex setara dengan iron 10 g **Indikasi** Mencegah dan mengobati anemia akibat defisiensi Fe pada babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/ekor **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. I. 09033577 PKC.** Obat keras

82. DOC – VIT

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinic acid, Ca-D-panthothenate, natrium, kalium, magnesium **Indikasi** Untuk mengurangi resiko stress pada DOC akibat transportasi dan vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 1-2 L air minum **Kemasan** 50 g, 200 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 09083700 PTS.** Obat bebas terbatas

83. DOXYMAX

PT. Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung doksisisiklin hidroklorida dan eritromisin tiosinate **Indikasi** Antibakteri yang peka terhadap doksisisiklin dan eritromisin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan unggas: 10 g/20 L air minum selama 3 hari berturut-turut. Babi: 5 g/10 L air minum sekitar 60 kg BB, selama 3 hari berturut-turut. Pengobatan unggas: 10 g/20 L air minum selama 5 hari berturut-turut. Babi: 5 g/10 L air minum sekitar 60 kg BB, selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 05103000 PKS.** Obat keras

84. DUFVIT EXTRA ORAL

**Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V-
Belanda/ Saka Menara Alam**

Bentuk Sediaan Cairan per oral **Komposisi** Setiap ml mengandung vitamin A 50.000 IU, vit D3 12.000 IU, vit E 20 mg, vit B1 50 mg, vit B2 0,10 mg, vit B6 0,25 mg, folic acid 0,05 mg,

vit C 20 mg, nicotinamide 0,50 mg, D-panthotenol 1,0 mg, menadion sodium bisulphite 1,0 mg, dan biotin 0,01 mg **Indikasi** Mencegah dan mengatasi kasus hipovitaminosis, gangguan kesehatan pada keadaan stress, infeksi penyakit serta meningkatkan kemampuan reproduksi pada ternak Perhatian Pemberian pada hewan bunting harus hati-hati, terutama pada masa periode pertama dan dapat diberikan 1 kali seminggu **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dewasa: 40 ml/1.000 L air minum. Anak ayam: 12 ml/1.000 L air minum. Babi: 10 ml/100 L air minum. Anak babi: 15 ml/100 L air minum. Kambing dan domba: 5 ml/100 L air minum **Kemasan** Botol 500 ml, 1.000 ml dan 5.000 ml **Deptan RI No.** I. 03102651 PTC. Obat bebas terbatas

85. DUFVIT INJ

**Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V.-Belanda/
Saka Menara Alam**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung vitamin A 50.000 IU, vit D3 25.000 IU, vit E 20 mg, vit B1 4,0 mg, vit B2 2,5 mg, vit B6 2,0 mg, vit B12 1,25 mg, vit C 30 µg, nicotinamide 0,2 mg dan D-panthenol 12,5 mg D-panthenol **Indikasi** Mencegah dan mengatasi kasus anaemia, hipovitaminosis, gangguan kesehatan pada keadaan stress, infeksi penyakit serta meningkatkan kemampuan reproduksi pada ternak Perhatian Pemberian pada hewan bunting harus hati-hati, terutama pada masa periode pertama, dapat diberikan 1 kali seminggu **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas dan burung dara pemberian obat secara oral. Untuk penyuntikan secara SC atau IM pada kuda dan sapi: 8-12 ml/ekor. Anak kuda dan anak sapi: 3-5 ml/ekor. Kambing/domba: 2-3 ml/ekor. Anak babi: BB < 10 kg: 1 ml/ekor, BB 10-30 kg: 1-3 ml/ekor. Induk babi: 4-5 ml/ekor **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No.** I. 05062936 PKC. Obat keras

86. DUPHAFRALAD3E FORTE

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3 dan vit E **Indikasi** Antidefisiensi vitamin A, vit D3, dan vit E pada sapi, kambing dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM atau SC. Untuk anak sapi: 0,5-1 ml. Sapi muda: 1-2 ml. Sapi dewasa: 3-6 ml. Anak kambing: 0,25-0,5 ml. Anak domba: 0,5-1 ml. Babi muda: 0,5-1 ml. Babi dewasa: 1-2 ml. Untuk pencegahan berikan satu suntikan tiap 2-3 bulan, sedangkan untuk pengobatan suntikan diberikan dengan interval lebih pendek **Kemasan** Botol 50 dan 100 ml **Deptan RI No.** I. 08081693 PKC. 2. Obat keras

87. DUPHAFRAL D3 1000

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung vitamin D3 1.000.000 IU **Indikasi** Sapi yang sebelumnya pernah menderita milk fever (demam susu). Sapi yang mempunyai produksi tinggi, mulai kelahiran ketiga dan seterusnya, serta sapi-sapi yang akan melahirkan dengan konsentrasi kalsium dalam pakan yang tidak seimbang **KontraIndikasi** Pemberian vitamin D3 yang berlebihan dapat menyebabkan pengapuran pada pembuluh darah Perhatian Jangan diberikan secara IV karena dapat menyebabkan shock **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntik IM dengan dosis 10 ml/ekor pada akhir masa kebuntingan sapi antara 2-8 hari sebelum kelahiran dan bila sampai 8 hari belum terjadi kelahiran maka diberikan

suntikan ulang dengan dosis 10 ml/ekor **Kemasan** Kotak berisi 10 botol @ 10 ml **Deptan RI No. I. 02091329 PKC. 2. Obat keras**

88. DUPHAFRAL E – SELENIUM

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin E, selenium, vit B1 dan sorbitol
Indikasi Antidefisiensi vitamin E dan selenium serta gangguan saraf dan otot pada kuda, sapi, domba, anjing dan kucing **Perhatian** Suhu penyimpanan 2-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM atau IV **Kemasan** Ampul 10 ml, vial 50 dan 100 ml **Deptan RI No. I. 08081620 PKC. 2. Obat keras**

89. DUPHAFRAL MULTI

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Tiap ml mengandung vit A 15.000 IU, vit D 7.500 IU, vit E 20 mg, vit B1 10 mg, vit B2 5 mg, vit B6 3 mg, vit B12 20 mg, nicotinamide 35 mg, dan d-Panthenol 25 mg **Indikasi** Pengobatan defisiensi vitamin A, vit D3, vit E dan defisiensi satu atau lebih vitamin dari kelompok vit B atau sebagai terapi suportif pada kasus gangguan absorpsi dan intake vitamin, rearing disease, rachitis, infeksi cacing, penyapihan, penyakit kulit, kerusakan syaraf, anemia dan masa penyembuhan **Perhatian** Jangan dicampur dengan obat lain atau antibiotik sebelum diberikan dan jangan diberikan melalui suntikan IV **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC dengan dosis anak sapi, anak kuda dan domba: 5-10 ml. Sapi dan kuda: 10-15 ml. Anak babi: 1-2 ml. Babi dan domba: 3-6 ml. Anjing < 10 kg: 0,5-2 ml dan anjing > 10 kg: 2-4 ml. Kucing: 0,5-1 ml. Jumlah tersebut adalah dosis yang direkomendasikan berdasarkan pada kebutuhan normal harian dan akan mencukupi selama 1-2 minggu. Untuk tujuan pengobatan, pemberian dapat diulangi dalam jangka waktu yang lebih pendek **Kemasan** Kotak isi 10 botol @ 100 ml **Deptan RI No. I. 05091408 PKC. 2. Obat keras**

90. DUPHALYTE

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin, elektrolit, asam amino dan zat gizi
Indikasi Pencegahan dan pengobatan dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit pada hewan sebagai akibat yang menyertai keadaan post operasi, pendarahan, muntah-muntah, diare, shock, kelelahan fisik, kehabisan tenaga dan DOC yang ditransportasikan **Perhatian** Pemberian secara IV harus dilakukan secara perlahan-lahan dan pastikan alat suntik benar-benar bersih dan steril serta hindarkan dari jangkauan anak-anak **Dosis dan Cara Pemakaian** Kuda: hanya dengan suntikan IV secara perlahan-lahan. Sapi dan babi: melalui suntikan IV secara perlahan-lahan, intraperitonium dan secara SC. Anjing dan kucing: melalui suntikan IV secara perlahan-lahan dan secara SC. Ayam umur sehari (DOC): melalui suntikan SC. Untuk dosis kuda, sapi dan babi: 2 ml/kg BB (s/d 100 ml tiap 50 kg BB). Untuk dosis anak kuda, anak sapi dan anak babi: 6 ml/kg BB (s/d 30 ml/5 kg BB). Untuk dosis anjing dan kucing: 10 ml/kg BB (s/d 50 ml/5 kg BB). Untuk dosis DOC: 0,5-1 ml/ekor **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI No. I. 01101257 PKC. 2. Obat keras**

91. DURAVIT**Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit B1 500 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit C 25.000 mg, vit K3 1.750 mg, vit B12 10 mg, calcium D-pantothenate 6.000 mg, biotin 100 mg, folic acid 250 mg dan nicotinic acid 8.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada sapi, babi, domba, kambing dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: 1 g/2 L air minum dan diberikan melalui air minum selama 3-5 hari. Pada sapi dan babi: 1 g/20-40 kg BB dan diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 0203034 PTS.** Obat bebas terbatas

92. EFFYDRAL**Fort Dodge Animal Health, Weesp, Holland/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Tablet Komposisi Sodium chloride (NaCl), potassium chloride (KCl), sodium hydrogen carbonate (NaHCO₃), anhydrous citric acid, glycine dan lactose monohydrate **Indikasi** Antidehidrasi untuk sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 tablet/L air hangat, disarankan pembuatan dilakukan menjelang pemberian melalui air minum **Kemasan** Box 8 dan 48 tablet **Deptan RI No. I. 03122232 PTM.** 1. Obat bebas terbatas

93. EGG MASTER**Hendy Pharmindo Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vit A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 mg, vit E 5.000 mg, vit K 1.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 10 mg, vit C 20.000 mg, folic acid 200 mg, Ca-d-Panthotenat 10.000 mg, biotin 100 mg, nicotinamida 1.500 mg, D-L-Methionine 50.000 mg, lysin HCl 25.000 mg, potasium chloride 6.000 mg, sodium chlorida 8.000 mg, magnesium sulfat 4.000 mg, mangan sulfat 6.000 mg **Indikasi** Meningkatkan produksi telur. Memperpanjang masa produksi telur. Menjaga kestabilan produksi telur agar tetap tinggi. Mempertebal kulit telur dan memperberat telur. Mencegah defisiensi vitamin asam amino dan elektrolit. Meningkatkan daya tahan tubuh. Memperbaiki FCR **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g dilarutkan dalam 5–10 L air minum diberikan selama 3–5 hari berturut–turut dan diulang setelah 2 minggu **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 03062596 PTS.** Obat bebas terbatas

94. EGG PROMOTOR**Mensana Aneka Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung bacitracin MD 50.000 mg, inositol 10.000 mg, vitamin A 3.000.000 IU, vit D3 600.000 IU, vit E 2.500 mg, vit K3 1.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 3.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 3 mg, vit C 15.000 mg, nicotinamide 15.000 mg, asam folat 150 mg, Ca-d-Panthonate 5.000 mg **Indikasi** Meningkatkan dan memacu produksi telur agar maksimal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengatasi stress untuk berbagai kondisi, mencegah defisiensi vitamin dan menambah nafsu makan **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara oral, pada unggas: 5 g dilarutkan dalam 10 L air minum **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D. 06043069 GTS.** Obat bebas terbatas

95. EGG STIMULANT**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung bacitracin MD 55 mg, vitamin A

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

6.000 IU, vit D3 1.000 IU, vit E 2 IU, vit K3 1 mg, vit B1 2 mg, vit B2 5 mg, vit B6 1 mg, vit B12 2 mg, vit C 20 mg, calcium D-pantothenate 4,8 mg, nicotinic acid 15 mg dan folic acid 250 mg **Indikasi** Mempercepat tercapainya produksi telur yang maksimal. Mencegah kemerosotan produksi telur sewaktu ayam terserang penyakit, stres karena vaksinasi, perubahan iklim dan perpindahan kandang. Mempercepat proses penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Meningkatkan produksi telur: 1 g tiap 2 L air minum diberikan selama 4 minggu pertama mulai bertelur. Mempertahankan produksi telur tetap tinggi sewaktu ayam terserang penyakit, stres post vaksinasi, perubahan cuaca dan perpindahan kandang: 1 g tiap 2 L air minum diberikan tiap hari sampai produksi telur normal. Memperbaiki dan memperpanjang masa produksi telur: 1 g tiap 2 L air minum diberikan tiap hari sampai produksi telur optimal. Mempertahankan produksi telur yang optimal, memperbaiki kualitas ransum, meningkatkan daya tetas dan mengurangi tingkat kematian: 1 g tiap 10 L air minum diberikan tiap hari sampai produksi telur normal **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0701729 FTS. 2.** Obat bebas terbatas

96. ELECTRO – SAN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B2, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, folic acid dan electrolyte **Indikasi** Mengatasi segala bentuk stress pada unggas. Mencegah defisiensi vitamin dan menjaga keseimbangan elektrolit dari tubuh. Meningkatkan nafsu makan, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum, atau 1 kg dicampur dalam 1 ton pakan dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 01041963 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

97. ELECTROVIT

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, nicotinamide, folic acid dan electrolyte **Indikasi** Mengatasi segala bentuk stress pada unggas. Menjaga stamina tubuh, meningkatkan nafsu makan dan mempertahankan produktivitas yang optimal **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum atau 1 kg dicampur dalam 1 ton pakan serta berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0403041 FTS. 3.** Obat bebas terbatas

98. ELESAP

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung kalium klorida 100 g, sodium bicarbonat 100 g, sodium klorida 250 g, magnesium sulfat 50 g **Indikasi** Sebagai antidefisiensi mineral pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg ELESAP untuk 100 ekor sapi, diberikan melalui air minum **Kemasan** 100 g dan 1 kg, 10 kg @ 100 g, 20 kg @ 100 g **Deptan RI No. D. 10023793 PTS** Obat bebas terbatas

99. 95. ENDURAN

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Soluble powder **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin A 5.000 IU, vit D3 500 IU, vit E 5,5 mg, vit K3 1,8 mg, vit B2 1,2 mg, vit B6 2 mg, vit B12 4 mcg, vit C 8 mg, asam nikotinat 8 mg, Ca-d-pantotenat 2 mg, selenium 32 mcg, Na, K, Ca dan Cl **Indikasi** Mengatasi defisiensi vitamin dan meningkatkan daya tahan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum, berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg dan 25 kg **Deptan RI No. D. 02102376 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

100. ENERGYN

Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** setiap ml mengandung asam kaproat 14 mg, asam kaprilat 440 mg, asam kaprat 240 mg, asam laurat 88 mg, asam miristat 36 mg, asam linoleat 10 mg, asam oleat 36 mg, asam palmitat 28 mg, vitamin 3000 IU, vit D3 1500 IU, vit E 10 mg, aroma 3.75 µl, dan betacaroten 550 µg **Indikasi** membantu anak babi yang lemah dengan BB yang kurang saat lahir dan hypothermi **Dosis dan Cara Pemakaian** anak babi 1 pulse (2 ml)/ ekor/hari pada dua hari perma kelahiran **Kemasan** 100 ml **Kementan RI No. I. 12094362 FTM.**

101. ERYMAX

PT. Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung erythromicine 150 g dan doxycycline 100 g **Indikasi** Pengobatan mycoplasmosis, coryza/snot, colibacillosis, infeksi saluran pencernaan dan pernafasan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan unggas: 10 g/20 L air minum selama 3 hari berturut-turut. Babi: 5 g/10 L air minum sekitar 60 kg BB, selama 3 hari berturut-turut. Pengobatan unggas: 10 g/20 L air minum selama 5 hari berturut-turut. Babi: 5 g/10 L air minum sekitar 60 kg BB, selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI No. D. 08103519 PKS.** Obat keras

102. ESP 8

Diasham Resources, Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sodium, potasium, magnesium, kalsium, vitamin C, vitamin B6 dan dekstrose **Indikasi** Sebagai terapi elektrolit antistress yang disebabkan cuaca panas, selama transportasi dan merangsang nafsu makan pada unggas, babi dan hewan ternak **Kemasan** Kantung 250 g dan 1 kg **Deptan RI No. I. 09033572 PTS.** Obat bebas terbatas

103. EXTRAVIT

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-panthothenate, nicotinamide dan elektrolit (Na⁺, K⁺, HCO₃⁻) **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara oral, pada unggas: 5 g/10 L air minum **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D. 081113521 PTS**

104. 100. FATROVIT POULTRY WS

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K dan vit C **Indikasi** Suplemen vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur secara akurat

10 g dalam 200 L air minum atau 100 kg pakan, dan untuk pengobatan harian dari 6.000 ayam umur 1 minggu, 1.600 ayam umur 4 minggu, 800 ayam umur 8 minggu dan 800 ayam Layer
Deptan RI No. I. 02112460 PTC. Obat bebas terbatas

105. FEDEX

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung iron dekstran **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan anemia akibat defisiensi Fe pada anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1-2 ml/ekor (tergantung kasus) Kemasan Vial 50 ml **Deptan RI No. D. 0502457 PKC.** 3. Obat keras

106. FERODEX 20% WITH VIT B12

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung Fe dextran 200 mg, vitamin B12 100 mcg **Indikasi** Mencegah dan mengobati anemia akibat defisiensi zat besi pada anak babi dan sapi yang baru lahir Kontra**Indikasi** Defisiensi vitamin E atau selenium **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak babi: dosis tunggal 1 ml/ekor, berikan melalui injeksi IM pada umur 1-3 hari, atau dua kali injeksi masing-masing 0,5 ml/ekor pada umur 1-3 hari, diulang 10-14 hari setelah injeksi pertama. Anak sapi: 2-4 ml/ekor, berikan melalui injeksi IM pada minggu pertama setelah lahir **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. D. 05123028 PKC.** Obat keras

107. FERODEX

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung Fe dextran 100 mg **Indikasi** Mencegah dan mengobati anemia akibat defisiensi zat besi pada anak babi dan sapi yang baru lahir Kontra**Indikasi** Defisiensi vitamin E atau selenium **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak babi: dosis tunggal 200 mg Fe atau 1-2 ml/ekor, berikan melalui injeksi IM pada umur 1-3 hari, diulang 10-14 hari setelah injeksi pertama. Anak sapi: dosis tunggal 400-800 mg Fe atau 4-8 ml/ekor, berikan melalui injeksi SC atau IM pada minggu pertama setelah lahir **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. D. 02102486 PKC.** Obat keras

108. FEROPAN 200 INJ

Woogene B&G – Korea Selatan/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung gleptoferron (sebagai Fe) dan fenol **Indikasi** Mencegah dan mengobati anemia defisiensi zat besi pada anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, dan untuk mencegah anemia defisiensi zat besi: 1 ml/kepala, atau sebelum usia 3 hari. Untuk pengobatan anemia defisiensi zat besi: 1 ml/kepala, saat tanda defisiensi terlihat **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml dan 500 ml **Kementan RI No. I. 12104372 PKC.** Obat keras

109. FEROSOL – E Inj

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung iron dextran 125 mg, vit E 50 mg, carrier qs 50 ml **Indikasi** Membantu pembentukan sel darah merah. Meningkatkan kesehatan anak babi. Mencegah penyakit kekurangan darah pada babi yang disebabkan oleh defisiensi zat besi. Menekan jumlah angka kematian anak babi. Membantu pertumbuhan anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Deptan RI No. D. 03072618 PKC.** Obat keras

- 110. FEROVITA** **Woogene B&G – Korea Selatan/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung iron dextran (sebagai Fe) dan cyanocobalamin
Indikasi Pengobatan anemia defisiensi zat besi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM pada babi: 1 ml. Sapi: 2-5 ml. Kuda: 5-10 ml. Kambing: 2-3 mL. Anjing: 1 ml **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 200 ml **Kementan RI No. I. 12054281 PKC.** Obat keras
- 111. FERRO 2000** **Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung ferro **Indikasi** Anti anemia pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. I. 12034231 PKC.**
- 112. FERRODIN** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung iron dextran **Indikasi** Anti anemia pada anak babi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol @ 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No. D. 08103508 PKC.** Obat keras
- 113. FERROVET 10% INJ SOL** **Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung iron-dextran complex dan vitamin B12
Indikasi Untuk pengobatan dan pencegahan kekurangan zat besi pada anak babi dan anak sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. I. 07053221 PKC.** Obat keras
- 114. FERROVET** **Duta Kaiser Pharmacy**
Bentuk Sediaan Koloid injeksi Komposisi Setiap 1 ml mengandung besi dekstran 100 mg dan vit B12 100 ig **Indikasi** Antianemia pada anjing, kucing, babi dan burung (terutama pada hewan yang hamil, setelah melahirkan atau menyusui dan baru lahir) Perhatian Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak babi untuk pencegahan: 1–1,5 ml. Untuk pengobatan: 1–2 ml. Anak sapi untuk pencegahan 4–8 ml. Untuk pengobatan: 6–12 ml. Sapi dan kuda 4– 8 ml. Anjing: 0,1-0,2 ml/kg BB. Kucing: 0,5 ml. Burung 0,1 ml/kg BB (Diulangi lagi pada 10-14 hari). Injeksikan secara IM **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. D. 03112672 PKC.** Obat keras
- 115. FORMULA HP** **Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, sorbitol dan betaine **Indikasi** Antidefisiensi vitamin A, vit D dan vit E pada ayam dan babi serta memperbaiki fungsi hati Perhatian Simpan pada ruangan yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 L/1000 L air minum; selama 2-3 hari Babi: 15-20 ml/ekor/hari selama 2-3 hari sebelum musim kawin dan selama 3-4 hari pertama laktasi **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 08083479 PTC.** Obat bebas terbatas
- 116. FORMULA-1** **Biotek Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung carnitine 80.000 IU, vitamin B1

6.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 3.000 mg, vit B12 4.000 mcg, vit C 30.000 mg, sorbitol 300.000 mg dan magnesium 45.750 mg **Indikasi** Memperbaiki stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan nafsu makan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum selama 5 hari berturut-turut (disarankan pada minggu pertama DOC datang) setelah itu sesuai kebutuhan **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No.** No. D. 06123156 PTS. Obat bebas terbatas.

117. FORTEVIT

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin A 60.000 IU, vit D3 12.000 IU, vit E 120 IU, vit K3 6 mg, vit B1 2 mg, vit B2 25 mg, vit B6 4 mg, vit B12 40 mg, vit C 150 mg, folic acid 3 mg, biotin 100 mg, calcium D-pantothenate 30 mg dan nicotinic acid 60 mg **Indikasi** Membantu pertumbuhan dan mengatasi stres. Meningkatkan produksi dan daya tetas telur. Memperbaiki konversi ransum, sehingga efisiensi ransum bertambah. Mempertinggi daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mempercepat pemulihan kesehatan sesudah sakit. Mencegah penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mempercepat pertumbuhan, dan mengurangi angka kematian. Mengatasi stres pada anak ayam atau ayam dara. Mempertinggi mutu ransum dan meningkatkan produksi telur atau mengatasi stres pada ayam petelur dan ayam pembibit (parent stock): 10 g tiap 60 L air minum. Untuk mengobati penyakit akibat kekurangan vitamin pada anak ayam (starter), ayam dara, ayam petelur dan ayam pembibit (parent stock): 10 g tiap 15 L air minum. Untuk mempertahankan produksi telur tetap tinggi: 10 g tiap 120 L air minum **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 0609647 PTS. 3. Obat bebas terbatas

118. 114. GANASUPERVIT PLUS

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin A 7.000 IU, vit B1 0,5 mg, vit B2 2,5 mg, vit B6 0,3 mg, vit B12 6 mg, vit C 11,2 mg, vit D3 1500 IU, vit E acetate 3 mg, vit K3 1,5 mg, carnitin 8 mg, asam folat 250 mcg, calcium pantothenate 3 mg, copper sulphate pentahydrate 2,5 mg, ferrous 15 mg, manganese 25 mg, potassium iodide 0,3 mg, Zn 10 mg, NaCl 7,5 mg, Mg 7,5 mg dan Ca carbonate 7,5 mg **Indikasi** mempertahankan kondisi kesehatan, membantu penyembuhan dari infeksi penyakit dan memenuhi kekurangan vitamin dan elektrolit seperti dalam situasi stress **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2-4 L air minum atau 2 kg/ton pakan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg, 30 kg dan 60 kg **Deptan RI No.** D. 03012509 PTS. Obat bebas terbatas

119. GF – 82

Multi Sarana Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 3 kg mengandung L-carnitine 50 g, chromium picolinate 50 g, vitamin B1 4 g, vit B2 4 g, vit B6 4 g, vit B12 1 g, methionine 50 g, selenium 2 g, magnesium 2 g dan carrier qs 3 kg **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian vitamin dapat dicampur ke ransum atau ke air minum dengan dosis 1 g tiap 1 kg ransum atau 1 g tiap 2 L air minum **Kemasan** Sachet aluminium foil 100 g dan drum 25 kg **Deptan RI No.** D. 12084328 PTS. Obat bebas terbatas

120. GROFAS

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B12, vit C, vit K3, Ca-d pantotenat, biotin, asam folat, nikotinat dan elektrolit Ca, Na, K, Cl dan Mg **Indikasi** Mengoptimalkan pertumbuhan pada ayam broiler **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 4 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No.** D. 0509324 FTS. 1. Obat bebas terbatas

121. GROGEL

Bio Science, USA/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Granule **Komposisi** Mengandung super absorbent polymer **Indikasi** Menjaga kelembaban selama transportasi unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g campuran/ekor DOC **Kemasan** Sachet 80 g, 200 g, 400 g dan 1.000 g **Deptan RI No.** I. 03012519 PTM. Obat bebas terbatas

122. GROW MORE

Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vit A, D3, E, K, B1,B2, B6, B12, C, asam pantotenat, asam folat, niacin, KCl, NaCl, MgSO₄, MnSO₄, NaSO₄, CuSO₄, ZnSO₄, lisin dan metionin **Indikasi** Untuk memacu pertumbuhan produksi dan untuk mengatasi stress terutama pada waktu temperatur tinggi dimana kekurangan cairan menjadi masalah utama, juga setelah vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1,5 g/2 L air minum **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 10 kg **Kementan RI No.** I. 12061782 PTS. 2. Obat bebas terbatas

123. HEKSAPLEX

Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung vitamin B1 2 mg, vit B2 2,74 mg, vit B6 2 mg, vit B12 1 mcg, panthotenol 8,6 mg, nicotinamide 20 mg **Indikasi** Pencegahan dan mengobati defisiensi vitamin B terutama pada masa pertumbuhan, kurang nafsu makan, kelemahan umum karena sakit dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui IM. Sapi/kuda: 8-15 ml/ekor. Babi: 5-10 ml/ekor. Anjing/kucing: 0,2-2 ml/ekor **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No.** D. 02042187 PKC. 1. Obat keras

124. HEMADEX

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung iron (sebagai iron dextran) 100 mg **Indikasi** Untuk pengobatan terhadap anemia karena kekurangan zat besi akibat parasit, penyakit infeksi, gizi tidak seimbang; membantu pertumbuhan dan penambahan BB serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak babi: 1 ml/ekor pada umur 2-4 hari dan diulang 2-3 minggu kemudian. Babi: bunting 5 ml/ekor, 2 minggu sebelum melahirkan. Anak sapi: 4-8 ml/ekor minggu pertama setelah partus. Sapi: 0,02 ml/kg BB. Kambing/domba: 1,5-5 ml/ekor **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No.** D. 05101279 PKC. 3. Obat keras

125. HEMOPIG

Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung gleptoferron 532.6mg/ml (Fe 200mg) **Indikasi** Pencegahan dan penanganan anemia pada piglet **Dosis dan Cara Pemakaian**

Pencegahan – Injeksikan secara IM 1 ml/ekor piglet berumur tidak lebih dari 3 hari setelah kelahiran. Pengobatan – Injeksikan secara IM 1 ml/ekor **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. I. 05062938 PKC.** Obat keras

126. HEPAVEX 200 **Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung sorbitol 200 g, DL-Methionine 10 g, choline chloride 18.75 g, magnesium sulphate 10 g, L-Carnitine hydrochloride 25 g dan bahan tambahan sampai 1 L **Indikasi** Gabungan beberapa macam zat untuk mengoptimalkan fungsi hati. Melindungi hati dengan cara meningkatkan metabolisme lemak, meningkatkan eliminasi deposit lemak pada hati dan menghasilkan energi yang akan meningkatkan parameter produksi dan meningkatkan pencernaan dan eliminasi toksin **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 ml/L air minum selama 5-7 hari. Rute pemberian secara oral **Kemasan 1 L Deptan RI No. I. 09043613 PTC.** Obat bebas terbatas

127. HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/

Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vit A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, vit K3, asam folat, asam nikotinat, kalsium pantotenat dan asam-asam amino **Indikasi** Diberikan pada unggas, hewan besar dan babi untuk pengobatan penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin dan asam amino, seperti saat pertumbuhan/produksi, pergantian pakan, sebelum dan sesudah vaksinasi, masa pemulihan dan dapat diberikan bersama antibiotika pada saat pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: 0,5 ml/L air minum. Babi menyusui: 2 ml/L air minum. Penggemukan: 0,5 ml/L air minum. Sapi muda: 1 ml/L air susu. Sapi dewasa: 0,5 ml/L air minum **Kemasan 1 L Kementan RI No. I. 12071967 PTC.** 2. Obat bebas terbatas

128. HIPRAMIN – B

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung alanin 14,2 mg, arginin 11 mg, asam aspartat 13,5 mg, sistein 4,2 mg, fenilalanin 8,9 mg, glisin 9,5 mg, asam glutamat 20,5 mg, histidin 6,9 mg, isoleusin 10,3 mg, lisin 15,1 mg, methionine 4,2 mg, prolin 20,1 mg, Serin 13,9 mg, Tirosin 7,9 mg, Threonin 13,9 mg, Triptofan 2,6 mg, Valin 17,2 mg, Vit B1 5 mg, Vit B2 4 mg, Vit B6 4 mg, vitamin B12 20 mg, asam pantotenat 10 mg dan asam nikotinat 20 mg **Indikasi** Unggas: defisiensi vitamin, kelemahan, sindrom malabsorpsi dan meningkatkan pertumbuhan. Sapi: defisiensi vitamin, osteomalacia, meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kebuntingan. Domba: defisiensi vitamin dan meningkatkan pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Unggas: 1 ml/4 L air minum. Babi dan sapi: 1-2 ml/4 L air minum **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. I. 04032215 PKC.** 1. Obat keras.

129. HIPRAVIT – AD3E FORTE

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung vitamin A 500.000 IU, vit D3 75.000 IU dan vit E 50 mg **Indikasi** Sapi: defisiensi vitamin, osteomalacia, perangsang pertumbuhan serta menjaga kebuntingan. Domba: defisiensi vitamin dan perangsang

pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara IM dengan dosis 0,1 ml/10 kg BB/sapi dewasa. Dosis 0,2 ml/10 kg BB/sapi muda. Babi dan domba: 0,40 ml/10 kg BB **Kemasan Botol 100 ml Kementan RI No. I. 12091872 PKC. 2. Obat keras**

130. HITOPVIT**Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1 kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 120.000 IU, vit B1 2.100 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 4.200 mg, vit B12 42.000 mg, vit C 150.000 mg, vit K3 6.000 mg, Ca-d-Panthothenate 30.000 mg, nicotinamide 60.000 mg, folic acid 3.000 mg dan biotin Indikasi Membantu pertumbuhan dan mengatasi stress. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Meningkatkan fertilitas, produksi telur dan susu. Meningkatkan kualitas telur dan daging **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 1 g dilarutkan dalam 12 L air minum diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 Kg @ 100 g, 20 Kg @ 100 g **Deptan RI No. D. 02061004 PTS. Obat bebas terbatas.**

131. INJECTAMIN**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B2, vit B6, vit B12, nicotinamide dan d-panthenol **Indikasi** Mencegah dan mengobati defisiensi vitamin pada hewan seperti gangguan pertumbuhan, gangguan reproduksi dan otot. Penyembuhan penyakit karena infeksi bakteri atau infestasi antiparasit serta kelemahan pada hewan yang baru dilahirkan dan anemia **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda dan kerbau: 2,5-5,0 ml/100-300 kg BB. Anak (sapi, kuda, kerbau): 1-2 ml/40-80 kg BB. Domba, kambing dan babi: 1-2 ml/40-80 kg BB. Anak babi dan anjing: 0,5-1 ml/5-10 kg BB. Kucing dan unggas: 0,10-0,20 ml/1-2 kg BB. Injeksikan perlahan-lahan secara IM **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 0506579 PKC. 1. Obat keras**

132. INJECTAVIT**Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B6, vit E, vit C dan nicotinamide Indikasi Sebagai antidefisiensi vitamin pada unggas dan hewan besar **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: 1 ml/10 L air minum untuk 3-6 hari atau 0,1 ml/kg BB secara IM. Sapi, kerbau, kuda: anak 5 ml, dewasa 10 ml. Domba dan kambing; anak 1 ml, dewasa 4 ml. Babi; anak 1 ml, dewasa 5ml dan pejantan 10 ml **Kemasan** Botol 10 ml, 30 ml dan 100 ml **Deptan RI No. I. 05071023 PKC. 3. Obat keras**

133. INJEKSI KALSIMUM BOROGLUKONAT**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung calcium gluconate 166 mg, boric acid 34 mg dan bahan pembantu secukupnya **Indikasi** Hypocalcaemia (kekurangan kalsium) pada hewan besar dan kecil **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat diberikan secara infus, dengan cara disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik (IV) atau ke bawah kulit (SC) dengan dosis: 1-1,5 ml tiap kg BB. Pemberian obat dapat diulang bilamana perlu, sesuai dengan petunjuk dokter hewan **Kemasan** Botol 250 ml dan 500 ml **Deptan RI No. D. 06091266 PKC. 2. Obat keras**

134. INJEKSI VITAMIN B KOMPLEKS

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung vitamin B1 2,5 mg, vit B2 1,6 mg, vit B6 1,25 mg, nicotinamide 12,5 mg dan D-panthenol 2,5 mg **Indikasi** Mencegah kekurangan vitamin B pada unggas, sapi, kuda atau babi. Menambah daya tahan tubuh dan mempercepat proses kesembuhan dari injeksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan sehari 1x atau bilamana perlu, secara tembus daging (IM). Ayam petelur dengan umur 1-2 bulan: 0,2-0,4 ml. Umur 2-3 bulan: 0,4-0,7 ml. Umur 3-4 bulan: 0,7-1 ml. Umur > 4 bulan: 1 ml. Ayam pedaging dengan BB 0,2-0,6 kg: 0,2-0,4 ml. BB 0,6-1 kg: 0,4-0,7 ml. BB 1-1,5 kg: 0,7-1 ml. BB > 1,5 kg: 1 ml. Babi < 40 kg: 1-2 ml. BB 40-75 kg: 2-3 ml. BB > 75 kg: 3-5 ml. Sapi, kuda anak sapi dan kuda: 3-5 ml. Sapi dan kuda dewasa: 5-10 ml. Anjing dan kucing: 0,25-0,5 ml tiap kg BB **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No.** D. 0204879 PKC. 2. Obat keras

135. INJEKSI VITAMIN B12

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung cyanocobalamin 100 mg dan bahan pembantu sampai 1 ml **Indikasi** Keadaan pertumbuhan dan produksi yang jelek. Anoreksia, anemia dan kelemahan umum, dermatitis, ganggana syaraf, gangguan persendian **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat disuntikkan secara tembus daging (IM) ke dalam otot paha atau sekitarnya, setiap hari atau 2 hari sekali sampai didapat hasil yang nyata, atau sesuai dengan petunjuk dokter hewan. Pada kuda, sapi dan domba untuk pertumbuhan yang kurang baik atau terhambat anemia sebelum/sesudah melahirkan, sebelum/sesudah operasi serta anoreksia (tidak ada nafsu makan). Kelemahan umum, gangguan efisiensi penggunaan ransum. Setelah mendapat serangan penyakit atau baru sembuh dari sakit. Kuda dan sapi dewasa: 1 ml tiap 50 kg BB. Anak kuda dan anak sapi: 1,2 ml tiap 20 kg BB. Domba dewasa dan anak domba: 0,3 ml tiap 5 kg BB. Untuk babi yang dermatitis (radang pada kulit) dan tingkat kesuburan yang jelek. Babi dewasa: 0,5 ml tiap 25 kg BB. Babi grower dan anak babi: 0,5 ml tiap 10 kg BB. Untuk anjing dengan gangguan syaraf seperti penyakit distemper, paresis, macam-macam gangguan pada persendian, anemia akibat serangan parasit. Anjing dewasa dan anak anjing: 0,3 ml tiap 5 kg BB **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No.** D. 06061265 PKC. 2. Obat keras

136. INTRAFER – 200 B12

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung Fe 200 mg, vitamin B12 dan cyanocobalamin 200 µg **Indikasi** Pengobatan terhadap anemia karena kekurangan zat besi akibat parasit, penyakit infeksi, gizi tidak seimbang. Membantu pertumbuhan dan penambahan BB. Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC. Anak babi: 1 ml (umur 3 hari). Babi bunting: 1,25 ml (2 minggu sebelum melahirkan). Anak sapi: 2-4 ml (umur 7 hari setelah lahir). Sapi: 1 ml/100 kg BB. Kambing dan domba: 1,25 ml/ekor. Anjing dan kucing: 0,5 ml/10 kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Kementan RI No.** I. 1104548 PKC. 1. Obat keras

137. INTROVIT – B – COMPLEX**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, Holland/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Tiap ml mengandung vitamin B1 10 mg, vit B2 5 mg, vit B6 5 mg, vit B12 20 mg, D-pantenol 12,5 mg, nikotinamid 50 mg, biotin 100 mg dan kolin klorida 10 mg **Indikasi** Kombinasi yang seimbang dari vitamin B yang diperlukan untuk anak sapi, sapi, kambing, unggas, domba dan babi. Pencegahan dan pengobatan kekurangan vitamin B pada hewan peternakan. Pencegahan dan pengobatan stress (yang disebabkan karena vaksinasi, penyakit, transportasi, kelembaban yang tinggi, suhu yang tinggi atau perubahan suhu yang ekstrim) serta perbaikan konversi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara SC atau IM. Sapi dan kuda: 10-15 ml. Anak sapi, anak kuda, kambing dan domba: 5-10 ml. Anak domba: 5-8 ml; Babi: 2-10 ml **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI No. I. 09033592** PTC. Obat bebas terbatas

138. INTROVIT – E – SELEN WS**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Serbuk larut air Komposisi Tiap g mengandung vitamin E 40 mg dan selenium 0,3 mg **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Vitamin E merupakan anti oksidan serta mempunyai efek imuno stimulator. Mencegah defisiensi vitamin E, terapi suportif pengobatan mastitis. Mencegah intoksikasi Fe pada sapi, kambing, domba, babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba: 0,5-1,0 g/ekor. Babi: 1 g/2 L air minum atau 1 kg/ton pakan. Ayam: 1 g/2 L air minum. Pemakaian selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1.000 g **Kementan RI No. I. 1104592 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

139. INTROVIT – E – SELEN**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Tiap ml mengandung vitamin E 50 mg dan sodium selenit 0,5 mg **Indikasi** Meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit, vitamin E merupakan anti oksidan serta mempunyai efek imuno stimulator. Mencegah defisiensi vitamin E. Terapi suportif pada pengobatan mastitis. Mencegah intoksikasi Fe pada sapi, kambing, domba dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba: 2 ml/10 kg BB. Babi: 1 ml/10 kg BB. Ayam: 0,25 ml/kg BB. Anjing dan kucing: 0,1 ml/kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI No. I. 05062920** PTC. Obat bebas terbatas

140. INTROVIT 4 + WS**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap g mengandung vitamin A 20.000 IU, vit D3 2.000 IU, vit E 30 mg, vit B1 3 mg, vit B2 6 mg, vit B6 6 mg, vit B12 60 mg, vit C 40 mg, Capantothenate 20 mg, vit K3 2 mg, nikotinamid 40 mg, asam folat 300 mg, biotin 250 mg, kolin klorid 50 mg, alanin 5 mg, arginin 2,8 mg, asam aspartat 11,4 mg, sistein 2,6 mg, asam glutamat 20 mg, glisin 25 mg, histidin 2,5 mg, Iso-Leusin 6,7 mg, leusin 10,7 mg, lisin 50 mg, metionin 50 mg, fenil alanin 3 mg, prolin 6 mg, serin 6,1 mg, treonin 7,6 mg, triptofan 1,9 mg, tirosin 2,3 mg, valin 6,4 mg **Indikasi** Defisiensi vitamin A, vit B kompleks,

vit D3, vit E dan defisiensi asam amino pada sapi, kuda, kambing, babi, domba dan unggas. Mempercepat pertumbuhan dan pertambahan BB. Meningkatkan produksi telur yang optimal dan mempertahankan puncak produksi yang lama. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi stres serta memulihkan stamina. Meningkatkan kualitas daging, telur dan susu. Meningkatkan fertilitas dan daya tetas telur. Mencegah penurunan produksi telur pada saat sakit, stres, pindah kandang dan perubahan cuaca **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba: 1 g/40 kg BB. Babi: 1 g/4 L air minum atau 1 kg/2 ton pakan. Ayam: 1 g/4 L air minum atau 1 kg/2 ton pakan. Pemakaian selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1.000 g **Kementan RI No. I. 1108720 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

141. INTROVIT AD3E WS

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin A 20.000 IU, vit D3 2.000 IU dan vit E 30 mg **Indikasi** Defisiensi vitamin A, vit D3, dan vit E pada sapi, domba, unggas, kambing dan babi. Meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan tubuh serta mengatasi stress. Meningkatkan fertilitas dan menurunkan resiko kelainan reproduksi. Mencegah rakhitis pada hewan muda dan osteomalasia pada hewan dewasa. Mengatasi gangguan metabolisme mineral karena pakan yang tidak seimbang **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi, sapi, kambing dan domba: 1 g/40 kg BB. Unggas dan babi: 1 g/4 L air minum. Pemakaian selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1.000 g **Kementan RI No. I. 1203773 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

142. INTROVIT ORAL

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung vitamin A 10.000 IU, vit D3 1.000 IU, vit E 15 mg, vit B1 3 mg, vit B2 3 mg, vit B6 3 mg, vit B12 30 mg, vit C 20 mg, Ca-pantotenat 10 mg, vit K3 1 mg, nikotinamida 20 mg, asam folat 150 mg, biotin 125 mg, kolin klorida 50 mg, alanin 2,4 mg, arginin 3 mg, asam aspartat 6,3 mg, sistein 0,1 mg, asam glutamat 10 mg, glisin 8,1 mg, histidin 1,2 mg, Iso-Leusin 1,5 mg, leusin 3,3 mg, lisin 12,7 mg, metionin 10,6 mg, fenil alanin 2,1 mg, prolin 2,7 mg, serin 2,4 mg, treonin 1,5 mg, triptofan 0,1 mg, tirosin 1,2 mg dan valin 1,5 mg **Indikasi** Defisiensi vitamin A, vit B kompleks, D3, vit E dan defisiensi asam amino pada sapi, kuda, kambing, babi, domba dan unggas. Mempercepat pertumbuhan dan pertambahan BB. Meningkatkan produksi telur yang optimal dan mempertahankan puncak produksi yang lama. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi stres serta memulihkan stamina. Meningkatkan kualitas daging, telur dan susu. Meningkatkan fertilitas dan daya tetas telur. Mencegah penurunan produksi telur pada saat sakit, stres, pindah kandang serta perubahan cuaca **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kambing dan domba: 1 ml/20 kg BB. Babi dan ayam: 1 ml/2 L air minum. Pemakaian selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 ml, 500 ml dan 1.000 ml **Kementan RI No. I. 0112593 PTC.** Obat bebas terbatas

143. JECTAVIT B12 INJ

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung vitamin B12 **Indikasi** Antidefisiensi vitamin

B12 pada sapi, kuda, babi, domba, kambing, anak babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. D. 08053439 PKC**. Obat keras

144. KALVIDOG**Kalbe Farma Tbk**

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, asam folat, niasinamid, Ca-Pantothenat, D-sorbitol, Fe, Ca, Cu, P dan Mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan tiap hari. Anak anjing: ½-1 tablet. Anjing dewasa: 1-2 tablet. Pemberian dapat dicampurkan pada pakan **Kemasan** Botol isi 100 tablet **Deptan RI No. D. 0604093 PTM**. 1. Obat keras

145. KC PERMASOL**Kor-Chin Biotech Co., Ltd China/Indovetraco Makmur Abadi**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niacin amide, folic acid, Ca-pantotenat, DL-methionine, mangan sulfate, zinc sulfat, cobalt sulfat, sodium bicarbonate dan potassium chloride **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-1.000 g dengan 1.000 L air atau 500-2.000 g dengan 1 ton pakan **Kemasan** Kantung 1.000 g **Kementan RI No. I. 13014433 PTS**. Obat bebas terbatas

146. KUMARUK**Degepharm**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vit A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nikotinamid, ca-pathothenate, biotin, asam folat, lysine HCl, methionine, ca-phosphate, MnSO₄, NaCl dan KCl **Indikasi** Antidefisiensi vitamin mineral dan asam amino pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Sachet 250 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI No. I. D. 06083091 PTM**. Obat bebas terbatas

147. LABRO**Kalbe Farma Tbk**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Kombinasi vitamin lengkap dan mineral **Indikasi** Suplemen vitamin dan mikronutrien untuk unggas, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada unggas: 2,5 g/5 L air minum. Pada sapi dan babi: 2,5 g/7,5 L air minum **Kemasan** Box 12,5 kg @ 250 g **Deptan RI No. D. 0401458 PTS**. 3. Obat keras

148. LIQAVITE**Kilco International, Scotlandia/
Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan berwarna kuning keruh **Komposisi** Vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B2, vit B6, vit B12, asam nikotinat, asam pantothenat, sodium, potassium, copper, zinc, manganes, magnesium, lysine, methionine **Indikasi** Antidefisiensi vitamin, asam amino dan mineral pada ternak. Membantu pemulihan dari penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 L pada 400 L air minum selama 5-6 hari atau pada waktu stress. Ulangi jika perlu **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 08083484 PTC**. Obat bebas terbatas

149. MAMALIA MINERAL

USFA, CV

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung calcium carbonat, D-calcium phosphat, natrium klorida, kalium iodida, zink sulfat, kalium klorida, cuprum sulfat dan magnesium sulfat **Indikasi** Untuk menguatkan sapi, kambing dan domba yang sedang bunting. Memperlancar produksi susu sapi, kambing, domba yang sedang menyusui. Meningkatkan daya tahan tubuh sapi kerapan. Memperbanyak produksi susu dan mencegah kelumpuhan terhadap sapi perah, menyempurnakan pertumbuhan sapi kereman, kerbau agar pertumbuhan cepat besar **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 1 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 07023169 PTS.** Obat bebas terbatas

150. MARATON

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Tiap kapsul mengandung ferro sulfate 75 mg, nicotinamide 10 mg, calcium pantothenate 10 mg, biotin 5 mcg, thiamine HCl 2 mg, riboflavin 2 mg, pyridoxine HCl 2 mg, cyanocobalamin 5 mcg, ascorbic acid 10 mg, folic acid 0,05 mg, kalium chloride 4 mg, natrium chloride 3 mg, magnesium sulfate 5 mg, mangan sulfate 0,02 mg, Cu (II) sulfate 0,4 mg, Zn sulfate 0,5 mg dan cobalt sulfate 0,5 mg **Indikasi** Menambah tenaga ayam aduan. Memulihkan kesehatan dan menambah darah. Menambah daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit dan membuat ayam lebih gesit **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk menambah tenaga dan memulihkan kesehatan: 2 kapsul sekali makan. Untuk menjaga kesehatan ayam umur 1-2 bulan: 3 hari sekali 1 kapsul. Ayam berumur lebih dari 2 bulan: 2 hari sekali 1 kapsul **Kemasan** 10 kapsul, 50 kapsul dan 100 kapsul **Deptan RI No. D. 0509136 PTM.** 2. Obat bebas terbatas

151. MASABRO

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 2.500 mg, vit K3 1.000 mg, vit C 20.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.500 mg, vit B12 4.000 mcg, niacin 5.000 mg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, arginine 7.000 mg, lysine 20.000 mg, methionine 200.000, glycine 25.000 mg, Na salisilat 10.000 mg, zinc 4.000 mg, mangan 8.000 mg, magnesium 5.000 mg, cobalt 2.000 mg, cooper 1.000 mg **Indikasi** Sapi: defisiensi vitamin, osteomalacia, perangsang pertumbuhan serta menjaga kebuntingan. Domba: defisiensi vitamin, perangsang pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Unggas berumur 0-6 minggu: 5 g/10 L air minum atau 5 kg/5 kg ransum. Unggas berumur 6-9 minggu: 5 g/15 L air minum atau 5 g/7,5 kg ransum **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No. D. 12061281 PTS.** 1. Obat keras

152. 146. MASACHICKS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung virginiamisina 20.000 mg, vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 3.000 mg, vit K3 1.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 3.000 mg, vit C 20.000 mg, niacin 15.000 mg, asam folat 150 mg dan Ca-d-Panthonate 5.000 mg **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh anak ayam agar pertumbuhan optimal. Menekan angka kematian anak ayam di minggu pertama, mengatasi gangguan pertumbuhan akibat kekurangan vitamin serta meningkatkan nafsu makan

dan efisiensi ransum. Mengatasi stress akibat transportasi, pindah kandang dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Unggas berumur 0-2 minggu: 5 g/7 L air minum. Unggas berumur 3-5 minggu: 5 g/10 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No. D. 1209969 FTS. 1. Obat keras**

153. MASAVIT**Mensana Aneka Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantotenat, asam nikotinat, asam folat, choline chloride, methionine, mangan, besi, seng, tembaga, iodium, kobalt dan magnesium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin, asam amino dan mineral pada unggas dan ternak lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D. 08081126 PTS. 2.**

154. MEGAVIT POULTRY**Vetindo Citrapersada**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, biotin, folic acid, niasin, calcium D panthothemat, elektrolit K, Mg dan Na **Indikasi** Mengatasi stress yang disebabkan oleh cuaca panas, pindah kandang, potong paruh, vaksinasi, pergantian pakan dan stress lainnya. Mempercepat pertambahan bobot badan dan mengoptimalkan produksi telur serta kualitas dari produksi. Merangsang nafsu makan dan membantu mempercepat proses penyembuhan karena penyakit. Memperbaiki keseimbangan cairan tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi serta defisiensi vitamin. Membantu hasil vaksinasi menjadi lebih baik **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 2,5 kg, 25 kg dan 30 kg **Deptan RI No. D. 0002830 FTS. Obat bebas terbatas**

155. METABOL INJ**Woogene B&G – Korea Selatan/Tri Dinamika Nusantara**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung butaphosphan dan vitamin B12 **Indikasi** Untuk memperbaiki gangguan metabolisme **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IV, IM atau SC, pada sapi dan kuda: 5-25 ml. Anak sapi: 5-12 ml. Domba: 2,5-5 ml. Babi: 1-2,5 ml. Anjing: 0,5-5 ml. Kucing: 0,5-2,5 ml. Pemberian secara oral melalui air minum pada ayam Layer dan breeder: 0,5 ml/kepala selama 2-7 hari. Broiler: 0,3 ml/kepala selama 5 hari **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1.000 ml **Kementan RI No. I. 12054280 PKC. Obat keras**

156. METABOLASE**FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung L-carnitine hydrochloride, thiocticacid, pyridoxine hydrochloride, cyanocobalamine, D-L-acetylmethionine, L-arginine, L-onithine hydrochloride, glycine, taurine, aspartic acid, glutamic acid, fruktose dan sorbitol **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino serta heparoprotektor pada unggas, babi, sapi dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian lewat IV, SC atau IP. Untuk sapi, kuda dan babi: 250-500 ml selama 2x sehari. Pada anak sapi, anak kerbau, domba dan kambing dewasa: 250 ml. Anak domba dan anak kambing: 20-40 ml/10 kg BB dan diberikan 2x sehari. Pemberian secara SC pada anak babi dan babi yang digemukan: 20-40 ml/10 kg BB dan diberikan 2x

sehari. Pada kelinci dan kucing: 2-4 ml/kg BB dan diberikan 2x sehari. Pemberian secara IV dan SC pada anjing: 2-4 ml/kg BB dan diberikan 2x sehari. Pemberian per oral pada unggas: 1 ml/4 L air minum atau 2-4 L/ton pakan selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 250 ml dan 500 ml **Deptan RI No. I. 04122397 PKC.** Obat keras

157. MIRAVIT

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, folic acid, nicotinamide, Ca-d-pantothenate, copper, cobalt, magnesium, manganese, zinc, ferrum, sodium, potassium **Indikasi** Mencegah dan mengobati defisiensi vitamin dan mineral. Mencegah stress karena vaksinasi, potong paruh, perubahan iklim, pindah kandang, transportasi. Mengembalikan kondisi hewan setelah sakit atau stress. Memelihara kestabilan produksi yang maksimal. Memperbaiki kualitas telur dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum. Babi dan sapi: 1 g/3 L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 07093305 PTS.** Obat bebas terbatas

158. MITACHICKS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung bacitracin MD 35 g, vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 2.500 IU, vit K3 1.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 1.000 mcg, vit C 21.000 mg, nicotinic acid 15.000 mg, folic acid 150 mg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, manganese sulfat 200 mg, zinc sulfat 250 mg dan cupri sulfat 150 mg **Indikasi** Memacu pertumbuhan secara optimal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit serta mencegah kekurangan vitamin dan mineral. Mencegah stress karena perubahan cuaca dan pindah kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Unggas: 5 g/7 L air minum selama 3 hari setiap minggu **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI No. D. 03102657 FTS.** Obat bebas terbatas

159. MIXBRO

Kalbe Farma Tbk.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung virginiamisin, vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasinamid, Ca-d-panthotenat, kolin klorida, asam folat, methionin dan arginin **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan nekrotik enteritis serta memicu pertumbuhan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g/10-13 L air minum **Kemasan** Ember plastik 12,5 kg @ 250 g **Deptan RI No. D. 0403760 FTS. 3.** Obat bebas terbatas

160. MULTI SOL – G

Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, Ca-d-Pantothenate, niacinamide, folic acid, dl-Methionine, cobalt, mangan, ferrum, kalium, natrium dan zinc **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan sebanyak 1 g/2 L air minum berikan selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 500 g **Kementan RI No. I. 12034248 PTS.** Obat bebas terbatas

161. MULTIVIT – CH

Kela Laboratories NV., Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, D-panthenol, vit PP, kholin, lisin, metionin, MgCl, Ca, Mn, Fe, Zn dan Cu **Indikasi** Antidefisiensi vitamin, mineral dan asam amino pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan Botol 1 L Kementan RI No. I. 12121210 PTC. 1.** Obat bebas terbatas

162. MULTIVIT B COMP.**Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya**

Bentuk Sediaan Larutan Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, D-panthenol dan nicotinamide **Indikasi** Untuk mencegah dan mengobati defisiensi vitamin, terutama untuk penyakit-penyakit pada masa pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda, unta: 20-30 ml. Anak sapi, anak kuda, kambing dan domba: 10-20 ml. Anjing, kucing dan anjing sapihan: 1-5 ml. Babi: 10-15 ml. Anak babi: 2-10 ml **Kemasan** 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. I. 0609872 PKC. 2.** Obat keras

163. MULTIVIT EXTRA**Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung kombinasi vitamin, asam amino dan mineral trace element **Indikasi** Diberikan pada keadaan stress sesudah vaksinasi, saat produksi puncak, pindah kandang dan sangat membantu dalam penyembuhan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/5 L air minum selama 10 hari **Kemasan 1 L Kementan RI No. I. 12101828 PTC. 2.** Obat bebas terbatas

164. MULTIVIT INJ**Norbrook Lab-UK/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung multivitamin **Indikasi** Mencegah dan mengobati defisiensi vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntik IM atau SC dengan dosis 20-30 ml pada kuda dan sapi dan dosis: 5-10 ml pada anak kuda, anak sapi, domba dan babi **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. I. 03102664 PKC.** Obat keras

165. MULTIVIT**Pyridam Veteriner**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg obat mengandung vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit E 2.500 IU, vit K3 3.500 mg, vit B1 1.500 mg, vit B2 3.500 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 6.000 mcg, vit C 20.000 mg, folic acid 200 mg, Ca D-pantothenate 10.000 mg, nicotinic acid 20.000 mg, sodium 20.000 mg, potasium 30.000 mg, magnesium 20.000 mg, mangan 5.000 mg, iron 2.000 mg, zinc 2.000 mg, copper 1.000 mg dan cobalt 300 mg **Indikasi** Memenuhi kebutuhan vitamin mineral dan elektrolit serta mencegah stress akibat perubahan cuaca, pindah kandang serta vaksinasi dll. Mempercepat pertumbuhan BB pada ayam broiler dan meningkatkan produksi serta kualitas telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 5 g (1 sendok teh) ke dalam 7,5-10 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0309751 PTS.** Obat bebas terbatas

166. MULTIVITAMIN B COMPLEX**FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit PP, dan Ca-d-pantothenic acid **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan terhadap defisiensi dan perlambatan pertumbuhan. Vitamin adjuvant selama pengobatan chemo-antibiotik dan

peningkatan pertahanan tubuh selama kondisi stress **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk semua spesies hewan 10 ml/10 L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI No. I. 12112464** PTC. 1. Obat bebas terbatas

167. NEOBRO

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung methionine 250 mg, lysine 10 mg, sodium salicylate 10 mg, vitamin A 5.000 IU, vit D3 500 IU, vit E 2,5 IU, vit K3 1 mg, vit B1 2 mg, vit B2 4 mg, vit B6 6 mg, vit B12 2 mg, vit C 10 mg, calcium D-pantothenate 5 mg, nicotinamide 15 mg, zinc 2 mg, manganese 2 mg, magnesium 5 mg, copper 0,4 mg dan cobalt 0,2 mg **Indikasi** Merangsang pertumbuhan ayam pedaging. Melengkapi segala kebutuhan vitamin dan asam amino yang perlu bagi pertumbuhan. Meningkatkan efisiensi ransum, dan menjadikan ayam pedaging lebih gemuk. Mencegah stres dan menambah daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur 0-6 minggu: 1 g tiap 2 L air minum atau 1 g tiap kg ransum. Ayam umur 6-9 minggu: 1 g tiap 3 L air minum atau 1 g tiap 1,5 kg ransum **Kemasan** Sachet aluminium 5 g, dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g, 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg, dan 15kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0609281 PTS. 3.** Obat bebas terbatas

168. NEOVIT E 20% + Se

Neofarma, S.R.L, Italy/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin E asetat dan selenium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin E dan selenium pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 25-50 ml dalam 100 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI No. I. 12054266** PTC. Obat bebas terbatas

169. NEW METHIOVIT

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung DL-methionine 350.000 mg, L-lysine HCl 50.000 mg, vitamin A 4.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 8.000 IU, vit K3 800 mg, vit B1 400 mg, vit B2 1.000 mg, vit B6 400 mg, vit B12 10.000 mcg, vit C 10.000 mg, folic acid 100 mg, Ca D-pantothenate 2.000 mg, nicotinamide 6.000 mg, potasium 50.000 mg, sodium 40.000 mg, magnesium 20.000 mg, mangan 5.000 mg, zinc 2.000 mg, copper 1.000 mg dan cobalt 300 mg **Indikasi** Menjaga tingkat produksi telur secara maksimal dan memperpanjang masa produksi ayam petelur. Meningkatkan kualitas telur, dan untuk ayam dara dapat mempercepat saat mulai bertelur. Mempertinggi daya tahan tubuh terhadap serangan wabah penyakit. Memenuhi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino yang sangat dibutuhkan ayam petelur **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 5 g (1 sendok teh)/10 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 04040282 FTS. 3.** Obat bebas terbatas

170. NOPSTRESS TF

Diasham Resource, Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, menadion sodium bisulfit (vit K), vit B12, vit B6, asam folat, asam askorbat, Na, K, Ca dan Mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan menjaga keseimbangan elektrolit pada unggas **Dosis dan Cara**

Pemakaian Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 100 g dan kantung 1 kg **Deptan RI No. I.** 0506881 PTS. 1. Obat bebas terbatas

171. NOPSTRESS WITH ELECTROLYTES

**Diasham Resources, Singapore/
SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B6, vit B12, vit C, asam folat, vit K, elektrolit Na, K, Mg, Ca sebagai garam klorida, asetat dan diasetat **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 100 g, 150 g, 1 kg dan 3 kg **Deptan RI No. I.** 0502488 PTS. 2. Obat bebas terbatas

172. NUTRIPLUS GEL

Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Gel **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit E dan nicotinamide **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 sendok teh/5 kg BB atau 10 cm⁵/5 kg BB atau 10 cm⁵/5 kg BB. Diberikan secara oral atau dicampurkan dalam pakan. Untuk mempercepat persembuhan, dapat diberikan 2 kali lipat (2-4 sendok teh/5 kg BB/hari). Untuk mempermudah pemberian, berikan sedikit pada mulut hewan, setelah hewan mencoba, baru diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan **Kemasan** Tube 120 g **Deptan RI No. I.** 05071572 PTM. 2. Obat bebas terbatas

173. OTAGUMMED

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung paracetamol 150 g, sorbitol 500 g, vitamin C 100 g dan vit K 1 g **Indikasi** Antipiretik (penurun panas tubuh) pada saat gumboro, sehingga ayam lebih nyaman. Mengurangi efek pendarahan serta meningkatkan sel-sel pertahanan tubuh. Baik diberikan setelah vaksinasi dan pada saat ayam sakit (febris) **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D.** 08123526 PTS. Obat bebas terbatas

174. OTRALECT

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 1.500 mg, vit D3 25 mg, vit E 8.000 mg, vit K3 2.400 mg, vit B1 1.200 mg, vit B2 1.800 mg, vit B6 1.600 mg, vit B12 10 mg, vit C 22.000 mg, Ca-d-Pantothenate 6.000 mg, nicotinamide 15.000 mg, folic acid 100 mg, dan elektrolit (Na, K, Cl, HCO₃) 435.000 mg **Indikasi** Menanggulangi stress umum seperti stress yang diakibatkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim, setelah vaksinasi, potong paruh, pindah kandang, transportasi, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 5 g/10 L air minum, selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Kementan RI No. D.** 13022472 PTS. 1. Obat bebas terbatas

175. OTRALITE

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 300 mg, vit D3 5 mg, vit

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

E 10.000 mg, sodium chloride 250.000 mg, potassium chloride 150.000 mg, dan bicarbonate natricus 250.000 mg **Indikasi** Menanggulangi stress umum seperti yang diakibatkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim, setelah vaksinasi, potong paruh, pindah kandang, transportasi, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 5 g/10 L air minum dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Kementan RI No. D. 13022497 PTS. 1.** Obat bebas terbatas

176. OTRAVIT

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit E 20.000 mg, vit K3 2.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 5.000 mcg, vit C 10.000 mg, Ca-d-Pantothenate 6.000 mg, asam nicotinate 10.000 mg, choline chloride 12.000 mg, DL-Methionine 10.000 mg, mangan 15.000 mg, ferrous 8.000 mg, zinc 9.000 mg, copper 3.900 mg, iodine 140 mg, cobalt 400 mg dan magnesium 20.000 mg **Indikasi** Meningkatkan produksi telur dan memacu pertumbuhan ternak. Mempertahankan produksi telur agar stabil dan memperpanjang masa produksi. Memperbaiki kualitas telur dan efisiensi pakan. Mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin, mineral dan asam amino serta mencegah stress karena vaksinasi, perubahan cuaca, pindah kandang, potong paruh dan transportasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum. Babi dan sapi: 1 g/3 L air minum **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D. 07083261 PTS.**

177. PANTISOL

Pantex, BV. Belanda/Starsia Asiatama

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C dan asam folat **Indikasi** Pengobatan dan pencegahan defisiensi vitamin mineral pada domba, kambing dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral lewat air minum. Pada sapi/kuda: 5 g/ekor. Anak domba: 0,5 g/ekor. Domba: 1 g/ekor. Anak kuda/sapi: 2 g/ekor. Unggas: 100 g/100 L air minum **Kemasan** Botol 100 g dan kaleng 1 kg **Deptan RI No. I. 0010361 PTS.** Obat bebas terbatas

178. PANTO VITAMIN

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vit B1, B2, nikotinamid, Ca-pantotenat dan caffeine **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi SC, IM atau IV. Hewan besar: 50–100 ml/hari. Hewan sedang: 20–50 ml. Hewan kecil 5–10 ml/hari **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No. D. 0507077 PKC. 1.** Obat keras

179. PANTOMINOVIT

Pantex, BV. Belanda/Starsia Asiatama

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit C, vit B1, vit B2, vit B6, vit C, asam folat, biotin, Ca-d-pantotenat, biotin, metionin, lisin dan inositol **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada unggas, sapi, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral lewat air minum. Unggas: 50-100 g/200 L pemberian selama 4-8 hari. Pada sapi, domba, kambing dan kuda: 100 g/100 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan botol 1.000 g **Deptan RI No. I. 0010259 PTS.** Obat bebas terbatas

- 180. PENERGETIC – T** **Penergetic International AG., Switzerland/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung natural calcium carbonate **Indikasi** Sebagai antidefisiensi mineral untuk ternak sapi, babi, kuda, kambing, unggas, dan hewan kecil **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan. Sapi dengan dosis 1-2 g/hari/LSU (Live Stock Unit, dimana 1 ekor sapi = 1 LSU). Babi dengan dosis 20 g/ton pakan basah atau 50 g/ton pakan kering. Unggas dengan dosis 20-50 g/ton pakan atau 200 mg/L air minum. Kuda dengan dosis 3-5 g/hari. Kambing dengan dosis 1 g/hari/LSU (1 ekor kambing dewasa = 0,1 LSU). Hewan kecil dengan dosis 1-3 g/minggu **Kemasan** Karton box 2 kg **Deptan RI No. I.** 07083257 FTS. Obat bebas terbatas
- 181. PERMASOL 500 GRANULE** **Choong Ang Biotech, Korea/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 800.000 IU, vit E 2.000 IU, vit K3 2.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 5.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 1.000 mcg, niasin 6.000 mg, asam Folat 400 mg, metionin 16.000 mg, Co 220 mg, Mn 140 mg, Fe 2.140 mg, vit K 3.740 mg, Na 2520 mg, Zn 130 mg, Kal-pantotenat 5.000 mg **Indikasi** Defisiensi nutrisi. Meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan serta produksi telur. Menurunkan kematian akibat stress. Memperbaiki kesuburan dan daya tetas, serta membantu pencegahan dan pengobatan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum. Babi: 1,5-5 g/ekor/hari. Sapi: 5 g/100 kg BB/hari. Ikan: 5-10 kg/ton pakan **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. I.** 03101326 PTM. 2. Obat bebas terbatas
- 182. PERMASOL 500 LIQUID** **Choong Ang Biotech, Korea/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin A 7.500.000 IU, vit D3 1.200.000 IU, vit E 5.000 IU, vit K3 1.000 mg, vit B1 1.000 mg, vit B2 700 mg, vit B6 500 mg, vit B12 5.000 mg, niasin 3.000 mg, asam folat 20 mg, MHA 8.000 mg, Co 100 mg, Mn 70 mg, Fe 2140 mg, vit K 1.870 mg, Na 1.260 mg, Zn 65 mg, Kal-pantotenat 2.500 mg **Indikasi** Defisiensi nutrisi. Meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan serta produksi telur. Menurunkan kematian akibat stress. Memperbaiki kesuburan dan daya tetas. Membantu pencegahan dan pengobatan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 50 ml/100 ekor/hari. Babi: 8 ml/ekor/hari (BB 15-70 kg) **Kemasan** 1 L **Deptan RI No. I.** 05012372 PTC. 1. Obat bebas terbatas
- 183. PIG – IRONJECT 20% + B12** **Dopharma BV, Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung Fe dekstran dan vitamin B12 **Indikasi** Hematinik pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM **Kemasan** Botol 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Kementan RI No. I.** 1206936 PKC. 1. Obat keras
- 184. POLYVIT STRESS** **Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, calcium D panthothenat, nicotinamide, elektrolit Ca, CL, K, Mg dan Na **Indikasi** Mencegah dan mengobati defisiensi multivitamin dan mengembalikan cairan elektrolit yang hilang karena diare atau pendarahan hebat. Mencegah dan mengobati

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

stress yang disebabkan oleh: vaksinasi, transportasi (pengangkutan/pindah kandang), produksi tidak stabil dan turun, pertumbuhan terhambat, nafsu makan kurang, pergantian pakan atau bahan baku pakan, bulu kasar dan rontok, perubahan cuaca, potong paruh dan lain-lain. Meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat kesembuhan karena penyakit virus, bakteri, parasit maupun jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: untuk pencegahan/pemeliharaan: 0,5 g/L air minum diberikan selama 3 hari berturut-turut. Untuk pengobatan: 1-1,5 g/L air minum diberikan selama 5 hari berturut-turut. Kambing/domba/babi/sapi/kuda: untuk pencegahan/pemeliharaan: 2 g setiap 25 kg BB dan diberikan selama 5-7 hari berturut-turut. Untuk pengobatan: 3 g/10 kg BB diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 2,5 kg dan 25 kg **Deptan RI No. D. 98071487 FTS. 1.** Obat bebas terbatas

185. POUSTIN C

CTCBIO, Korea/Pakan Serasi

Bentuk Cairan Komposisi Mengandung polyethoxylated ascorbic acid **Indikasi** Antidefisiensi vitamin C pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/10 L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. 06033056 PTC.** Obat bebas terbatas

186. POWER VIT

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vit A 6.000.000 IU, vit D3 600.000 IU, vit E 2.500 IU, vit K3 1.000 mg, vit C 30.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 5.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 4 mg, Ca-d-Pantothemat 5.000 mg, nicotinamida 15.000 mg, asam folat 150.000 mg, biotin 50 mg **Indikasi** Memperkuat daya tahan anak ayam. Menambah nafsu makan dan mempercepat pertumbuhan. Memperbaiki konversi pakan. Mencegah dan mengatasi defisiensi vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 03102645 PTS.** Obat bebas terbatas

187. PREMVIT

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D 12.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit K 6.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 4.000 mg, vit B12 40 mcg, vit C 150.000 mg, biotin 100 mg, pantothenate acid 30.000 mg, folid acid 3.000 mg dan nicotinamide 60.000 mg **Indikasi** Meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan unggas. Memperbaiki efisiensi produksi unggas serta daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/12 L air minum, selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D. 06023044 PTM.** Obat bebas terbatas

188. PRIMA AMINOACID PLUS 2002

MJPF Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Tiap L mengandung asam aspartic 15 g, threonine 6,4 g, serin 6,6 g, glutamik acid 25 g, proline 5 g, glycin 1 g, alanine 2 g, cystein 1 g, methionine 14 g, isoleucine 6,4 g, phenylalanin 2,6 g, tyrosine 6,8 g, L-lysine 20 g, histidine 5,5 g, arginine 1,5 g, tryptophan 3,5 g, vitamin A 20 MIU, vit D3 5 MIU, vit E 9 g, vit B1 5 g, vit B2 10 g, vit

B6 30 g, vit B12 30 g, vit C 15 g, vit K3 5 g, folic acid 1 g, pantothenat 10 g dan nicotinic acid 2 g **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan defisiensi asam amino dan vitamin. Meningkatkan daya tahan tubuh serta meningkatkan produksi telur dan BB. Meningkatkan status imun sistem **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI No. D. 03072623 PTC.** Obat bebas terbatas

189. PRIMA DEXTRA-CY PLUS**MJPF Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung iron dextran 100 mg dan vitamin E 50 mg **Indikasi** Pengobatan anemia pada babi dan anak sapi yang disebabkan oleh defisiensi zat besi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. D. 03102663 PKC.** Obat keras

190. PRIMA HIT STRESS**MJPF Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Tiap 100 ml mengandung ekstrak tumbuhan 10 g, L-lysine-HCl 5 g, vitamin A 500 IU, vit E 0,1g, vit C 15 g, elektrolit alami qs **Indikasi** Mencegah stress dan mencegah kematian mendadak. Mempercepat proses kesembuhan serta meningkatkan daya tahan tubuh dan derajat kesehatan. Meningkatkan pertumbuhan BB dan produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 04032732 PTC.** Obat bebas terbatas

191. PRIMA VITA PLUS**MJPF Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 7 MIU, Na 0,1 g, vit D3 1,5 MIU, vit K 0,3 g, vit E 3 g, Mg 0,05 g, vit B1 10,8 g, Mn 1,5 g, vit B2 2,5 g, Fe 15 g, vit B6 1,6 g, Zn 10 g, vit B12 830 mcg, Cu 2,5 g, vit C 11,2 g, vit K3 2,5 g, Ca-d-pantothenate 3 g, niacinamide 5,75 g dan biotin 5,75 g **Indikasi** Merupakan multivitamin dan elektrolit yang lengkap dan dalam jumlah yang sesuai, sangat dibutuhkan untuk metabolisme dan anabolisme zat nutrisi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 g dan 500 g **Deptan RI No. D. 03072622 PTC.** Obat bebas terbatas

192. PROMOTOR L**Laboratorios Calier, S.A.–Spain/Megan Galus Kinantan**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Asam amino dan multi vitamin **Indikasi** Mengatasi ketidakseimbangan vitamin dan asam amino pada unggas disaat stres atau gangguan lainnya. Meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu tercapainya produksi puncak. Mengoptimalkan jumlah telur, fertilitas hatchabilitas, memperbaiki FCR dan membantu tercapainya pertumbuhan optimum **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan dalam air unggas 1 ml untuk 23 L air minum selama 3-5 hari. Hewan besar: 5 ml/10 kg BB/hari dicampur dengan air minum atau 6 ml untuk 1 L air minum selama 4-5 hari **Kemasan** 1 L **Deptan RI No. I. 04091401 PTS.** 2. Obat bebas terbatas

193. PROTEK – ALL PLUS**Dawes Laboratories, USA/Lito Prima Mandiri**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin A 15,290 IU, vit D3 3,525 ICU, vit E 4,7 IU, vit B12 14,7 mcg, vit K 6,1 mg **Indikasi** Mencegah dan mengatasi defisiensi

vitamin. Mengatasi stress dan memperbaiki kondisi tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** 17,5 g/50 L air minum untuk stres berat. 17,5 g/150 L air minum untuk stres ringan. 500 g/ton pakan **Kemasan** Box 1 kg **Kementan RI No.** 1. 12111915 PTS. 3. Obat bebas terbatas

194. PROTEK-STRES

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, biotin, Ca-d-pantothenate, folic acid, methionine, lysine, arginine, glycine, NaCl, KCl dan NaHCO₃ **Indikasi** Meningkatkan pertumbuhan dan BB. Mengatasi stress serta antidefisiensi vitamin, asam amino dan elektrolit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/5-10 L air minum **Kemasan** 100g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 09073652 PTS. Obat bebas terbatas

195. UYUH MEDI EGG

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 15.000.000 IU, vit D3 1.500.000 IU, vit E 2.500 IU, vit K 150 mg, vit B1 1 g, vit B2 4 g, vit B6 2 g, vit B12 5 mg, lysine HCl 100 g, methionine 160 g, calcium D-pantothenate 5 g, niacinamide 15 g dan folic acid 150 mg **Indikasi** Meningkatkan produksi telur. Menjaga produksi telur tetap tinggi pada keadaan stres karena cuaca buruk, pindah kandang dan lain-lain. Mempertahankan produksi telur tetap baik meskipun mutu ransum kurang baik atau waktu ganti ransum **Dosis dan Cara Pemakaian** Mengatasi stres, mencegah kekurangan vitamin dan protein, mempercepat tercapainya produksi telur yang tinggi serta meningkatkan daya tahan tubuh: 1 g tiap 1 L air minum. Memperbaiki konversi ransum, meningkatkan produksi telur serta meningkatkan daya tetas telur: 1 g tiap 2 L air minum **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g, dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 0204799 FTS. 1. Obat bebas terbatas

196. PUYUH VITANAK

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin A 12.000 IU, vit D3 1.000 IU, vit E 1 IU, vit B1 1 mg, vit B2 3 mg, vit B6 0,5 mg, vit B12 2 mg, calcium D-pantothenate 5 mg, niacinamide 20 mg, lysine 100 mg dan methionine 200 mg **Indikasi** Membantu pertumbuhan dan mengurangi angka kematian yang tinggi pada anak puyuh. Mencegah kekurangan vitamin pada anak puyuh. Mengatasi stres dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak puyuh umur 0-4 minggu: 1 g tiap L air minum. Bila puyuh terlihat lesu dan angka kematian tinggi: 2 g tiap L air minum. Sebelum dan sesudah vaksinasi, pada perubahan cuaca, dll: 1 g tiap L air minum. **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No.** D. 06081282 PTS. 2. Obat bebas terbatas

197. PUYUHVIT

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg obat mengandung DL-methionine 75.000 mg, L-lysine HCl 75.000 mg, vitamin A 20.000.000 IU, vit D3 4.000.000 IU, vit E 8.000 IU, vit K3 2.000 mg, vit B1 800 mg, vit B2 7.500 mg, vit B6 1.500 mg, vit B12 7.500 mcg, vit C 50.000

mg, folic acid 100 mg, Ca D-pantothenate 5.000 mg, nicotinamide 15.000 mg, sodium 1.000 mg, potasium 2.000 mg, magnesium 2.500 mg, mangan 5.000 mg, zinc 2.000 mg, cobalt 300 mg dan iron 2.000 mg **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan anak puyuh, meningkatkan efisiensi makanan serta memenuhi kebutuhan akan vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak puyuh dan burung: 5 g (1 sendok teh)/5-10 L air minum. Puyuh dewasa: 5 g (1 sendok teh)/10-20 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0309812 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

198. REX VITAL**S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatangguh**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, vit K3, asam folat, asam nikotinat dan kalsium pantotenat **Indikasi** Diberikan pada unggas, babi, lembu, domba, kambing dan kelinci untuk pengobatan penyakit avitaminosis pada umumnya. Meningkatkan pertumbuhan/produksi, sebagai anti-stress dan pada masa pemulihan setelah infeksi karena virus, bakteri dan infestasi parasit. Serta meningkatkan nafsu makan **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum dengan dosis: 1–2 g/L air minum **Kemasan** 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI No. I. 07073247 PTS.** Obat bebas terbatas

199. RHODIVIT**Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit B2 240.000 mg, vit B1 1.200 mg, vit B6 4.200 mg, vit B12 42 mg, vit K3 6.000 mg, Ca-D-pantothenate 30.000 mg, folic acid 3.000 mg, biotin 105 mg dan vit C 150.000 mg **Indikasi** Meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ternak. Meningkatkan produksi susu dan daging serta mengatasi stress **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dan itik: meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan: 1 g dilarutkan dalam 12 L air minum dan diberikan setiap hari. Mengatasi stress rutin dan kekurangan vitamin: 1 g dilarutkan dalam 6 L air minum. Babi dan sapi: 10 g diberikan cukup sekali setiap hari dalam makanan/air minum sesuai dengan jumlah ternak **Kemasan** 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 0502169 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

200. RIDAN**KELALab-Belgia/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung Fe dextran **Indikasi** Mengatasi defisiensi Fe pada anak babi **Kontra Indikasi** Defisiensi Se **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan IM atau SC 2 ml/ekor pada umur 3-4 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. I. 01121047 PKC.** Obat keras

201. RYOMICIN**Pyridam Veteriner**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg obat mengandung ayfivin 40.000 mg, vitamin A 4.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 8.000 IU, vit K3 800 mg, vit B1 400 mg, vit B2 1.000 mg, vit B6 400 mg, vit B12 2.000 mcg, vit C 10.000 mg, folic acid 100 mg, Ca D-pantothenate 2.000 mg dan nicotinamide 6.000 mg **Indikasi** Meningkatkan produksi telur secara maksimal. Memperpanjang masa bertelur dan menjaga tingkat produksi telur tetap tinggi. Melindungi ayam dari infeksi bakteri dan untuk pembibitan dapat memperbaiki kualitas dan daya tetas

telur serta menurunkan angka kematian embrio **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 5 g (1 sendok teh)/10 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0309624 FTS. 2.** Obat bebas terbatas

202. SELETOCO INJECTION

Cheil Bio Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin E acetate dan sodium selenite **Indikasi** Antidefisiensi vitamin E dan selenium pada sapi, babi dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 4-8 ml/ekor. Babi: 6-10 ml/ekor. Domba: 1 ml/ekor dan berikan secara IM **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. I. 12114378 PKC.** Obat keras

203. SELEVIT – SB FORTE

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap 1 kg mengandung vitamin A 6.000.000 IU, vit D3 1.200.000 IU, vit E 18.000 mg, vit K 5.000 mg, vit B1 2.100 mg, vit B2 500 mg, vit B6 500 mg, vit B12 1.500 mcg, vit C 500 mg, Ca-d-Panthothenate 2.000 mg, niacinamide 6.000 mg, folic acid 100 mg, elektrolit 40.000 mg dan selenium 72 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral selenium **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam, sapi dan babi: larutkan 1 g SELEVIT-SB FORTE® ke dalam 4 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Kementan RI No. D. 12024220 PTS.** Obat bebas terbatas

204. SINDOCHICKS

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung virginiamycin 20.000 mg, vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 2.500 mg, vit K3 1.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 2.500 mcg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, nicotinamide 15.000 mg dan folic acid 150 mg **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi angka kematian anak ayam serta mengatasi defisiensi vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 5 g/7 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D. 03052589 FTS.** Obat bebas terbatas

205. SINDOVIT SUPER

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vitamin A 50.000.000 IU, vit D3 10.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit K3 6.000 mg, vit B1 2.100 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 4.200 mg, vit B12 40 mg, vit C 150.000 mg, biotin 105 mg, Ca-d-pantothenate 30.000 mg, nicotinamide 60.000 mg dan folic acid 3.000 mg **Indikasi** Menanggulangi stress berat, menekan kematian anak ayam, menjaga stabilitas produksi telur serta menanggulangi kekurangan vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/10-12 L air minum **Kemasan** Can 10 kg (Sachet @ 100 g), can 10 kg (Sachet @ 250 g), drum 30 kg (Sachet @ 100 g) dan drum 30 kg (Sachet @ 250 g) **Deptan RI No. D. 02112496 PTS.** Obat bebas terbatas

206. SING A SONG

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit C, nicotinamic dan d-panthenol **Indikasi** Antdefisiensi vitamin dan meningkatkan

vitalitas pada burung Perhatian Simpan di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Membuat burung rajin berkicau. 4 tetes tiap 60 ml air minum/hari untuk burung kecil. 8 tetes tiap 60 ml air minum/hari untuk burung besar. Menjaga vitalitas burung. 5 tetes tiap 60 ml air minum/hari untuk burung kecil. 10 tetes tiap 60 ml air minum/hari untuk burung besar **Kemasan** Botol 30 ml **Deptan RI No.** D. 08013383 PTC. Obat bebas terbatas

207. SOLVIT**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap ml mengandung vitamin A 12.000 IU, vit D3 3.200 IU, vit E 3,2 mg, vit K3 0,8 mg, vit B1 2 mg, vit B6 1,2 mg, vit C 4 mg, asam folat 0,3 mg, Ca-d-pantotenat 4 mg, protein 20 mg dan bahan tambahan sampai 1 ml **Indikasi** Mengatasi gejala stress pada ayam dan meningkatkan pertumbuhan ayam. Meningkatkan bobot badan ayam, meningkatkan efisiensi pemakaian ransum. Menjaga vitalitas dan kekebalan terhadap penyakit dan infeksi serta meningkatkan kualitas karkas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/L air minum selama 2-3 hari atau 1 ml/5 L air minum selama 5-10 hari **Kemasan** Botol kaca 300 ml **Kementan RI No.** D. 12114376 PTC. Obat bebas terbatas

208. STRESS PROTECTOR**Avindo Perdana Bahtera Mulia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 5.000 mg, vit K3 2500 mg, vit B2 5.000 mg, vit B6 4.000 mg, vit B12 2.500 mg, Ca-d-panthotenat 8.000 mg, vitamin C 20.000 mg, nicotinic acid 10.000 mg, lysine 80.000 mg, sodium acetate 60.000 mg, potasium acetate 70.000 mg, magnesium oxide 4.000 mg, sodium chloride 50.000 mg **Indikasi** Mencegah stress rutin akibat perubahan berbagai keadaan seperti stress post vaksinal, transportasi, potong paruh, perubahan cuaca, dll. Mengganti cairan elektrolit yang hilang akibat stress berat dan diare. Mencegah avitaminosis, mengoptimalkan metabolisme pakan, serta meningkatkan produktifitas ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 5-7 hari. Babi 30 g untuk 100 kg BB, dan dianjurkan diberikan setelah pemberian antibiotik dan obat cacing selama 3 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan pot 500 g **Deptan RI No.** D. 03012511 PTS. TM. Obat bebas terbatas

209. STRESSGRIN**Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 2,5 g, vit K3 0,5 g, vit B2 0,75 g, vit B12 0,0125 g, folic acid 0,24 g, Ca-d-Panthothenat 5 g, nicotinamide 12,5 g, NaCl 1 g dan KCl 1 g **Indikasi** Mengatasi segala macam bentuk stress yang terjadi pada saat ayam datang, vaksinasi, potong paruh, transportasi, perubahan cuaca dan perpindahan kandang. Membantu proses penyembuhan penyakit. Meningkatkan nafsu makan dan membantu pertumbuhan. Meningkatkan produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g dalam 2 L air minum lalu aduk sampai rata **Kemasan** 100 g, 1 Kg, 10 Kg @ 100 g, 20 kg @ 100 g **Deptan RI No.** D. 05022874 PTS Obat bebas terbatas.

210. STRESS – STOP**Sanbe Farma**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

B2, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, folic acid dan electrolyte **Indikasi** Mengatasi segala bentuk stress pada unggas, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum, atau 1 kg dicampur dalam 1 ton pakan dan berikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 10 g, 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg Deptan RI No. D. 0204342 PTS. Obat bebas terbatas

211. STRONG EGG

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung lysine 100 g, methionine 400 g, vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 2.500 IU, vit B1 2 g, vit B2 4 g, vit B6 1 g, vit B12 1 mg, vit C 20 g, vit K 1 g, nicotinamide 15 g dan calcium D-pantothenate 5 g **Indikasi** Memperkuat kerabang telur. Untuk mencegah telur tipis dan mudah pecah. Memperbesar telur. Telur yang diproduksi tiap hari menjadi lebih besar dan lebih berat. Meningkatkan dan memperpanjang produksi telur. Memperpendek masa rontok bulu **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap 2 L air minum **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D.** 0207152 FTS. 2. Obat bebas terbatas

212. STRONG N FIT

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** Setiap L mengandung L-carnitin 25.000 mg, vitamin A 3.500.000 IU, vit D3 750.000 IU, vit E 7.500 mg, vit K 500 mg, vit B1 500 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 1.250 mg, vit C 7.500 mg, D-panthenol 4.000 mg, nicotinamide 10.000 mg **Indikasi** Membantu pembentukan energi untuk perbaikan produksi telur, BB, FCR dan daya tahan tubuh **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml tiap 2 L air minum **Kemasan** Boks 12 botol @ 120 ml dan botol 300 ml **Deptan RI No. D.** 07123363 PTC. Obat bebas terbatas

213. STRONGPLUS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate dan niacin **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Mengatasi defisiensi vitamin, meningkatkan nafsu makan, pemulihan setelah sakit **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D.** 08063450 PTS

214. SUPER FIT FORTE

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 7.000.000 IU, vit D3 1.400.000 IU, vit E 3.000 IU, vit K3 4.000 mg, vit C 30.000 mg, vit B1 3.000 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 4 mg, Ca-d-Pantothenat 7.000 mg, nicotinamida 20.000 mg, Na, K, Mg, Ca (Elektrolit qs) **Indikasi** Mencegah stress pada saat perubahan cuaca. Meningkatkan nafsu makan. Memperbaiki konvers pakan. Memperkuat daya tahan tubuh. Membantu mempercepat kesembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/1-2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D.** 03102646 PTS. Obat bebas terbatas

215. SUPER FIT**Hendy Pharmindo Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 2.000.000 IU, vit D3 300.000 IU, vit E 1.500 IU, vit K3 3.000 mg, vit C 10.000 mg, vit B1 500 mg, vit B2 1.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 1 mg, Ca-d-Pantothenat 3.000 mg, nicotinamida 3.000 mg, Na, K, Mg, Ca (Elektrolit qs) **Indikasi** Untuk mencegah defisiensi vitamin. Memperkuat daya tahan tubuh. Membantu mempercepat kesembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum, selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg Deptan RI No. D. 03012513 PTS. Obat bebas terbatas

216. SUPER POWER**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Setiap kapsul mengandung vitamin A 87,5 IU, vit D3 8,75 IU, vit E 0,04 IU, vit K 0,22 mg, vit B1 0,04 mg, vit B2 0,07 mg, vit B6 0,02 mg, vit B12 0,11 mg, vit C 0,35 mg, calcium D-pantothenate 0,26 mg, nicotinamide 0,26 mg, caffeine 3 mg, a-[1-(methylamino) ethyl] benzene methanol 3 mg dan mineral berupa Ca, Na, K, Zn, Fe, Cu dan Mg 50 mg **Indikasi** Menambah tenaga pada ayam waktu diadu. Membuat napas lebih panjang, tahan lelah dan sakit serta lebih gesit. Menjaga kesehatan, mempertinggi daya tahan terhadap perubahan suhu dan mencegah penyakit. Mencegah infeksi karena luka setelah diadu **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 kapsul diberikan antara 1/2-1 jam sebelum ayam diadu. Untuk menjaga kesehatan, untuk ayam umur 1-2 bulan: 3 hari sekali 1 kapsul. Lebih dari 2 bulan: 2 hari sekali 1 kapsul diberikan pada pagi hari setelah ayam diberi makan **Kemasan** Botol plastik 10 kapsul. Botol kaca coklat 50 kapsul dan 300 kapsul **Deptan RI No. D. 0204155 PTM. 2.** Obat bebas terbatas

217. SUPER TOP**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Setiap kapsul mengandung vitamin A 100 IU, vit D3 10 IU, vit E 0,25 IU, vit K 1 mg, vit B1 0,04 mg, vit B2 0,07 mg, vit B6 0,02 mg, vit B12 0,5 mg, vit C 0,35 mg, calcium D-pantothenate 0,25 mg, nicotinamide 0,5 mg, caffeine 3 mg, a-[1-(methylamino) ethyl] benzene methanol 3 mg dan mineral berupa Ca, Na, K, Zn, Fe, Cu dan Mg secukupnya **Indikasi** Membuat ayam adu menjadi galak, kuat, agresif dan bertenaga ekstra. Menjadikan ayam tahan sakit pada waktu diadu. Memperpanjang napas ayam pada waktu diadu. Memulihkan kesehatan setelah ayam sakit atau diadu. Menambah daya tahan tubuh terhadap penyakit. Meningkatkan kerja ayam pemacek **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk menambah tenaga ayam adu: 2 kapsul diberikan ½-1 jam sebelum diadu. Untuk menjaga kesehatan, mempertinggi daya tahan terhadap penyakit, serta stres. Meningkatkan daya kerja ayam pemacek, untuk umur < 1 bulan: 3 hari sekali ½ kapsul. Umur 1-2 bulan: 3 hari sekali 1 kapsul. Umur > 2 bulan: 2 hari sekali 1 kapsul **Kemasan** Pot 10 kapsul **Deptan RI No. D. 02041819 PTM. 1.** Obat bebas terbatas

218. SUPER VITAMINO**Korea Thumb Vet Co. Ltd., Korea/SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit E, vit B1, vit B6, vit D3, vit K3, vit B2, vit B12, choline tartate, pantotenic acid, L-lysine, L-tryptophan, bio tin, niasin,

DL-methionine, L-threonine dan L-isoleucine **Indikasi** Sebagai kontrol terhadap defisiensi vitamin, produksi stimulant, growth promotor, pada tahap pertumbuhan dan masa aktif saat produksi, pada situasi stress, pada tahap pemulihan kesehatan dan pada saat transportasi pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 1 kg **Deptan RI No. I. 07053219 PTS.** Obat bebas terbatas

219. SUPER – BRO

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung basitrasin MD, vitamin A, vit D3, vit C, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, Ca-d-pantothenat, nicotinic acid, lysine HCl, methionine **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan. Memperbaiki kualitas karkas. Menambah efisiensi pakan. Sebagai tambahan vitamin dan protein saat sakit/stress **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 1-2 L air minum setiap hari **Kemasan** 50 g, 200 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 08053435 PTS.** Obat bebas terbatas

220. SUPER – EGG

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung basitrasin MD, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, Ca-d-pantothenat, nicotinic acid, folic acid, lysine HCl dan methionine **Indikasi** Meningkatkan produksi telur, dan mencegah penurunan produksi telur saat terjadi perubahan cuaca pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 50 g, 200 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 08013380 PTS.** Obat bebas terbatas

221. SUPER – P

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lysine HCl, methionine, vitamin A, vit D3, vit E, folic acid, nicotinic acid, Ca-d-pantothenat, vit B1, vit B2, vit B6 dan vit B12 **Indikasi** Antidefisiensi vitamin, asam amino dan mineral pada unggas (puyuh) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g untuk 1-2 L air minum **Kemasan** 20 g, 200 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 08083487 PTS.** Obat bebas terbatas

222. SUPER – VITA

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 60.000 IU, vit K3 18.000 mg, vit C 170.000 mg, vit B1 6.000 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 18.000 mg, vit B12 60.000 mg, Ca-d-pantothenat 50.000 mg, niacin 180.000 mg, folic acid 3.000 mg **Indikasi** Untuk membantu pengobatan defisiensi vitamin. Memperkuat daya tahan tubuh dan membantu mempercepat kesembuhan. Untuk unggas yang mengalami stress berat seperti sedang sakit (gumboro, ND, ILT, coryza, berak darah). Saat awal produksi, setelah vaksinasi tertentu (ILT, coryza, EDS). Saat puncak produksi dan stress berat lainnya (potong paruh, pindah kandang, penimbangan) **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g dalam 2 L air minum selama 4-6 hari **Kemasan** 50 g dan 200 g **Deptan RI No. D. 06083108 PTS.** Obat bebas terbatas

223. SUPRALIT +

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3

1.000.000 IU, vit E 8.000 mg, vit K3 2.400 mg, vit B1 1.200 mg, vit B2 1.800 mg, vit B6 1.600 mg, vit B12 10 mg, vit C 20.000 mg, nicotinamide 15.000 mg, folic acid 100 mg dan elektrolit (Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻) 435.000 mg **Indikasi** Mengatasi stress karena cuaca panas, perubahan cuaca, potong paruh, pindah kandang/transportasi, dll **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Unggas: 5 g/10 L air minum selama keadaan stress **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No.** D. 1210468 PTS. 1. Obat bebas terbatas

224. SUPRALIT

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 1.000.000 IU, vit D3 200.000 IU, vit E 10.000 IU dan elektrolit (sodium chloride, potassium chloride, sodium bikarbonat) **Indikasi** Menjaga keseimbangan elektrolit tubuh agar tetap stabil serta mengganti banyaknya elektrolit tubuh yang hilang akibat stres **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250g **Kementan RI No.** D. 12092458 FTS. 1. Obat bebas terbatas

225. TELUR VIT

Aves

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinic acid, calcium-d-panthotenate dan folic acid **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan produksi telur. Mencegah penurunan produksi telur saat terjadi perubahan cuaca dan penyakit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 50 g, 200 g dan 1 kg **Deptan RI No.** D. 09023558 PTS. Obat bebas terbatas

226. TM – VITA

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 6.000.000 IU, vit D3 1.200.000 IU, vit E 2.500 mg, vit K3 750 mg, vit B1 500 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, Vit B12 3.000 mcg, vit C 12.000 mg, Ca-pantothenate 5.000 mg, folic acid 100 mg, biotin 5.000 mcg, niacin 8.000 mg, selenium 36 mg dan electrolyte: K, Na, Mg dan Cl **Indikasi** Mengatasi segala bentuk stress pada unggas. Menjaga stamina tubuh agar selalu sehat dan mencegah terjadinya defisiensi vitamin, mineral serta elektrolit dalam tubuh. Meningkatkan produktifitas ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum, selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Kementan RI No.** D. 1104640 PTS. Obat bebas terbatas

227. TOLEVIT 10 PLUS Se

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin E dan sodium selenite **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan defisiensi vitamin E dan selenium **Dosis dan Cara Pemakaian** Encerkan melalui air minum sesuai dosis. Unggas: 50-100 ml/200 L air minum. Sapi dan kuda: 3-5 ml/ekor. Domba: 1-2 ml/ekor **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI No.** I. 1207952 PTC. 1. Obat bebas terbatas

228. TOLEVIT 10

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin E **Indikasi** Antidefisiensi vitamin

E Dosis dan Cara Pemakaian Untuk ayam diencerkan dengan air minum 4-8 ml/10 L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI No. I. 1207643 PTC. 1.** Obat bebas terbatas

229. TONOPHOSPHAN COMPOSITION Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Setiap ml mengandung 200 mg sodium 4-dimethylamino-2-methylphenyl-phosphonate, 0,04 mg cobaltouschloride 6H₂O, 0,092 mg ammonium molybdate 4H₂O, 0,333 mg sodium selenite 5H₂O, 1,10 zinc sulphate, 0,77 mg manganese (II)-sulphate H₂O, 5 mg nicotinicacid dan 6 mg phenethylalcohol (microbial agent) **Indikasi** Tonikum untuk penanganan gangguan metabolik pada kuda, sapi, domba, kambing, babi, unggas. Tetani dan paresis akibat gangguan metabolisme kalsium, magnesium dan fosfor pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM, SC atau IV. Pada kasus akut 5-20 ml untuk hewan besar dan 1-3 ml untuk hewan kecil. Pada kasus kronis 5-10 kali injeksi dengan dosis 2,5-5 ml pada hewan besar dan 1-2 ml pada hewan kecil **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No. I. 05011412 PKC. 2.** Obat keras

230. TOPVIT

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D₃, vit E, vit K, vit B₁, vit B₂, vit B₆, vit B₁₂, vit C, folic acid, Ca-d-pantothenate, nicotinamide, cuprum, cobalt, magnesium, manganese, zinc, ferrum dan iodum **Indikasi** Meningkatkan produktivitas ternak serta pencegahan dan pengobatan terhadap defisiensi vitamin dan mineral. Memperbaiki kualitas telur dan memelihara kestabilan produksi maksimal **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas (Layer, broiler, itik): 1 g/2 L air minum atau 1 kg/ton pakan. Babi dan sapi: 1 g/3 L air minum atau 500 g/ton pakan dan diberikan 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** 1.000 g, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0312941 PTS. 3.** Obat bebas terbatas

231. TOXIDREN

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D₃, vit E, vit C, vit B₆, vit K, vit B₁₂, folic acid, buthylated hydroxyanisole, buthylated hydroxytoluene **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada unggas, babi, sapi, kuda, domba dan onta **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk semua spesies hewan campurkan secara akurat 100-200 g dalam 100 kg pakan atau 50-100 g dalam 100 L air minum selama 3-12 hari **Kemasan** Botol 1,5 L **Deptan RI No. I. 07013160 PTS.** Obat bebas terbatas

232. TURBO

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin A 5.000 IU, vit D 1.600 IU, vit E 3 IU, vit K 1 mg, vit B₁ 2 mg, vit B₂ 4 mg, vit B₆ 0,3 mg, vit B₁₂ 2 mg, vit C 20 mg, methionine 50 mg, lysine 100 mg, asam folat 0,2 mg, calcium D-pantothenate 5 mg dan nicotinamide 15 mg **Indikasi** Meningkatkan dan memperpanjang masa produksi telur. Menambah kesuburan (fertilitas). Mencegah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin serta mencegah stres **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g tiap L air kemudian dicampurkan ke dalam 2 kg ransum (2,5 g obat/kg ransum) **Kemasan** Sachet aluminium 5 g

dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0608800 FTS. 2. Obat bebas terbatas**

233. ULTRAMIN**AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 g mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit C, vit B1, vit B2, vit B6, vit K3, nikotinamide, Ca-D-Lysine HCl **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan asam amino pada unggas, sapi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 100 g **Kementan RI No. I. 12064291 PTS.**

234. ULTRAVIT M**AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, riboflavin, niacin, Ca-d-panthothenate, pyridoxine HCl **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas, sapi, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 100 g, Botol 500 g dan kantung 25 kg **Deptan RI No. 10053837 PTS**

235. VETADE FORTE**Duta Kaisar Pharmacy**

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung vit A 500.000 IU, vit D 50.000 IU, vit E 50 mg (dalam minyak) **Indikasi** Antidefisiensi vitamin A, D, E pada hewan ternak **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak babi, domba: 0,5–1 ml. Babi: 2 ml. Domba 1–2 ml. Anak sapi, anak kuda: 2–3 ml. Sapi, kuda: 3–5 ml (Diulang 1 bulan sekali). Injeksikan secara SC dan IM **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml dan botol 100 ml **Deptan RI No. D. 0204362 PKC. Obat keras**

236. VET B – 1**Duta Kaisar Pharmacy**

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung vit B1 100 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin B1 pada hewan ternak **Perhatian** Simpan di tempat yang kering, gelap dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Kuda, sapi: 0,05–0,5 ml/kg BB/hari. Kambing: 0,2-2 ml/kg BB/hari. Babi 0,05-1 ml/kg BB/hari. Anjing, kucing: 0,02-0,04 ml/kg BB/hari. Unggas: 0,05–0,04 ml/kg BB/hari. Injeksikan secara SC dan IM **Kemasan** Vial 20 ml, 50 ml, botol 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No. D. 0204103 PKC. Obat keras**

237. VET B – 12**Duta Kaisar Pharmacy**

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung vitamin B12 1 mg **Indikasi** Antianemia pada kambing, babi, sapi, anjing dan kucing **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis untuk kambing, babi, sapi: 1–5 mcg/kg BB/hari. Anjing, kucing: 100 mcg/hari. Apabila dalam keadaan sakit maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 5–10 kalinya dan diulang dalam beberapa hari. Injeksikan secara SC dan IM **Kemasan** Vial 10 ml, botol 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No. D. 03072614 PKC. Obat keras**

238. VET B – PLEKS**Duta Kaisar Pharmacy**

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung vitamin B1 2 mg,

vit B2 2 mg, vit B6 2 mg, nikotinamid 20 mg, pantotenol 10 mg **Indikasi** Antidefisiensi vit B-kompleks pada hewan ternak **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda: 10–30 ml. Anak sapi, anak kuda: 1–5 ml. Babi: 3–5 ml/40 kg BB. Anak babi 1–2 ml/40 kg BB. Kambing, domba: 1–5 ml. Anjing, kucing, kelinci: 1–2 ml. Diberikan 2–3 kali seminggu. Injeksikan secara SC dan IM **Kemasan** Vial 20 ml, botol 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No.** D. 03112671 PKC. Obat keras

239. VET – CHOICE

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Mengandung vitamin B1 10 mg, vit B2 4 mg, vit B3 40 mg, vit B4 20 mg, vit B6 4 mg, vit B12 10 mcg dan vit C 40 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada sapi, kuda, babi domba, anjing dan kucing **Perhatian** Jangan diberikan secara intravena (IV). Jangan dicampur dengan antibiotik lain. Saat penyuntikkan harus dijaga kondisi aseptiknya. Simpan di tempat yang sejuk dan jauhkan dari sinar matahari **Dosis dan Cara Pemakaian** Anjing, kucing: 0,5–2 ml. Anak babi, anak domba: 1–2 ml. Babi, domba 3–6 ml. Anak sapi, anak kuda: 5–10 ml. Sapi, kuda: 10–15 ml. Diulang 1 minggu sekali **Kemasan** Vial 20 ml, botol 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No.** D. 05032911 PKC. Obat keras

240. VETERDRYL

Duta Kaisar Pharmacy

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Setiap 1 ml mengandung 10 mg difenhidramin HCl **Indikasi** Pengobatan reaksi alergi seperti urtikaria, reaksi anafilaksis, dermatitis alergi, rhinitis alergi, pruritis, gatal-gatal pada peradangan dan asma bronchial. Pengobatan mabuk/antiemetic dan terapi tambahan untuk laminitis aseptik pada sapi **Indikasi** Pada hewan yang hipersensitif terhadap difenhidramin HCl **Perhatian** Simpan di tempat yang sejuk kering dan terlindung dari cahaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Hewan kecil (anjing, kucing): 0,1 ml/kg BB. Hewan besar (kuda, sapi): 1,0 ml/20 kg **Kemasan** Vial 15 ml, dan 100 ml **Deptan RI No.** D. 05032908 PKC. Obat keras

241. VIAMIN – 34 INJECTION

Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung glucose, sodium acetate, calcium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, L-arginine HCl, sodium glutamate, L-histidine HCl, L-leucine, DL-isoleucine, L-lysine HCl, L-methionine, DL-phenylalanine, L-threonine, DL-tryptophan, DL-valine, L-cysteine HCl, thiamine HCl, riboflavin, nicotinamide, d-panthenol, pyridoxine HCl, cyanocobalamin. **Indikasi** Terapi pendukung untuk mencegah dan mengatasi pendarahan pada saat dan setelah operasi, muntah, diare, shock, dehidrasi, kelemahan fisik, ketidakseimbangan elektrolit dan hypoproteinemia **Perhatian** Jangan diberikan pada penyakit hati kronis **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 0.1–0.2 ml/kg BB secara IM, IV, SC **Kemasan** Botol 100 ml **Deptan RI No.** I. 04122849 PKC. Obat keras

242. VIGANTOL E

Bayer Korea, Ltd, Korea/Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Injeksi **Komposisi** Mengandung vitamini A palmitate, vit D3 dan vit E acetate **Indikasi** Profilaksis dan antidefisiensi vitamin A, vit D3 dan vit E pada sapi, babi, domba, kambing dan anjing **Perhatian** Overdosis dapat mengakibatkan hiperavitaminosis dan

hiperitamin D **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM. Sapi, kuda betina, babi bunting, sapi jantan, kuda jantan, babi jantan: 5 ml. Anak kuda, anak sapi: 3 ml. Babi, kambing, domba: 2 ml. Babi muda, anjing: 1 ml **Kemasan** Botol @ 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No. I. 09083690** PTC. Obat keras

243. VIGO VIT**Hendy Pharmindo Satwa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung carnitin HCl 50 g, vit E 1 g dan vit C 40 g **Indikasi** Mempercepat kesembuhan penyakit terutama akibat gumboro. Meningkatkan nafsu makan dan produktivitas ternak. Menurunkan FCR dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1-2 g/1-2 L air minum selama 3-5 hari. Babi: 20 g/ekor dilarutkan dalam air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 03012514 PTS.** Obat bebas terbatas

244. VIGROO**Biotek Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung carnitine 25.000 mg, vitamin B1 1.500 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 10.000 mg, vit C 25.000 mg, Mg 7.500 mg dan sorbitol 300.000 mg **Indikasi** Vitamin untuk meningkatkan nafsu makan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 ml/25-30 kg BB selama 3 hari berturut-turut (terutama pada minggu pertama DOC datang), setelah itu sesuai kebutuhan dengan dosis: 1 ml/2 L air minum **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 06103144 PTC.** Obat bebas terbatas

245. VITAMINO SOL (VIRBAC VITAMINO SOLUTION)**Virbac Vietnam Co.****Ltd., Vietnam/Emvi Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit C, vit B1, vit B6, vit K3, calcium panthothenate, arginine dan lysine **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/5 L air minum untuk 5-10 hari atau 1 ml/L untuk 2-3 hari (Penggunaan setiap bulan) **Kemasan** Botol 500 ml, 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 12071006 PTC. 3.** Obat bebas terbatas

246. VITAMINO SP**Virbac Vietnam Co. Ltd., Vietnam/Emvi Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit C, vit B1, vit B6, vit B12, vit K3, calcium panthothenate, folic acid, sodium chloride, amino acid, cobalt sulphate, copper sulphate, magnesium sulphate dan manganese sulphate **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan defisiensi nutrisi. Meningkatkan resistensi terhadap stress. Memperbaiki produktivitas dan pelengkap dalam pencegahan penyakit infeksius dan parasitik pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis pencegahan: 1 kg/10.000 L air minum. Dosis pengobatan: 1 kg/5.000 L air minum atau 1 kg/2-4 ton pakan selama 5-10 hari **Kemasan** Sachet 8 g, 24 g, dan 100 g; boks 1 kg, ember 5 kg dan drum 25 kg **Kementan RI No. I. 11013990 FTS.** Obat bebas terbatas

247. VI – SORBITS

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Setiap tablet mengandung zat besi 9,50 mg, vitamin B12 8,00 mcg, pyridoxine HCl 1,00 mg, folic acid 0,20 mg, thiamine mononitrate 1,00 mg, riboflavin 1,00 mg, niacinamide 10,00 mg, calcium pantothenate 0,50 mg, vit A1 250,00 IU, vit D3 125,00 IU, vit E 2,00 IU, linoleic acid 20,00 mg, D-sorbitol 145,00 mg, calcium 100 mg, phosphorus 77,30 mg, magnesia 1,00 mg dan copper 0,50 mg **Indikasi** Suplemen nutrisi untuk anjing dan kucing yang mengandung 18 vitamin essensial dan mineral essensial untuk setiap hari **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 tablet/hari dan bisa diberikan langsung atau dicampurkan dengan makanan **Kemasan** Botol isi 50 tablet dan 200 tablet **Deptan RI No. I. 0612448 FTM. 3. Obat bebas terbatas**

248. VIT – ECO

Tekad Mandiri Citra

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin A 3.750.000 IU, vit D3 750.000 IU, vit E 5.000 mg, vit K3 500 mg, vit B1 250 mg, vit B2 125 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 6.000 mcg, vit C 20.000 mg, Ca-Panthotenat 2.000 mg, nicotinamid 5.000 mg, trace-mineral dan elektrolit Cu, Mn, Zn, K, Na, Mg dan Cl **Indikasi** Defisiensi vitamin dan mineral pada unggas, sapi, babi dan ternak besar lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: melalui air minum 1 g/2 L air minum. Sapi, babi dan ternak besar lainnya: 1 g/20-40 kg BB dan diberikan berturut-turut selama 3-5 hari **Deptan RI No. D. 10113943 PTM.**

249. VIT AD3 E 300 INJ.

Kepro bv, Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Tiap ml larutan mengandung vitamin A 300.000 IU, vit D3 100.000 IU dan vit E 50 mg **Indikasi** Pengobatan dan pencegahan dari kekurangan vitamin A, vit D3 dan atau vit E, yang ada hubungannya dengan infeksi-infeksi bakteri. Meningkatkan masa produksi, gangguan pertumbuhan, gangguan reproduksi dan gangguan samplings yang tidak menular, enteritis, serta masalah ketidakseimbangan dan masalah kulit. Tindakan pencegahan selama kerja keras dan kondisi di bawah tekanan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemberian penyuntikan secara intramuskuler atau subkutan. Kuda, sapi: 5-10 ml/ekor. Anak sapi: 3 ml/ekor. Anak kuda: 5 ml/ekor. Babi: 2-3 ml/ekor. Domba, kambing: 4 ml/ekor **Kemasan** Vial multidosis 100 ml **Deptan RI No. I. 07043210 PKC. Obat keras**

250. VIT GEMUK (SAPI + KAMBING)

Sinar Harapan, UD

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lysin hydrochloride, L-Methionine, vit A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, Ca Pathotenat, vit C dan niacin **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi stress. Meningkatkan kualitas produksi dan mempercepat pertumbuhan pada sapi dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 100 g, 1 kg dan 10 kg **Deptan RI No. D. 07023171 PTS. Obat bebas terbatas**

251. VIT GEMUK (UNGGAS)

Sinar Harapan, UD

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lysin hydrochloride, L-Methionine, vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, Ca-Pathotenat, vit C dan niacin **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi stress. Meningkatkan kualitas produksi dan

mempercepat pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 100 g, 1 kg dan 10 kg **Deptan RI No. D. 07023172 PTS**. Obat bebas terbatas

252. VITA CHICKS**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung bacitracin MD 35 mg, vitamin A 5.000 IU, vit D3 500 IU, vit E 2,5 IU, vit K3 1 mg, vit B1 2 mg, vit B2 4 mg, vit B6 1 mg, vit B12 1 µg, vit C 20 mg, nicotinic acid 15 mg dan calcium D-Pantothenate 5 mg **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan, mencegah kekurangan vitamin, mengatasi stres, serta mengurangi angka kematian pada anak ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Umur 0-2 minggu (setiap hari) dan 5 minggu-dewasa (selama gangguan): 5 g tiap 7 L atau 2 sendok plastik putih rata tiap 1,5 L air minum. Umur 3-4 minggu (setiap hari): 5 g tiap 12 L air minum atau 2 sendok plastik putih rata tiap 2,5 L air minum **Kemasan** Sachet 5 g, 10 g, 50 g, 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D. 0608730 GTS. 2**. Obat bebas terbatas

253. VITA F – 1P**Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1 HCl, vit B2, vit B6 HCl, vit B12, vit C, menadione sodium bisulphate, calcium pantothenate, nicotinamide, folic acid, inositol, choline chloride dan ferrous sulphate **Indikasi** sebagai antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 1-2 kg VITA F-1p/ton pakan **Kemasan** Sak 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI No. I. 12114380 PTS**. Obat bebas terbatas

254. VITA PLEX B**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung vitamin B1 0,05 mg, vit B2 0,125 mg, vit B6 0,15 mg, niacinamide 1,0 mg, calcium D-pantothenate 0,075 mg **Indikasi** Meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki penyerapan zat makanan di saluran pencernaan. Mempercepat pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit dan setelah pemberian obat keras serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Kaplet dimasukkan ke mulut dan didorong ke dalam kerongkongan atau dihancurkan lalu dicampurkan ke ransum atau dilarutkan dalam air minum. Untuk burung besar: 1 kaplet/hari, sedangkan untuk burung kecil: ½ kaplet/hari **Kemasan** Boks 12 pot @ 10 kaplet **Deptan RI No. D. 07103330 PTM**. Obat bebas terbatas

255. VITA PLEX DROPS**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Drops **Komposisi** Setiap ml mengandung vitamin B1 0,31 mg, vit B2 0,2 mg, vit B6 0,19 mg, niacinamide 1,56 mg, calcium D-pantothenate 0,31 mg dan bahan pembantu sampai 1 ml **Indikasi** Meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki penyerapan zat makanan di saluran pencernaan. Mempercepat pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit dan setelah pemberian obat keras serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Obat diteteskan langsung ke mulut

burung atau dicampur dengan air minum. Untuk burung besar: 8 tetes tiap 60 ml air minum, sedangkan untuk burung kecil: 4 tetes tiap 60 ml air minum **Kemasan** Boks 12 botol @ 30 ml **Deptan RI No. D. 07103331 PTC.** Obat bebas terbatas

256. VITA PLEX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung vitamin B1 0,10 mg, vit B2 0,25 mg, vit B6 0,30 mg, niacinamide 2,0 mg, calcium D-pantothenate 0,15 mg **Indikasi** Mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B-kompleks. Menambah daya tahan ayam terhadap penyakit. Mencegah stres, terutama pada waktu perubahan cuaca, vaksinasi atau pindah kandang. Mempertinggi efisiensi pemakaian ransum dan mempercepat pertumbuhan **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Masukkan kaplet ke dalam kerongkongan ayam, lalu didorong ke dalam, atau larutkan kaplet di dalam air minum ayam. Diberikan setiap hari 1 kaplet tiap ekor ayam dewasa atau ½ kaplet tiap ekor anak ayam **Kemasan** Sachet plastik 50 kaplet. Botol kaca 100 kaplet dan 500 kaplet **Deptan RI No. D. 0609811 PTM. 3.** Obat bebas terbatas

257. VITA STRESS

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 6.000 IU, vit D3 1.200 IU, vit E 2,5 IU, vit K3 3 mg, vit B1 2 mg, vit B2 3 mg, vit B6 1 mg, vit B12 2 mg, vit C 20 mg, nicotinic acid 15 mg, calcium D-pantothenate 5 mg, elektrolit sebagai natrium, kalium, kalsium dan magnesium 750 mg **Indikasi** Menambah daya tahan tubuh dan mencegah stres pada waktu sebelum serta sesudah vaksinasi. Setelah potong paruh, pindah kandang, penggantian ransum, pada waktu iklim yang buruk dan pada masa rontok bulu. Mencegah kekurangan vitamin pada ayam terutama jika terdapat gangguan pertumbuhan, penurunan produksi telur dan gangguan pertumbuhan bulu. Mempercepat pemulihan kesehatan setelah sakit dan sesudah pengobatan dengan obat-obat antibiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g tiap L air, diberikan 2 hari sebelum dan sesudah vaksinasi. 1 g tiap 2 L air, diberikan selama 7-10 hari, untuk mencegah stres setelah pindah kandang, pada waktu iklim yang buruk, penggantian ransum, pada gangguan pertumbuhan dan penurunan produksi telur dan pada pemulihan kesehatan setelah sakit **Kemasan** Sachet aluminium 5 g dan 10 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0608985 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

258. VITA STRESS – B

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinamide, Ca-d-pantothenate, Ka, K, Mg dan Ca **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada burung **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk mengatasi stress: 1 g/10 g diberikan bersama pakan atau 1 g/60 ml melalui air minum setiap hari untuk burung besar. 0,5 g/10 g diberikan bersama pakan atau 0,5 g/60 ml melalui air minum setiap hari untuk burung kecil. Untuk defisiensi vitamin: 0,5 g/10 g diberikan bersama pakan atau 0,5 g/60 ml melalui air minum setiap hari untuk burung kecil. 0,25 g/10 g diberikan bersama

pakan atau 0,25 g/60 ml melalui air minum setiap hari untuk burung besar **Kemasan** Botol 10 g **Deptan RI No. D. 08093495 PTS.** Obat bebas terbatas

259. VITA STRONG**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin A 5.000 IU, vit D3 500 IU, vit E 2,5 IU, vit K 1 mg, vit B1 2 mg, vit B2 4 mg, vit B6 1 mg, vit B12 1 mg, vit C 20 mg, nicotinic acid 15 mg dan calcium-D-pantothenate 5 mg **Indikasi** Mempersiapkan ayam sebelum vaksinasi dengan memperkuat tubuh ayam sehingga vaksin memberikan efek perlindungan yang maksimal. Untuk mempercepat pemulihan kesehatan setelah sakit, terutama setelah pengobatan dengan obat-obat keras. Menghilangkan stres setelah pemotongan paruh, pindah kandang, cuaca yang buruk dan pada masa rontok bulu. Mempersiapkan fisik, kekuatan ayam adu sebelum diadu. Menyegarkan kembali, memulihkan kesehatan setelah diadu **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebelum vaksinasi: 1 g tiap 1 L air minum, diberikan 2 hari sebelum vaksinasi. Untuk mempercepat pemulihan kesehatan, menghilangkan stres dll: 1 g tiap 2 L air minum, diberikan selama 7-10 hari. Untuk ayam adu: 1 sendok teh rata dalam 1 L air minum, diberikan selama 2 hari sebelum diadu dan 2 hari sesudah diadu **Kemasan** Sachet aluminium 5 g, 10 g dan 25 g. Gelas 100 g. Wadah plastik 500 g dan 1 kg. Tin 5 kg. Ember 10 kg dan 15 Kg. Drum 20 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0608156 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

260. VITABRO**Pyridam Veteriner**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung L-lysine HCl 40.000 mg, DL-methionine 300.000 mg, vitamin A 2.500.000 IU, vit D3 600.000 IU, vit E 2.500 IU, vit K3 500 mg, vit B1 1.000 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 2.000 mcg, vit C 5.000 mg, Ca D-pantothenate 5.000 mg, sodium 10.000 mg, magnesium 4.000 mg, manganese 5.000 mg, zinc 2.000 mg, cupri 1.000 mg dan cobalt 500 mg **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan anak ayam, ayam broiler dan ayam pejantan dalam waktu singkat. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit terutama pada peternakan ayam di daerah tropis. Meningkatkan efisiensi penggunaan makanan secara ekonomis dan bermanfaat dalam memperbaiki konversi makanan **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g (1 sendok teh)/10 L air minum **Kemasan** 10 g, 100 g, ½ kg, 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI No. D. 0309144 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

261. VITACART PLUS**MJPF Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap L mengandung sodium citrate 36.000 mg, potassium citrate 24.000 mg, L-carnitine HCl + ATP factor 20.000 mg, vitamin PP 2.400 mg, sorbitol 20.000 mg, vit B1 600 mg, niacinamide 6.400 mg, vit C 15.000 mg **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan BB. Mengurangi kasus stanting. Meningkatkan produktivitas telur dan derajat kesehatan. Meningkatkan sistem immune serta mencegah stress karena serangan penyakit post vaksinasi dan perubahan cuaca **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat brosur dan leaflet **Kemasan** 100 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 05022865 PTC.** Obat bebas terbatas

262. VITACHIP**Biotek Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 8.500.000 IU, vit D3

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

750.000 IU, vit E 500 mg, vit K3 130 mg, vit B1 500 mg, vit B2 1.500 mg, vit B6 1.700 mg, vit B12 3 mcg, vit C 18.000 mg, folid acid 100 mg, pantothenate acid 5.000 mg, nicotinamide 5.000 mg dan elektrolit K, Na, Mg dan Cl **Indikasi** Mencegah stress, menjaga kesehatan dan memperbaiki efisiensi produksi unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No.D.12022108 PTS.**
2. Obat bebas terbatas

263. VITAL CHORUS – FORTE

KBNP, Inc, korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, vit K3, folic acid, nicotinamide, calcium pantothenate, choline chloride, alanine, arginine HCl, phenylalanine, histidine, leucine, lysine HCl, DL-methionine, threonine dan valine **Indikasi** Meningkatkan pertumbuhan, nafsu makan, daya tetas, mencegah stress dan kelemahan pada cangkang telur. Memperkuat ketahanan terhadap penyakit, pencegahan dan pengobatan atas kegunaan vitamin dan asam amino **Dosis dan Cara Pemakaian** Berikan setelah dilarutkan dalam air minum. Unggas: 1 ml/L. Babi: 1-10 ml/ekor. Sapi: 4-20 ml/ekor **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 04042747 PTC.** Obat bebas terbatas

264. VITAMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit K3 6.000 mg, vit B1 2.100 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 4.200 mg, vit B12 43 mg, vit C 150.000 mg, biotin 105 mg, Ca-d-pantothenate 30.000 mg, niacin 60.000 mg dan folic acid 3.000 mg **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh, pertumbuhan, reproduksi dan produksi yang optimal **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara oral. Unggas: 10 g/100-120 L air minum **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No. D. 1204387 PKS. 1.** Obat bebas terbatas

265. VITAMILD PLUS

Avian Satwa Anugrah

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 6.000.000 IU, vit D3 1.200.000 IU, vit E 2.500 mg, vit K3 3.000 mg, vit C 20.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 3.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 2.000 mcg, Ca-D-pantothenate 5.000 mg dan nicotinic acid 15.000 mg **Indikasi** Menambah daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan kesehatan setelah sakit. Mencegah dan mengatasi stress umum seperti pasca vaksinasi, potong paruh, pindah kandang, rontok bulu dan perubahan iklim yang ekstrim serta mencegah defisiensi/kekurangan vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No. D. 11024008 PTS.** Obat bebas terbatas

266. VITAMIN AD3E PANTEX INJECTABLE

Pantex-Holland/

PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung vitamin A palmitate 8,0 MIU 4.706 g (1.700 IU/mg), vit D3 4 MIU 1 g (4.000 IU/mg), vit E acetate 2 g dan soya oil 84,8 g **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan akibat defisiensi vitamin A, vit D3 dan vit E.

Gangguan pertumbuhan, gangguan reproduksi, non infeksius enteritis, rachitis dan masalah kulit **Kontraindikasi** Overdosis Vitamin D3 dapat menyebabkan hipercalemia pada hewan muda **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IM atau SC: Kuda, sapi: 10 ml/ekor. Babi: 5-8 ml/ekor. Kambing, domba: 4 ml/ekor. Anak babi: 1-3 ml/ekor. Anjing: 1-5 ml/ekor. Kucing: 1-2 ml/ekor **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No.** I. 12084324 PKC

267. VITAMIN AD3E**Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3 dan vit E **Indikasi** Hipovitaminosis pada semua kasus anemia, selain itu vitamin A, vit D3 dan vit E berfungsi meningkatkan hasil breeding dan rearing, masalah pertumbuhan, peningkatan resistensi, stress dan profilaktik **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM, pada sapi dan unta: 1 ml/50 kg BB. Calves dan foals: 1 ml/15 kg BB. Domba: 1 ml/15 kg BB. Kuda: 1 ml/40 kg BB. Unggas: 1 ml/10 unggas **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No.** I. 12094335 PKC. Obat keras

268. VITAMIN B COMPLEX-S INJEKSI**Wonderindo Pharmatama**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, nicotinamide dan D-Panthenol **Indikasi** Antidefisiensi vitamin B-complex. Mengatasi kelesuan dan gangguan metabolisme, menambah nafsu makan, memperbaiki kondisi tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki pertumbuhan, memelihara fungsi normal pada sistem saraf, dan suplemen vitamin setelah pengobatan dengan antibiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan intramuskuler. Hewan besar: 5-10 ml. Hewan kecil: 1-2 ml **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Kementan RI No.** D. 11034026 PKC. Obat keras

269. VITAMIN B12 INJEKSI**Wonderindo Pharmatama**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B12 **Indikasi** Antidefisiensi vit B12 pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi SC atau IM 5–10 mcg/kg BB/hari. Dosis dapat berubah tergantung pada beratnya kasus dan respon penderita itu sendiri **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No.** D. 0512179 PKC. 1. Obat keras

270. VITAMIN B6 INJEKSI**Wonderindo Pharmatama**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Mengandung pyridoxine hydrochloridum **Indikasi** Mencegah kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh defisiensi vitamin B6 seperti: diare, gangguan pertumbuhan pada hewan muda, penurunan nafsu makan, penurunan penglihatan, keguguran dan kelahiran premature pada babi, penurunan produksi telur pada ayam petelur dan “cakar bengkok” pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan subkutan atau intramuskuler atau intravena pelan: Sapi, kerbau, kuda, babi: 1-10 ml. Domba, kambing, anak babi: 1-5 ml. Anjing, kucing: 1-2 ml. Unggas: 0,2-0,5 ml **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI No.** D. 10073865 PKC. Obat keras

271. VITAMIN E SELLENIUM**AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin E dan selenium **Indikasi** Sebagai

antidefisiensi vitamin E dan selenium pada unggas, domba dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 500 ml **Kementan RI No. I. 11024007 PTC.**

272. VITAMIN E50 + Se INJ

Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung alpha-tocopherol acetate (vitamin E) 50 mg dan sodium selenite 0.5 mg **Indikasi** Pencegahan atau pengobatan distropi otot (white muscle disease, stiff lamb disease) pada sapi, kambing, domba babi dan unggas. Encephalomalacia, diatese eksudativa, penurunan daya tetas telur pada unggas. Penurunan kesuburan (kematian embrio) pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** SC atau IM. Pada unggas secara oral. Domba, sapi dan anak babi: 2 ml/10 kg BB. Babi: 1 ml/10 kg BB. Unggas: 5 ml/30 L air minum selama 6 hari **Kemasan** 100 ml **Deptan RI No. I. 12092219 PKC. 2.** Obat keras

273. VITAMIX INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, nicotinamide dan D-Panthenol **Indikasi** Terutama diperlukan pada semua keadaan akibat defisiensi vitamin B-complex. Mengatasi kelesuan, dan gangguan metabolisme. Menambah nafsu makan, memperbaiki kondisi tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki pertumbuhan, memelihara fungsi normal pada sistem syaraf, dan suplemen vitamin setelah pengobatan dengan antibiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan subkutan dan intramuskuler: Anak babi (berat < 40 kg): 1-2 ml. Babi (berat 40-75 kg): 2-3 ml. Babi (berat >75 kg): 3-5 ml. Sapi, kuda: 1-10 ml. Anak sapi, anak kuda, anak domba, anak anjing: 1-5 ml. Kucing, anjing, kelinci: 1-2 ml 2,5-5 g **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. D. 11054082 PKC.** Obat keras

274. VITAPOULT

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Vitamin dan mineral **Indikasi** Meningkatkan produksi telur dan efisiensi makanan. Mempercepat pertumbuhan pada ayam broiler dan ayam dara. Memperbaiki kualitas kulit telur sehingga tidak mudah pecah. Mencegah stress dan menambah daya tahan terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 g/L air minum diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 1 kg dan 5 kg **Deptan RI No. D. 0307794 FTS. 2.** Obat bebas terbatas

275. VITARAL

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung vitamin A 10.000 IU, vit D3 2.000 IU, vit E 9 mg, vit K3 0,766 mg, vit B1 1,8 mg, vit B2 4 mg, vit B6 3 mg, vit B12 7,86 mcg, vit C 36, biotin 0,1 mg, pantothenate acid 10 mg, folid acid 0,5 mg, elektrolit K, Na, Mg dan Cl **Indikasi** Mencegah stress untuk memperbaiki efisiensi produksi dan daya tahan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum, selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No. D. 12041818 PTS. 2.** Obat bebas terbatas

276. VITARAL PLUS

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung bacitracin methylene disalysilate 50 mg, vitamin A 10.000 IU, vit D3 2.000 IU, vit E 18 mg, vit K3 1,5 mg, vit B1 1,8 mg, vit B2 5

mg, vit B6 4 mg, vit B12 30 mcg, Vit C 45 mg, Biotin 0,2 mg, Pantothenic acid 15 mg, Folid acid 1 mg, elektrolit K, Na, Mg, Cl **Indikasi** Menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan dalam saluran pencernaan. Anti stress untuk memperbaiki efisiensi produksi dan daya tahan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Deptan RI No.** D. 07021803 FTS. 1. Obat bebas terbatas.

277. VITASAM**Biotek Indonesia**

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg Vitasam mengandung Vit A 15.000.000 IU, Vit D3 3.000.000 IU, Vit E 20.000 mg, Vit K3 6.000 mg, Vit B1 1.500 mg, Vit B2 3.000 mg, Vit B6 2.000 mg, Vit B12 15.000 mcg, Vit C 50.000 mg, Folid Acid 500 mg, Pantothenate Acid 10.000 mg, Nicotinamide 25.000 mg, Biotin 60.000 mcg, Methionine 24.000 mg, Lysine 32.000 mg, Arginine 7.500 mg, Cystein 4.500, Isoleucine 2.500 mg, Leucine 4.500 mg, Phenylalanine 3.500 mg, Tryptophan 3.250 mg, Threonine 9.500 mg, Histidine 1.100 mg, Valine 3.500 mg, Alanine 7.500 mg, Serine 5.500 mg **Indikasi** Sebagai antistress dan untuk meningkatkan produktivitas unggas. Untuk pertumbuhan dan kesehatan unggas. Untuk meningkatkan kualitas telur dan mempertahankan puncak produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Anak ayam umur 1-7 hari: 6 g/10 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Ayam dewasa umur 4 minggu ke atas (Pullet, Layer, Broiler, Breeder): 3 g/10 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI No.** D. 12041861 PTS. 2. Obat bebas terbatas.

278. VITASAM EFFERVESCENT**Biotek Indonesia**

Bentuk Sediaan Tablet **Komposisi** Setiap tablet mengandung Vit. A 35.000 IU, Vit. D3 7.500 IU, Vit. E 15 mg, Vit. K3 5 mg, Vit. C 500 mg, Folic Acid 0,5 mg, Nicotinamide 75 mg, Methionine 550 mg, Lysine 750 mg, Cystein 50 mg, Phenyl alanine 50 mg, Tryptophan 50 mg, Histidine 45 mg, Elektrolit K, Na, Cl, Mg dan Zn **Indikasi** Untuk pertumbuhan dan kesehatan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 tablet/50 L air minum, diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** tube = 10 tablet **Deptan RI No.** D. 07113355 PTM. Obat bebas terbatas.

279. VITASOL-E**Biotek Indonesia**

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap L mengandung Vit E 100.000 mg, Selenium 500 mg **Indikasi** Meningkatkan fertilitas dan mencegah gangguan reproduksi. Mencegah defisiensi vitamin E dan gangguan otot karena nutrisi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 0,5-1 ml/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut. Sapi 3-5 ml/ekor. Domba 1-2 ml/ekor. Kocok lebih dahulu sebelum digunakan **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Deptan RI No.** D. 06103145 PTC. Obat bebas terbatas.

280. VITOL – 140**Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung vitamin A 80.000 IU, vit D3 40.000 IU dan vit E 20 mg **Indikasi** Defisiensi vitamin A, vit D3 dan vit E pada sapi, kuda, kambing, domba, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 10

SEDIAAN FARMASETIK

Anti Defisiensi Vitamin, Mineral dan Asam Amino

ml. Pedet dan anak kuda: 5 ml. Kambing dan domba: 3 ml. Babi: 5-8 ml. Anak babi: 1-3 ml. Anjing: 1-5 ml. Kucing: 1-2 ml. Ayam: 0,2 ml/kg BB **Kemasan** Vial 100 ml **Deptan RI No.** I. 05062923 PKC. Obat keras

281. VITOSELEN

Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin E dan selenium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin E dan selenium pada ayam, babi, sapi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Layer/ Broiler: 240 ml/1000 L air minum selama 7 hari, Babi: 1 ml/20 kg BB setiap hari selama 5 hari. Sapi: 5 ml tiap ekor sapi setiap hari selama 3 minggu. Kuda: 1 cc/100 kg BB selama 7 hari setiap bulan **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No.** I. 08083478 PTC. Obat bebas terbatas.

282. WONDER VITAMIN B1 INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B1 **Indikasi** Antidefisiensi vitamin B1 pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi SC, IM, atau IV. Sapi, kerbau, kuda, babi: 1-10 ml. Domba, kambing, anak babi: 1-5 ml. Anjing, kucing: 1-2 ml. Unggas: 0,2-0,5 ml **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI No.** D. 05072949 PKC. Obat keras

283. WONDER VITAMYCIN POWDER

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, niacinamid, calcium pantotenat, Na-benzoate dan DL-Methionine **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada burung **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g ke dalam 1,5 L air minum atau 5 g dicampurkan ke dalam 1 kg pakan **Kemasan** Vial 10 g **Deptan RI No.** D. 05103005 PTS. Obat bebas terbatas

284. X – TRA ANTISTRESS

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit C, vit B1, vit B2, vit B6, kalium, natrium, magnesium dan kalsium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI No.** D. 08043409 PTS. Obat bebas terbatas

285. X – TRA BETAGAIN

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung betain HCl 250 g, vitamin C 90 g, potassium 2 g, magnesium 4 g, zinc 20 g dan natrium 20 g **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan elektrolit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI No.** D. 09023562 PTS. Obat bebas terbatas

286. X – TRA CARNICEL

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap L mengandung L-carnitine 50 g, vitamin C 60 g, kalsium 150 mg, potassium 300 mg, sodium 400 mg, magnesium 300 mg dan vitamin B1 2.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan elektrolit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian**

Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI No. D. 08123525 PTS.** Obat bebas terbatas

287. X – TRA CARNIVA

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung L-carnitine, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B6, vit B12, biotin, vit C, folic acid, kalsium, kalium, natrium, magnesium dan selenium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI No. D. 08073463 PTS.** Obat bebas terbatas

288. X – TRA E – SELEN SUPERMIN

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin E 35.000 mg, selenium 300 mg, copper 400 mg dan zinc 4.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI No. D. 08103514 PTS.** Obat bebas terbatas

289. X – TRA FASTBRO

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit K3, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, biotin, nicotinamide, folic acid, kalsium, kalium, natrium dan magnesium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 50 g **Deptan RI No. D. 08073466 PTS.** Obat bebas terbatas

290. X – TRA VITALIT

Cakar Mas

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, vit K3, biotin, Ca-d-panthothenate, folic acid, nicotinamide, kalsium, kalium, natrium dan magnesium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum selama 3 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet @ 100 g dan 500 g **Deptan RI No. D. 08103515 PTS.** Obat bebas terbatas

291. XTRA VITAN

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk. **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit B1 2.100 mg, vit B2 25.000 mg, vit B6 4.200 mg, vit B12 42 mg, vit C 150.000 mg, vit K3 6.000 mg, asam folat 3.000 mg, biotin 115 mg, Ca 30.000 mg dan asam nikotinat 60.000 mg **Indikasi** Melengkapi kebutuhan vitamin, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, meningkatkan produksi dan membantu proses penyembuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/6-12 l air minum 5-7 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI No. D. 02071076 PTS.** Obat bebas terbatas

292. ZAGRO AD3EK

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vit A 33,4 MIU, vit D3 3,0 MIU, vit E 6 g dan vit K3 5 g **Indikasi** Antidefisiensi pada unggas, kambing, domba dan

sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 1 g/4-6 L air selama 7 hari. Kambing, domba: 4 g/ekor. Sapi 8 g/ekor **Kemasan** Sachet 100 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI No. I. 06043070** PTS. Obat bebas terbatas

293. ZAGROSOLAD3E **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Tiap L mengandung vitamin A 100 MIU, vit D3 20 MIU dan vit E 25 g **Indikasi** Antidefisiensi vitamin E dan selenium pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 ml/4 L air. Sapi: 10 ml/ekor. Babi: 1 ml/4 L air **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I 08113522 PTC.** Obat bebas terbatas

294. ZAGROSOLES **Zagro Singapore Pte, Ltd/Zagro Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin E dan selenium **Indikasi** Antidefisiensi vitamin E dan selenium pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas, sapi perah, domba dan babi: 1 ml/L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 08063447 PTC.** Obat bebas terbatas

295. ZAGROVIT **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinic acid, pantothenic acid, folic acid, L-carnithine, lysine HCl, DL-methionine, Mg-sulphate, potasium chloride dan sodium chloride **Indikasi** Antidefisiensi vitamin, mineral dan asam amino pada unggas, sapi, kambing serta babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas 0,5-1 g/L air. Domba, kambing, sapi, babi: 1-2 g/L **Kemasan** Sachet 100 g dan 1 kg **Deptan RI No. I. 06043071 PTS.** Obat bebas terbatas

296. ZOOBETAMIN **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit K, vit B12, D-pantothenic acid dan sorbitol **Indikasi** Antidefisiensi vitamin pada sapi, kambing, babi, kuda, kelinci dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dilarutkan pada air minum untuk sapi, kambing, babi dan kuda dengan dosis 1 ml/L air minum. Pada anak sapi, anak kambing, anak babi dan kelinci dengan dosis 1-2,5 ml/L air minum. Pada unggas dengan dosis 100 ml/100 L air minum **Kemasan** Botol 1 L **Deptan RI No. I. 03032544 PTC.** Obat bebas terbatas

297. ZOOSOL AMINOSAL **Instituto delle Vitamine SpA., Italia/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, d-pantothenate acid, biotin, niacinamide, choline chloride, L-lysine HCl, DL-methionine, L-tryptophan, L-threonine, dextrose, magnesium chloride dan sodium chloride **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin asam amino dan elektrolit pada unggas, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam air minum **Kemasan** Botol @ 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 12044250 PTC.** Obat bebas terbatas

298. ZOOSOL CALORVIT

**Instituto delle Vitamine SpA., Italia/DSM
Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin E acetate, vit B2, dan vit C **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin pada ayam, domba, kuda dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam air minum **Kemasan** Botol @ 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 12094352** PTC. Obat bebas terbatas

299. ZOOSOL LISOVIT

**Instituto delle Vitamine SpA.,
Italia/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H, PP, d-pantothenate acid, choline chloride, potassium sorbate, L-lysine HCl, DL-methionine, L-tryptophan dan L-threonine **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin dan asam amino pada unggas, sapi, babi, kambing dan kelinci **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam air minum **Kemasan** Botol @ 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 12054273** PTC. Obat bebas terbatas

300. ZOOSOL PAN 50

**Instituto delle Vitamine SpA., Italia/
DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, vit H, PP, d-pantothenate acid dan choline chloride **Indikasi** Sebagai antidefisiensi vitamin pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam air minum **Kemasan** Botol @ 1 L dan 5 L **Kementan RI No. I. 12084318** PTC. Obat bebas terbatas. ****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

ANALGESIKA, ANTIPIRETIKA DAN ANTI INFLAMASI

01.14

1. ANTI COLD

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan Mengandung metampiron **Indikasi** Analgesik dan antipiretik pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi < 16 kg: 1-3 ml. BB 16-40 kg: 3-5 ml. BB 40-75 kg: 5-15 ml. BB > 75 kg: 15-30 kg. Sapi dan kuda: 50-100 ml. Kambing/domba/anak sapi/anak kuda: 15-30 ml. Anak kambing/anak domba/anjing: 5-15 ml. Kucing/kelinci: 1-5 ml. Angsa: 0,1-5 ml. Ayam/itik umur 0-5 minggu: 0,1-0,3 ml. Umur 5-10 minggu: 0,3-0,5 ml. Umur > 10 minggu: 0,5-2 ml. Merpati/burung: 0,01-0,5 ml. Melalui suntikan secara SC atau IM **Kemasan** 50 ml dan 100 ml Deptan RI No. D. 0512236 PKC. 1. Obat keras

2. ASAGUMED

Avian Satwa Anugah

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung parasetamol 100 g, carnitine 55 g, vitamin C 200 g, vit B1 1,5 g dan sorbitol 50 g **Indikasi** Antipiretik (menurun panas/demam) pasca vaksinasi dan pada saat serangan penyakit gumboro. Memperbaiki metabolisme tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan terhadap penyakit serta mengatasi stress umum **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum dan berikan selama 5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g Deptan RI No. D. 10013775 PTS. Obat bebas terbatas

3. BIO – DEXA

Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo

Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Setiap ml mengandung dexamethasone 1,52 mg **Indikasi** Digunakan untuk kondisi infeksi atau non infeksi pada kasus inflammatory, gluconeogenic, ketosis, kegagalan fungsi hati dan gejala suhu tubuh rendah **Dosis dan Cara Pemakaian** Kuda dan sapi: 5-15 ml. Pony, pedet, babi, kambing dan domba: 1-2,5 ml. Anjing: 0,12-1 ml. Kucing: 0,12-0,25 ml **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI No. I. 12034229** PKC. Obat keras

4. BIOCOLD

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung parasetamol 100 mg, sorbitol 100 mg dan carnitine 60 mg **Indikasi** Penurun panas, mengurangi rasa sakit dan mengatasi gangguan post vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 1,5-3 g/10 kg BB (15-30 mg/kg BB/hari) selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g Deptan RI No. D. 09013547 PTS. Obat keras.

5. CIPDEX

Cipla, Ltd/Aginusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung dexamethasone sodium phosphate BP 4,4 mg (setara dengan dexamethasone BP 3,344 mg, preservatives: methyl paraben BP 0,15% w/v, propyl paraben BP 0,02% w/v **Indikasi** Antiinflamasi pada kuda, sapi, kambing, domba, babi, anjing dan kucing **KontraIndikasi** Tidak digunakan untuk kasus nefritis kronis dan hiperkortikalism dan infeksi virus pada masa viremia **Dosis dan Cara Pemakaian** Kuda

dan sapi: 10-30 mg sehari secara IM. Anak kuda, anak sapi, kambing, domba dan babi: 2-5 mg sehari secara IM. Anjing: 0,25-2 mg sehari secara IM. Kucing: 0,25-0,5 mg sehari secara IM
Waktu Henti Obat Untuk daging yang dikonsumsi dan yang berasal dari sapi: 1 hari setelah pemakaian terakhir CIPDEX baru boleh dipotong. Kuda dan Babi: 63 hari. Kambing dan domba: 91 hari. Untuk susu hasil perahan pada sapi yang diterapi CIPDEX, dibuang hasilnya setelah 2x pemerahan atau kira-kira 2 jam setelah pemakaian terakhir CIPDEX. Kambing dan domba 35 hari setelah pengobatan terakhir CIPDEX. **Kemasan** Botol kaca @ 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. I. 12094339 PKC.** Obat keras

6. DEXADRESON

Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan (injeksi) **Komposisi** Setiap ml mengandung 2,77 mg dexamethasone disodium phosphate setara dengan 2,0 mg dexamethasone **Indikasi** Penggunaan untuk anti inflamasi, anti alergi, anti shock dan bersifat glukoneogenik pada sapi, kuda, kambing, domba, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau IV. Untuk kasus shock diberikan secara IV. Pada sapi dan kuda: secara lokal dengan dosis 1-5 ml/hewan (2-10 mg), secara sistemik: 0,06 mg/kg dan secara IM. Pada kambing dan domba: secara lokal dengan dosis 1-2,5 ml/hewan (2-5 mg), secara sistemik: 0,06 mg/kg dan secara IM. Anjing dan kucing: 0,01 mg/kg secara IM **Kemasan** Vial 50 ml Deptan RI No. I. 05062390 PKC. 1. Obat keras

7. DEXAROIDE

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung dexamethasone (natrium fosfat) **Indikasi** Antiinflamasi pada sapi, kuda, domba, kambing dan hewan kecil yang digunakan untuk mengobati ketosis dan acetoneimia, kondisi shock sebelum dan sesudah operasi, pencegahan stress, alergi, uticaria, pruitus, eksim, penyakit kulit yang tidak spesifik, arthritis, tendovaginitis, bursitis, spondylitis, hernia dari cakram intervertebral, luxation, distorsi, paresis, mastitis, agalactia, tenany, uedema, otitis externa, keratitis dan pencernaan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC pada sapi: 1,3-5,0 ml/ekor/hari. Kuda: 0,5-1,3 ml/20 kg BB/ekor/hari. Domba dan kambing: 0,5-1,3 ml/10 kg/ekor/hari. Hewan kecil: 0,03-0,25 ml/ekor/hari. Dalam kasus ketosis, lakukan injeksi ulang setelah 2 hari **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml Deptan RI No. I. 10093903 PKC. Obat keras

8. DEXATOZOON INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung deksametason **Indikasi** Antiinflamasi pada sapi, kuda, kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 10-30 ml. Kambing/domba: 5-10 ml. Babi dengan BB < 40 kg: 0,5-2 ml. BB 40-75 kg: 3-5 ml. BB > 75 kg: 5-10 ml. Melalui suntikan SC atau IM **Kemasan** 100 ml Deptan RI No. D. 0510577 PKC. 1. Obat keras

9. DRYCLOXA – KEL

Kela Lab NV, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung cloxacillin benzathine **Indikasi** Pengobatan mastitis pada sapi di masa kering kandang **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Syringe 9 g Deptan RI No. I. 04082797 PKC. Obat keras

10. FLOGISTAN

Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada

Bentuk Sediaan Soluble powder **Komposisi** Tiap g mengandung guaranin 36 mg, butadion 64 mg, thiamin HCl 0,1 mg, vitamin K3 1,2 mg, tripotasium sitrat 280 mg, trisodium sitrat 210 mg dan monosodium karbonat 84 mg **Indikasi** Anti radang, penghilang nyeri, penurunan panas pada radang infeksi dan bukan infeksi seperti nefritis, bursitis, arthritis, miositis, anti gout, dan penyegar tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 1 g/L air minum, berikan selama 3 hari berturut-turut. Anjing: 1 g/6 kg BB, berikan 2-3 kali sehari. Kuda: 1 g/10 kg BB, berikan 2-3 kali sehari **Kemasan** 100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg Deptan RI No. D. 02082291 PKS. 1. Obat keras

11. FLUNIXIN INJECTION

Norbrook Laboratories Ltd., Inggris/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung flunixin **Indikasi** Untuk mengurangi inflamasi karena gangguan muskuloskeletal dan kronik yang berhubungan dengan kolik pada kuda dan mengurangi inflamasi akut oleh penyakit respiratori pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 50 ml dan 100 ml Deptan RI No. I. 0609851 PKC. 1. Obat keras

12. FLUNIXVET INJ

Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung flunixin meglumine **Indikasi** Antiinflamasi pada kuda dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IV. Pada kuda dengan kasus equine kolik: 1,1 mg/kg BB (1 ml/45 kg BB) dengan injeksi secara IV yang diulangi sekali atau dua kali jika kolik kembali terjadi. Kelainan muskuloskeletal: 1,1 mg/kg BB (1 ml/45 kg BB) dengan injeksi secara IV sehari sekali hingga 5 hari. Sapi: 2,2 mg/kg BB (2 ml/45 kg BB) dengan injeksi secara IV yang diulangi jika diperlukan pada interval waktu 24 jam hingga 5 hari **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. I. 12054282 PKC.** Obat keras

13. LACTACLOX

Norbrook Laboratories Ltd., Inggris/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung cloxacillin dan ampicilin **Indikasi** Pengobatan mastitis pada sapi perah **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Strip berisi 6 syringe masing-masing berisi 5 ml **Deptan RI No. I. 03122083 PKM.** 1. Obat keras

14. NEOPROFEN INJECTION

Pfizer Animal Health India Ltd., India/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ketoprofen 100 mg/ml dan L-arginin 70 mg/ml **Indikasi** Analgesik dan antipiretik bagi sapi, kerbau, babi, kambing, domba, kuda, anjing dan kucing **Perhatian** Gunakan sesuai petunjuk dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi, kerbau, babi, kambing dan domba: 3 mg/kg BB (1 ml/ 33 kg BB) secara IM, IV atau SC selama 3-5 hari. Untuk kuda: 2,2 mg/kg (1 ml/kg BB) secara IM atau SC selama 3-5 hari. Untuk anjing dan kucing: 2 mg/kg BB (1 ml/50 kg BB) secara IM atau IV selama 3-5 hari **Kemasan** Botol 100 ml **Kementan RI No. I. 11094146 PKC.** Obat keras

15. NOVALDON

Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung metampiron 250 mg,

SEDIAAN FARMASETIK

Analgesika, Antipiretika dan Anti Inflamasi

piramidon 50 mg, lidokain 15 mg **Indikasi** Sebagai antipiretik, analgesik, anti inflamasi dan spasmolitik pada kolik intestinal **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui IM. Sapi/kuda: 10-20 ml/ekor. Kambing/domba: 3-5 ml/ekor. Anjing/kucing: 1-2 ml/ekor **Kontra Indikasi** Tidak dianjurkan pada kerusakan jantung, hati dan ginjal. Pada hewan pacu, jangan dipakai 3-5 hari sebelum lomba. Jangan diberikan bersama dengan fenilbutazon dan klorpromasin **Kemasan** 50 ml, 100 ml **Deptan RI** No. D. 02062183 PKC. 1. Obat keras

16. PIRETAMAS

Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung parasetamol **Indikasi** Menurunkan panas tubuh pada saat infeksi penyakit (Gumboro, CRD, dll) **Dosis dan Cara Pemakaian** Oral. Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** Sachet 100 g dan 250 g **Kementan RI** No. D. 12124405 PTS. Obat bebas terbatas

17. RIMADYL

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kaplet **Komposisi** Setiap kaplet mengandung carprofen 25 mg, 75 mg atau 100 mg **Indikasi** Meringankan rasa sakit dan peradangan pada anjing. Efektif untuk mengurangi gejala klinis yang berhubungan dengan osteoarthritis pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara peroral 1 mg/BB 2x sehari Perhatian Jangan diberikan pada anjing yang hipersensitivitas terhadap carprofen **Kemasan** Botol isi 60 kaplet, 100 kaplet dan 250 kaplet **Deptan RI** No. I. 03122689 PKM. Obat keras

18. SULPIDON INJEKSI

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung dipyrone dan lidokai **Indikasi** Digunakan sebagai analgesik, antipiretik dan antispasmodik pada sapi, kuda, kambing, domba, babi, anjing dan kucing Perhatian Air susu sapi boleh dikonsumsi 2 hari setelah pengobatan dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 10-20 ml/200-400 kg BB. Domba dan kambing: 5-10 ml/30-60 kg BB. Babi: 10 ml/50-100 kg BB. Anjing dan kucing: 3-6 ml/5-10 kg BB **Kemasan** 20 ml, 50 ml dan 100 ml **Deptan RI** No. D. 0510975 PKC. 1. Obat keras

19. TOLFEDINE CS INJECTION

Vetquinol SA, Perancis/Aginusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung tolfenamic acid **Indikasi** Antiinflammatory non steroid, analgesik, antipiretik pada sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: untuk penyakit respirasi dosis 2 mg/kg (1 ml/20 kg BB) secara IM dan pengobatan diulangi kembali setelah 48 jam. Mengobati mastitis: 4 mg/kg BB (1 ml/10 kg BB) dosis tunggal secara IV. Babi: 2 mg/kg BB (1 ml/20 kg BB) dengan injeksi tunggal secara IM **Kemasan** Botol 50 ml, 100 ml dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 08083488 PKC. Obat keras.****

HORMON REPRODUKSI**01.15****1. BIO – OXYTOCIN****Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo****Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama****Bentuk Sediaan** Cairan dalam botol **Komposisi** Setiap ml mengandung oxytocin 10 IU

Indikasi Support partus normal, mencegah haemoragi uterus, terapi suportif terhadap retensi plasenta, metritis dan stimulasi air susu **Dosis dan Cara Pemakaian** Induk babi: obstetric: 30-50 IU, produksi air susu: 5-20 IU. Sapi: obstetric: 75-100 IU, produksi air susu: 10-20 IU. Anjing betina: obstetric: 5-25 IU, produksi air susu: 2-10 IU. Kucing: 5-10 IU, produksi air susu: 1-10 IU. Dengan injeksi secara IM atau SC atau IV secara perlahan tiap 3-4 jam **Kemasan** Botol 50 ml **Kementan RI No. I. 12074314 PKC.** Obat keras

2. BIOTOCIN**Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada****Bentuk Sediaan** Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung oksitosin 10 IU **Indikasi**

Membantu pengeluaran air susu pada hewan yang sedang laktasi. Mempercepat pengeluaran janin pada diagnosa inertia uterin. Membantu pengeluaran sisa plasenta. Membantu pengembalian rahim ke bentuk semula setelah melahirkan. Kontraksi usus lemah, atonia uteri, lokiometra, prolaps uteri dan pendarahan uterus **Kontra Indikasi** Distokia pada posisi abnormal, premature, torsio uteri, janin terlalu besar, hiperkontraksi uterus, tetanus uteri dan ruptur uteri **Perhatian** Kelebihan dosis akan mengakibatkan spasmus uteri, ruptur uteri dan takikardia **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM atau SC. Kuda/sapi: 4-6 ml/ekor. Kambing/domba: 1-2 ml/ekor. Babi: 1-3 ml/ekor. Anjing/kucing: 0,25-1 ml/ekor **Kemasan** 50 ml Deptan RI No. D. 0204107 PKC. Obat keras

3. CAPRIGLANDIN Inj.**Caprifarmindo**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung dinoprost tromethamine **Indikasi** Hormon reproduksi untuk penyerentak birahi pada sapi, kuda dan babi. Pengobatan endometritis kronis dan pyometra, birahi tenang dan mengatur kelahiran **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM. Sapi: 5ml/ekor. Kuda: 5 ml/ekor. Babi: 2 ml/ekor **Kemasan** 10 ml, 20 ml dan 50 ml Deptan RI No. D. 08053440 PKC. Obat keras

4. CAPRITOCIN Inj.**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung oxytocin **Indikasi** Memperlancar produksi air susu. Membantu proses kelahiran. Membantu penyembuhan kasus metritis dan retensio sekundinarum **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi IM. Sapi: 1,5-10 ml/ekor. Babi, kambing, domba: 0,5-5 ml/ekor. Anjing: 0,25-3 ml/ekor. Kucing: 0,05-0,8 ml/ekor **Kemasan** 10 ml, 20 ml, 50 ml dan 100 ml Deptan RI No. D. 08053432 PKC. Obat keras

5. CHORULON**Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku untuk injeksi **Komposisi** Setiap vial mengandung 1.500 IU hormon HCG (human chorionic gonadotropin) **Indikasi** Kontrol masalah fertilitas (induksi ovulasi, sistoovaria, anestrus, ovulasi yang tertunda, kurang libido dan cryptorchidism) pada

sapi, anjing dan kuda Perhatian Simpan obat pada suhu 8150C **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 1.500 IU secara IM atau IV. Kuda betina: 1.500-3.000 IU secara IM atau IV. Anjing: 100-500 IU secara IM **Kemasan** Vial berisi 1.500 IU dan 5.000 IU HCG + pelarut Deptan RI No. I. 0510413 PKS. 2. Obat keras

6. FERTAGYL

Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Tiap ml mengandung 0,1 mg gonadorelin **Indikasi** Sistikovari, perbaikan fertilitas pre dan post partus **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 2,5-5 ml secara IM. Kelinci: 0,2 ml secara IM **Kemasan** Vial 5 ml Deptan RI No. I. 0504165 PKC. 2. Obat keras

7. FOLLIGON

Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Pelet **Komposisi** Setiap vial mengandung hormon PMSG (pregnant mare serum gonadotrophin) 1.000 IU **Indikasi** Anestrus, superovulasi, perbaikan fertilitas, spermatogenesis yang kurang baik pada hewan jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi betina: 300-3.000 IU, sapi jantan: 1.500-3.000 IU, pemberian secara IM. Kuda betina: 2.000 IU, kuda jantan: 1.500-3.000 IU, pemberian secara IM. Domba betina: 400-750 IU, domba jantan 500-1.000 IU, pemberian secara IM. Kambing betina: 1.000 IU, kambing jantan 500-1.000 IU, pemberian secara IM. Babi: 1.000 IU, pemberian secara IM. Anjing betina: 50-200 IU, anjing jantan: 400-1.000 IU, pemberian secara IM. Kucing jantan: 400-1.000 IU, pemberian secara IM **Kemasan** Vial 1.000 IU + pelarut Deptan RI No. I. 0512415 PKC. 2. Obat keras

8. GONASER

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap ml mengandung serum gonadotrophin (PMSG) 100 IU **Indikasi** Domba/kambing/sapi: anestrus, superovulasi, sinkronisasi estrus dan merangsang perkembangan follikel ovarium **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara IM pada sapi: 2.000 IU/ekor, domba/kambing: 300-600 IU/ekor **Kemasan** Vial 5 ml Deptan RI No. I. 04012210 PKC.1 Obat keras

9. GONAVET VEYX

Veyx Pharma GmbH – Jerman/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung gonadorelin [6-D-Phe] asetat **Indikasi** Babi: sinkronisasi ovulasi untuk inseminasi waktu selama dengan metode peningkatan pada kelompok sow, tetapi juga untuk optimisasi kecepatan dan penampilan reproduksi. Cattle: Induksi ovulasi pada kasus penundaan ovulasi kedua untuk defisiensi LH yang insufisien, dan sinkronisasi ovulasi untuk sinkronisasi estrus, stimulasi ovarium pada puerperium pada hari ke 12 postpartum serta cysts ovarium dari defisiensi LH. Kuda: acycilia dan anestrus (saraf pusat LH – defisien insufisiensi siklus reproduksi) dan induksi ovulasi (reduksi waktu panas) **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC. Sows: 0,50-1,0 ml, (sinkronisasi) setara dengan 25-50 µg gonadorelin [6-D-Phe]. Gilts: 1,0-1,5 ml, (sinkronisasi) setara dengan 50-75 µg gonadorelin [6-D-Phe]. Mares: 2,0-3,0 ml, setara dengan 100-150 µg gonadorelin [6-D-Phe]. Heifers: 1,0-2,0 ml, setara dengan 50-100 µg gonadorelin [6-D-Phe] **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml dan 50 ml **Kementan RI No. I. 12074300 PKC.** Obat keras

- 10. HORMONIPRA** **HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap ml mengandung oksitosin 10 IU **Indikasi** Membantu proses partus/atoni uterus, memperlancar sekresi dan ekskresi air susu setelah partus, retensio plasenta dan metritis **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara SC/IM/IV. Pada Sapi: 5-7 ml/ekor. Babi: 3-5 ml/ekor **Kemasan** Vial 10 ml Deptan RI No. I. 03072203 PKC. 1. Obat keras

- 11. INTERTOCIN – S** **Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Setiap ml mengandung oxytocin sintesis dengan konsentrasi 10 IU/ml **Indikasi** Stimulasi kontraksi uterus, mempercepat involusi uterus post partus, mengontrol perdarahan post partus dan membantu “milk let down” pada kasus agalactia **Kontra Indikasi** Pada kasus distokia “obstructive”, jika digunakan untuk membantu kelahiran dan serviks harus sudah terbuka **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC atau IM untuk kuda: 0,5-5 ml. Sapi: 1-5 ml. Domba, kambing dan babi: 0,5-3 ml. Anjing: 0,2-1 ml. Kucing: 0,1-0,5 ml **Kemasan** Vial 10 ml, 25 ml dan 50 ml Deptan RI No. I. 05041147 PKC. 2. Obat keras

- 12. JURAMATE** **Jurox Pty Ltd, Australia/Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung cloprostenol sodium **Indikasi** Hormon untuk pengobatan dan kontrol siklus estrus pada sapi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 20 ml dan 100 ml Deptan RI No. I. 09043610 PKC. Obat keras

- 13. LACTAGEN INJEKSI** **Wonderindo Pharmatam**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung oxytocin, vit B1, B2, nicotinamid dan calcium pantotenat **Indikasi** Hormon untuk membantu dan mendorong kemampuan berlaktasi pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: 2,5-5 ml. Sapi, kuda: 10-25 ml. Domba, kambing: 2,5-5 ml. Anjing: 1,5-2,5 ml. Kucing, kelinci: 0,5-1,5 ml. Diberikan melalui suntikan SC atau IM **Kemasan** 5 ml, 10 ml, 20 ml dan 50 ml Deptan RI No. D. 0702320 PKC. 1. Obat keras

- 14. LUTALYSE** **Pfizer Inc., Belgium/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap ml mengandung dinoprost tromethamin 5 mg dan benzyl alcohol 9,45 mg **Indikasi** Penyeragaman birahi, pengobatan endometritis kronis dan pyometra, pengobatan birahi tidak kentara (silent heat) dan korpus luteum persisten, agen penggugur kandungan serta mengatur kelahiran **Dosis dan Cara Pemakaian** Pengaturan estrus pada sapi dan kuda: sebanyak 5 ml secara IM, diberikan 4 hari setelah estrus. Induksi abortus sapi: 5-7 ml secara IM dapat digunakan hingga kebuntingan di atas 150 hari. Kuda: 5 ml secara IM dapat digunakan hingga kebuntingan 35 hari. Induksi kelahiran sapi: 5-7 ml secara IM pada atau setelah umur kebuntingan 270 hari dengan interval pemberian 1-8 hari. Babi: 2 ml secara IM diberikan 3 hari sebelum kelahiran dijadwalkan. Metritis kronis dan pyometra pada sapi: 5 ml secara IM, 2-3 minggu setelah kelahiran dan diulang selama 10-12 hari **Kemasan** Vial 10 ml Deptan RI No. I. 0708113 PKS. 3. Obat keras

- 15. MAPRELIN** **Veyx Pharma GmbH – Jerman/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung peforelin/gonadorelin [5-His, 6-Asp, 7-Trp, 8-Lys] **Indikasi** Untuk penggunaan bioteknikal dan intended untuk kelompok atau pengobatan herd. Induksi siklus estrus pada induk babi setelah weaning dan induksi estrus pada seksualitas gilt yang matang pada terapi untuk menghambat siklus estrus dengan progesterone **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM dengan dosis peforelin dalam μg dan maprelin dalam ml/hewan (dosis bergantung paritas). Primiparous sows 24 jam setelah weaning off piglet: 37,5 μg = 0,5 ml. Pluriparous sows 24 jam setelah weaning off piglet: 150 μg = 2,0 ml. Gilts 48 jam setelah terminasi medikasi untuk menghambat siklus: 150 μg = 2,0 ml. Untuk aplikasi tunggal. Gunakan alat siring otomatis untuk vial 50 ml dan 100 ml **Kemasan** Botol 10 ml, 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. I. 12034242 PKC.** Obat keras
- 16. NOROPROST** **Norbrook Lab-UK/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung prostaglandin F₂ alpha **Indikasi** Hormon untuk pengobatan terhadap gangguan reproduksi pada ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 ml/ekor **Kemasan** Vial 10 ml dan 30 ml **Deptan RI No. I. 03112683 PKC.** Obat keras
- 17. OESTRADIOL BENZOAT** **Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Setiap vial mengandung oestradiol benzoat 5 mg/ml **Indikasi** Metritis dan pyometra, salah kawin (mesalliance), kesulitan kencing, prostatitis, prostat hiperplasia dan kelebihan libido **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 0,006 mg/kg, secara IM. Anjing betina: 0,01 mg/kg, secara IM atau SC. Anjing jantan: 0,03 mg/kg, secara IM atau SC **Kemasan** Vial 10 ml **Deptan RI No. I. 05120330 PKC. 2.** Obat keras
- 18. OVALUMON INJEKSI** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung ethinyl estradiol **Indikasi** Pengobatan hormon terhadap gangguan reproduksi pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 5 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 5-10 ml. Kuda: 2-5 ml setiap hari selama 5 hari. Babi, domba, kambing: 2-3 ml diberikan tiap tiga hari sekali. Anjing/kucing: 0,5-2 ml diberikan tiap tiga hari sekali. Diberikan melalui suntikan SC atau IM **Kemasan** 20 ml dan 30 ml **Deptan RI No. D. 0604322 PKC. 1.** Obat keras
- 19. OXYTOCIN – 10** **Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi Komposisi Tiap ml mengandung oksitosin 10 IU **Indikasi** Meningkatkan kontraksi otot halus uterus. Mempercepat involusi uteri. Mengatasi kasus retensio secundinarum, atoni uterus, lochiometra, hemoragi uteri, agalactia post partus pada sapi, kuda, domba, kambing, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC. Kuda dan sapi: 4-5 ml. Babi: 2-4 ml. Domba dan kambing: 1-3 ml **Kemasan** Vial 50 ml **Deptan RI No. D. 08053422 PKC.** Obat keras

20. OXYTOCIN INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung oxytocin **Indikasi** Hormon untuk membantu mendorong kemampuan berlaktasi pada hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, kuda: 10 ml. Babi: 3-5 ml. Kambing/domba: 3-5 ml. Anjing: 0,5-3 ml. Kucing 0,5-1 ml. Kelinci: 0,1-0,2 ml. Untuk merangsang pengeluaran air susu: 1-2 ml. Untuk pengobatan mastitis pada sapi: 2-4 ml. Diberikan melalui suntikan secara SC, IM atau IV pelan **Kemasan** 5 ml, 10 ml, 20 ml dan 50 ml Deptan RI No. D. 0604332 PKC. 1. Obat keras

21. OXYTOCIN VET

Veyx Pharma GmbH – Jerman/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung oxytocin **Indikasi** Sebagai hormon untuk pengobatan reproduksi pada kuda, sapi, kambing, domba, babi, anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IV, IM atau SC **Kemasan** Botol 50 ml dan 100 ml **Kementan RI No. I. 11064105 PKC.** Obat keras

22. OXYTOCINA PITUITARIA

**Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/
Megan Galus Kinantan**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap 1 ml mengandung sintetik oxytocin 20 IU **Indikasi** Merangsang otot polos yang digunakan pada masa kelahiran (merangsang kontraksi otot uterus), retention secundarium, atoni uterus, inertia uterine primer dan sekunder. Merangsang produksi susu pada kasus agalactia. Kombinasi dengan antibiotic pada kasus metritis distokia, mechanic obstruction, kelainan uterus, penyakit kardiovaskular dan ukuran foetus yang terlalu besar **Waktu Henti Obat** 2 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IM atau IV. Jika dibutuhkan dapat diulang setelah 30 menit. Gangguan kelahiran sapi: 3,7-5,0 ml. Kuda: 3,7-7,5 ml. Babi, kambing, domba: 1,5-2,5 ml. Anjing: 0,25-1,25 ml. Kucing: 0,25-0,5 ml. Gangguan pengeluaran susu (agalactia) pada sapi dan kuda: 0,5-1,0 ml. Babi, kambing, dan domba: 0,25-1,0 ml. Anjing, dan kucing: 0,05-0,5 ml **Kemasan** 50 ml Deptan RI No. I. 03031407 PKS. 1. Obat keras

23. PG 600

Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Pelet injeksi **Komposisi** Setiap vial mengandung 400 IU PMSG (pregnant mare serum gonadotropin) dan 200 IU HCG untuk babi **Indikasi** Memulai siklus estrus, memperbanyak jumlah anak/kelahiran, anestrus, pemeriksaan kebuntingan serta induksi estrus pada dara **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan** Vial dosis tunggal + pelarut dan vial 5 dosis + pelarut Deptan RI No. I. 0512440 PKC. 2. Obat keras

24. PGF VEYX FORTE

Veyx Pharma GmbH – Jerman/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung cloprostenol sodium **Indikasi** Untuk sinkronisasi estrus pada sapi dan babi, anestrus, purulen genital yang hebat atau pada kasus pyometra yang disebabkan karena siklus progesteron dihambat. Induksi aborsi sampai pada hari ke 120 kehamilan. Mumifikasi fetus. Induksi parturisi dari hewan peliharaan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC pada sapi: 2,0 ml/ekor dan babi: 0,7 ml/ekor **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml dan 50 ml **Kementan RI No. I. 11084131 PKC.** Obat keras

25. PGF VEYX

Veyx Pharma GmbH – Jerman/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung cloprostenol sodium **Indikasi** Untuk sinkronisasi estrus pada sapi dan babi, anestrus, purulen genital yang hebat atau pada kasus pyometra yang disebabkan karena siklus progesteron dihambat. Induksi aborsi sampai pada hari ke 120 kehamilan. Mumifikasi fetus. Induksi parturisi dari hewan peliharaan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC, pada sapi: 5,7 ml/ekor dan babi: 2,0 ml/ekor **Kemasan** Botol 10 ml, 20 ml dan 50 ml **Kementan RI No.** I. 11054080 PKC. Obat keras

26. PLUSET

Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan

Bentuk Sediaan Bubuk dan cairan pelarut **Komposisi** 1 vial terdiri dari follicle-stimulating hormone (FSH) 500 IU dan luteinizing hormone (LH) 500 IU. 1 vial pelarut terdiri dari chlorocresol 0,02 g dan sterile, pyrogen-free 20 ml **Indikasi** Induksi super ovulasi **Kontra Indikasi** Jangan diberikan pada sapi yang sedang hamil **Dosis dan Cara Pemakaian** Pluset yang telah dilarutkan (dengan pelarutnya) hanya diberikan melalui suntikan secara IM **Kemasan** 20 ml **Deptan RI No.** I. 03052577 VKS. Obat keras

27. POTAHORMON INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung progesteron **Indikasi** Pengobatan hormon terhadap gangguan reproduksi pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 5 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Habitual aborsi, lahir dini pada sapi, kuda: 15-30 ml. Babi: 6-10 ml. Domba/kambing, anjing: 3-10 ml. Hipoplasia ovarium, subestrus, ovulasi tidak teratur pada sapi, kuda: 8-10 ml. Babi: 3-5 ml. Domba/kambing, anjing: 2-5 ml. Milchmangel pada sapi, kuda: 8-15 ml. Babi: 6-12 ml. Domba/kambing, anjing: 2-5 ml. Kista ovarii pada sapi, kuda: 15-30 ml. Babi: 6-20 ml. Domba/kambing, anjing: 3-10 ml. Retensi plasenta pada kuda: 15-60 ml. Babi: 6-20 ml. Domba/kambing, anjing: 6-20 ml. Repeat breeder pada sapi, kuda: 15 ml. Diberikan melalui suntikan SC atau IM **Kemasan** 20 ml **Deptan RI No.** D. 0604406 PKC. 1. Obat keras

28. PROSTAVET – C

Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Larutan injeksi **Komposisi** Mengandung etiproston (PGF 2 α) **Indikasi** Pengobatan terhadap gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau (endometritis kronis, subestrus, anestrus). Menginduksi kelahiran dan luteolisis serta pengaturan siklus estrus **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (2 ml), injeksi IM. (Pada pemberiannya tergantung kasus) **Kemasan** Vial 2 ml **Deptan RI No.** I. 0507990 PKC. 3. Obat keras

29. TESTOHORMON INJEKSI

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung testosteron propionat **Indikasi** Pengobatan hormon terhadap gangguan reproduksi pada hewan **Perhatian** Jangan diberikan 2 hari sebelum hewan dipotong untuk dikonsumsi dagingnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Mal-perkembangan anak babi: 0,5-1 ml. Babi: 3-5 ml. Sapi, kuda: 5-10 ml. Kambing/domba: 3-5 ml. Anjing: 1-5 ml. Kucing/kelinci: 0,5-1 ml. Angsa/kalkun: 0,1-1 ml. Ayam/itik/merpati/puyuh: 0,1-0,5 ml.

Obat yang bekerja secara lokal (Mata, telinga, mulut, kuku, ambing, kulit dan mukosa)

Pada kasus yang berat diberikan seminggu sekali melalui suntikan SC atau IM **Kemasan** 20 ml dan 30 ml **Deptan RI** No. D. 0604080 PKC. 1. Obat keras. ****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

OBAT YANG BEKERJA SECARA LOKAL

01.16

(Mata, Telinga, Mulut, Kuku, Ambing, Kulit dan Mukosa)

- 1. ANTI PICK** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Salep **Komposisi** Mengandung crecylie acid 10% **Indikasi** Mengobati luka dan mencegah kanibalisme **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Oleskan pada luka **Kemasan** Wadah plastik 20 g **Deptan RI No.** D. 0701148 PBM. 2. Obat bebas
- 2. CIL** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Salep **Komposisi** Mengandung formaldehyde solution 1,6% **Indikasi** Untuk pengobatan cacar, infeksi dan luka **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Oleskan pada bagian yang luka **Kemasan** Wadah plastik 18 g **Deptan RI No.** D. 0703145 PTU. 2. Obat bebas terbatas
- 3. CLOXALAK** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung cloxacillin dan ampicillin **Indikasi** Mengobati mastitis periode laktasi **Perhatian** Air susu dapat dikonsumsi 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 1 syringe/kuartir. Kambing dan domba: ½ syringe/kuartir **Kemasan** Dus isi 6 syringe @ 5 ml **Deptan RI No.** D. 0010102 PKC. Obat keras
- 4. CLOXALENE DRY COW** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung cloxacillin benzathine **Indikasi** Mengobati mastitis pada sapi masa kering kandang **Kontra Indikasi** (Bila ada) Obat tidak boleh diberikan pada sapi yang produksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi satu dosis syringe untuk setiap quartir setelah pemerahan terakhir pada saat kering kandang **Kemasan** Box 12 syringe **Deptan RI No.** I. 0601193 PKC. 1. Obat keras
- 5. DENFUS SPRAY** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung thiamphenicol **Indikasi** Pengobatan terhadap infeksi kuku pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Disemprotkan langsung pada luka **Kemasan** Tabung spray 175 g (250 ml) **Deptan RI No.** I. 06013035 PKM. Obat keras
- 6. DORIS SKIN CARE POWDER** **Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung acidum salicylicum, balsamum peruvianum, mentholum, sulfur praecipitatum dan zinc oxidum **Indikasi** Mengatasi gatal-gatal pada binatang yang disebabkan oleh penyakit kulit seperti kudis, kurap, koreng, jamur. Memberikan rasa sejuk dan segar pada kulit. Menghasilkan wewangian yang harum dan tahan lama bagi binatang **Dosis dan Cara Pemakaian** Tuangkan keseluruhan permukaan kulit dan gosok. Ulangi 2-3 kali/hari **Kemasan** Botol 100 g **Deptan RI No.** I. 08043400 PTS. Obat bebas terbatas

7. **DRYCLOX** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung cloxacillin dan ampicillin **Indikasi** Mengobati mastitis periode kering kandang pada sapi, kambing dan domba **Perhatian** Pemotongan hewan dapat dilakukan 10 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 1 syringe/kuartir. Kambing dan domba: ½ syringe/kuartir **Kemasan** Dus isi 6 syringe @ 5 ml **Deptan RI No. D. 06021043 PKC. 1. Obat keras**
8. **IMAVEROL** **Elanco Animal Health, Belgia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Larutan Komposisi Mengandung enilconazole 100 mg/ml **Indikasi** Pengobatan dermatophytosis pada anjing, kuda dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Encerkan dengan air hangat (1/50) sampai diperoleh konsentrasi 2.000 ppm. Pengobatan diberikan secara topikal sebanyak 4 kali dengan interval 3-4 hari. Pada kasus yang persisten, pengobatan dapat dilanjutkan sampai terjadi kesembuhan **Kemasan** Botol 100 ml dan 1 L **Kementan RI No. I. 11044041 PTC. Obat bebas terbatas**
9. **MASTILAK** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung procaine penicillin G dan dihydrostreptomycin **Indikasi** Mengobati mastitis periode laktasi pada sapi, kambing dan domba **Perhatian** Air susu dikonsumsi 3 hari setelah pemberian obat dihentikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi: 1 syringe/kuartir. Kambing dan domba: ½ syringe/kuartir **Kemasan** Dus isi 6 syringe @ 5 ml **Deptan RI No. D. 0012778 PKC. Obat keras**
10. **NEO BLUE** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung methylen blue dan gentian violet **Indikasi** Mengobati cacar, luka-luka, infeksi kulit pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dioleskan di bagian luka **Kemasan** 60 ml dan 1 L **Deptan RI No. D. 0512620 PTC. 1. Obat bebas terbatas**
11. **PYRIKOL – DROPS** **Pyridam Veteriner**
Bentuk Sediaan Cairan tetes mata Komposisi Mengandung chloramphenicol 0,5% **Indikasi** Mengobati iritasi dan infeksi pada mata hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Teteskan 2-3 tetes pada mata yang mengalami iritasi dan infeksi **Kemasan** 5 ml, 10 ml dan 30 ml **Kementan RI No. D. 13014430 PKC. Obat keras**
12. **SULFANILAMIDE SALEP** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Salep Komposisi Mengandung sulfanilamide **Indikasi** Mengatasi luka-luka infeksi pada kulit **Perhatian** Hanya untuk pemakaian luar **Dosis dan Cara Pemakaian** Dioleskan di bagian luka sekali atau dua kali sehari **Kemasan** 75 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI No. D. 0510074 PTM. 1. Obat bebas terbatas**
13. **SUROLAN** **Elanco Animal Health, Belgia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Larutan Komposisi Mengandung miconazole nitrate, prednisolon acetate dan polymixin B sulfate **Indikasi** Pengobatan otitis eksterna dan dermatitis pada anjing dan

kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian secara topikal atau tetes telinga **Kemasan** Botol 15 ml dan 30 ml **Kementan RI No. I. 11104161 PTC.** Obat bebas terbatas

14. WONDER IODINE SPRAY

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung iodium dan kalii iodidum **Indikasi** Desinfeksi kulit pada semua spesies hewan **Perhatian** Hanya untuk pemakaian luar **Dosis dan Cara Pemakaian** Semprotkan pada bagian yang luka **Kemasan** 100 ml dan 250 ml **Deptan RI No. D. 06043076 PTC.** Obat bebas terbatas.****

Bab II.

Paparan Pemerian Sediaan

Biologik

Paparan pemerian (*Description*) obat hewan disusun sesuai dengan golongan obat hewan berdasarkan farmakologi. Dalam setiap kelompok, sediaan obat hewan disusun menurut alfabetis nama dagangnya. Secara umum penyusunan materi ini dimulai dari nama obat hewan, nama produsen, nama importir (bila ada), nama distributor, **bentuk sediaan, komposisi, indikasi**, kontra **indikasi** (bila ada), peringatan (bila ada), dosis, cara pemakaian, kemasan, nomor pendaftaran dan klasifikasi obat hewan. Paparan sediaan ini disusun sejauh mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

BAB II. SEDIAAN BIOLOGIK

02

WAKSIN UNGGAS

02.01

1. **ADENIPRAVAC ND/IB** **HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum $1,3 \times 10^8 \text{EID}_{50}$, virus *IB strain H52* inaktif titer minimum 10^8EID_{50} dan virus *EDS'76 strain Adeno 127* inaktif titer minimum 500 HAU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap ND, IB dan EDS'76 **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara IM/SC **Kemasan** Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04052218 VKC. 1. Obat keras
2. **ADENIPRAVAC TRIPLE** **HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum $3 \times 10^8 \text{EID}_{50}$, virus *EDS'76 strain Adeno 127* inaktif titer minimum 500 HAU dan virus *IBD strain W2512* inaktif titer minimum 10^5EID_{50} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap ND, EDS'76 dan IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara IM/SC **Kemasan** Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07033188 VKC. Obat keras
3. **AE VAC** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Avian encephalomyelitis strain AE-67* **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Avian encephalomyelitis* (epidemic tremor) pada ayam petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat. Jangan diberikan pada ayam yang berproduksi dan jika diberikan pada saat berproduksi akan menurunkan produksi telur 10-15% selama 10 hari 2 minggu. Telur-telur jangan ditetaskan sebelum 4 minggu sebelum vaksinasi. Hentikan pengobatan dan pemberian desinfektan pada air minum dalam 24 jam sebelum vaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus dingin, bersih, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu *skim*). Vaksin ini jangan diberikan dengan penggunaan tempat air minum otomatis atau melalui tangki pengobatan lain. Hentikan pemberian air minum selama 2-4 jam sebelum vaksinasi. Jika suhu udara terlalu panas, air minum tetap diberikan **Dosis dan Cara pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui air minum/cekok pada ayam umur 10 minggu atau paling lambat 4 minggu sebelum bertelur. Untuk 1.000 dosis perlu dicampur dalam 4 galon air minum (15,2 L) **Kemasan** Box vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0303431 VTS. 2. Obat bebas terbatas
4. **AE + POX** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif AE strain Calnek minimum $102,80 \text{EID}_{50}$ dan virus POX strain Cutter minimum $102,74 \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit Avian Encephalomyelitis dan Fowl pox pada unggas **Perhatian**

Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat Dosis dan Cara Pemakaian 1 dosis melalui tusuk sayap Kemasan Vial 1.000 dosis Deptan RI No. I. 05042328 VTS. 1. Obat bebas terbatas

5. **AE** **AAKO BV-Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *AE strain Calnek 1143* minimum $10^{6.2}$ CFU/dosis **Indikasi** Pengebalan penyakit *AE* unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan** 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042567 VKS. TML. Obat keras
6. **AE – POXINE** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Avian encephalomyelitis strain AE-67* dan virus aktif *Fowl pox* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Avian encephalomyelitis* (epidemic tremor) dan *Fowl pox* (cacar unggas) pada ayam petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat. Jangan diberikan pada ayam yang berproduksi dan berumur kurang dari 3 minggu atau sedang sakit. Jika diberikan pada saat berproduksi akan menurunkan produksi telur 10-15% selama 10 hari hingga 2 minggu. Telur-telur jangan ditetaskan sebelum 4 minggu dari saat vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam. Diberikan melalui tusuk sayap (*wing web*) pada ayam sehat antara umur 8 minggu sampai 4 minggu sebelum mulai bertelur **Kemasan** Tiap kotak isi 10 vial @ 1.000 dosis dan dilengkapi dengan 4 buah alat penusuk (*stabvaccinator*). Tiap vial vaksin dilengkapi dengan pelarut **Deptan RI** No. I. 0405965 VTS. 2. Obat bebas terbatas
7. **AVABRON HN – G3** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND strain LaSota minimum 106,56EID50 dan IB tipe Mass strain Holland minimum 103,6EID50 **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Perhatian** Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0312707 VTS. 2. Obat bebas terbatas
8. **AVAPOX** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif POX strain Cutter minimum 102,74EID50 **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit Fowl pox pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tusuk sayap **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0309422 VTS. 2. Obat bebas terbatas
9. **AVI IB H120** **Laprovot, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IB strain H120* minimum $10^{3.5}$ TCID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor diberikan melalui air minum, tetes mata dan tetes hidung **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12111216 VTS. 1. Obat bebas terbatas

10. **AVI IBD INTER** **Laprovect, Hungaria/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IBD strain LIBDV* minimum $10^{3.0} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis diberikan melalui air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0107117 VKS-TM. Obat keras
11. **AVI ND LASOTA + IB H120** **Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *ND strain LaSota* minimum $10^{5.5} \text{TCID}_{50}$ dan *IB strain B-48* minimum $10^{2.6} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor diberikan melalui air minum atau tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 11121201 VTS. 1. Obat bebas terbatas
12. **AVI ND LASOTA** **Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif ND strain LaSota minimum $10^{5.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum dan tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 1201774 VTS. 1. Obat bebas terbatas
13. **AVIAN INFECTIOUS CORYZA VACCINE, INACTIVATED** **QYH Biotech Company Limited, China/Lito Prima Mandiri**
Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *H. Paragallinarum serotype A strain C-H-pg-8* sebelum diinaktivasi dan *serotype C strain Hpg-668* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Memberikan pencegahan terhadap penyakit coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Kementan RI** No. I. 12074304 VTC. Obat bebas terbatas
14. **AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5 SUBTYPE, N28 STRAIN)** **Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine Co., Ltd China/Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Minyak emulsi putih susu **Komposisi** Setiap botol mengandung 500 dosis virus inaktif *Avian influenza subtype H5 strain N28* **Indikasi** Vaksin ini digunakan untuk vaksinasi inaktif pada ayam untuk melawan virus *Avian influenza* (flu burung) **Dosis dan Cara Pemakaian** Umur 2-5 minggu: 0,3 ml/ekor secara SC di bagian leher/suntik di otot dada. Umur diatas 5 minggu: 0,5ml/ekor secara SC di bagian leher/suntik di otot dada **Kemasan** 400 botol/karton **Deptan RI** No. DPS. I. 0702192 VKC. Obat keras
15. **AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5N2 SUBTYPE)** **Harbin WeiKe Bio-Technology Development Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia**
Bentuk Sediaan Emulsi berwarna putih susu **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *AI strain A/Turkey/England/N28/73 subtype H5N2* minimum $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ 0,2 ml sebelum

diinaktivasi **Indikasi** Mencegah unggas dari infeksi virus AI subtype H5 **Perhatian** Simpan pada suhu 2-8°C, jangan dibekukan. Pemberian vaksin harus dihentikan 28 hari sebelum ayam dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Produk ini diberikan dengan injeksi IM pada dada atau SC pada leher bagian belakang. Ayam umur 2-5 minggu: setiap ekor 0,3 ml. Ayam umur 5 minggu atau lebih: setiap ekor 0,5 ml. Untuk hasil yang lebih baik dan tingkat proteksi yang lebih lama 0,5 ml vaksin dapat diberikan setiap 4 bulan pada *breeder* atau *layer* **Kemasan** 250 ml/botol (500 dosis) **Deptan RI** No. DPS. I. 0602157 VKC. Obat keras

16. AVIFFA RTI**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *TRT/SHS (strain VCO3)* minimal $10^{2,3}$ CCID₅₀ **Indikasi** Untuk pencegahan terhadap penyakit *swollen head syndrome* **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan tetes mata/air minum tiap ekor 1 (satu) dosis **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05121506 VKS. 2. Obat bebas terbatas

17. AVINEW FROZEN**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *strain VG/GA*, titer virus minimal $10^{6,5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pencegahan pada unggas terhadap ND, terutama tipe ganas (VVND) **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan segera setelah dilarutkan. Vaksinasi individual secara *spray*, tetes mata, celup paruh (pada ayam umur 1 hari). Vaksinasi massal melalui air minum (diatas umur 7 hari) **Kemasan** Vial @ 5.000 dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12092461 VTS. 1. Obat bebas terbatas

18. AVINEW**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *strain VG/GA* titer virus minimal $10^{6,5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pencegahan pada unggas terhadap ND tipe ganas (VVND) **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan segera setelah dilarutkan. Vaksinasi individual secara tetes mata, celup paruh (pada ayam umur 1 hari). Vaksinasi massal melalui air minum (diatas umur 7 hari), *spray* **Kemasan** Botol @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12091853 VTS. 2. Obat bebas terbatas

19. AVIPRO 101 CORYZA**Lohmann Animal Health International, USA/****Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Avibacterium paragallinarum* tipe A *strain 0083* minimum $2,0 \times 10^7$ CFU, tipe C *strain Modesto* minimum $4,0 \times 10^7$ CFU dan *strain 17756* minimum $5,0 \times 10^7$ CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit *Infectious coryza* yang disebabkan oleh infeksi *Avibacterium paragallinarum* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara IM pada otot dada atau paha. Vaksinasi *layer*, *breeder* dan *broiler* dilakukan pada umur 3 minggu atau lebih. Vaksinasi ulang 3-6 minggu kemudian. Vaksinasi ulang pada *layer* atau *breeder* tiap 3 bulan sekali **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 08021589 VTC. 2. Obat bebas terbatas

20. AVIPRO 104 MG BACTERIN

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Mycoplasma gallisepticum* minimum $10^{6.0}$ CCU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycoplasma gallisepticum* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi dilakukan pada umur 5 minggu. Vaksinasi ulang 4 minggu kemudian **Kemasan Botol** 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI No. I. 11084130 VTC.** Obat bebas terbatas

21. AVIPRO 105 ND

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung virus inaktif ND tipe B1 strain LaSota minimum $5,0 \times 10^7$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada ayam. Vaksin membentuk antibodi yang terpelihara selama siklus produksi. Menghasilkan keturunan dengan tingkat imunitas maternal yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi layer dan breeder dilakukan pada umur 16-20 minggu. Sebelumnya ayam divaksinasi (awal) dengan vaksin ND aktif setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan Botol** 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No. I. 0502868 VTC.** 2. Obat bebas terbatas

22. AVIPRO 105 ND CHICK

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung virus inaktif ND tipe B1 strain LaSota minimum $10^{8.1}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada anak ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,1 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi anak ayam dilakukan pada umur 1 hari **Kemasan Botol** 500 ml (5.000 dosis) **Deptan RI No. I. 09123750 VTC.** Obat bebas terbatas

23. AVIPRO 106 REO

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung *Avian reovirus inaktif strain 1733* minimum $10^{5.8}$ TCID₅₀ dan *strain S1133* minimum $10^{6.3}$ TCID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap infeksi reovirus pada ayam. Vaksin membentuk antibodi yang terpelihara selama siklus produksi. Menghasilkan keturunan dengan tingkat imunitas maternal yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu. Vaksinasi ulang 4-6 minggu kemudian. Sebelumnya ayam divaksinasi (awal) dengan vaksin REO aktif setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan Botol** 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI No. I. 13102688 VKC.1.** Obat keras

24. AVIPRO 108 FC4

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida* serotipe 1 (strain X-73), serotipe 3 (strain P-1059), serotipe 4 (strain P-1662) dan serotipe 3x4 (strain P-408) **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit fowl cholera yang disebabkan oleh infeksi *Pasteurella multocida* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi *breeder* dan *layer* dilakukan pada umur 12-16 minggu. Vaksinasi ulang 3-6 minggu kemudian. *Breeder* dan *layer* harus divaksinasi ulang setiap 3 bulan **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 11084141 VKC. Obat keras

25. AVIPRO 109 SE4

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Salmonella enteritidis* phage tipe 8, 24, 14 B dan 23 minimum $10^{7,7}$ CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk menurunkan jumlah koloni bakteri *Salmonella enteritidis* pada organ internal dan saluran reproduksi ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi dilakukan pada umur 12-16 minggu. Vaksinasi ulang 4-6 minggu kemudian **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 12034233 VKC. Obat keras

26. AVIPRO 201 ND – IB

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif ND strain LaSota minimum $10^{7,7}$ EID₅₀ dan virus IB tipe Massachusetts strain Dg minimum $10^{6,9}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam. Vaksin membentuk antibodi yang terpelihara selama siklus produksi, menghasilkan keturunan dengan tingkat imunitas maternal yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu. Sebelumnya ayam divaksinasi (awal) dengan vaksin ND-IB aktif setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 10063845 VTC. Obat bebas terbatas

27. AVIPRO 202 ND – IBD

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif IBD strain Baxendale minimum $10^{6,2}$ TCID₅₀ dan virus ND strain LaSota minimum $10^{7,7}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit IBD dan ND pada ayam. Vaksin membentuk antibodi yang terpelihara selama siklus produksi, menghasilkan keturunan dengan tingkat imunitas maternal yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu dan diulang pada umur 38-42 minggu. Sebelumnya ayam divaksinasi

(awal) dengan vaksin ND dan IBD aktif setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini
Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0912804 VTC. 3. Obat bebas terbatas

28. AVIPRO 221 ND – IB2

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND tipe B1 strain LaSota* minimum $10^{7.7}\text{EID}_{50}$, virus *IB tipe Massachusetts strain Dg* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$ dan tipe *Arkansas strain ARK 3168* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam. Vaksin membentuk antibodi yang terpelihara selama siklus produksi, menghasilkan keturunan dengan tingkat imunitas maternal yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah atau IM pada otot dada atau paha. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu. Vaksinasi ulang pada umur 38-42 minggu. Sebelumnya ayam divaksinasi (awal) dengan vaksin ND-IB aktif setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 09071627 VTC. 2. Obat bebas terbatas

29. AVIPRO 331 ND – IB2 – BD3

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IBD strain Baxendale (Standard tipe 1)* minimum $10^{6.2}\text{TCID}_{50}$, *strain Delaware Variant 1084A* minimum $10^{3.9}\text{EID}_{50}$, *strain Delaware Variant 1084E* minimum $10^{2.0}\text{EID}_{50}$, *strain Maryland* minimum $10^{5.8}\text{TCID}_{50}$, virus *ND tipe B1 strain LaSota* minimum $10^{7.7}\text{EID}_{50}$, virus *IB tipe Massachusetts strain Dg* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$ dan tipe *Arkansas strain ARK 3168* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND, IB dan IBD pada ayam. Vaksin membentuk antibodi yang terpelihara selama siklus produksi, menghasilkan keturunan dengan tingkat imunitas maternal yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada leher bagian bawah. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu. Vaksinasi ulang pada umur 38-42 minggu. Sebelumnya ayam divaksinasi (awal) dengan vaksin aktif IBD, ND dan IB setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04112286 VTC. 1. Obat bebas terbatas

30. AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND tipe B1 strain LaSota* minimum $10^{7.7}\text{EID}_{50}$, virus *IB tipe Massachusetts strain Dg* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$, virus *IBD strain Baxendale (Standard tipe 1)* minimum $10^{6.2}\text{TCID}_{50}$ dan *Avian Reovirus strain S1133* minimum $10^{6.3}\text{TCID}_{50}$ dan *strain 1733* minimum $10^{5.8}\text{TCID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND, IB, IBD, dan reovirus (malabsorption syndrome dan tenosynovitis) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada bagian leher atau IM pada otot paha. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu. Vaksinasi ulang pada umur 38-42 minggu. Sebelumnya ayam

divaksinasi (awal) dengan vaksin aktif IBD, ND, IB dan REO setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 13104643 VKC. Obat keras

**31. AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND tipe B1 strain LaSota* minimum $10^{7.7}\text{EID}_{50}$, virus *IB tipe Massachusetts strain Dg* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$, tipe *Arkansas strain ARK 3168* minimum $10^{6.9}\text{EID}_{50}$, virus *IBD strain Baxendale (Standard tipe I)* minimum $10^{6.2}\text{TCID}_{50}$, strain *Delaware variant 1084A* minimum $10^{3.9}\text{TCID}_{50}$, strain *Delaware variant 1084E* minimum $10^{2.0}\text{TCID}_{50}$, strain *Maryland* minimum $10^{5.8}\text{TCID}_{50}$ dan *Avian Reovirus strain SI133* minimum $10^{6.3}\text{TCID}_{50}$ dan strain *1733* minimum $10^{5.8}\text{TCID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND, IB, IBD, dan reovirus (*malabsorption syndrome dan tenosynovitis*) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml)/ekor. Disuntikkan secara SC pada bagian leher atau IM pada otot paha. Vaksinasi *breeder* dan *pullet* dilakukan pada umur 16-20 minggu. Vaksinasi ulang pada umur 38-42 minggu. Sebelumnya ayam divaksinasi (awal) dengan vaksin aktif IBD, ND, IB dan REO setidaknya 4 minggu sebelum pemakaian vaksin ini **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 12084327 VKC. Obat keras

**32. AVIPRO AE TREMBLEX Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Avian Encephalomyelitis (AE) strain calnek 1143* minimum $10^{3.0}\text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus *AE* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 10 minggu atau lebih **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09070884 VTS. 2. Obat bebas terbatas

**33. AVIPRO IB H120 Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain massachusetts H120* minimum $10^{3.0}\text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit *IB* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum atau *spray*. Vaksinasi melalui air minum pada umur 4 minggu atau lebih, diikuti vaksinasi dengan IB H52 pada umur 10 minggu. Pada *pullet* dilakukan 6-8 minggu sebelum bertelur dan diulang 4 minggu kemudian. Vaksinasi secara *spray* dilakukan pada umur 1 hari. *Breeder* divaksin pada umur 6-8 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis, 2.500 dosis dan 5.000 dosis **Deptan RI** No. I. 10033809 VTS. Obat bebas terbatas

**34. AVIPRO IB M 48 Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB tipe*

massachusetts strain 48 minimum $10^{3.7} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 5 minggu atau lebih. Untuk *pullet*, vaksinasi ulang diberikan pada umur 16 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0905589 VTS. 1. Obat bebas terbatas

35. AVIPRO IBD XTREME

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain V217 (intermediate plus)* minimum $10^{2.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit IBD (gumboro) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum. Vaksinasi dilakukan pada ayam umur 10 hari **Kemasan** Vial 1.000, 2.500, 5.000 dan 10.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11084142 VKS. Obat keras

36. AVIPRO ILT

**Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious laryngotracheitis (ILT)* minimum $10^{2.8} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ILT pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata, tetes hidung atau air minum. Vaksinasi dilakukan pada umur 4-6 minggu. Vaksinasi ulang pada umur 12-14 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Kementan RI** No. I. 11034016 VKS. Obat keras

37. AVIPRO LT

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious laryngotracheitis (ILT)* minimum $10^{2.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit *ILT* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata atau air minum. Vaksinasi dilakukan pada umur 4-6 minggu. Vaksinasi ulang pada umur 12-14 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dan 5.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07091014 VKS. 1. Obat keras

38. AVIPRO MD RISPENS RL

**Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan *Deep frozen cell associated* **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *marek strain rispens/CVI 988* minimum $10^{3.0} \text{PFU}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit marek pada anak ayam umur 1 hari (DOC) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,2 ml)/ekor, disuntikkan secara IM atau SC setelah vaksin dilarutkan dalam pelarut. Vaksinasi dilakukan pada DOC *breeder* dan *layer* segera setelah menetas **Kemasan** Ampul 1.000 dosis dilengkapi dengan pelarut **Kementan RI** No. I. 13014435 VKS. Obat keras

39. AVIPRO MG F

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri aktif *Mycoplasma*

gallisepticum strain F minimum $1,26 \times 10^{7.0}$ CCU **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycoplasma gallisepticum* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum. Vaksinasi dilakukan pada umur 12 minggu atau lebih, tidak lebih dari 4 minggu sebelum bertelur **Kemasan** Vial 1.000 dan 2.500 dosis **Kementan RI** No. I. 12094361 VKS. Obat keras

40. AVIPRO ND B1

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND tipe B1 strain hitchner B1 minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata, tetes hidung, air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan mulai umur 1 hari sampai 3 minggu atau lebih **Kemasan** Vial 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0910743 VTS. 1. Obat bebas terbatas

41. AVIPRO ND C131

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND strain *LaSota clone 13-1* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 14 hari atau lebih **Kemasan** Vial 2.500 dosis dan 5.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11034015 VTS. Obat bebas terbatas

42. AVIPRO ND HB1

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND tipe B1 strain *hitchner B1* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan mulai umur 1 hari atau lebih **Kemasan** Vial 1.000 dosis, 2.500 dosis dan 5.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11034014 VTS. Obat bebas terbatas

43. AVIPRO ND LASOTA

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND strain *LaSota* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 14 hari atau lebih **Kemasan** Vial 1.000, 2.500 dosis dan 5.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11034023 VTS. Obat bebas terbatas

44. AVIPRO ND VISOTA

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND tipe B1 strain *LaSota* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada

ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes hidung, tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 2 minggu atau lebih **Kemasan** Vial 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 10063844 VTS. Obat bebas terbatas

45. AVIPRO ND – IB LASOTA

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain LaSota* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan *virus IB strain massachusetts H120* minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$

Indikasi Untuk pengebalan terhadap penyakit *ND* dan *IB* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 3-4 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Kementan RI** No. I. 11034024 VTS. Obat bebas terbatas

46. AVIPRO ND – IB POLYBANCO

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND tipe B1 strain hitchner B1* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$, *virus IB tipe massachusetts strain 48* dan *tipe connecticut strain connecticut* minimum $10^{3.8} \text{EID}_{50}$

Indikasi Untuk pengebalan terhadap penyakit *ND* dan *IB* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes hidung, tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi dilakukan pada umur 1 minggu atau lebih. Vaksinasi ulang pada umur 16-20 minggu **Kemasan** Vial 1.000, 2.500 dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04052314 VTS. 1. Obat bebas terbatas

47. AVIPRO ND – IB SOHOL

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND tipe B1 strain LaSota* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan *virus IB tipe Massachussets strain Holland* minimum $10^{3.3} \text{EID}_{50}$

Indikasi Untuk pengebalan terhadap penyakit *ND* dan *IB* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes hidung atau tetes mata pada umur 2 minggu, melalui air minum pada umur 5 minggu atau secara *spray* pada umur 6 minggu **Kemasan** Vial 1.000, 2.500 dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07092344 VTS. 1. Obat bebas terbatas

48. AVIPRO POX CEO

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Fowl pox strain FPC* minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$

Indikasi Untuk pengebalan terhadap penyakit *Fowl pox* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor dengan cara tusuk sayap (*wing-web*). Vaksinasi dilakukan pada umur 5 minggu atau lebih. Untuk *pullet* pada umur 8-20 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis dilengkapi dengan pelarut dan jarum penusuk (*double-needle*) **Kementan RI** No. I. 13061836 VTS.1. Obat bebas terbatas

49. AVIPRO POX TC

Lohmann Animal Health International, USA/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Fowl pox strain FPT* minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit Fowl pox pada anak ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor dengan cara tusuk sayap (*wing-web*). Vaksinasi pada anak ayam umur 1 hari atau lebih. Untuk *broiler* dan *pullet* pada umur 1 hari sampai 10 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis dilengkapi dengan pelarut dan jarum penusuk (*double-needle*) **Kementan RI** No. I. 1103307 VTS. 1. Obat bebas terbatas

50. AVIPRO POX

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Fowl pox strain HP-B* minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit *Fowl pox* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor dengan cara tusuk sayap (*wing-web*). Vaksinasi dilakukan pada umur 7-14 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis dilengkapi dengan pelarut dan jarum penusuk (*double-needle*) **Kementan RI** No. I. 11084129 VTS. Obat bebas terbatas

51. AVIPRO PRECISE

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain LC 75* minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit IBD pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum. Vaksinasi dilakukan mulai umur 7 hari atau lebih. Vaksinasi *broiler* tanpa antibodi maternal pada umur 7 hari, sedangkan *broiler* dengan antibodi maternal pada umur 14 hari. *Layer* tanpa antibodi maternal divaksin pada umur 7 hari dan *layer* dengan antibodi maternal pada umur 3-4 minggu. **Kemasan** Vial 1.000, 2.500, 5.000 dan 10.000 dosis **Kementan RI** No. I. 13064548 VKS. Obat keras

52. AVIPRO REO

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Avian reovirus strain 1133* minimum $10^{4.0} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap infeksi reovirus pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,2 ml)/ekor, secara injeksi IM atau SC setelah vaksin dilarutkan dalam pelarut. Vaksinasi *breeder* dan *layer* dilakukan pada umur 3-10 hari. Vaksinasi ulang dengan vaksin REO inaktif pada umur 5-9 minggu dan 2-4 minggu sebelum bertelur **Kemasan** Vial 1.000 dosis dilengkapi dengan pelarut **Kementan RI** No. I. 11104164 VKS. Obat keras

53. AVIPRO THYMOVAC

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Chicken infectious anaemia (CAV) strain cux-1* minimum $10^{4.5} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap infeksi CAV pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air

minum. Vaksinasi *breeder* dilakukan pada umur 8-15 minggu. Jangan diberikan sebelum umur 8 minggu dan 6 minggu sebelum bertelur **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11104165 VKS. Obat keras

54. AVIPRO VIBURSA CE

**Lohmann Animal Health International, USA/
Lohmann Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain CE (intermediate)* minimum $10^{2.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit *IBD* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui air minum. Vaksinasi anak ayam tanpa maternal antibodi dilakukan pada umur 10 hari. Anak ayam dengan maternal antibodi divaksin 2 kali yaitu pada umur 10-14 hari dan diulang 2-3 minggu setelah vaksinasi pertama **Kemasan** Vial 1.000, 2500 dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04042743 VKS. Obat keras

55. BAK IB

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggungh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB strain Massachusetts* dengan titer minimal $10^{7.5} \text{EID}_{50}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *IB* **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml SC dibawah kulit leher atau IM (otot dada) pada *breeder* dan *layer*. Dianjurkan vaksinasi I dengan vaksin *IB live strain Massachusetts H120* **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 07103327 VTC. Obat bebas terbatas

56. BAK IC

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggungh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *Haemophilus paragallinarum serotype A strain "221"* minimum $3 \times 10^{9.0} \text{CFU}$ dan *Haemophilus paragallinarum serotype C strain "H18"* minimum $3 \times 10^{9.0} \text{CFU}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml disuntikkan secara SC (belakang leher) *breeder* dan *layer*. Vaksinasi I: 6-8 minggu. *Booster* 4 minggu sebelum produksi **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04062120 VTC. 1. Obat bebas terbatas

57. BAK ND + EDS + IB

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggungh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain 'S'/ Mukteswar* dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$, virus inaktif *EDS'76 strain 127* dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IB strain M-41* dengan titer minimal $10^{7.5} \text{EID}_{50}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, EDS'76 dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml disuntikkan secara SC (belakang leher) atau secara IM (otot dada) pada umur 18-20 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04042319 VKC. 1. Obat keras

58. BAK ND + EDS

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggungh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain 'S'/ Mukteswar* dengan titer minimal $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ dan virus inaktif *EDS'76 strain 127* dengan

titer minimal $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Imunisasi terhadap penyakit ND dan EDS'76 **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml disuntikkan secara SC (belakang leher) pada umur 18-20 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04022173 VKC.
1. Obat keras

59. BAK ND + IB

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain 'S'/ Mukteswar* dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IB strain M-41* dengan titer minimal $10^{7.5} \text{EID}_{50}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml disuntikkan secara SC (belakang leher) atau secara IM (otot dada) pada umur 18-20 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 12074297 VTC.
Obat bebas terbatas

60. BAK ND + IBD

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain 'S'/ Mukteswar* dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IBD strain 2512 Winterfield* dengan titer minimal $10^{6.0} \text{EID}_{50}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml disuntikkan secara SC (belakang leher) atau secara IM (otot dada) pada umur 18-20 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 09022329 VTC. 1. Obat bebas terbatas

61. BAK ND

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain 'S'/ Mukteswar* dengan titer minimal $10^{8.2} \text{EID}_{50}$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml disuntikkan secara SC (belakang leher) atau IM (otot dada) *breeder* dan *layer*. Vaksinasi I: 28 hari. *Booster* 18 minggu sebelum produksi. Dianjurkan vaksinasi pertama dengan ND aktif **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 11092126 VTC. 2. Obat bebas terbatas

62. BAL IB H120

Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatangguh

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain Massachusetts H120* dengan titer minimal $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan ayam sehat terhadap penyakit IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksikan 1 dosis vaksin atau Vaksinasi I: untuk ayam sehat umur 2 minggu, melalui air minum atau *spray* serta intraokular atau intranasal. Vaksinasi II: untuk umur 21 hari kemudian melalui air minum. Vaksinasi III dst, setiap 3 bulan melalui *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04042097 VTS.
1. Obat bebas terbatas

- 63. BAL IB H52** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBL strain Massachusetts holland H52* dengan titer minimal $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan ayam umur 4 minggu atau lebih terhadap infeksi bronchitis setelah pemberian vaksinasi dengan vaksin IB yang lebih ringan **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum atau *spray* serta intraokular atau intranasal **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05122395 VTS. 1. Obat bebas terbatas
- 64. BAL IBD** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain D-78* dengan titer minimal $10^{2.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalaan terhadap penyakit IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Imunisasi ayam sehat umur 2 minggu melalui air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04042745 VKS. Obat keras
- 65. BAL ILT** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain Hudson* dengan titer minimal $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif terhadap ILT **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 tetes secara intraokular pada ayam umur 4 minggu atau lebih. *Booster*: umur 8-16 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04022201 VKS. 1. Obat keras
- 66. BAL ND + IB** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain B1* dengan titer minimal $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan virus aktif *IB strain Massachusetts H120* dengan titer minimal $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum atau *spray* serta intraokular atau intranasal **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05122324 VTS. 1. Obat bebas terbatas
- 67. BAL ND CLONE** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain B1, Lasota strain Clone 30* dengan titer minimal $10^{5.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan aktif terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum atau *spray*. Untuk ayam sehat umur 2 minggu. Vaksinasi DOC di daerah enzootik. Vaksinasi II: untuk ayam umur 21 hari. Vaksinasi III dst, setiap 3 bulan **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12111970 VTS. 2. Obat bebas terbatas
- 68. BAL ND LASOTA** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND tipe B1 strain N63 Lasota* dengan titer minimal $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan aktif terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk ayam muda secara intraokular/intranasal. Ayam dewasa melalui air minum atau *spray*. Vaksinasi I: umur 2 minggu atau lebih (DOC untuk daerah enzootik). Vaksinasi II: untuk ayam umur 21 hari. Vaksinasi III dst, setiap 3 bulan **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11042095 VTS. 2. Obat bebas terbatas

- 69. BAL POX** **Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanguh**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Liofilisasi Pox strain Beaudette* dengan titer minimal $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan aktif terhadap penyakit fowl pox **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada ayam umur 3-4 minggu dengan cara tusuk sayap **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12022128 VTS.
 2. Obat bebas terbatas
- 70. BICOVAC** **CA Laboratorios Asociados, Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum inaktif, serotype A strain 221* minimal $2,5 \times 10^9$ CFU dan *Haemophilus paragallinarum inaktif, serotype C strain H-18* minimal $2,5 \times 10^9$ CFU sebelum diinaktifkan **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit infeksius coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis vaksin atau 0,5 ml pada umur ayam 15-16 minggu secara IM pada dada atau paha **Kemasan** 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06013034 VTC. Obat bebas terbatas
- 71. BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND + IB + IBD)** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} , *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6.7} \text{EID}_{50}$, *Antigen IBD strain VNJO* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{5.7} \text{CCID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB dan IBD pada anak ayam serta untuk menimbulkan titer maternal antibodi yang tinggi pada DOC **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur. Pada *booster*: setelah puncak produksi untuk menjaga level maternal antibodi asal induk **Kemasan** Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04022718 VTC. Obat bebas terbatas
- 72. BINEWVAX 0,3** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen IB strain mass 41*, titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6.7} \text{EID}_{50}$, *Antigen ND strain ulster 2C*, titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dengan suntikan secara IM atau SC dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0209958 VTC. 3. Obat bebas terbatas
- 73. BINEWVAXIDROP** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen IB strain mass 41*, titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6.7} \text{EID}_{50}$, *Antigen ND strain ulster 2C*, titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} , *Antigen EDS '76* titer minimal 10^6CCID_{50} sebelum diinaktifasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IB, ND dan EDS pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dengan suntikan secara IM atau SC, dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan

dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0503950 VKC. 4. Obat keras

74. **BIOMAREK HVT** **ATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Mareks (herpes virus) strain FC 126* minimum 1.500 PFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit marek pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan melalui IM di sayap pada umur 1-2 hari **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06081649 VKS. 2. Obat keras
75. **BIORAL H120** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain massachussets H 120* minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan tetes mata/hidung, *spray* atau air minum dengan dosis 1 (satu) dosis/ekor. Untuk ayam pedaging: vaksinasi I pada minggu I - vaksinasi II pada umur 3-4 minggu - vaksinasi III pada umur 13-14 minggu - vaksinasi IV pada umur 3-4 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0710525 VTS. 4. Obat bebas terbatas
76. **BIOVAC LS – H120** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain lasota* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan virus aktif *IB strain massachusetts H120* minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Lewat tetes mata dan hisung, lewat air minum. Pada *broiler* vaksinasi pertama pada umur 4-8 hari (*Booster* 3 minggu kemudian) **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06080408 VTS. 1. Obat bebas terbatas
77. **BIOVAK B1** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain hitchner B1* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi pertama pada umur 4-8 hari (*booster* 3 minggu kemudian). Lewat tetes mata dan hidung larutkan isi vial dalam larutan garam fisiologis dalam alat penetes. Lewat air minum larutkan isi vial ke dalam air **Kemasan** Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06091605 VTS. 2. Obat bebas terbatas
78. **BIOVAK LASOTA** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain LaSota* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada *broiler* vaksinasi pertama pada umur 4-8 hari (*Booster* 3 minggu). Larutkan isi vial dalam air kemasan botol 1.000 dosis **Kemasan** Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05091604 VTS. 2. Obat bebas terbatas

79. **BIRD CLOSE 5.1** **IPB SHIGETA Animal Pharmaceuticals**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *AI inaktif subtiipe H5N1* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit AI pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis (0,2 ml)/ekor secara SC **Kemasan** Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. DPS. D. 0603166 VKC. PRG. Obat keras
80. **BIVAC II** **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain massachusetts* minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dengan BIVAC 1 pada umur 2-4 minggu. Vaksinasi ulang dengan bivac 2 pada umur 8-12 minggu. Larutkan isi vial ke dalam air **Kemasan** Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05031606 VKS. 2. Obat keras
81. **BNE – VAC** **ChoongAng Vaccine Lab. Korea/Mitravet**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap dosis (sebelum diinaktivasi) mengandung tidak kurang dari virus inaktif *ND strain LaSota* $10^{9.5} \text{EID}_{50}$, virus inaktif IB tipe *Massachusetts Strain M-41* ($10^{7.5} \text{EID}_{50}$) dan virus inaktif *EDS'76 strain BC-14* 10^8EID_{50} **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap penyakit IB, ND dan EDS'76 pada ayam petelur dan pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam dengan 0,5 ml vaksin secara IM pada umur 14-16 minggu (2-4 minggu sebelum mulai produksi). Kekebalan akan terbentuk dalam 2-3 minggu setelah vaksinasi **Kemasan Botol @** 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 13062502 VKC. 1. Obat keras
82. **BROILERMUNE** **Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair (oil *adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *ND strain LaSota 5log₂ HI* titer sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,1 ml/ekor, disuntik secara SC (di bawah kulit leher) atau IM (otot paha) **Kemasan** Botol 100 ml (1.000 dosis) dan botol 500 ml (5.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 10123969 VTC. Obat bebas terbatas
83. **BROILERTRAKE – M** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain Comercial modified* minimum **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *ILT* pada unggas **Perhatian** Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03121884 VTS. 1. Obat bebas terbatas
84. **BRONCHIN** **AAKO BV-Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Oil emulsion **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain VH* minimum $10^{8.3}$ dan *IB inaktif strain massachusetts M41* minimum $10^{6.7}$ **Indikasi** Proteksi terhadap ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikkan 0,5 ml secara SC atau IM **Kemasan** 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03042133 VTC. 1. Obat bebas terbatas

- 85. BRONCHITIS MASS (BRON MASS) Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB tipe massachusetts strain M-41* dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IB pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat dan jika memungkinkan vaksinlah semua ayam yang rentan di lingkungan tersebut pada waktu yang sama. Selama 10–14 hari setelah vaksinasi, hindarkan partikel vaksin yang terbawa oleh sepatu, baju, dll ke dalam daerah dimana ayam-ayamnya belum divaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu *skim*) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, pada ayam umur 1 hari atau lebih. Melalui air minum pada ayam umur 2 minggu atau lebih. Jika divaksinasi dibawah umur 2 minggu sebaiknya dilakukan vaksinasi ulang. Melalui *spray*/semprot pada ayam umur 4 minggu atau lebih **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05021405 VTS. 2. Obat bebas terbatas
- 86. BRONHIKAL SPF Genera, Inc., Croatia/Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Avian infectious bronchitis strain H120* aktif **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Infectious bronchitis* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Oculanasal: tambahkan 100 ml aquadest ke dalam vial yang berisi 1.000 dosis, kocok hingga larut. Teteskan pada mata dan hidung masing-masing 1 tetes. Melalui air minum: larutkan 1.000 dosis dengan 10 L air untuk DOC umur 7 hari. Larutkan 1.000 dosis dengan 20 L air untuk ayam berumur 2-3 minggu. Larutkan 1.000 dosis dengan 40 L air untuk ayam umur 2 bulan ke atas. Penyemprotan: Larutkan 1.000 dosis dengan 100-150 ml aquadest, semprotkan pada DOV saat berada di *hatchery* atau di box transport menggunakan perlengkapan aerosol (droplet 30-100 µm. Untuk ayam dewasa, vaksin disemprotkan setelah ayam dikumpulan terlebih dahulu. Vaksin juga dapat disemprotkan langsung pada kandang **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 07043194 VTS. Obat bebas terbatas
- 87. BRONIPRA – 1 HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB strain Massachusetts H120* aktif titer minimum 10^3EID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor secara tetes mata/tetes hidung/oral/*spray* **Kemasan** Vial 1000 dosis **Kementan RI** No. I. 11081654 VTS. 2. Obat bebas terbatas
- 88. BRONIPRA – ND HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB strain H52* inaktif titer minimum 10^8EID_{50} dan virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum $1,3 \times 10^8 \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap IB dan ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara SC/IM **Kemasan** Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12111923 VTC. 2. Obat bebas terbatas

89. **BRONIPRA – ND/IBD** **HIPRA,S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB strain H52* inaktif titer minimum $10^{7.5} \text{EID}_{50}$, virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum 10^9EID_{50} dan virus *IBD strain W2512* inaktif titer minimum $10^{6.5} \text{TCID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap IB, ND dan IBD **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara SC/IM **Kemasan** Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06083096 VTC. Obat bebas terbatas
90. **BRONKICHIK** **Indovax Private Limited, India/Otasindo Primasatwa**
Bentuk Sediaan Pelet kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious brochitis (IB) strain massachusetts* minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Mencegah penyakit *infectious bronchitis* (IB). Diberi untuk vaksinasi awal (primer vaksinasi) dan vaksinasi ulang (*booster*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam umur 1-9 hari (primer vaksinasi) dan diulang lagi pada umur 28-40 hari (*booster*). Melalui tetes mata, tetes hidung, tetes mulut atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083676 VTS. Obat bebas terbatas
91. **BRONKI – L** **Indovax Private Limited, India/Otasindo Primasatwa**
Bentuk Sediaan Pelet kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Powl pox live* yang diatenuasi, *CAM (chorio-allantoic membrane) adapted virus of chicken embryo origin* minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit fowl pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas satu dosis vaksin dengan injeksi IM **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09103738 VTS. Obat bebas terbatas
92. **BUR 706** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung *antigen gumboro yang telah diatenuasi strain S 706* minimal 10^4CCID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan dengan cara tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi pada umur 1 hari (minggu pertama) dan pada minggu kedua **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05011403 VKS. 2. Obat keras
93. **BURCELL HVT** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain ST-14 (lukert)* minimum $10^{2.1} \text{TCID}_{50}$ dan merek HVT strain FC-126 minimum 1418 PFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro dan merek pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan dengan cara tetes mata, air minum atau *spray*. Vaksinasi pada umur 1 hari (minggu pertama) **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0110427 VKS. Obat keras
94. **BURSA BLEN M** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain 2512* minimum $10^{2.9} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan dengan cara tetes mata, air minum atau *spray*.

Vaksinasi pada umur 1 hari (minggu pertama) dan pada minggu kedua **Kemasan Vial @ 1.000 dosis Deptan RI No. I. 09081193 VKS. 2. Obat keras**

- 95. BURSA – MEX** **Laboratorio Avimex SA de Mexico/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus hidup *IBD strain intermediate lukert 10^{2.5}EID₅₀/dosis* **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata dan air minum **Kemasan** 1.000 dosis/vial **Deptan RI No. I. 04032730 VKS. Obat keras**
- 96. BURSAPLEX** **Pfizer Animalh Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung bahan aktif virus *gumboro strain winterfield 2512* dari yang dikombinasikan dengan *bursal disease antiserum* (antibodi terhadap gumboro) **Indikasi** Memberikan pengebalan terhadap anak ayam terhadap penyakit gumboro (IBD) **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi diberikan pada telur ayam umur 18 hari di mesin penetasan **Kemasan** Vial 2.000 dosis dan 8.000 dosis **Deptan RI No. I. 04012712 VKS. Obat keras**
- 97. BURSA – VAC** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif IBD strain Moulthrop minimum 103,5EID50 **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IBD pada unggas Perhatian Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis Deptan RI No. I. 05042914 VKS. Obat keras**
- 98. BURSA – VAC 3** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif IBD strain Moulthrop minimum 103,5EID50 **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis Deptan RI No. I. 02101820 VKS. 1. Obat keras**
- 99. BURSIMUNE** **Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IBD (Gumboro) strain KB-1 intermediate* **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum **Kemasan Vial 1.000 dosis Deptan RI No. I. 12091256 VKS. 1. Obat keras**
- 100. BURSINE – 2** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain bursine-2* yang merupakan modifikasi dari *strain lukert* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IBD (gumboro) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih Perhatian Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu skim) **Dosis**

dan Cara Pemakaian 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui air minum, cekok atau tetes mata pada ayam umur 7 hari atau lebih tua. Jika vaksinasi dilakukan dibawah umur 7 hari, sebaiknya vaksinasi ulang dilakukan antara umur 7-28 hari. Untuk *breeder* vaksinasi sebaiknya dilakukan 6-8 minggu sebelum divaksinasi dengan vaksin IBD (gumboro) inaktif Kemasan Box vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0211929 VTS. 2. Obat bebas terbatas

101. BURSINE – K

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung tidak kurang $10^{6,0}$ TCID₅₀ virus inaktif *IBD strain bursine-2* sebelum diinaktifkan **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IBD (gumboro) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit dan sebagai vaksinasi ulangan 4 minggu sebelum masa produksi **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat, dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC atau IM dengan dosis 0,5 ml/ekor pada ayam umur 3 minggu atau lebih tua Kemasan Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0401425 VTC. 2. Obat bebas terbatas

102. BURSINE N – K

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung tidak kurang $10^{6,0}$ TCID₅₀ virus inaktif *IBD strain bursine-2* dan $10^{7,5}$ EID₅₀ virus aktif *ND strain kimber* sebelum diinaktifkan, gentamisin dan amphotericin B sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IBD (gumboro) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit dan sebagai vaksinasi ulangan 4 minggu sebelum masa bertelur **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Jangan diberikan pada masa produksi. Hanya untuk ayam sehat, dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC atau IM dengan dosis 0,5 ml/ekor Kemasan Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0107772 VTS. 2. Obat bebas terbatas

103. BURSINE PLUS

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain bursine-2* yang merupakan modifikasi dari *strain lukert* dan merupakan vaksin *IBD intermediate plus* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IBD (gumboro) pada ayam *broiler* dan petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat dan gunakan seluruh isi vaksin jika telah dibuka. Bakarlah wadah vaksin dan sisanya yang tidak digunakan. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu skim) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui air minum, cekok atau tetes mata pada ayam umur 7 hari atau lebih tua. Jika vaksinasi dilakukan dibawah umur 7 hari, sebaiknya vaksinasi ulang dilakukan antara umur 7-28 hari. Untuk *breeder*, vaksinasi sebaiknya dilakukan antara 6-8 minggu sebelum divaksinasi dengan vaksin IBD (gumboro) inaktif Kemasan Box 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04052223 VKS. 1. Obat keras

104. CALAVAC BRONCHITIS (H 120)

CA Laboratorios Asociados,

Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain H 120* $3 \times 10^{3.3} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis pada umur 1 hari dan selanjutnya. Revaksinasi sebaiknya diberikan pada umur 2 minggu atau lebih. Untuk *pullet*, vaksinasi *booster* harus diberikan pada umur antara 16-18 minggu. Pemberian lewat air minum Kemasan Vial (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 05012850 VTS. Obat bebas terbatas

105. CALAVAC GUMBORO INTERMEDIATE

CA Laboratorios Asociados,

Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *gumboro aktif strain lukert* dengan titer minimal $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk ayam umur minimal 9 hari melalui air minum Kemasan Vial (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 05012851 VTS. Obat bebas terbatas

106. CALAVAC NEWCASTLE BRONCHITIS

CA Laboratorios Asociados,

Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain LaSota* dengan titer minimal $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan virus aktif *IB strain H120* dengan titer minimal $10^{3.3} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor pada umur 1 hari melalui intranasal-intraocular dan pada 2 minggu melalui air minum Kemasan Vial (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 04102825 VTS. Obat bebas terbatas

107. CALAVAC NEWCASTLE LASOTA

CA Laboratorios Asociados,

(LaSota+H120)

Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain LaSota* dengan titer minimal $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk ayam muda secara intranasal/intraocular. Pada ayam dewasa melalui air minum atau *spray* Kemasan Vial (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 04092799 VTS. Obat bebas terbatas

108. CALAVAC POWL POX

CA Laboratorios Asociados,

Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Powl pox* aktif minimal $10^{2.7} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit powl pox **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tusuk sayap Kemasan Vial (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 05092997 VTS. Obat bebas terbatas

109. CAPRIVACAI – K

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus *AI strain A/chicken/West*

Java/PWT-WIJ/2006 sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8,0}\text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan pada unggas terhadap penyakit *Avian influenza* **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM atau SC dengan dosis 0,15 ml/ekor pada ayam kecil. Dengan dosis 0,30 ml/ekor pada ayam besar Kemasan Botol @ 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. DPS. D. 0906227 VKC. Obat keras

110. CAPRIVAC IBD – K**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis mengandung virus *IBD strain #951* inaktif, sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{6,5}\text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan pada unggas terhadap penyakit *Infectious bursal disease* (gumboro) **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM atau SC sebanyak 0,3 ml/ekor pada ayam pembibit umur 18-20 minggu dan 40-42 minggu Kemasan Botol @ 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 09103735 VTC. Obat bebas terbatas

111. CAPRIVAC NBG – K**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis mengandung virus *ND strain ITA*, virus *IB strain I269* dan virus *IBD strain #951* inaktif, sebelum diinaktivasi berturut-turut tidak kurang dari $10^{8,0}\text{EID}_{50}$, $10^{6,0}\text{EID}_{50}$ dan $10^{6,5}\text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan pada unggas terhadap penyakit *Newcastle disease*, *Infectious bronchitis* dan *Infectious bursal disease* (gumboro) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara intramuskuler atau subkutan pada ayam pedaging, petelur maupun pembibit. Dengan dosis 0,15 ml/ekor untuk ayam kecil. Dengan dosis 0,3 ml/ekor untuk ayam dewasa Kemasan Botol @ 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. D. 09103727 VTC. Obat bebas terbatas

112. CAPRIVAC NB – K**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis mengandung virus ND strain ITA inaktif, sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8,0}\text{EID}_{50}$ dan virus *IB strain I37*, *I269* dan *PTS-III* inaktif, sebelum diinaktivasi masing-masing strain tidak kurang dari 10^6EID_{50} **Indikasi** Memberikan kekebalan pada unggas terhadap penyakit *Newcastle disease* (ND) dan *Infectious bronchitis* (IB) **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM atau SC pada ayam pedaging, petelur maupun pembibit. Dengan dosis 0,15 ml/ekor untuk ayam kecil. Dengan dosis 0,30 ml/ekor untuk ayam dewasa Kemasan Botol @ 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 09103734 VTC. Obat bebas terbatas

113. CAPRIVAC ND AI – K**Caprifarmindo Labs.**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis vaksin mengandung virus *ND strain ITA*, sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8,0}\text{EID}_{50}$ dan virus *AI strain A/chicken/West Java/PWT-WIJ/2006* sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8,0}\text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk memperoleh kekebalan terhadap penyakit *Newcastle disease* dan *Avian influenza* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM atau SC dengan dosis 0,15 ml/ekor pada ayam kecil. Dengan dosis 0,30 ml/ekor pada ayam besar Kemasan Botol @ 100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. DPS. D. 0906228 VKC. Obat keras

114. CAPRIVAC ND – K

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis mengandung virus *ND strain ITA* sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan pada unggas terhadap penyakit *Newcastle disease* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM atau SC pada ayam pedaging, petelur maupun pembibit. Dengan dosis 0,15 ml/ekor untuk ayam kecil. Dengan dosis 0,30 ml/ekor untuk ayam besar Kemasan Botol @ 100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 09103717 VTC. Obat bebas terbatas

115. CAPRIVAC NE – K

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis mengandung virus *ND strain ITA* sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ dan virus *EDS'76* sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{7.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap penyakit *Newcastle disease* dan *Egg drop syndrome* pada ayam petelur dan pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM sebanyak 0,3 ml pada ayam umur 14-16 minggu (2-4 minggu sebelum mulai produksi) Kemasan Botol @ 100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 09123764 VKC. Obat keras

116. CAPRIVAC NG – K

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap dosis mengandung virus *ND strain ITA* sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{8.0} \text{EID}_{50}$ dan virus *IBD strain #951* sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{6.5} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan pada unggas terhadap penyakit *Newcastle disease* dan *Infectious bursal disease* (gumboro) **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM atau SC pada ayam pedaging, petelur maupun pembibit. Dengan dosis 0,15 ml/ekor untuk ayam kecil. Dengan dosis 0,30 ml/ekor untuk ayam besar Kemasan Botol @ 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. DPS. D. 0905224 VKC. Obat keras

117. CEVAC BROILER ND K

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair (oil adjuvant) Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus *inaktif ND strain LaSota 5log₂ HI* titer sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,1 ml/ekor, disuntik secara SC (di bawah kulit leher) atau IM (otot paha) Kemasan Botol 100 ml (1.000 dosis) dan botol 500 ml (5.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 12092459 VTC. 1. Obat bebas terbatas

118. CEVAC BRON 120 L

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IB strain mass H-120* minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IB pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 08072184 VTS. 1

119. CEVAC CORYMUNE 4 K

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung bakteri *Avibacterium paragallinarum tipe A* minimum $7\log_{10}$ CFU, *tipe B* minimum $7\log_{10}$ CFU dan *tipe C* minimum $7\log_{10}$ CFU dan *Salmonella enteritidis min.* $4,0\log_2$ MAT **Indikasi** Direkomendasikan untuk pencegahan pada ayam *breeder* dan *layer* terhadap *Infectious coryza* dan *Infeksi S. enteritidis* sebagai primer pada vaksin multivalen terhadap penyakit yang sama, diberikan 4-6 minggu kemudian, sebelum masa produksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diberikan secara IM didaerah dada atau SC di kulit leher bagian bawah dengan dosis 0,5 ml pada ayam *breeder* atau *layer pullet*, pada umur 8-12 minggu Kemasan Botol 250 ml (500 dosis), 500 ml (1.000 dosis) dan 1.500 ml (3.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 11024013 VKC. Obat keras

120. CEVAC CORYMUNE 7 K

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus *ND strain Lasota min.* $^{50}PD_{50}$, virus *IB strain M41* minimum $6\log_2$ HI, virus *EDS'76 strain B8/78* minimum $7\log_2$ HI, Bakteri *Avibacterium paragallinarum tipe A*, *tipe B* dan *tipe C* masing-masing minimum $7\log_{10}$ CFU, *Salmonella enteritidis min.* $5,0\log_2$ MAT **Indikasi** Direkomendasikan untuk vaksinasi pada ayam *breeder* dan *layer* untuk melawan penyakit newcastle, infeksius bronchitis, *Eggs drop syndrome '76*, *Infectious coryza*, dan *Infeksi S. Enteritidis* **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis vaksin (0,5 ml) diinjeksikan secara IM atau SC/ayam *breeder* atau *layer pullet*, 2-4 minggu sebelum masa produksi, antara umur 4-8 minggu Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 12024223 VKC. Obat keras

121. CEVAC FPL

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Fowl pox strain cutter* minimum $10^{2,2}EID_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit folwl pox pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor disuntikan secara wing web. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada brosur petunjuk penggunaan Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07112260 VTS. 1. Obat bebas terbatas

122. CEVAC GUMBO L

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus *IBD* (gumboro) aktif *strain LIBDV* minimum $10^{3,0}TCID_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor aplikasi diberikan melalui air minum Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 03012521 VKS. Obat keras

123. CEVAC IBD L

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus *IBD* (gumboro)

aktif *strain winterfield 2512* minimum $10^{2.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor aplikasi diberikan melalui air minum Kemasan Vial 1.000 dosis dan vial 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 1104162 VKS. 1. Obat keras

124. CEVAC LT L

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Laryngotracheitis strain T-20* minimum $10^{2.6} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi laryngotracheitis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor diberikan melalui tetes mata Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07102263 VKS. 1. Obat keras

125. CEVAC MD HVT & RISPENS

**Ceva Biomune Co., USA/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *Marek's disease strain HVT & Cryo No. 1*, setidaknya 3246 PFU dan virus *Marek's disease strain rispen CVI988 & Cryo No. 1* setidaknya 1983 PFU **Indikasi** Direkomendasikan untuk diberikan pada ayam DOC atau telur berembryo umur 18-19 hari untuk membantu mencegah penyakit marek's yang disebabkan oleh virus *marek's disease* yang sangat virulen **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebelum diberikan, vaksin harus dicairkan lebih dahulu dan diencerkan dengan pelarut (*diluent*) yang tersedia dalam kemasan vaksin. Segera setelah dicairkan, campurkan vaksin dengan pelarut pada temperatur ruang. Segera gunakan vaksin tersebut dan sesekali kocok vaksin untuk memastikan suspensi sel merata. Vaksinasi in ovo diberikan dengan dosis 0,1 ml/embryo. Vaksin juga dapat diberikan secara subkutan dengan dosis 0,2 ml pada DOC di bagian belakang leher Kemasan Ampul 1.000, 2.000 dan 4.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12094353 VKS. Obat keras

126. CEVAC MD RISPENS

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin virus *Marek's disease strain rispen CVI988 & Cryo No. 1* setidaknya 2412 PFU **Indikasi** Direkomendasikan untuk diberikan pada ayam DOC atau telur berembryo umur 18-19 hari untuk membantu mencegah penyakit Marek's yang disebabkan oleh virus *Marek's disease* yang sangat virulen **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebelum diberikan, vaksin harus dilarutkan terlebih dahulu dan diencerkan dengan pelarut (*diluent*) yang tersedia dalam kemasan vaksin. Segera setelah dicairkan, campurkan vaksin dengan pelarut pada temperatur ruang. Segera gunakan vaksin tersebut dan sesekali kocok vaksin untuk memastikan suspensi sel merata. Vaksinasi in ovo diberikan dengan dosis 0,1 ml per embryo. Vaksin juga dapat diberikan secara subkutan dengan dosis 0,2 ml pada DOC di bagian belakang leher Kemasan Ampul 1.000, 2.000 dan 4.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12094354 VKS. Obat keras

127. CEVAC MG F

**Ceva Saude Animale Ltda, Brazil/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung bakteri *Mycoplasma*

gallisepticum strain F minimal 10^6 CFU **Indikasi** Digunakan sebagai immunisasi aktif pada ayam petelur dan *breeder* untuk mengurangi tingkat mortalitas dan gejala klinis karena infeksi yang disebabkan oleh *Mycoplasma gallisepticum* **KontraIndikasi** Jangan digunakan pada ayam yang sakit. Jangan vaksinasi ayam dalam 2 minggu sebelum periode bertelur dan selama periode bertelur. Jangan diberikan pada kalkun. Selama 7 hari sebelum dan sesudah vaksinasi hindari pemberian antibiotik yang aksinya melawan *Mycoplasma gallisepticum* (seperti chlortetracycline, oxytetracyclin, tylosine, quinolones dan lain-lain). Vaksin ini sebaiknya jangan diberikan dalam satu minggu sebelum dan sesudah pemberian vaksinasi ND aktif, IB, avian pneumovirus atau vaksin ILT **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tiap ayam. Diberikan pada ayam sebelum terpapar dan sebelum produksi telur, pada umur antara 8-16 minggu. Ayam di *farm* dengan resiko tinggi terinfeksi MG harus divaksin 2 kali, dengan vaksinasi awal pada umur 6-10 minggu, selanjutnya *booster* vaksinasi pada umur 12-16 minggu, dengan interval vaksinasi minimal 2 minggu. Vaksin diberikan melalui tetes mata atau tetes hidung Kemasan 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Kementan RI No. I. 12124400 VKS.** Obat keras

128. CEVAC NB L**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/****Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *ND aktif strain LaSota* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ dan virus *IB aktif strain massachusetts* minimum $10^{3.0}$ EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor aplikasi diberikan melalui tetes mata dan air minum Kemasan Vial 1.000 dosis, 2.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI No. I. 0903035 VTS.** 1. Obat bebas terbatas

129. CEVAC ND EDS K**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/****Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *ND inaktif strain LaSota* minimum 50 PD₅₀ dan virus *EDS inaktif strain B8/78* menginduksi minimum $7\log_2$ HI **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5ml/ekor aplikasi diberikan secara SC (dibawah kulit daerah leher) dan IM (pada otot dada atau paha) Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No. I. 07102140 VKC.** 1. Obat keras

130. CEVAC ND IB EDS K**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/****Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND inaktif strain LaSota* minimum 50 PD₅₀, virus *IB inaktif strain massachusetts* minimum $6\log_2$ HI dan virus *EDS inaktif strain B8/78* minimum $7\log_2$ HI **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, IB dan EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5ml/ekor aplikasi diberikan secara SC (dibawah kulit daerah leher) dan IM (pada otot dada atau paha) Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No. I. 07102139 VKC.** 1. Obat keras

131. CEVAC ND IB K

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *ND* inaktif *strain LaSota* minimum $^{50}PD_{50}$ dan virus *IB* inaktif *strain massachusetts* minimum $6\log_2$ HI **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5ml/ekor aplikasi diberikan secara SC (dibawah kulit daerah leher) dan IM (pada otot dada atau paha) Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06053081 VTC. Obat bebas terbatas

132. CEVAC ND IBD K

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain LaSota* minimum $^{50}PD_{50}$ dan virus *IBD* inaktif *strain GP* menginduksi minimum $3\log_{10}$ VN **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IBD (gumboro) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5ml/ekor aplikasi diberikan secara SC (dibawah kulit daerah leher) dan IM (pada otot dada atau paha) Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 08122149 VKC. 1. Obat keras

133. CEVAC NEW K

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain LaSota* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis (0,5ml)/ekor secara SC (dibawah kulit daerah leher) dan IM (pada otot dada atau paha) Kemasan Botol 500 ml (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 12091664 VTC. 1. Obat bebas terbatas

134. CEVAC NEW L

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* aktif *strain LaSota* minimum $10^{6,5}EID_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor aplikasi diberikan dengan cara tetes mata, *spray* dan air minum Kemasan Vial 1.000 dosis dan vial 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 06092194 VTS. 1. Obat bebas terbatas

135. CEVAC TRANSMUNE IBD

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IBD strain Winterfield 2512 G-61* minimum 65 PD_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi penyakit IBD (gumboro) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Vial 1.000 dosis, 2.000 dosis, 2.500 dosis, 5.000 dosis dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08123527 VTS. Obat bebas terbatas

136. CEVAC TRANSMUNE

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IBD strain Winterfield 2512 G-61* minimum 0,1 CID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi penyakit IBD (gumboro) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Vial 1.000 dosis, 2.000 dosis, 2.500 dosis, 4.000 dosis, 5.000 dosis, 8.000 dosis dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12054276 VKS. Keras

137. CEVAC VITABRON L

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Newcastle disease strain PHYL.MV.42* minimum 10^{6,5}EID₅₀ dan virus *Infectious bronchitis strain massachusetts HI20* minimum 10^{3,3}EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi penyakit ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Vial 1.000 dosis, 2.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 08093490 VTS. Obat bebas terbatas

138. CEVAC VITAPEST L

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Newcastle Disease strain PHYL.MV.42* minimum 65 PD₉₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Vial 1.000 dosis, 2.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0903380 VTS. 1. Obat bebas terbatas

139. CHICK N – K

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain kimber* sebelum diinaktifkan dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada *broiler*, petelur maupun pembibit dan diberikan pada ayam sehat berumur 1-4 hari dikombinasi dengan vaksin aktif **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat, dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC dengan dosis 0,1 ml/ekor. Vaksinasi hanya untuk ayam sehat umur 1-4 hari Kemasan Botol berisi 250 ml (2.500 dosis) **Deptan RI** No. I. 02101182 VTC. 2. Obat bebas terbatas

140. CHICK N POX TC

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Powl pox strain 946* yang diatenuasi pada kultur jaringan, gentamisin dan amphotericin B sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit powl pox (cacar unggas) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit dan dapat diberikan pada umur berapa saja **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tusuk sayap (*wing web*) pada ayam umur 1 hari atau lebih tua. Jika ayam divaksin umur 1 hari, sebaiknya di vaksinasi ulang pada umur 7 minggu. Ayam yang divaksinasi umur 7 minggu atau lebih tua hanya memerlukan vaksinasi satu

kali Kemasan Kotak isi 10 vial @ 1.000 dosis dan dilengkapi dengan 4 buah alat penusuk (*stabvaccinator*). Tiap vial vaksin dilengkapi dengan pelarut **Kementan RI** No. I. 1110052 VTS. 3. Obat bebas terbatas

141. CHICKOPEST

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis (0,2 ml) mengandung antigen ND, titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{7,6} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada DOC/anak ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan SC pada pangkal leher, dengan dosis 0,1 ml. Vaksinasi anak ayam/DOC: Minggu I: gabungan Chickopest 0,1 ml (secara SC – pangkal leher) + Avinew (tetes mata/*spray*) Kemasan 300 ml (3.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06030026 VTC. 2. Obat bebas terbatas

142. CHOLERIN TRIPLE

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida strain x-73 (serotype 1)* minimum $2,5 \times 10^9$ CFU/dosis sebelum diinaktivasi, *strain P-1059 (serotype 3)* minimum $2,5 \times 10^9$ CFU/dosis sebelum diinaktivasi dan *strain P-1662 (serotype 4)* minimum $0,7 \times 10^9$ CFU/dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Mencegah penyakit kolera pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0808143 VTC. 1. Obat bebas terbatas

143. CIRCOMUNE W

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus *Chicken anemia* minimum $10^{6,2} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Chicken infection anemia* yang disebabkan oleh virus *Chicken infection anemia* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikan secara *wing web*. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada brosur petunjuk penggunaan Kemasan Botol 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08033398 VKC. Obat keras

144. CIRCOMUNE

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus *Chicken anemia* minimum $10^{4,9} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Chicken infection anemia* yang disebabkan oleh virus *Chicken infection anemia* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikan secara *wing web*. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada brosur petunjuk penggunaan Kemasan Botol 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08033397 VKC. Obat keras

145. CORI – MEX

Laboratorio Avimex, SA de Mexico/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotipe A strain W, B strain EBD* dan *C strain Modesto* masing-masing titer minimum 10^8CFU/dosis **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit infeksi coryza pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml-1 ml) diberikan dengan cara penyuntikan secara

SC pada bagian leher atau IM pada otot paha Kemasan Botol 1.000 dosis (500 ml) **Deptan RI** No. I. 03032554 VTC. Obat bebas terbatas

146. CORIPRAVAC **Laboratorios Hipra SA, Spanyol/Mensana Aneka Satwa**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotype A, serotype B dan serotype C* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit coryza pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan Kemasan Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08051652 VTC. 2

147. CORIVAC **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *H. paragallinarum serotype A* minimum 3×10^9 CFU sebelum diaktifasi dan bakteri inaktif *H. paragallinarum serotype C* minimum 3×10^9 CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Infectious coryza* **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas diinjeksi dengan 0,5 ml vaksin secara SC. Vaksinasi pertama pada 6-8 minggu, dosis *booster* 4 minggu sebelum bertelur Kemasan Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06091754 VTC. 2. Obat keras

148. CORYVAX **Indovax Private Limited, India/Otasindo Primasatwa**

Bentuk Sediaan Pellet kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Powl pox live* yang diatenuasi, *CAM (chorio-allantoic membrane) adapted virus of chicken embryo origin* minimum $10^{3,0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit fowl pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas satu dosis vaksin dengan injeksi IM Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09103738 VTS. Obat bebas terbatas

149. CORYZA BIVALENT **Licensi Kitasato Institute, Jepang/SHS International**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotype HA-1 (A) strain 221* minimum 5×10^6 sebelum diinaktivasi dan *H. paragallinarum serotype HA-4 (C) strain H-18* minimum 5×10^6 sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Dua kali injeksi 0,5-1 ml dengan selang 10 minggu pada urat daging paha Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 06011392 VTC. 2. Obat bebas terbatas

150. CORYZA OIL – 3 **Fort Dodge Saude Animal, Brazil/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotype A strain modesto, serotype C strain W dan serotype B strain HPGBr-VI* sebelum aktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit snort/pilek yang disebabkan oleh *haemophilus paragallinarum* pada ayam petelur dan ayam pembibit dan diberikan pada ayam sehat umur 5 minggu atau lebih. Injeksi ulang diberikan 4 minggu kemudian **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih Perhatian Hanya untuk ayam yang sehat dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC dengan dosis 0,5 ml/ekor Kemasan Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 02092341 VTC. 1. Obat bebas terbatas

151. CORYZA

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotype C strain modesto* minimum $10^{8,5}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan penyakit coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis (0,5 ml)/ekor secara IM pada dada Kemasan 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 07033183 VTC. Obat bebas terbatas

152. CORYZAVAC KBL

Kyoto Biken Lab., Jepang/Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung *Haemophilus paragallinarum serotype A strain 221* minimum 1.00×10^{11} CFU, *Haemophilus paragallinarum serotype C strain KA* minimum 1.00×10^{11} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit Coryza **Dosis dan cara pemakaian** Umur dibawah 40 hari 0,25 ml, umur 40 hari atau lebih 0,5 ml disuntikkan secara IM Kemasan 500 ml **Deptan RI** No. I. 06091741 VTC. 2. Obat bebas terbatas.

**153. DHN AVIAN INFLUENZA VACCINE,
INACTIVATED**

**Zhaoqing Dahuanong
Biology Medicine Co., Ltd/Cakar Mas**

Bentuk Sediaan Emulsi Komposisi Setiap dosis mengandung virus inaktif *Avian influenza (AI) tipe A serotype H5N2 strain A/Turkey/England/N28/73* **Indikasi** Imunisasi terhadap AI pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas umur 2-4 minggu: disuntik sebanyak 0,3 ml secara SC. Untuk unggas diatas umur 5 minggu: disuntik sebanyak 0,5 ml secara IM Kemasan Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. DPS. I. 0702192 VKC. Obat keras

154. DIFTOSECT CT

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis mengandung virus *Powl pox DCEP 25* minimum 10^3 CCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit powl pox pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditusukkan kedalam membran sayap atau dengan digoreskan pada sisi luar paha dengan dosis 0,01 ml Kemasan Flacon 5 x 1.000 dosis + 5 x 10 ml pelarut **Deptan RI** No. I. 04101245 VTS. 1. Obat bebas terbatas

155. EDS – VAC

Fort Dodge Saude Animal, Brazil/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung virus inaktif EDS (adenovirus) strain 127 sebelum aktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit EDS pada *layer* dan *breeder* **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat dan kokoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC dengan dosis 0,5 ml/ekor pada *layer* dan *breeder* umur 14-18 minggu atau lebih Kemasan Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 01071866 VKC. 1. Obat keras

156. EDS + NDV + IB

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Oil emulsion Komposisi Setiap dosis mengandung virus EDS, NDV dan IB **Indikasi** Pencegahan penyakit EDS, NDV dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian**

Disuntikkan 0,5 dosis secara SC atau IM Kemasan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06092401 VKC. 1. Obat keras

157. EDS + NDV

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan *Oil emulsion* **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *EDS* dan *NDV*

Indikasi Pencegahan penyakit EDS dan ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikkan 1

dosis secara SC atau IM Kemasan 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03041924

VKC. 1. TML. Obat keras

158. EDS NEW VAC

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang atau setara dengan 1:60 HA unit virus inaktif *EDS (adenovirus) strain adeno 127* dan $10^{9,0} \text{EID}_{50}$ virus inaktif

ND strain kimber sebelum diinaktivkan **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit EDS dan ND pada *layer* dan *breeder* dan diberikan pada ayam sehat umur 14-18 minggu atau lebih

tua **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih Perhatian Hanya untuk ayam sehat, dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian**

Diberikan melalui suntikan SC atau IM dengan dosis 0,5 ml/ekor pada *layer* dan *breeder* umur 14-18 minggu Kemasan Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 02111928

VKC. 1. Obat keras

159. EDS OLVAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif EDS dan virus inaktif ND **Indikasi** Pengebalan inaktif terhadap penyakit EDS dan ND pada unggas **Dosis**

dan Cara Pemakaian Unggas diinjeksi dengan 0,5 ml vaksin lewat SC Kemasan Botol 1.000

dosis **Deptan RI** No. I. 09031673 VKC. 2. Obat keras

160. EDS VAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *EDS'76 strain*

127 Mc ferran minimum 80 PD_{50} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas diinjeksi dengan 0,5 ml, sedikitnya 3

minggu sebelum dimulainya periode bertelur lewat SC atau IM Kemasan Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0604160 VKC. 1. Obat keras

161. ENC – BI – EDS VACCINE

Laboratorio Avimex, SA de Mexico/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Virus inaktif kombinasi *ND strain Lasota* titer minimum $10^{9,0} \text{EID}_{50}$ /dosis sebelum diinaktivasi, *IB tipe connecticut strain A 5968* titer minimum $10^{5,0} \text{EID}_{50}$ /

dosis sebelum diinaktivasi dan *EDS adenovirus tipe III strain JPA* titer minimum $10^{5,5} \text{EID}_{50}$ /dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, IB dan EDS pada ayam

Dosis dan Cara Pemakaian 1 dosis (0,5 ml) diberikan dengan cara penyuntikan secara SC pada bagian leher atau IM pada otot paha Kemasan Botol 1.000 dosis (500 ml) **Deptan RI**

No. I. 0109726 VTC. Obat bebas terbatas

162. ENC – EDS VACCINE

Laboratorio Avimex, SA de Mexico/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif kombinasi *ND strain Lasota* titer minimum $10^{9.0} \text{EID}_{50}$ /dosis sebelum diinaktivasi dan *EDS adenovirus tipe III strain JPA* titer minimum $10^{5.5} \text{EID}_{50}$ /dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan EDS pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml) diberikan dengan cara penyuntikan secara SC pada bagian leher atau IM pada otot paha Kemasan Botol 1.000 dosis (500 ml) **Deptan RI** No. I. 04052756 VKC. Obat keras

163. ENCIVAX

Indovax Private Limited, India/Otasindo Primasatwa

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain intermediate LaSota* minimum 10^8EID_{50} virus **Indikasi** Pengebalan inaktif terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara pemakaian** Unggas: satu dosis vaksin dengan injeksi secara IM dan SC Kemasan Vial 100 ml (500 dosis), dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 09103737 VTC. Obat bebas terbatas

164. ENTEROVAX

Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif Reovirus strain S 1133/C6 minimum $104,4 \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit reovirus pada unggas Perhatian Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 02102484 VKS. Obat keras

165. F VAX MG

**Intervet Inc. (Merck Animal Health), USA/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Mycoplasma gallisepticum* aktif *strain F* titer minimum $6,0 \times 10^6 \text{CCU}$ **Indikasi** Imunisasi aktif terhadap penyakit *Mycoplasma gallisepticum* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara *spray* atau tetes mata **Deptan RI** No. DPS. I. 0803212 VKS. Obat keras

166. FOWL POX

Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Fowl pox strain Beaudette*, minimum titer $10^{2.6} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Fowl pox* **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara tusuk sayap dan diamati 6-8 hari setelah vaksinasi dengan adanya nodul/bekas pada tempat suntikan menunjukkan bahwa vaksinasi berhasil Kemasan Vial 1000 dosis **Deptan RI** No. I. 04092816 VTS. Obat bebas terbatas.

167. GALLIMUNE 201 (IBD + REO)

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen IBD strain VNJO* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{5.7} \text{CCID}_{50}$ *Antigen avian viral arthritis reovirus strain S1133* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^7CCID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IBD dan reo pada ayam serta untuk menimbulkan titer maternal antibodi yang tinggi pada DOC **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM dengan dosis

0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03122699 VKC. Obat keras

168. GALLIMUNE 203 (ND + IB)**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} . *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7} \text{EID}_{50}$. **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur. Pada *booster* setelah puncak produksi Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05123019 VTC. Obat bebas terbatas

169. GALLIMUNE 301 (ND + IC2)**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung virus inaktif *ND strain ulster 2C* minimum 10^8EID_{50} . *H. paragallinarum serotype A strain W* minimum 2,3 log 2 UHA1 dan *H. paragallinarum serotype C strain modesto* minimum 2,3 log 2 UAG **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM atau SC dengan dosis 0,3 ml/ekor Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05123020 VTC. Obat keras

170. GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS)**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} . *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7} \text{EID}_{50}$. *Antigen EDS strain V127* titer sebelum diinaktivasikan 10^6CCID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB dan EDS pada ayam serta untuk menimbulkan maternal antibodi yang tinggi pada DOC **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05103007 VKC. Obat bebas terbatas

171. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO)**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} . *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7} \text{EID}_{50}$. *Antigen IBD strain VNJO* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{5,7} \text{CCID}_{50}$. *Antigen avian viral arthritis reovirus strain S1133* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^7CCID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB, reo pada ayam serta IBD dan reo untuk menimbulkan maternal antibodi pada DOC yang dihasilkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur. Pada *booster* setelah puncak produksi Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03022523 VKC. Obat keras

172. GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2)

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} . *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7} \text{EID}_{50}$. *Antigen IC2 tipe A strain W* titer minimal 2,3 log 2 UHA1. *Antigen IC2 tipe C strain modesto* titer minimal 2,3 log 2 UAG **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB dan coryza pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan pertama untuk daerah rawan pada umur 8-12 mg Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03102662 VTC. Obat bebas terbatas

173. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD)

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} . *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7} \text{EID}_{50}$. *Antigen EDS strain V127* titer sebelum diinaktivasikan 10^6CCID_{50} . *Antigen IBD strain VNJO* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{5,7} \text{CCID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB, EDS pada ayam serta IBD pada induk ayam. Untuk menimbulkan maternal antibodi pada DOC yang dihasilkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03122698 VKC. Obat keras

174. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2)

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} . *Antigen IB strain mass 41* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7} \text{EID}_{50}$. *Antigen EDS strain V127* titer sebelum diinaktivasikan 10^6CCID_{50} . *Antigen IBD strain VNJO* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{5,7} \text{CCID}_{50}$. *Antigen IC2 tipe A* titer minimal 2,3 log 2 UHA1. *Antigen IC2 tipe C* titer minimal 2,3 log 2 UAG **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB, EDS dan IC2 pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04022719 VKC. Obat keras

175. GALLIMUNE FLU H5N9

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis (0,3 ml) mengandung antigen inaktif *Avian influenza strain H5N9*, minimum 10 HI.U, oil excipient sampai 0,3 ml **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Avian influenza* **Dosis dan Cara pemakaian** Diberikan dengan suntikan IM atau SC dengan dosis 0,3 ml/ekor. Waktu vaksinasi pada *broiler* umur 7 atau 14 hari, pada *layer* dan *breeder* umur 2-4 minggu dan pada saat 3-4 minggu sebelum periode bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. DPS. I. 0504124 VKC. Obat keras

176. GALLIMUNE IBD

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis (0,3 ml) mengandung virus *IBD inaktif strain*

VNJO minimum $10^{5.7}$ CCID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM atau SC dengan dosis 0,3 ml/ekor Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06013040 VTC. Obat bebas terbatas

177. GALLIMUNE MG

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *Mycoplasma gallisepticum strain S6* dengan titer 10^8 CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh *Mycoplasma gallisepticum* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml. Vaksinasi pertama umur 6–8 minggu, pada *booster* 3–4 minggu sebelum bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05062947 VKC. Obat keras

178. GALLIMUNE ND

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,1 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasi minimal 10^8 EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan SC pada pangkal leher dengan dosis 0,1 ml. Suntikan dilakukan pada anak ayam umur 1 hari (pada minggu pertama) Kemasan Botol 500 ml (5.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05092998 VTC. Obat bebas terbatas

179. GALLIMUNE ND DAY OLD

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,1 ml) mengandung *antigen ND strain ulster* titer sebelum diinaktivasi minimal 10^8 EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara SC pada pangkal leher dengan dosis 0,1 ml. Suntikan dilakukan pada anak ayam umur 1 hari (pada minggu pertama) Kemasan Botol 500 ml (5.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04112839 VTC. Obat bebas terbatas

180. GALLIMUNE REO

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen Avian viral arthritis reovirus strain S1133* titer sebelum diinaktivasi minimal 10^7 CCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit reo pada ayam dan untuk menimbulkan titer maternal antibodi yang tinggi pada DOC **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3–4 minggu sebelum periode bertelur sebagai *booster* dari vaksinasi aktif Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03122700 VTC. Obat bebas terbatas

181. GALLIMUNE SE

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *Salmonella enteritidis strain LB 111* dengan titer $3,75 \times 10^9$ CFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh *Salmonella enteritidis* pada unggas **Dosis dan Cara**

Pemakaian Diberikan dengan suntikan secara SC atau IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan pertama dilakukan pada umur 6–8 minggu, pada *booster* dilakukan pada 3–4 minggu sebelum periode bertelur Kemasan Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04092813 VKC. Obat keras

182. GALLIVAC AE

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Avian encephalomyelitis virus strain calnek 1143* minimal 10^3EID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit AE pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara dicampurkan ke dalam air minum. Waktu vaksinasi 10–14 minggu Kemasan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07103332 VKS. Obat keras

183. GALLIVAC LASOTA

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung paling sedikit 10^7EID_{50} virus strain *LaSota* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara tetes mata/hidung, air minum, *spray*, suntikan secara IM. Vaksinasi pertama umur 1 hari secara tetes mata, atau pada umur 14 hari dengan air minum atau *spray* Perhatian Vaksinasi hanya pada hewan yang sehat Kemasan 1 vial 1.000 dosis, 2.000 dosis dan 5.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05123021 VTS. Obat bebas terbatas

184. GALLIVAC REO

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis (0,2 ml) mengandung virus aktif *Arthritis strain S 1133* minimal 10^4TCID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Avian viral arthritis* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml disuntikkan secara SC pada leher. Waktu vaksinasi pada anak ayam (untuk daerah resiko tinggi) umur 8–10 hari, pada *booster* umur 6–8 minggu Kemasan Vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03012517 VKS. Obat keras

185. GEORGIA STRAIN

Indovax Private Limited, India/Otasindo Primasatwa

Bentuk Sediaan Pelet kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain intermediate (georgia strain)* minimum 10^3PFU virus **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit IBD/gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: satu dosis vaksin dengan tetes mata, tetes hidung dan air minum Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08123538 VTS. Obat bebas terbatas

186. GUMB – VAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IBD inaktif strain NEV 39* minimum $10^{5,5}\text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IBD **Dosis dan Cara Pemakaian** Dianjurkan vaksinasi pada *breeder* dengan umur sekitar 18 minggu. Ayam diinjeksi dengan 0,5 ml vaksin lewat SC atau IM Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06091806 VTC. 2. Obat bebas terbatas

187. GUMBIN MB

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan *Oil emulsion* **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain Kumarov* minimum $10^{8,6}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi dan *Gumboro strain MB* minimum $10^{7,3}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan penyakit ND dan gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntik 0,5 cc secara SC atau IM Kemasan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042020 VTC. 1. Obat bebas terbatas

188. GUMBOKAL SPF

Genera, Inc., Croatia/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *gumboro disease strain winterfield 2512* aktif **Indikasi** Pencegahn terhadap penyakit gumboro pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1.000 dosis dengan 10 L air. Dianjurkan melakukan vaksinasi tunggal pada ayam umur 10-20 hari. Atau, lakukan 2 kali vaksinasi pada ayam umur 8-12 hari lalu re-vaksinasi pada umur 18-20 hari. Sebaiknya vaksinasi tidak dilakukan 4 hari sebelum atau sesudah vaksinasi Nd dan IB Kemasan Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. 07043193 VKS. Obat keras

189. GUMBOPEST

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen gumboro*, titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{6,7}$ CCID₅₀ *antigen ND*, titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8 EID₅₀ **Indikasi** Untuk pencegahan terhadap ND dan gumboro pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan secara IM/SC dosis 0,3 ml. Waktu vaksinasi pada anak ayam (untuk daerah resiko tinggi) umur 3-4 hari dengan dosis gumbopest 0,3 ml + Avinew. Pada *breeder* diberikan 3-4 minggu sebelum periode produksi. Bila diperlukan pada *booster* dapat diberikan pada umur 40-45 minggu Kemasan Botol @ 1.000 dosis (300 ml) **Deptan RI** No. I. 12091932 VTC. 2. Obat bebas terbatas

190. GUMBORIFFA 0,3

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen gumboro strain VNJO* titer sebelum diinaktivasikan minimal $10^{5,7}$ CCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro pada ayam pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Gumboriffa diberikan dengan suntikan secara IM atau SC dengan dosis 0,3 ml/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur. Program vaksinasi pada anak ayam untuk daerah resiko tinggi umur 1 hari BUR 706, umur 1-14 hari BUR 706/gumboral CT+ gumboriffa 0,3. Pada *breeder* diberikan 3-4 minggu sebelum bertelur. Bila diperlukan *Booster* dapat dilakukan pada umur 40-45 minggu Kemasan 150 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 050753 VTC. 4. Obat bebas terbatas

191. GUMBORO MB

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung *virus gumboro* **Indikasi** Pencegahan penyakit gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis secara tetes mata atau air minum Kemasan 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03041956 VKS. 1. Obat keras

192. HAEMOVAX 0,3

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung bakteri aktif *Haemophilus paragallinarum* serotype A strain W minimum $10^{8,7}$ CFU. *Haemophilus paragallinarum* serotype C strain modesto minimum $10^{8,7}$ CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit snot (coryza) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM dengan dosis 0,3 ml/ekor. Program vaksinasi 2 kali suntikan dengan jangka waktu 6 minggu. Vaksinasi I diberikan pada umur 12–13 minggu, vaksinasi II diberikan pada umur 18-19 minggu. Kemasan 300ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04101040 VTC. 2. Obat bebas terbatas

193. HG – GEL VAC 3

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *H. paragalinarum* inaktif serotype A, dan *H. paragalinarum* serotype B **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Infectious coryza* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin harus disuntikan secara SC pada bagian belakang leher bagian dorsal Kemasan Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 07033190 VTC. Obat bebas terbatas

194. HG – GEL VAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *H. paragalinarum* inaktif serotype A minimum 3×10^9 CFU dan *H. paragalinarum* inaktif serotype C minimum 3×10^9 CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Infectious coryza* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin harus disuntikan secara SC pada bagian belakang leher dengan dosis 0,5 ml. Vaksinasi pertama umur 4-5 minggu, dan booster diberikan pada 16-18 minggu sebelum bertelur Kemasan Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06091755 VTC. 2. Obat bebas terbatas

195. HIMMVAC IB LIVE VACCINE

KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB strain H-120* aktif, titer minimum $10^{3,0}$ EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap virus IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, melalui air minum dan melalui *spray* Kemasan Vial 1000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083697 VTS. Obat bebas terbatas

196. HIMMVAC IBD LIVE VACCINE

KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IBD aktif strain Lukert*, titer minimum $10^{6,5}$ EID₅₀, **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit IBD pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum Kemasan Vial 100 dosis, 1000 dosis dan 2000 dosis **Deptan RI** No. I. 10053839 VKS. Obat keras

197. HIMMVAC IB – ND COMBINED OIL VACCINE

**KBNP Inc, Korea/
Blue Sky Biotech**

Bentuk Sediaan Cair (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB inaktif strain H-120* titer minimum $10^{6,5}$ EID₅₀ dan virus *ND inaktif strain B1*, titer minimum $10^{8,5}$ EID₅₀

Indikasi Pengebalan inaktif terhadap penyakit IB dan ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam dengan dosis 0,5 ml secara IM atau SC Kemasan Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 11064099 VKC. Obat bebas terbatas

198. HIMMVAC IB – ND – EDS COMBINED OIL VACCINE

**KBNP Inc, Korea/
Blue Sky Biotech**

Bentuk Sediaan Cair (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB* inaktif *strain H-120* titer minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$, virus *ND* inaktif *strain B1* titer minimum $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *EDS* inaktif *strain EDS'76* titer minimum $10^{7.2} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi. **Indikasi** Pengebalan inaktif terhadap penyakit IB, ND dan EDS pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam dengan dosis 0,5 ml secara IM atau SC Kemasan Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12074309 VKC. Obat keras

199. HIMMVAC ILT LIVE VACCINE

KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Infectious Laryngotracheitis aktif strain IVR-12* minimum $10^{2.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit ILT pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara tetes mata Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12094359 VKS. Obat keras

200. HIMMVAC LASOTA LIVE VACCINE

KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* aktif, titer minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui tetes mata/tetes hidung (pada ayam umur 1 hari atau lebih), melalui air minum (pada ayam umur 2 minggu atau lebih) dan melalui *spray* (pada ayam umur 4 minggu atau lebih) Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09043612 VTS. Obat bebas terbatas

201. HIMMVAC ND HIGH VACCINE

KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* aktif *strain Ulster*, titer minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$, **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, melalui air minum dan melalui *spray* Kemasan Vial 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Kementan RI** No. I. 10123956 VTS. Obat bebas terbatas.

202. HIMMVAC ND OIL VACCINE

KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Cair (*oil adjuvant*) **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain B1*, titer minimum $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan inaktif terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam dengan dosis 0,5 ml secara IM atau SC Kemasan Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Kementan RI** No. I.11024010 VTC. Obat bebas terbatas

203. HIMMVAC ND – IB COMBINED LIVE VACCINE

**KBNP Inc, Korea/
Blue Sky Biotech**

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain B1*, titer minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan *IB strain H-120* aktif, titer minimum $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit ND dan penyakit IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, melalui air minum dan melalui *spray* Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09053617 VTS. Obat bebas terbatas

204. HIPRAGUMBORO – BPL2

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum $1,3 \times 10^8 \text{EID}_{50}$ dan virus *IBD strain W-2512* inaktif titer minimum 10^5EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara IM/SC **Kemasan** Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 01071742 VTC. 1. Obat keras

205. HIPRAGUMBORO – CH/80

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IBD strain CH-80* aktif titer minimum $10^{3.5} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/*spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05022406 VKS. 1. Obat keras

206. HIPRAGUMBORO – GM97

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IBD strain GM97* aktif titer minimum 10^2EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/*spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06083094 VKS. Obat keras

207. HIPRAPOX

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Avian Pox strain 92 W* aktif titer minimal 10^4EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap diphteria **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tusuk sayap **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03102164 VTS. 1. Obat keras

208. HIPRAVIAR – B1

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain HBI* aktif titer minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes hidung/tetes mata/oral/*spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06021644 VTS. 2. Obat keras

209. HIPRAVIAR – BPL2

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum $1,3 \times 10^8 \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND **Dosis dan Cara**

Pemakaian 0,5 ml/ekor secara IM/SC **Kemasan** Botol 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 01071743 VTC. 1. Obat keras

210. HIPRAVIAR – CLON

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain Clon CL 79* aktif titer minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/spray **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06021643 VTS. 2. Obat keras

211. HIPRAVIAR – CLON/H120

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain CL/79* aktif titer minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IB strain Massachusetts H120* aktif titer minimal 10^3EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/spray **Kemasan** Vial 1000 dosis **Deptan RI** No. I. 05022860 VTS. Obat keras

212. HIPRAVIAR – ILT

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ILT strain CHP – 50* aktif titer minimum 10^3MID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap ILT **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/spray **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12071911 VKS. 2. Obat keras

213. HIPRAVIAR – ND BROILERS

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum $1,3 \times 10^8 \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml/ekor secara SC **Kemasan** Botol 1.250 dosis dan 2.500 dosis **Kementan RI** No. I. 12061964 VTC. 2. Obat keras

214. HIPRAVIAR – S

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* aktif titer minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/spray **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06021624 VTS. 2. Obat keras

215. HIPRAVIAR – S/H120

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* aktif titer minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IB strain Massachusetts H120* aktif titer minimal 10^3EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes mata/tetes hidung/oral/spray **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04062013 VTS. 1. Obat keras

216. HIPRAVIAR – TRT4

HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa

Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *TRT strain 1062* inaktif titer minimum 10^7 TCID₅₀, virus *ND strain LaSota* inaktif titer minimum 10^9 EID₅₀, virus *IB strain H52* inaktif titer minimum $10^{7.5}$ EID₅₀, dan virus *IBD strain W2512* inaktif titer minimum $10^{6.5}$ TCID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap SHS, ND, IB dan IBD **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/ekor secara IM **Kemasan** Botol 500 dosis **Deptan RI** No. I. 06083095 VKC. Obat keras

217. IB – OLVAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung virus *ND* inaktif *strain hertz* minimum $10^{8.5}$ EID₅₀ dan virus *IB* inaktif *strain M41, D274, dan D1466* minimum $3 \times 10^{7.5}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan SC pada belakang leher atau IM pada dada dengan dosis 0,5 ml pada ayam usia 18 minggu **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0608289 VTC. 1. Obat keras

218. IB H – 52

AAKO BV, Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain H-52* **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit cacar pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042104 VTS. 1. TML. Obat bebas terbatas

219. IB H – 120

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IB strain H-120* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan penyakit IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis secara tetes mata atau hidung, melalui air minum atau *spray* **Kemasan** 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042019 VTS. 1. TML. Obat bebas terbatas

220. IB – VAC

Choong Ang Vaccine Lab. – Korea/Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus IB tipe mass strain Holland 120 mengandung tidak kurang dari 103EID50 **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap penyakit IB pada ayam pedaging (broiler) maupun petelur (layer) **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes mata atau hidung. Larutkan 1 vial vaksin dalam 30 ml pelarut kemudian teteskan pada mata/hidung sebanyak 1 tetes ($\pm 0,03$ ml)/ekor. Air minum: larutkan 1 vial vaksin ke dalam air minum dengan takaran sesuai umur ayam. Semprot/spray: larutkan 1 vial vaksin ke dalam 500 ml air, kemudian semprotkan dengan jarak ± 30 cm dari atas kepala ayam. Gunakan aerosol sprayer dengan ukuran partikel kecil (mikrodroplets) **Kemasan** 1.000 dosis x 10 vial **Deptan RI** No. I. 0012758 VTS. Obat bebas terbatas

221. IBA VAC ST

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IBD aktif strain W 2512* minimum 10^3 EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IBD pada unggas **Dosis dan**

Cara Pemakaian Diberikan melalui air minum Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07093270 VTS. Obat bebas terbatas

222. IBA VAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain I-65 PV* minimum 10^3EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit IBD **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan isi vial ke dalam air. Umur terbaik untuk pemberian vaksin adalah sekitar minggu ke-3 Kemasan Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06081607 VKS. 2. Obat keras

223. IBD + NDV + IB AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan *Oil emulsion* **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain komarov* sebelum diinaktivasi, IBD sebelum diinaktivasi dan *IB strain massachusetts M-41* minimum $10^{6.7}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan penyakit ND, IBD dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikkan 0,5 dosis secara SC atau IM Kemasan Vial 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042571 VTC. 1. TML. Obat bebas terbatas

224. IBD BLEN

Merial-Select, USA/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain winterfield 2512* minimum $10^{2.6} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan penyakit IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor diberikan melalui air minum Kemasan Vial @ 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08191192 VKS. 2. Obat keras

225. IBD V877

Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain I/877* tidak kurang dari $10^{3.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui tetes mata atau melalui air minum Kemasan Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04062762 VKS. Obat keras

226. IBD – VAC

ChoongAng Vaccine Lab. Korea/Mitravet

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain intermediet* mengandung tidak kurang dari $10^{3.5} \text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Untuk pencegahan dan memperoleh kekebalan terhadap penyakit IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 vial vaksin ke dalam air minum dengan takaran sesuai umur ayam. Untuk umur > 6 minggu: diberikan secara IM. Kekebalan akan berkembang dalam 7-14 hari **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 04012713 VKS. Obat keras

227. IC – VAC

ChoongAng Vaccine Lab. Korea/Mitravet

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap dosis mengandung bakteri *Haemophilus paragallinarum serotipe A strain W* dan tipe *C strain Madesto* sebelum diinaktivasi masing-masing tidak kurang dari 10^9CFU **Indikasi** Memberikan pencegahan dan memperoleh kekebalan terhadap penyakit *Infectious coryza* pada ayam petelur dan pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam sebanyak 0,5 ml pada umur 4-6 minggu dan 1 ml pada umur

lebih dari 6 minggu yang diinjeksikan secara IM **Kemasan Botol @ 1.000 dosis Kementan RI No. I. 13061310 VTC.1.** Obat bebas terbatas

228. ILT

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain samberg* minimum $10^{6,2}$ **Indikasi** Pencegahan penyakit ILT **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis secara tetes mata atau air minum **Kemasan** 1.000 dosis **Deptan RI No. I. 03041965 VKS. 1. TML.** Obat keras

229. ILT – VAC

ChoongAng Vaccine Lab. Korea/Mitravet

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Tiap dosis vaksin mengandung virus aktif *ILT strain I/R-12* tidak kurang dari $10^{2,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk memperoleh kekebalan terhadap penyakit ILT (*Infectious Laryngotracheitis*) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes mata atau hidung: Larutkan 1 vial vaksin dalam 30 ml pelarut, kemudian teteskan pada mata/hidung sebanyak 1 tetes ($\pm 0,03$ ml)/ekor. Air minum : larutkan 1 vial vaksin ke dalam air minum dengan takaran sesuai umur ayam. Semprot/*spray*: larutkan 1 vial vaksin ke dalam 500 ml air, kemudian semprotkan dengan jarak ± 30 cm dari atas kepala ayam. Gunakan aerosol sprayer dengan ukuran partikel kecil (*mikrodroplets*). Program vaksinasi: vaksinasi awal umur 4 minggu atau kurang **Kemasan Vial @ 1.000 dosis Kementan RI No. I. 03112702 VKS.** Obat keras

230. IMOPEST

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND strain ulster 2C* titer sebelum diinaktivasikan minimal 10^8EID_{50} **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan suntikan secara IM atau SC dengan dosis 0,3 ml/ekor. Program vaksinasi anak ayam (*layer*; *broiler* dan *breeder*): Minggu I gabungan dari chickopest 0,2 ml + pestos/avinew secara tetes mata, *pullet* (*layer* dan *breeder*). Vaksinasi II pada umur 8-10 minggu, vaksinasi dengan imopest dengan dosis 0,3 ml. Vaksinasi III pada umur 3-4 minggu sebelum periode bertelur dengan dosis imopest 0,3 ml **Kemasan** 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No. I. 12091297 VTC.3.** Obat bebas terbatas

231. INACTIVATED CORYZA VACCINE

Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd/Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Tiap dosis mengandung mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum* type A dan tipe C **Indikasi** Kekebalan terhadap penyakit coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM dengan dosis 0,2 cc **Waktu Henti Obat** 14 hari **Kemasan** 500 dosis dan 1.000 dosis/vial (250 ml dan 500 ml) **Deptan RI No. I. 12124412 VTS**

232. INFECTIOUS BRONCHITIS H120, LIVE VACCINE

Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd/Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Tiap dosis virus *IB strain H120* minimum $10^{3,5} \text{EID}_{50}$, *Lyophilization stabilizer* 20%, gentamycin 0,03% **Indikasi** Kekebalan terhadap

penyakit IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis. Tetes mata, air minum **Waktu Henti Obat** 14 hari **Kemasan** 1.000 dosis/vial **Deptan RI** No. I. 12124413 VTS

233. INFECTIOUS BRONCHITIS H – 52 **AAKO BV-Belanda/SHS International**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain H-52*

Indikasi Pencegahan terhadap penyakit cacar pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis secara tetes mata atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042104 VTS. 1. TML. Obat bebas terbatas

234. INFECTIOUS BRONCHITIS H52, **Harbin Pharmaceutical Group**
LIVE VACCINE **Bio Vaccine Co., Ltd/Sarana Veterinaria Jaya Abadi**

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus aktif *IB strain H52* minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$, *Lyophilization stabilizier* 20%, gentamycin 0,03% **Indikasi** Kekebalan terhadap penyakit IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata dan air minum **Waktu Henti Obat** 14 hari **Kemasan** 1.000 dosis/vial **Deptan RI** No. I. 12124414 VTS

235. INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS **Harbin WeiKe Bio-Technology LIVE**
VACCINE (K137) **Development Company, China/**
Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku berwarna putih gading **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus ILT (strain K317) $3 \times 10^{2.7} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Mencegah penyakit ILT bagi semua jenis bibit ayam umur lebih dari 5 minggu **Perhatian** Vaksin harus dihabiskan dalam 24 jam setelah botol dibuka, dan simpan pada suhu -15°C **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diencerkan dengan pelarut vaksin (biasanya 50 ml) sesuai label pada vial. Imunisasi ayam dengan 0,1 ml secara intraoral, tetes mata atau injeksi **Kemasan** 500 dosis/vial, 10 vial/boks, 24 boks/karton **Kementan RI** No. I. 11124186 VKM. Obat bebas terbatas

236. INMUGAL IBA GUMBORO **Laboratorios Ovejero SA. Spanyol/**
Saka Menara Alam

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *gumboro intermediate strain winterfield 2512* minimum $10^{2.0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro. Digunakan untuk vaksinasi awal dengan umur 7 hari, 21-25 hari dan vaksin ulang pada ayam produksi pada umur 12 minggu **Perhatian** Simpan pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$. Tidak boleh pada suhu beku dan harus terhindar dari sinar matahari **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes mata atau hidung. Larutkan 1 vial vaksin dalam pelarut 30 ml sebanyak 1 tetes/ekor. Air minum sesuai takaran minum umur ayam **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07113337 VKS. Obat keras

237. INMUGAL VP LASOTA **Laboratorios Ovejero SA. Spanyol/Saka Menara Alam**

Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain Lasota* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap *newcastle disease*/tetelo pada ayam. Digunakan untuk vaksinasi awal dengan umur 7 hari, 21-25 hari dan vaksin ulang pada ayam

produksi pada umur 12 minggu **Perhatian** Simpan pada suhu 2-8°C. Tidak boleh pada suhu beku dan harus terhindar dari sinar matahari **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes mata atau hidung. Larutkan 1 vial vaksin dalam pelarut 30 ml sebanyak 1 tetes/ekor. Air minum sesuai takaran minum umur ayam. *Spray* larutkan 1 vial dalam 500 ml air kemudian semprotkan dengan jarak 30 cm diatas kepala ayam. Suntik secara SC **Kemasan** Vial 1.000 dosis, 2.500 dosis dan 5.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07113336 VTS. Obat bebas terbatas

238. ITA ND + IBD

Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *ND strain LaSota* minimum $^{50}PD_{50}$ dan virus *IBD* sebelum diinaktivasi *strain GP* menginduksi minimum $3log_{10}$ VN **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor diinjeksikan secara SC (dibawah kulit leher) dan IM (otot dada atau otot paha) **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 100113785 VKC. Obat keras

239. ITA (NEW) ND

Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *ND strain LaSota* minimum $^{50}PD_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor diinjeksikan secara SC (dibawah kulit leher) dan IM (otot dada atau otot paha) **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. I. 05042924 VTC. Obat bebas terbatas

240. ITA ND + IB + EDS

Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *ND strain LaSota* minimum $^{50}PD_{50}$, *IB strain M41* menginduksi minimum $7log_2$ HI dan *EDS strain B8/78* menginduksi minimum $6log_2$ HI **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, IB dan EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor diinjeksikan secara SC (dibawah kulit leher) dan IM (otot dada atau otot paha) **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. I. 10123970 VKC. Obat keras

241. IZOVAC B1 HITCHNER

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *ND strain B1 Hitchner* minimum $10^{6,5}EID_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor lewat air minum, *spray* atau tetes mata pada umur 1 hari, diulang pada 2-3 minggu kemudian **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07081585 VTS. 2. Obat bebas terbatas

242. IZOVAC CLONE

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap dosis mengandung virus *ND strain clone* 10^6EID_{50} dalam larutan stabil **Indikasi** Pengebalan terhadap ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui tetes mata, *spray*, atau air minum. Pemberian I: ayam umur 1 hari (*spray* atau tetes mata). Pemberian II: 2-3 minggu kemudian. *Booster*: setiap 2-3

bulan pada *layer* atau *breeder* **Kemasan** 1.000 dosis dan 2.500 dosis/vial **Deptan RI** No. I. 08051587 VTS. 2. Obat bebas terbatas

243. IZOVAC CORYZA 3

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung kultur bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotype A* 5×10^9 CFU, *serotype B* 5×10^9 CFU, dan *serotype C* 5×10^9 CFU **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis 0,5 ml/ekor secara SC pada umur 6-8 minggu. *Booster*: 4 minggu sebelum bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 1206567 VTC. 1. Obat bebas terbatas

244. IZOVAC FC

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida serotype 1* 2×10^9 , *serotype 3* 2×10^9 dan *serotype 4* minimum 2×10^9 CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit kolera pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara SC pada umur 3-4 minggu. *Booster* 4 minggu kemudian **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 05102399 VTC. 1. Obat bebas terbatas

245. IZOVAC FOWL – POX

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *fowl pox strain breskia P-1* minimum 10^3 EID₅₀ + pelarut **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit cacar pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor secara tusuk sayap pada umur 5-15 minggu **Kemasan** Box isi 10 botol ukuran 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07021579 VTS. 2. Obat bebas terbatas

246. IZOVAC GUMBORO 2

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *gumboro intermediate strain winterfield* minimum 10^3 EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap gumboro pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor lewat air minum pada umur 8-10 hari, dan diulang pada umur 18-20 hari. *Breeder* divaksinasi ulang pada umur 18 minggu dengan vaksin inaktif. Vaksinasi ketiga diberikan sebelum bertelur bersamaan dengan vaksin IBD inaktif **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 03122697 VKS. Obat keras

247. IZOVAC GUMBORO

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *gumboro strain 1-65-PV* minimum 10^3 EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap gumboro pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor lewat air minum pada umur 14 hari. *Breeder* divaksinasi ulang pada umur 18 minggu dengan vaksin inaktif **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05011582 VKC. 1. Obat keras

248. IZOVAC H120 - LA SOTA

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *ND*

strain Lasota minimum 10^6EID_{50} dan virus aktif *IB strain Massachusetts H120* minimum 10^3EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor lewat air minum pada umur 21-28 hari, kemudian diulang setiap 2-3 bulan **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05091910 VTS. 1. Obat bebas terbatas

249. IZOVAC H120 – B1 HITCHNER

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *ND strain B1 Hitchner* minimum $10^{6.5}\text{EID}_{50}$ dan virus aktif *IB strain Massachusetts H120* minimum 10^3EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap ND dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor lewat air minum, *spray* atau tetes mata pada umur 1 hari, diulang pada 2-3 minggu kemudian. *Booster* dilakukan 2-3 bulan **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04052115 VTS. 1. Obat bebas terbatas

250. IZOVAC IB H120

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *IB strain Massachusetts* minimum 10^3EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor melalui air minum, *spray* atau tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04021757 VTS. 1. Obat bebas terbatas

251. IZOVAC ILT

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *ILT strain PV/64* minimum $10^{3.2}\text{TCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ILT pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor melalui tetes mata pada ayam umur 4 minggu. *Booster* dilakukan sekitar umur 15-20 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07051580 VKS. 2. Obat keras

252. IZOVAC LASOTA

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *ND strain Lasota* minimum 10^6EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 1.000 dosis dan 2.500 dosis/vial **Deptan RI** No. I. 08051584 VTS. 2. Obat bebas terbatas

253. IZOVAC MG

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung kultur inaktif *Mycoplasma gallisepticum strain S-6* minimum $1,5 \times 10^{10}\text{CFU}$ sebelum diinaktivasi. **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi *Mycoplasma gallisepticum* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor secara SC pada umur 12 minggu. *Booster*: 18-20 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 07011045 VKC. 2. Obat keras

254. IZOVAC ND

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung virus inaktif

ND strain Lasota minimum 50 PD₅₀ dalam emulsi minyak **Indikasi** Pengebalan terhadap ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis (0,5 ml)/ekor ayam, secara SC atau IM pada umur 28 hari. *Booster*: pada umur 18 minggu sebelum periode bertelur. Vaksinasi sebelumnya dengan menggunakan vaksin aktif **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 12091855 VTC. 2. Obat bebas terbatas

255. IZOVAC ND – BROILER

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,1 ml) mengandung virus inaktif *ND strain Lasota* minimum 50 PD₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor ayam, secara IM yang sebelumnya divaksinasi dengan menggunakan vaksin aktif **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 07081586 VTC. 2. Obat bebas terbatas

256. IZOVAC ND – EDS

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung virus inaktif *ND* tidak kurang dari 50 PD₅₀ dan virus inaktif *EDS'76* minimum 10⁸EID₅₀ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis (0,5ml)/ekor ayam, secara IM atau SC pada umur 18-20 minggu, sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 12111854 VKC. 2. Obat keras

257. IZOVAC ND – EDS – IB

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung virus inaktif *ND tipe velogenik strain Lasota* minimum 50 PD₅₀ virus inaktif *EDS'76 strain Mac Ferran 127* minimum 10⁸EID₅₀ sebelum inaktivasi dan virus inaktif *IB strain Massachusetts M41* minimum 10^{7,5}EID₅₀ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, EDS'76 dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis (0,5ml)/ekor ayam, secara IM atau SC pada umur 18-20 minggu, sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 0701926 VKC. 2. Obat keras

258. IZOVAC ND – IBD

IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis vaksin (0,5 ml) mengandung virus inaktif *ND tipe velogenik* dan immunogenisitas tinggi minimum ⁵⁰PD₅₀ dan virus *IBD strain Winterfield 2512* minimum 2x10⁶EID₅₀ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap ND dan IBD pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis (0,5ml)/ekor ayam, secara IM atau SC pada umur 18-20 minggu, sebelum periode bertelur. Vaksinasi sebelumnya dengan menggunakan vaksin aktif **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 02101887 VTC. 1. Obat bebas terbatas

259. K VAC CHICKEN ND

Sinsui India Private Limited, India/Farmadika Sejahtera

Indonesia

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease*

sebelum inaktif³ 10⁹EID₅₀ **Indikasi** Cocok untuk mencegah *Newcastle disease* bagi semua jenis bibit ayam **Perhatian** Jangan memvaksinasi selama 42 hari sebelum dipotong. Simpan pada suhu 2°C-8°C dan jangan dibekukan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok vaksin sebelum dan selama pemberian. Vaksinasi pada ayam umur 1 hari dan vaksin ini dapat digunakan selambatnya umur 10 hari. Vaksinasi dengan 1 dosis atau 0,1 ml/ ayam secara SC **Kemasan** 500 ml (5.000 dosis)/botol **Kementan RI** No. I. 11013985 VTC. Obat bebas terbatas

260. K VAC CORYZA

**Sinsui India Private Limited, India/
Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Emulsi berwarna putih susu **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragalinarum* serotipe A strain 221 dan serotipe C strain S1, masing-masing minimal 2x10⁸CFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit coryza **Perhatian** Simpan pada suhu 2- 7 °C, jangan dibekukan. Pemberian vaksin harus dihentikan 42 hari sebelum dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Produk ini diberikan dengan injeksi SC pada leher bagian belakang. Dosis 0,5 ml/ekor ayam. *Breeder* dan *layer* vaksinasi diantara umur 12 sampai 16 minggu. Revaksinasi 4 sampai 6 minggu kemudian. Vaksin dibiarkan pada temperatur ruang sebelum digunakan **Kemasan** 500 ml/botol (1.000) dosis **Deptan RI** No. I. 09103741 VTC. Obat bebas terbatas

261. K VAC ND

Sinsui India Private Limited, India/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease* sebelum inaktif³ 10⁹EID₅₀ **Indikasi** Cocok untuk mencegah *Newcastle disease* bagi semua jenis bibit ayam dari semua umur **Perhatian** Kocok vaksin sebelum dan selama pemberian. Jangan memvaksinasi ayam selama 42 hari sebelum dipotong dan simpan pada suhu 2°C-7°C. Jangan dibekukan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam sebaiknya divaksinasi awal dengan vaksin *Newcastle disease* virus live minimal 4 minggu sebelum menggunakan vaksin ini. Vaksinasi ayam pada umur 16-20 minggu sebanyak 1 dosis (0,5 ml). Jika ayam dipertahankan selama tahun kedua, revaksinasi selama berganti bulu. Dosis ½ ml (0,5 ml)/ayam **Kemasan** 500 ml (1.000 dosis)/botol **Deptan RI** No. I. 09123758 VTC. Obat bebas terbatas

262. K VAC ND – IB

**Sinsui India Private Limited, China/
Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle Disease* minimal 10⁹EID₅₀ sebelum inaktivasi. Virus avian infectious bronchitis 10⁶EID₅₀ sebelum inaktivasi **Indikasi** Cocok untuk mencegah penyakit newcastle disease dan IB bagi semua jenis bibit ayam dari semua umur **Perhatian** Jangan memvaksinasi selama 42 hari sebelum dipotong. Simpan pada suhu 2°C-8°C dan jangan dibekukan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok vaksin sebelum dan selama pemberian. Vaksinasi ayam pada umur 16-20 minggu. Jika ayam dipelihara sampai tahun ke dua, revaksinasi selama berganti bulu. Vaksinasi sebanyak 1 dosis (0,5 ml)/ayam. Injeksi secara SC pada daerah leher bawah menggunakan teknik aseptik **Kemasan** 500 ml (1.000 dosis)/botol **Deptan RI** No. I. 10033816 VTC. Obat bebas terbatas

263. KOMAVET

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Vaksin diformulasi dalam bentuk kering beku dan berisi cairan chorio allantois telur ayam bertunas yang ditulari virus ND yang ditambah larutan tryptose dan *skim milk*. Setiap dosis vaksin mengandung sekurang-kurangnya $10^{5.5}$ ELD₅₀ virus aktif *ND strain komarov* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit tetelo (ND - *Newcastle Disease*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 0,5 ml secara IM. Larutkan vaksin dengan garam faali 0,85% sebanyak 100 ml (200 dosis), kocok sampai rata sebelum dipakai. Vaksin harus habis dipakai 4 jam setelah dilarutkan. Pada ayam sehat vaksin tidak menimbulkan gejala yang perlu dikhawatirkan **Kemasan** Vial 200 dosis **Deptan RI** No. D. 0707532 VTS.

2. Obat bebas terbatas

264. LA SOTA MASS BLEN

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain Lasota* minimum 10^7 EID₅₀ dan *IB strain massachusetts* minimum $10^{5.6}$ EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Direkomendasikan diberi pada ayam yang sehat, dengan program vaksinasi umur 4 hari melalui tetes mata sedangkan umur 11 hari melalui air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0512674 VTS.

2. Obat bebas terbatas

265. LARVAC

Neuva Eurobio Vaccini s.r.l., Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious laryngo tracheitis strain gelenzei-marty* minimum $10^{3.2}$ TCID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ILT **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan isi vial dalam air. Pemberian yang tepat dengan tetes hidung, tetes mata. *Broiler*: divaksinasi pertama pada hari ke-21 sampai ke-28, vaksinasi kedua pada hari ke-40. *Layer*: vaksinasi pertama pada umur 4-6 minggu, vaksinasi kedua sebelum mulai bertelur (15-20 minggu) **Kemasan** Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05021610 VKS. 2. Obat keras

266. LARYNGOTRACHEITIS,

Harbin Pharmaceutical Group Bio

LIVE VACCINE

Vaccine Co., Ltd/Sarana Veterinaria Jaya Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT* titer minimum $10^{3.5}$ EID₅₀. *Lyophilization stabilizer* 20%, gentamycin 0,03% **Indikasi** Kekebalan terhadap penyakit ILT **KontraIndikasi** Tidak boleh diberikan pada ayam sakit/kurang sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata, tetes hidung dan air minum **Waktu Henti Obat** 14 hari **Kemasan** 1.000 dosis/vial **Deptan RI** No. I. 13024449 VKS

267. LARYNGO – VAC

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious laryngotracheitis strain cover* dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Laryngotracheitis* menular (ILT) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat dan vaksinlah semua ayam yang rentan terhadap penyakit ILT yang

menular pada saat bersamaan. Reaksi radang mata (conjunctivitis) mungkin terjadi 4 hari setelah vaksinasi. Kejadian seperti ini sering terjadi pada keadaan kering (kemarau) dan keadaan kandang kotor. Reaksi ini segera hilang kira-kira 3 hari kemudian Usahakan vaksin jangan sampai tumpah dan tercecer **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata pada ayam umur 4 minggu. Jika kondisi mendesak, vaksinasi mungkin dilakukan lebih awal yaitu pada umur 10 hari. Vaksinasi ulang sebaiknya dilakukan pada ayam umur 16-20 minggu **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis dan dilengkapi dengan pelarut **Kementan RI** No. I. 1207064 VKS. 2. Obat keras

268. LASOTA + H – 120

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain VH* minimum $10^{6,0} \text{EID}_{50}$ dan *IB strain H-120* minimum $10^{3,5}$ **Indikasi** Pencegahan penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis secara tetes mata atau hidung, melalui air minum atau *spray* **Kemasan** 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042134 VTS. 1. Obat bebas terbatas

269. LASOTA STRAIN (NEWCASTLE DISEASE VACCINE)

Indovax Private Limited,

India/Otasindo Primasatwa

Bentuk Sediaan Pelet kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain Lasota* minimum 10^6EID_{50} **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: satu dosis vaksin dengan tetes mata, spray, tetes hidung dan air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083678 VTS. Obat bebas terbatas

270. LASOTA

Laboratorio Avimex, SA de Mexico/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus hidup *ND tipe B1 strain Lasota* titer minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit *Newcastle disease* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor melalui tetes hidung, tetes mata, air minum dan aerosol **Kemasan** 1.000 dosis/vial **Deptan RI** No. I. 01071484 VTS. Obat bebas terbatas

271. LASOTA

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain lasota* minimum 10^9EID_{50} **Indikasi** Pencegahan penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis secara tetes mata atau hidung, melalui air minum atau *spray* **Kemasan** 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03041919 VTS. 1. Obat bebas terbatas

272. LAYERMUNE 2

Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/

Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *IB serotype Massachusetts strain holland* minimum $10^{7,3} \text{EID}_{50}$ dan *ND strain LaSota* minimum $10^{8,8} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Dosis**

dan Cara Pemakaian 0,5 ml/ekor melalui suntikan SC (dibawah kulit leher) **Kemasan Botol** 500 ml **Deptan RI** No. I. 12061055 VTC. 1. Obat bebas terbatas

273. LAYERMUNE ND

**Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/
Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *ND strain LaSota tipe B1* minimum $10^{10,4}$ EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml/ekor, disuntik secara SC (dibawah kulit leher) **Kemasan Botol** 500 ml **Deptan RI** No. I. 06022348 VTC. 1. Obat bebas terbatas

274. LAYERMUNE SE

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung bakteri inaktif *Salmonella enteridis* minimum 1×10 CFU/ml **Indikasi** Pengebalan terhadap salmonellosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml (1 dosis)/ekor diberikan secara SC (dibawah kulit leher) **Kemasan Botol** 500ml **Deptan RI** No. I. 05092293 VKC. Obat keras

275. LENTOVET

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Vaksin diformulasi dalam bentuk kering beku dan berisi cairan chorio allantois telur ayam bertunas yang ditulari virus ND serta ditambahkan dengan larutan laktosa dan *skim milk*. Setelah dilarutkan, setiap dosis vaksin (0,1 ml) mengandung sekurang-kurangnya $10^{6,5}$ ELD₅₀ virus aktif *ND strain F* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit tetelo (ND - *Newcastle disease*) **Dosis dan Cara Pemakaian Ayam:** 0,1 ml tetes mata, hidung atau mulut. Larutan vaksin dengan garam faali 0,85% sebanyak 20 ml (200 dosis), kocok sampai rata sebelum dipakai. Teteskan 0,1 ml (2 tetes) masing-masing 1 tetes pada mata kiri dan kanan atau masing-masing 1 tetes pada hidung kiri dan kanan dan 2 tetes pada mulut **Kemasan Vial** 200 dosis **Deptan RI** No. D. 0707533 VTS. 2. Obat bebas terbatas

276. LIVACOX Q

Biopharm, Republik Ceko/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. maxima* masing-masing minimum 30.000-50.000 ookista dan *E. necatrix* minimum 10.000 ookista **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit koksidirosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk setiap 100 ekor ayam gunakan 1 ml (100 dosis) dilarutkan dalam 19 ml air **Kemasan Botol** 100 ml (1.000 dosis) dan 50 ml (500 dosis) **Kementan RI** No. I. 13024450 VKS. Obat keras

277. LIVACOX T

Biopharm, Republik Ceko/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung *E. tenella*, *E. acervulina*, dan *E. maxima* masing-masing minimum 30.000-50.000 ookista **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit koksidirosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk setiap 100 ekor ayam gunakan 1 ml (100 dosis) dilarutkan dalam 19 ml air **Kemasan Botol** 100 ml (1.000 dosis) dan 50 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 08013382 VKC. Obat keras

278. LT BLEN

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain T20* minimum $10^{4.3}$ EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ILT pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor diberikan melalui tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0510469 VKS. 2. Obat keras

279. LT – IVAX

Schering-Plough Animal Health, USA/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain P2012 modified live virus* minimum $10^{2.9}$ TCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ILT pada unggas **Perhatian** Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03122703 VKS. Obat keras

**280. MAREK DISEASE VACCINE
(STRAIN CVI – 988)**

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *marek strain rispens CVI-988* minimum 1500 PFU/dosis **Indikasi** Pencegahan penyakit marek pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor **Kemasan** Ampul 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042568 VKS. TML. Obat keras

281. MAREK RISPEN CVI 988

Merial/Romindo Primavetcom

(MAREK'S DISEASE VACCINE LIVE CHICKEN HERPES VIRUS)

Bentuk Sediaan *Deep frozen cell associated* **Komposisi** Setiap dosis mengandung *antigen marek strain CVI 988/rispens* minimal 1.000 PFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit marek pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml/ekor diberikan pada umur 1 hari secara IM/SC **Kemasan** Ampul 1.000 dosis + 200 ml pelarut **Deptan RI** No. I. 06053073 VKS. Obat keras

282. MAREK RISPEN CVI 988 + HVT

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan *Deep frozen cell associated* **Komposisi** Setiap dosis mengandung *antigen marek strain CVI 988/rispens* minimal 1.000 PFU dan *marek HVT strain FC-126* minimum 1466 PFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit marek pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml/ekor diberikan pada umur 1 hari secara IM/SC **Kemasan** Ampul 1.000 dosis + 200 ml pelarut **Deptan RI** No. I. 1203462 VKS. 1. Obat keras

**283. MAREK'S DISEASE VACCINE,
SEROTYPE 3, LIVE VIRUS/MAREK's HVT**

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus marek strain FC-126 minimum 1466 PFU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit marek pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntik secara IM atau SC pada anak ayam segera setelah menetas dengan dosis 0,2 ml/ekor **Kemasan** Ampul 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05103013 VKS. Obat keras

284. MAVAX FOWL POX

Malta Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *powl pox strain brescia P-1* minimum 10^3EID_{50} yang dilemahkan **Indikasi** Imunisasi aktif untuk melindungi ayam *breeder* dan *layer* terhadap penyakit cacar unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi diberikan dengan cara tusuk sayap menggunakan garpu penusuk yang telah dicelupkan pada larutan vaksin. *Breeders*: diberikan pada umur 5-15 minggu. *Layer*: diberikan satu bulan sebelum periode bertelur **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04032735 VTS. Obat bebas terbatas

285. MAVAX LA SOTA

Malta Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain lasota* minimum titer 10^6EID_{50} **Indikasi** Vaksinasi pada ayam *breeder*, *broiler* dan *layer* terhadap virus ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada DOC sampai ayam dewasa, vaksin dapat diberikan melalui air minum, tetes mata atau tetes hidung **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 04041705 VTS. I. Obat bebas terbatas

286. MAVAX ND + EDS + IB

Malta Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan *Oil emulsion* **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain lasota* sebelum inaktivasi titer minimal 10^9EID_{50} , virus *EDS'76 strain 127 McFerran* sebelum inaktivasi titer minimal 10^8EID_{50} , virus *IB strain M-41* sebelum inaktivasi titer minimal $10^{7.7} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap infeksi ND, EDS'76 dan IB pada *breeder* dan *layer* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml disuntikkan secara SC (dibawah kulit pada leher bagian belakang) atau IM pada otot pektoral, unggas yang divaksin harus sudah diminisasi awal dengan vaksin aktif Mavax lasota dan Mavax bronchitis H120 terlebih dahulu, setelah itu divaksinasi dengan Mavax ND + EDS + IB pada umur 16-20 minggu (sebelum periode bertelur) **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 03092635 VKC. Obat keras

287. MAVAX ND

Malta Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Cairan emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain herts* minimum 10^9EID_{50} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Imunisasi aktif pada ayam *breeder*, *broiler* dan *layer* untuk mencegah penyakit virus ND **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml disuntikkan secara SC (dibawah kulit pada leher bagian belakang) atau IM (otot pectoral) pada *breeder*, *broiler* dan *layer* **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04041713 VTC. I. Obat bebas terbatas

288. MD – VAC CFL

Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 2.000 PFU virus aktif *Marek's disease (herpes virus kalkun/HVT) strain FC – 126* dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Marek's disease* pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit umur 1 hari **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat, dan kocoklah

baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui suntikan secara SC dengan dosis 0,2 ml/ekor pada ayam umur 1 hari (DOC) **Kemasan** Kotak isi 10 vial @ 1.000 dosis dilengkapi dengan pelarut **Deptan RI** No. I. 0211061 VKS. 2. Obat keras

289. MEDIVAC AI

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Mengandung virus Avian influenza (AI) sub tipe H5N1 isolat lokal, yang telah diinaktifkan dan diemulsikan ke dalam adjuvant untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi virus Avian influenza (AI) minimal 50 PD50 **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit Avian influenza (AI) pada ayam pedaging, ayam jantan, ayam petelur dan ayam pembibit **Perhatian** Simpan vaksin pada suhu 2-8°C, jangan sampai beku. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan. Harus dengan resep dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis tiap ekor anak ayam: 0,2 ml. Ayam dewasa: 0,5 ml. Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah **Kemasan** 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Kementan RI** No. D. 12034249 VKC. Obat keras

290. MEDIVAC AI 0,3

Medion

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Mengandung virus Avian influenza (AI) sub tipe H5N1 strain A/Chicken/West Java/PWT-Wij/2006 yang telah diinaktifkan dan diemulsikan ke dalam adjuvant untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi virus Avian influenza (AI) minimal 50PD50 **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit Avian influenza (AI) pada ayam pedaging, ayam jantan, ayam petelur dan ayam pembibit **Perhatian** Simpan vaksin pada suhu 2-8°C, jangan sampai beku. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan. Harus dengan resep dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis tiap ekor anak ayam: 0,1 ml. Ayam dewasa: 0,3 ml. Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau subkutan SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah **Kemasan** 300 ml **Kementan RI** No. D. 12024226 VKC. Obat keras

291. MEDIVAC CORYZA B

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk suspensi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *Haemophilus paragallinarum* strain W dan *modesto* yang telah diinaktifkan. Bakteri diadonisorpsikan ke dalam adjuvant aluminium hidroksida untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis minimal mengandung masing-masing 108CFU H. *paragallinarum* strain W dan *modesto* **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit Infectious coryza (korisa/snot) pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Dosis tiap ekor ayam: 0,5 ml **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 06091518 VTC. 2. Obat bebas terbatas

292. MEDIVAC CORYZA T SUSPENSION**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk suspensi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *Haemophilus paragallinarum* strain W, spross dan modesto yang telah diinaktifkan. Bakteri diadisosorpsikan ke dalam adjuvant aluminium hidroksida untuk memperpanjang dan meningkatkan daya kerja vaksin. Tiap dosis minimal mengandung masing-masing 108CFU *H. paragallinarum* strain W, spross dan modesto **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit Infectious coryza (korisa/snot) pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam melalui suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Dosis tiap ekor ayam: 0,5 ml **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 04022729 VTC. Obat bebas terbatas

293. MEDIVAC GUMBORO A**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus Infectious bursal disease (IBD/gumboro) aktif strain cheville 1/68. Virus dikembangkan dalam telur SPF (Specific Pathogen Free) berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus gumboro minimal 102,0EID50 **Indikasi** Untuk mencegah penyakit gumboro pada ayam pedaging, ayam jantan, ayam petelur, dan ayam pembibit. Dapat diberikan pada anak ayam umur 7 hari, yang umumnya masih mempunyai kekebalan asal induk yang tinggi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis setiap ekor ayam melalui tetes mulut (cekok) atau air minum. Pemberian melalui air minum dilakukan jika ayam sudah berumur 1 minggu atau lebih. Untuk memperoleh tingkat kekebalan yang optimal, berikan melalui tetes mulut **Kemasan** Vial 100 dosis, 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. D. 08011824 VKS. 1. Obat keras

294. MEDIVAC GUMBORO B**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus IBD/gumboro strain D22. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis vaksin mengandung virus IBD/gumboro minimal 103,5TCID50 **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit IBD/gumboro pada ayam pedaging, ayam jantan, ayam petelur dan ayam pembibit yang berumur 10 hari atau lebih **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis pada setiap ekor ayam melalui tetes mulut (cekok) atau air minum pada ayam yang berumur 10 hari atau lebih. Untuk memperoleh tingkat kekebalan yang optimal, berikan melalui tetes mulut **Kemasan** 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 0011700 VKS. Obat keras

295. MEDIVAC GUMBORO EMULSION**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus IBD/gumboro strain winterfield 2512 yang telah diinaktifkan. Virus diemulsikan ke dalam adjuvant minyak mineral untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi virus minimal 107,0EID50 tiap ml sebelum diinaktifasi atau setara dengan 800 netralisasi serum virus IBD/gumboro **Indikasi** Digunakan untuk mencegah

penyakit IBD/gumboro pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan. Pada ayam pembibit juga berguna untuk meningkatkan dan menyeragamkan tingkat kekebalan asal induk pada anak ayam yang dihasilkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam melalui suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Diberikan pada ayam yang pernah divaksin atau bersamaan dengan vaksin IBD/gumboro aktif (Medivac Gumboro A atau Medivac Gumboro B). Dosis tiap ekor anak ayam: 0,2 ml. Ayam dewasa: 0,5 ml **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 02041796 VTC. 1. Obat bebas terbatas

296. MEDIVAC IB H – 120

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus Infectious bronchitis (IB) strain H-120 massachusetts. Virus dikembangkan dalam telur SPF (Specific Pathogen Free) berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis vaksin mengandung virus IB minimal 103,5EID50 **Indikasi** Digunakan sebagai vaksinasi pertama atau ulang untuk mencegah penyakit IB pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Perhatian** Simpan vaksin pada suhu 2–8°C. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis setiap ekor melalui tetes mata, tetes hidung, air minum atau semprot kasar (coarse spray) **Kemasan** 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 04121683 VTS. 1. Obat bebas terbatas

297. MEDIVAC IB H – 52

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus IB strain H - 52 massachusetts. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis vaksin mengandung virus IB minimal 103,5EID50 **Indikasi** Digunakan untuk vaksinasi ulang pada umur 56 hari setelah ayam pernah divaksin dengan Medivac IB H-120 untuk mencegah penyakit IB pada ayam petelur dan ayam pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Dapat diberikan pada ayam melalui air minum atau semprot (spray) **Perhatian** Jangan menggunakan Medivac IB H-52 pada ayam yang sedang bertelur. Vaksinasi IB pertama pada ayam, atau pada peternakan yang memiliki ayam berbagai umur dalam satu lokasi peternakan. Simpan vaksin pada suhu 2–8°C. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan **Kemasan** 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 02041682 VTS. 1. Obat bebas terbatas

298. MEDIVAC ILT

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus ILT strain A 96. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus ILT minimal 102,5EID50 **Indikasi** Digunakan untuk vaksinasi pertama atau ulangan pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Perhatian** Vaksinasi ILT menggunakan cara tetes mata akan menyebabkan radang dan pembengkakan pada selaput mata. Reaksi ini akan hilang dalam waktu 3 hari. Vaksinasi ND aktif atau IB aktif pada 1–2 minggu sebelum

vakcinasi ILT akan menyebabkan reaksi yang lebih kuat. Simpan vaksin pada suhu 2–8°C. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebaiknya dilakukan melalui tetes mata. Larutkan Medivac ILT dalam larutan dapar (pelarut) yang sesuai, kemudian kocok sampai rata. Usahakan jangan sampai berbuih. Teteskan larutan vaksin pada mata satu tetes tiap ekor, tunggu sampai vaksin betul-betul masuk ke dalam mata (ayam akan mengerjapkan mata berkali-kali) baru dilepaskan **Kemasan** 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. D. 04031700 VKS. 1. Obat keras

299. MEDIVAC ND – AI EMULSION**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus ND strain LaSota dan AI sub tipe H5, yang telah diinaktifkan dan diemulsikan ke dalam adjuvant minyak mineral untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi virus ND minimal 107,0EID50 tiap ml atau setara dengan 50PD50 dan potensi virus AI minimal 109,5EID50 tiap ml atau setara dengan 50PD50 **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit ND dan AI pada ayam pedaging, ayam jantan, ayam petelur dan ayam pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap ekor anak ayam 0,2 ml. Ayam dewasa 0,5 ml. Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah **Kemasan** Botol 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. DPS. D. 0705195 VKC. Obat keras

300. MEDIVAC ND CLONE 45**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus ND strain clone 45. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus ND minimal 107EID50 **Indikasi** Digunakan untuk vaksinasi pertama (terutama pada anak ayam yang mempunyai kekebalan asal induk yang tinggi), revaksinasi dan vaksinasi darurat pada saat ada wabah ND pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan. Hasil vaksinasi pada ayam yang sudah sakit ND sangat tergantung pada kondisi tubuh **Perhatian** Simpan vaksin pada suhu 2–8°C. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis setiap ekor ayam melalui tetes mata, tetes hidung, air minum, semprot (spray) atau suntikan **Kemasan** 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 06011517 VTS. 2. Obat bebas terbatas

301. MEDIVAC ND – EDS EMULSION**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus ND strain LaSota dan adenovirus 127 McFerran yang telah diinaktifkan. Virus diemulsikan ke dalam adjuvant minyak mineral untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi minimum 109,0EID50 tiap ml atau setara dengan 50PD50 virus ND dan 1.000 HA unit adenovirus 127 **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit ND dan EDS⁷⁶ pada ayam petelur dan pembibit. vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan. Harus dengan resep dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam melalui suntikan IM (tembus daging/otot) di dada/paha atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang

sebelah bawah. Sebelum divaksin ayam harus sudah pernah divaksin dengan vaksin ND aktif agar kekebalannya terhadap ND dapat terbentuk sempurna. Vaksinasi dilakukan pada umur 16-18 minggu atau selambat-lambatnya 2 minggu sebelum ayam bertelur. Dosis tiap ekor ayam 0,5 ml **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 06011519 VKC. 2. Obat keras

302. MEDIVAC ND EMULSION 0.3

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease strain LaSota*. Virus dikembangkan dalam telur SPF sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus ND minimal $^{50}PD_{50}$ **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit ND pada ayam pedaging, jantan, petelur dan pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis pada setiap ekor ayam melalui suntikan IM atau SC **Kemasan** Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 10093902 VTC. Obat bebas terbatas

303. MEDIVAC ND EMULSION

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* yang telah diinaktifkan. Virus diemulsikan ke dalam *adjuvant* minyak mineral untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi minimum $10^{9,0}EID_{50}$ tiap ml atau setara dengan $^{50}PD_{50}$ virus ND **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit ND pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Diberikan sebagai vaksinasi pertama yang disertai dengan vaksin ND aktif, vaksinasi ulangan pada umur 16-18 minggu, atau selambat-lambatnya 2 minggu sebelum ayam bertelur pada ayam yang sebelumnya telah divaksin dengan vaksin ND aktif. Dosis tiap ekor anak ayam 0,2 ml, sedangkan untuk ayam dewasa 0,5 ml **Kemasan** 100 ml, 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 06011469 VTC. 2. Obat bebas terbatas

304. MEDIVAC ND GUMBORO EMULSION

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Newcastle disease strain LaSota* dan virus *gumboro strain winterfield 2512*. Virus dikembangkan dalam telur SPF sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus ND dan gumboro masing-masing minimal $^{50}PD_{50}$ **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit ND pada ayam pedaging, jantan, petelur dan pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam dengan cara suntikan IM di paha/dada atau SC dileher bagian belakang sebelah bawah. Dosis tiap ekor anak ayam 0,2 ml sedangkan untuk ayam dewasa 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. D. 09113744 VTC. Obat bebas terbatas

305. MEDIVAC ND HITCHNER BI

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain hitchner BI*. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga

bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus ND minimal 10^7EID_{50} . **Indikasi** Digunakan pada vaksinasi pertama untuk mencegah penyakit ND pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dapat diberikan 1 dosis pada setiap ekor ayam melalui tetes mata, tetes hidung atau semprot (*spray*) **Kemasan** 50 dosis, 100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 06011468 VTS. 2. Obat bebas terbatas

306. MEDIVAC ND LA SOTA**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota*. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus ND minimal 10^7EID_{50} . **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit ND pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis setiap ekor ayam melalui tetes mata, tetes hidung, semprot (*spray*), air minum atau suntikan **Kemasan** 50 dosis, 100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 06011467 VTS. 2. Obat bebas terbatas

307. MEDIVAC ND-EDS-IB EMULSION**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* minimum $10^{9,0}\text{EID}_{50}$ tiap ml, *adenovirus 127 strain McFerran* minimum 1.000 HA unit dan *IB strain massachusetts 41* minimum $10^{7,0}\text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi yang telah diinaktifkan. Virus diemulsikan ke dalam *adjuvant* minyak mineral untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin. Tiap dosis mengandung potensi minimal $^{50}\text{PD}_{50}$ virus ND, 1.000 HA unit adenovirus 127 dan 2 indeks netralisasi virus IB **Indikasi** Untuk mencegah penyakit ND, EDS'76 dan IB pada ayam petelur dan ayam pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Diberikan pada ayam petelur atau pembibit pada umur 16-18 minggu atau selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa bertelur (dengan catatan ayam telah mendapatkan vaksinasi ND dan IB dengan vaksin aktif selama masa pemeliharaan sampai ayam siap bertelur). Dosis vaksin 0,5 ml tiap ekor ayam **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 05102313 VKC. 1. Obat keras

308. MEDIVAC ND-IB EMULSION**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* minimum $10^{9,0}\text{EID}_{50}$ tiap ml dan *IB strain massachusetts 41* minimum $10^{6,5}\text{EID}_{50}$ tiap ml yang telah diinaktifkan. Virus diemulsikan ke dalam *adjuvant* minyak mineral untuk meningkatkan dan memperpanjang daya kerja vaksin **Indikasi** Untuk mencegah penyakit ND dan IB pada ayam pedaging, ayam jantan, ayam petelur dan ayam pembibit **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Diberikan pada ayam yang pernah divaksin atau bersamaan dengan vaksin ND dan IB aktif. Dosis tiap ekor anak ayam

0,2 ml, sedangkan untuk ayam dewasa 0,5 ml **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 04032738 VTC. Obat bebas terbatas

309. MEDIVAC ND – IB

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain clone 45* dan virus *IB strain H-120 massachusetts*. Virus dikembangkan dalam telur SPF berembrio sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung minimal 10^7EID_{50} virus ND dan $10^{3,5} \text{EID}_{50}$ virus IB **Indikasi** Digunakan pada vaksinasi pertama atau ulang untuk mencegah penyakit ND dan IB pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis pada setiap ekor ayam melalui tetes mata, tetes hidung, semprot (*spray*) atau air minum **Kemasan** 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 04031860 VTS. 1. Obat bebas terbatas

310. MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk emulsi **Komposisi** Mengandung virus *Newcastle disease (ND) strain LaSota*, *Infectious bronchitis (IB) strain massachusetts 41* dan *Infectious bursal disease (IBD/gumboro) strain winterfield 2512* yang telah diinaktifkan. Virus diemulsikan ke dalam *adjuvant* minyak mineral untuk memperpanjang dan meningkatkan daya kerja vaksin **Indikasi** Digunakan untuk mencegah *penyakit Newcastle disease (ND)*, *Infectious bronchitis (IB)* dan *IBD/gumboro* pada ayam petelur, ayam pembibit, ayam pedaging dan ayam jantan. Pada ayam pembibit juga berguna untuk meninggikan dan menyeragamkan tingkat kekebalan asal induk pada anak ayam yang dihasilkan **Perhatian** Simpan vaksin pada suhu 2-8°C, jangan sampai beku. Tanggal kedaluwarsa berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara suntikan IM (tembus daging/otot) di paha/dada atau SC (bawah kulit) di leher bagian belakang sebelah bawah. Diberikan pada ayam yang pernah divaksin atau bersamaan dengan vaksinasi ND, IB dan IBD/gumboro aktif. Dosis 0,2 ml tiap ekor anak ayam atau 0,5 ml tiap ekor ayam dewasa **Kemasan** 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 06012316 VTC. 1. Obat bebas terbatas

311. MEDIVAC POX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Vaksin aktif berbentuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Powl pox strain M-92*. Virus dikembangkan dalam telur SPF sehingga bebas dari pencemaran mikroorganisme patogen. Setiap dosis mengandung virus pox minimal 10^3EID_{50} **Indikasi** Digunakan untuk mencegah penyakit pox (cacar) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan 1 dosis pada setiap ekor ayam melalui suntikan tusuk sayap (*wingweb*) **Kemasan** 100 dosis + pelarut, 500 dosis + pelarut dan 1.000 dosis + pelarut **Deptan RI** No. D. 03111680 VTS. 1. Obat bebas terbatas

312. MULTIMUNE K

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida serotype 1 strain X-73*, *serotype 3 strain P-1059*, dan *serotype 4 strain P-1662*,

masing-masing minimum 5×10^8 CFU **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit fowl cholera pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor aplikasi diberikan melalui air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05101434 VTC. 1. Obat keras

313. MULTIMUNE K5 **Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida* serotipe 1 strain X-73, serotipe 3 strain P1059, serotipe 4 strain P1662, serotipe 3x4 CU strain dan serotipe 3x4 (UGA) strain masing-masing minimum 270 CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit fowl cholera pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor aplikasi diberikan melalui air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan vial 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 06023039 VTC. Obat keras

314. MYVAC 202 **Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain Lasota* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ dan *IB Mass strain H120* minimum $10^{3.0}$ EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Newcastle Disease* dan *Infectious Bronchitis* **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum **Kemasan** Vial 1000 dosis **Deptan RI** No. I. 04062769 VTS. Obat bebas terbatas

315. NAMA VAC LAS-IB **Sinsui India Private Limited, India/
Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Masa spon berwarna kuning pucat **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain LaSota* minimum $10^{6.5}$ EID₅₀ dan *IB strain massachusetts* minimum 10^3 EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan/Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam baik untuk vaksinasi pertama dan revaksinasi **KontraIndikasi** Vaksin tidak boleh terkena mata karena dapat menyebabkan peradangan pada mata. Jangan vaksinasi ayam yang secara klinis sakit atau kelelahan setelah transportasi **Perhatian** Simpan pada suhu 2-7°C dan gunakan untuk sekali pakai. Pemberian vaksin harus dihentikan 21 hari sebelum dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Air minum. Tetes mata untuk ukuran 1.000, 500, 200 dosis setiap ekor ayam 1 tetes. Tetes hidung untuk ukuran 1.000, 500, 200 dosis setiap 1 ekor ayam satu tetes. Larutkan vaksin sesuai dengan aturan dalam brosur **Kemasan** Vial 15 ml (1.000 dan 5.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 09083688 VTS. Obat bebas terbatas

316. NAMA VAC NDLAS **Sinsui India Private Limited, India/
Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Masa spon berwarna ungu **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain lasota* minimal $10^{6.5}$ EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan/Pengebalan aktif terhadap penyakit ND pada ayam baik untuk vaksinasi pertama maupun revaksinasi **KontraIndikasi** Vaksin tidak boleh terkena mata karena dapat menyebabkan peradangan pada mata. Jangan vaksinasi ayam yang secara klinis sakit atau kelelahan setelah transportasi **Perhatian** Simpan pada suhu 2-7°C dan gunakan untuk sekali pakai. Pemberian vaksin harus dihentikan 21 hari sebelum dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Air minum. Tetes mata untuk ukuran 1.000, 500, 200

dosis setiap ekor ayam 1 tetes. Tetes hidung untuk ukuran 1.000, 500, 200 dosis setiap ekor ayam satu tetes, spray. Larutkan vaksin sesuai dengan aturan dalam brosur **Kemasan Vial 20 ml** (10.000 dosis), vial 15 ml (2.000 dan 5.000 dosis) dan vial 5 ml (1.000, 500 dan 200 dosis) **Deptan RI No. I. 09083687 VTS. Obat bebas terbatas**

317. NB^{LH} – VAC

ChoongAng Vaccine Lab.-Korea/Mitravet

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus aktif *ND strain LaSota* tidak kurang dari $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IB tipe Massachusetts strain Holland-120* tidak kurang dari $10^{2,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap penyakit ND dan IB pada ayam pedaging (*broiler*) maupun petelur (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Air minum: sebelum vaksinasi, biarkan ayam $\pm$ 2 jam tanpa air minum. Kemudian larutkan 1 (satu) vial vaksin 1.000 dosis dengan air minum sesuai umur ayam. Tetes mata atau hidung: larutkan 1 vial vaksin dalam 30 ml pelarut kemudian teteskan pada mata/hidung sebanyak 1 tetes ($\pm$ 0,03 ml)/ekor **Kemasan** 1.000 dosis x 10 vial **Kementan RI No. I. 12031022 VTS. 1. Obat bebas terbatas**

318. ND SINCO BRONVAC

Pasteur Institute, Romania/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain Lasota*, minimum $10^9 \text{EID}_{50}/\text{ml}$, virus *EDS 76 strain 127* minimum $10^{7,5} \text{EID}_{50}/\text{ml}$ dan virus *IB strain H 120* minimum $10^{7,5} \text{EID}_{50}/\text{ml}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, EDS dan IB pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml (1 dosis)/ekor ayam melalui suntikan SC **Kemasan botol 500 ml Deptan RI No. I. 06013038 VKC. Obat keras**

319. ND VACCINE LASOTA

AAKO BV, Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis mengandung Virus aktif *Newcastle disease strain lasota* **Indikasi** Untuk pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum dan diberikan melalui tetes mata, tetes hidung, *spray* atau injeksi IM **Kemasan Vial 500 dosis, 1.000 dosis, 2.000 dosis, 2.500 dosis dan 5.000 dosis Deptan RI No. I. 13021919 VTS. 2. Obat bebas terbatas**

320. ND VIRUS LASOTA AND IB VIRUS 120 LIVE VACCINE

QYH Biotech Company

Bentuk Sediaan Kering beku/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain lasota* minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ dan virus aktif *IB H 120* minimum $10^{3,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan pengebalan terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor melalui tetes mata, air minum dan *spray* **Kemasan Vial 1.000 dosis Deptan RI No. I. 07013163 VTS. Obat bebas terbatas**

321. NDG – VAC

ChoongAng Vaccine Lab. Korea/Mitravet

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif sebelum diinaktivasi tidak kurang dari $10^{9,0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap penyakit *Newcastle Disease* (ND) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur <

39 hari: dosis 0,25 ml. Ayam umur 40 hari: dosis 0,5 ml. Diinjeksikan secara IM. Program vaksinasi: vaksinasi awal umur 4 minggu. Vaksinasi kedua ayam petelur umur 4 minggu dan selanjutnya tiap 3-4 bulan sekali **Kemasan Botol @ 1.000 dosis Kementan RI No. I. 1201735 VTC. 1. Obat bebas terbatas**

322. NDLS – VAC

ChoongAng Vaccine Lab. Korea/Mitravet

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Tiap dosis mengandung virus ND *strain LaSota* aktif tidak kurang dari $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Memberikan kekebalan terhadap penyakit tetelo (ND) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes mata atau hidung: larutkan 1 vial vaksin dalam 30 ml pelarut, kemudian teteskan pada mata/hidung sebanyak 1 tetes ($\pm 0,03$ ml)/ekor. Air minum: larutkan 1 vial vaksin ke dalam air minum dengan takaran sesuai umur ayam. Program vaksinasi: vaksinasi awal ayam umur 1-4 hari (tetes mata/hidung atau semprot). Vaksinasi berikutnya ayam umur 3-4 minggu, vaksinasi berikutnya dilakukan 3 minggu setelah vaksin pertama dan selanjutnya untuk ayam petelur tiap 3-4 bulan sekali. **Kemasan** 1.000 dosis x 10 vial **Kementan RI No. I. 11111215 VTS. 1. Obat bebas terbatas**

323. NDV4HR

Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND *strain V4 heat resistant* minimum 106.5EID_{50} **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit Newcastle Disease **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum, tetes mata/hidung, *spray* **Kemasan** vial 1000 dosis **Deptan RI No. I. 07063223 VTS. Obat bebas terbatas**

324. NECTIN

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Oil emulsion **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND *strain komarov* minimum $10^{8.3} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Disuntikkan 0,2 ml secara SC untuk umur 1 hari dan dosis 0,5 ml untuk semua umur **Kemasan** 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI No. I. 03041709 VTC. 1. TML. Obat keras**

325. NEDEVAC

Pasteur Institute, Romania/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif ND *strain Lasota* minimum 10^9EID_{50} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml (1 dosis)/ekor ayam melalui suntikan SC atau IM **Kemasan Botol 100 ml (200 dosis) Deptan RI No. I. 05042915 VTC. Obat bebas terbatas**

326. NEMOVAC

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis mengandung antigen SHS, *strain PL21* minimum $10^{2.3} \text{EID}_{50}$ yang telah dimodifikasi minimal $10^{2.3} \text{CCID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit SHS **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan tetes mata, air minum, *spray* 1 dosis/ekor. Suntikan dilakukan 3-4 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** 1.000 dosis **Deptan RI No. I. 0512742 VKS. 1. Obat keras**

327. NEW BRONZ MG

Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang $10^{10.4} \text{EID}_{50}$ virus aktif *Newcastle disease strain kimber*, $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ virus aktif *Infectious bronchitis tipe massachusetts strain H-52* dan $10^{10.4} \text{EID}_{50}$ virus aktif *IB strain M-41* dan 1.000 CFU *Mycoplasma galisepticum strain R-980* sebelum diinaktifkan **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit newcastle disease, infectious bronchitis dan penyakit yang disebabkan mycoplasma galisepticum pada ayam petelur maupun pembibit. Diberikan sebagai vaksinasi ulangan pada ayam sehat umur 4 minggu sebelum mulai bertelur setelah sebelumnya diberi priming dengan vaksin aktif ND dan IB **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC atau IM dengan dosis 0,5 ml/ekor pada ayam umur 3 minggu atau lebih tua **Kemasan** Tiap botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 01091897 VKC. 1. Obat keras

328. NEW BRONZ

Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang $10^{10.4} \text{EID}_{50}$ virus aktif *Newcastle disease strain kimber*, virus aktif *IB strain M-41* dan *strain H-52* masing-masing minimum $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktifkan dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Newcastle disease* dan *Infectious bronchitis* pada ayam petelur maupun pembibit. Diberikan sebagai vaksinasi ulangan pada ayam sehat umur 4 minggu sebelum mulai bertelur **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan SC atau IM dengan dosis 0,5 ml/ekor pada ayam umur 3 minggu atau lebih tua **Kemasan** Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 01021183 VTC. 2. Obat bebas terbatas

329. NEWCA – MEX

Laboratorio Avimex, SA de Mexico/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Newcastle disease strain Lasota* titer minimum 10^{10}EID_{50} /dosis sebelum diaktifasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit infeksi *Newcastle disease* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml) diberikan dengan cara penyuntikan secara SC pada bagian leher atau IM pada otot paha **Kemasan** Botol 1.000 dosis (500 ml) **Deptan RI** No. I. 01071021 VTC. Obat bebas terbatas

330. NEWCASTLE B1

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND tipe B1 strain B1 dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND (tetelo) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat, jika memungkinkan vaksinlah semua ayam yang rentan di lingkungan tersebut pada waktu yang sama. Selama 10-14 hari setelah vaksinasi, hindarkan partikel vaksin yang dibawa oleh sepatu, baju dan lain-lain ke dalam daerah dimana ayam-ayamnya belum divaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu *skim*) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata/tetes hidung pada ayam umur 1 hari lebih sedangkan pada ayam berumur 2 minggu atau

lebih pemberiannya melalui air minum. Jika divaksinasi dibawah umur 2 minggu sebaiknya dilakukan vaksinasi ulang. Pada ayam umur 4 minggu atau lebih pemberiannya melalui semprot/*spray* **Kemasan** Kotak isi 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0211057 VTS.

2. Obat bebas terbatas

331. NEWCASTLE DISEASE –**INFECTIOUS BRONCHITIS****LIVE VACCINE (LASOTA+H120)****Harbin Weike Bio-Technology****Development Company, China/****Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku berwarna putih gading, kering beku, mudah larut dalam pengencer **Komposisi** Setiap dosis vaksin hidup ini mengandung virus *ND strain Lasota* $\geq 10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *Avian infectious bronchitis* strain H120 $3 \times 10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Cocok untuk mencegah penyakit *Newcastle disease* dan *Avian infectious bronchitis* bagi semua jenis bibit ayam dari semua umur **Perhatian** Gunakan vaksin dalam 4 jam setelah diencerkan. Jika vaksin diberikan melalui air minum, harus dihabiskan dalam 2 jam. Hentikan pemberian air minum 3-4 jam sebelum vaksinasi. Berikan interval 5-7 hari dengan vaksinasi *Infectious laryngotracheitis* atau *Infectious bursal disease* aktif untuk menghindari interaksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diencerkan dengan pelarut vaksin sesuai label pada vial. Dosisnya adalah 0,03-0,04 ml secara intranasal atau intraokular dan didouble dengan air minum **Kemasan** Vial 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 10033769 VTS. Obat bebas terbatas

332. NEWCASTLE DISEASE AND EGG DROP SYNDROME**QYH Biotech Company****VACCINE INACTIVATED (La Sota Strain + 911 Strain)****Limited, China/****Lito Prima Mandiri**

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* minimum $10^{8.1} \text{EID}_{50}$ dan virus *EDS* minimum $10^{6.8} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Memberikan pengebalan terhadap penyakit ND dan EDS Penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** Setiap dosis 0,5 ml/ekor secara IM **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 07033186 VKC. Obat keras

333. NEWCASTLE DISEASE B1 BRON CONN MASS**Pfizer Animal Health, USA/****Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain B1* dan virus aktif *IB strain connecticut* dan *strain massachusetts M-41* dengan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND (tetelo) dan IB pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit diberikan pada ayam sehat umur 1 hari atau lebih **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Vaksinlah semua ayam yang rentan di lingkungan tersebut pada waktu yang sama. Selama 10-14 hari setelah vaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu *skim*) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, pada ayam umur 1 hari atau lebih. Melalui air minum pada ayam umur 2 minggu atau lebih dan jika divaksinasi dibawah umur 2 minggu sebaiknya dilakukan

direvaksinasi. Melalui spray/semprot pada ayam umur 4 minggu atau lebih **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 1210424 VTS. 3. Obat bebas terbatas

**334. NEWCASTLE DISEASE KILLED Harbin Weike Bio-Technology Development
VACCINE (LA SOTA) Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan berwarna putih gading, kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease (strain LaSota)*, sebelum inaktif $3 \times 10^{8,0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Mencegah penyakit *Newcastle disease* bagi semua jenis bibit ayam dari semua umur **Perhatian** Vaksin harus dihabiskan dalam 24 jam setelah botol dibuka. Direkomendasikan untuk sering mengganti jarum *syringe* selama injeksi vaksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur 2 minggu diinjeksi 0,2 ml secara SC pada leher dan pada waktu yang sama divaksinasi dengan vaksin live secara intranasal atau intraokular. Tetapi ayam *broiler* harus diinjeksi satu kali dengan cara yang sama. Ayam umur 2 bulan diinjeksi 0,5 ml dan jangka waktu imunitas mencapai 10 bulan. Jika ayam diinjeksi dengan vaksin live 0,5 ml sebelum 2 sampai 3 minggu dari periode bertelur, proteksi harus berlangsung sepanjang periode bertelur **Kemasan** 250 ml/botol (60 botol/dus), 500 ml/botol (30 botol/dus) **Kementan RI** No. I. 11124187 VTC. Obat bebas terbatas

**335. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS II Pfizer Animal Health, USA/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain Lasota* dan virus aktif *IB strain holland (H-52)* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND (tetelo) dan IB pada ayam petelur maupun pembibit diberikan pada ayam sehat umur 1 hari atau lebih **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Vaksinlah semua ayam yang rentan di lingkungan tersebut pada waktu yang sama. Selama 10-14 hari setelah vaksinasi, Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu skim) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, pada ayam umur 1 hari atau lebih. Melalui air minum pada ayam umur 2 minggu atau lebih dan jika divaksinasi dibawah umur 2 minggu sebaiknya dilakukan vaksinasi ulang. Melalui spray/semprot pada ayam umur 4 minggu atau lebih **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 1212432 VTS. 3. Obat bebas terbatas

**336. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS Pfizer Animal Health, USA/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain Lasota* dan virus aktif *IB strain M-41* dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Terhadap penyakit ND (tetelo) dan IB pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit diberikan pada ayam sehat umur 1 hari atau lebih **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Vaksinlah semua ayam yang rentan di lingkungan tersebut pada waktu yang sama. Selama 10-14 hari setelah vaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu skim) **Dosis dan**

Cara Pemakaian 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, pada ayam umur 1 hari atau lebih. Melalui air minum pada ayam umur 2 minggu atau lebih dan jika divaksinasi dibawah umur 2 minggu sebaiknya dilakukan vaksinasi ulang. Melalui *spray*/semprot pada ayam umur 4 minggu atau lebih **Kemasan** Kotak isi 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05031404 VTS. 2. Obat bebas terbatas

**337. NEWCASTLE DISEASE LIVE
VACCINE (CLONE 30)**

**Harbin Weike Bio-Technology Development
Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku berwarna putih gading, kering beku, mudah larut dalam pengencer **Komposisi** Setiap dosis vaksin ND aktif ini mengandung virus *ND strain clone-30*³ 10^{6.5}EID₅₀ **Indikasi** Cocok untuk mencegah penyakit *Newcastle disease* bagi semua jenis bibit ayam dari semua umur **Perhatian** Gunakan vaksin dalam 4 jam setelah diencerkan. Jika vaksin diberikan melalui air minum, harus dihabiskan dalam 2 jam. Hentikan pemberian air minum 3-4 jam sebelum vaksinasi. Berikan interval 5-7 hari dengan vaksinasi *Infectious laryngotracheitis* atau *Infectious bursal disease* aktif untuk menghindari interaksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes hidung vaksin diencerkan dalam 15-25 ml pelarut vaksin, setiap ekor ayam satu tetes. Air minum vaksin diencerkan dengan air minum, dosis 10 ml untuk ayam dewasa dan 5 ml untuk ayam kecil. *Spray* 1 ml vaksin dapat digunakan untuk vaksinasi sekitar 200 ekor ayam, waktu dipakai setiap 1 ml vaksin ditambah air 1000 ml. rekomendasi prosedur vaksinasi, vaksinasi I pada umur 7-10 hari, vaksinasi II sekitar umur 30 hari, *layer* atau *breeder* dibooster setiap 7-8 minggu kemudian, atau dikombinasi dengan pemakaian vaksin inaktif **Kemasan** Vial 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 10013770 VTS. Obat bebas terbatas

**338. NEWCASTLE DISEASE LIVE
VACCINE (LA SOTA)**

**Harbin Weike Bio-Technology Development
Company, China/ Farmadika Sejahtera Indonesia**

Bentuk Sediaan Masa spon berwarna putih gading, kering beku dan dapat melarut cepat dalam pengencer **Komposisi** Setiap dosis vaksin aktif ini mengandung virus *ND strain LaSota* 3x10^{6.5}EID₅₀ **Indikasi** Cocok untuk mencegah penyakit *Newcastle disease* bagi semua jenis bibit ayam dari semua umur **Perhatian** Gunakan vaksin dalam 4 jam setelah diencerkan. Jika vaksin diberikan melalui air minum, harus dihabiskan dalam 2 jam. Hentikan pemberian air minum 3-4 jam sebelum vaksinasi. Berikan interval 5-7 hari dengan vaksinasi *Infectious laryngotracheitis* atau *Infectious bursal disease* aktif untuk menghindari interaksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes hidung vaksin diencerkan dalam 15-25 ml pelarut vaksin. Setiap ekor ayam 1 tetes. Air minum vaksin: diencerkan dengan air minum, dosis 10 ml untuk ayam dewasa dan 5 ml untuk ayam kecil. *Spray* 1 ml vaksin dapat digunakan untuk vaksinasi sekitar 200 ekor ayam. Waktu dipakai setiap 1 ml vaksin ditambah air 1.000 ml. Rekomendasi prosedur vaksinasi vaksinasi I pada umur 7-10 hari. Vaksinasi II sekitar umur 30 hari, *layer* atau *breeder* dibooster setiap 7-8 minggu kemudian, atau dikombinasi dengan pemakaian vaksin inaktif **Kemasan** Vial 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 06093120 VTS. Obat bebas terbatas

339. NEWCASTLE DISEASE N-63

**Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/
Pimaimas Citra**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND strain LaSota minimum 106,5EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada unggas Perhatian Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 03031873 VTS. 1. Obat bebas terbatas

340. NEWCASTLE DISEASE N-79

**Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/
Pimaimas Citra**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND Clone strain LaSota minimum 106,5EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada unggas Perhatian Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 04022389 VTS. 1. Obat bebas terbatas

**341. NEWCASTLE DISEASE VACCINE
INACTIVATED (LA SOTA STRAIN)**

**QYH Biotech Company Limited, China/
Lito Prima Mandiri**

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain Lasota* minimum 10^{8,1}EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Memberikan pencegahan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis 0,5 ml pemberian lewat IM, dan penyimpanan 4-8°C **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 07013165 VTC. Obat bebas terbatas

**342. NEWCASTLE DISEASE VACCINE
LIVE (LASOTA STRAIN)**

**QYH Biotech Company Limited, China/
Lito Prima Mandiri**

Bentuk Sediaan Kering beku/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain Lasota* minimum 10^{6,5} EID₅₀ **Indikasi** Memberikan pencegahan terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor. Pemberian lewat tetes mata, air minum, semprot **Kemasan** Vial 1.000 dosis penyimpanan 4-8°C **Deptan RI** No. I. 07013164 VTS. Obat bebas terbatas

**343. NEWCASTLE DISEASE VACCINE,
LIVING, BP (VET) (B1 STRAIN)**

**Venkateshwara Hatcheries Pvt, Ltd India/
Vetindo Citrapersada**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Newcastle disease, strain B1* minimum 10^{6,5}EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan aktif terhadap ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin dapat diberikan pada ayam berumur 1-6 hari. Vaksin dapat diberikan melalui *spray*, air minum, tetes mata atau tetes hidung. Campuran vaksin harus merata dan diberikan pada ayam yang sehat sehingga dapat mencapai imunisasi yang optimal **Kemasan** Vial @ 100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis, 5.000 dosis dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083674 VTS. Obat bebas terbatas

**344. NEWCASTLE DISEASE VACCINE, Venkateshwara Hatcheries Pvt, Ltd India/
LIVING, BP (VET) (LASOTA STRAIN) Vetindo Citrapersada**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Newcastle disease, strain lasota* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap ND pada unggas

Dosis dan Cara Pemakaian Vaksin dapat diberikan pada ayam berumur satu hari sampai dewasa. Vaksin dapat diberikan melalui air minum, tetes mata atau tetes hidung. Campuran vaksin harus merata dan diberikan pada ayam yang sehat sehingga dapat mencapai imunisasi yang optimal **Kemasan** Vial @100 dosis, 200 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis, 5.000 dosis dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083675 VTS. Obat bebas

**345. NEWCASTLE INFLUENZA Laboratio AVIMEX SA DE CV, Mexico/
KILLED VIRUS VACCINE Avindo Perdana Bahtera Mulia**

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif sebelum diinaktivasi *Newcastle disease strain LaSota* minimum $10^{8.6} \text{CEID}_{50}$ dan virus inaktif *Avian influenza (AI) tipe A serotype H5N2 strain A/Chicken/Mexico/232/94/CPA* minimum $10^{7.7} \text{CEID}_{50}$ **Indikasi**

Imunisasi terhadap ND dan AI pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis 0,5 ml/ekor untuk unggas umur 8 hari atau lebih secara SC **Kemasan** 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. DPS. I. 0705199 VKC. Obat keras

346. NEWCASTLE K Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung $10^{9.0} \text{EID}_{50}$ *ND strain kimber* sebelum diinaktivasi dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Newcastle disease* pada *layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC atau IM dengan dosis 0,5 ml dan jika digunakan sebagai *booster*, pada umur 4 minggu sebelum bertelur **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0812566 VTC. 3. Obat bebas terbatas

347. NEWCASTLE LASOTA Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ virus aktif *ND tipe B1 strain Lasota* dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND (tetelo) pada ayam *broiler*, petelur maupun pembibit dan berikan pada ayam sehat umur 1 hari atau lebih **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Vaksinlah semua ayam yang rentan di lingkungan tersebut pada waktu yang sama. Selama 10–14 hari setelah vaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu *skim*) **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam. Diberikan melalui tetes mata/tetes hidung pada ayam umur 1 hari atau lebih. Melalui air minum pada ayam umur 2 minggu atau lebih dan jika divaksinasi dibawah umur 2 minggu sebaiknya dilakukan vaksinasi ulang. Melalui *spray*/semprot pada ayam umur 4 minggu atau lebih **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 1209058 VTS. 3. Obat bebas terbatas

348. NEWVAC LASOTA

Pasteur Institute, Romania/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND* minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Newcastle disease* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 ml (1 dosis)/ekor ayam melalui suntikan SC Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05022899 VTS. Obat bebas terbatas

349. NOBILIS AE + POX

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal $10^{2,5} \text{EID}_{50}$ virus aktif *strain calnek 1143* dan $10^{2,8} \text{EID}_{50}$ virus aktif *Powl pox strain gibbs* **Indikasi** Imunisasi aktif terhadap *pullet layer*, *breeder* dan kalkun terhadap *Avian encephalomyelitis* dan *Powl pox* **Dosis dan Cara Pemakaian** Metode *wing web*. Vaksinasi ayam: dilakukan pada umur 8-16 minggu. Revaksinasi dilakukan pada periode ganti bulu. Vaksinasi kalkun: dilakukan pada umur 18-26 minggu Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05062212 VTS. 1. Obat bebas terbatas

350. NOBILIS AE 1143

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaktif aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal 10^3EID_{50} virus aktif *AE strain calnek 1143* **Indikasi** Imunisasi aktif terhadap *pullet layer*, *breeder* dan kalkun terhadap *Avian encephalomyelitis* **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum. Vaksinasi ayam: dilakukan pada umur 8-16 minggu, revaksinasi dilakukan pada periode ganti bulu. Vaksinasi kalkun: dilakukan pada umur 18-26 minggu **Kemasan Vial** 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0506724 VTS. 2. Obat bebas terbatas

351. NOBILIS CORVAC

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif, emulsi air dalam minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum serotype A strain 083*, *B strain spross* dan *C strain H-18*, masing-masing minimum 3×10^8 sebelum diinaktifasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit coryza pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam secara SC, mulai umur 5 minggu atau lebih tua dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** 500 ml **Deptan RI** No. I. 06022405 VTC. 1. Obat bebas terbatas

352. NOBILIS CORYZA

Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* saponin **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum strain 083 (serotype A)*, *strain spross (serotype B)*, *strain H-18 (serotype C)*, masing-masing minimum PD_{70} sebelum diinaktifasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit coryza pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam antara umur 5-10 minggu dengan 0,25 ml vaksin dan revaksinasi tidak lebih dari 4-6 minggu sebelum onset bertelur. Interval antara pemberian paling tidak 4 minggu **Kemasan**

250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 0502482 VTC. 1. Obat bebas terbatas

353. NOBILIS E COLI INAC

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif, *water in oil emulsion* **Komposisi** Setiap dosis mengandung *antigen E. coli fimbrial (F11)* dan *E. coli falgellar (FT)* masing-masing minimum 68,3 mg

Indikasi Imunisasi pasif *broiler* terhadap kolibasilosis melalui vaksinasi induk **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi ayam *broiler breeder* pada umur 6-12 minggu. Ulangi pada umur 14-18 minggu. Interval antara vaksinasi paling tidak 6 minggu **Deptan RI** No. I. 05070848 VTC. 1. Obat bebas terbatas

354. NOBILIS EDS

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal $6,5 \log 2$ virus *EDS strain BC14* **Indikasi** Pengebalan ayam *layer* dan *breeder* terhadap EDS'76 selama masa bertelur **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM pada otot paha/otot dada atau secara SC pada bagian leher. Vaksinasi dilakukan pada ayam umur 4 minggu sebelum bertelur dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0410554 VKC. 2. Obat keras

355. NOBILIS G + ND

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal $10^{6,6} \text{TCID}_{50}$ virus aktif *gumboro strain D78* dan virus aktif *ND strain clone 30* minimum EID_{50} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap gumboro dan ND **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM pada otot dada/paha atau SC pada bagian leher. Vaksinasi dilakukan pada ayam umur 4 minggu sebelum masa bertelur dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0410967 VTC. 2. Obat bebas terbatas

356. NOBILIS GUMBORO 228E

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal 10^2EID_{50} virus *IBD aktif strain 228 E* **Indikasi** Imunisasi aktif ayam terhadap penyakit gumboro (IBD) **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum. Umur vaksinasi tergantung dari titer antibodi maternal **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 00111760 VKS. 1. Obat keras

357. NOBILIS GUMBORO D78

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal 10^4TCID_{50} virus *IBD aktif strain D78* **Indikasi** Imunisasi aktif ayam terhadap penyakit gumboro

(IBD) **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum, tetes hidung atau *spray* (*coarse spray*), vaksinasi dapat dilakukan mulai dari 7-28 hari **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0602771 VKS. 2. Obat keras

358. NOBILIS GUMBORO INAC **Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/**
Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal $10^{6.6}$ TCID₅₀ virus aktif *gumboro strain D78* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap penyakit gumboro **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui penyuntikan secara IM pada otot paha/otot dada atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *breeder* **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04102418 VTC. 1. Obat bebas terbatas

359. NOBILIS IB + G + ND **Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/**
Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Mengandung virus inaktif *IB strain M41* minimum 4log₂ HI unit, *IBD strain D78* minimum 12,5log₂ VN unit dan *ND strain clone 30* minimum ⁵⁰PD₅₀ unit sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *IB (type massachusetts)*, IBD (gumboro) dan ND. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM pada otot dada/otot paha atau SC pada bagian leher **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04101370 VTC. 2. Obat bebas terbatas

360. NOBILIS IB + ND + EDS **Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/**
Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB strain M41* minimum 4log₂ HI unit, *ND strain clone 30* minimum ⁵⁰PD₅₀ unit dan *EDS'76 strain BC14* minimum 6,5log₂ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *IB (serotype massachusetts)*, *ND* dan *EDS'76*. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *layer/breeder* dan diberikan pada umur 4 minggu sebelum mulai masa bertelur **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan dilakukan secara IM pada otot dada/otot paha atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05021101 VKC. 2. Obat keras

361. NOBILIS IB + ND **Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/**
Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB strain M41* minimum 4log₂ HI unit dan virus inaktif *ND strain clone 30* minimum ⁵⁰PD₅₀ unit sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *IB (serotype massachusetts)* dan ND. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM pada otot dada/otot paha atau

SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04091100 VTC. 3. Obat bebas terbatas

362. NOBILIS IB 4/91

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal $10^{3,6} \text{EID}_{50}$ virus *IB* aktif *strain 4/91* **Indikasi** Imunisasi aktif ayam terhadap infeksi virus *IB serotipe 4/91* atau serotipe yang memiliki hubungan serologis **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum, *spray*, tetes mata/hidung. Tingkat proteksi yang luas didapat bila dilakukan vaksinasi Nobilis IB Ma5 pada umur sehari dan diikuti dengan vaksinasi menggunakan Nobilis IB 4/91 pada umur 14 hari **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0501793 VTS. 1. Obat bebas terbatas

363. NOBILIS IB H – 120

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal 10^3EID_{50} virus *Infectious bronchitis* aktif *strain H120* **Indikasi** Imunisasi aktif ayam *broiler, layer, breeder* serta vaksinasi yang dianggap darurat terhadap *Infectious bronchitis tipe massachusetts* **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum, *spray*, tetes mata/hidung. Vaksinasi dapat dilakukan mulai dari umur 1 hari **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0601235 VTS. 3. Obat bebas terbatas

364. NOBILIS IB MA 5

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal 10^3EID_{50} virus *Infectious bronchitis strain Ma5 (serotipe massachusetts)* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Imunisasi aktif ayam terhadap infeksi virus *Infectious bronchitis tipe massachusetts* atau serotipe yang berhubungan secara serologis **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06012392 VTS. 1. Obat bebas terbatas

365. NOBILIS IB MULTI + ND + EDS Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB strain M41* minimum $4 \log_2$ unit VN/dosis, *IB strain D274* minimum $4 \log_2$ unit VN/dosis, *ND strain clone 30* minimum $4 \log_2$ unit HI/1/50 dosis dan *EDS'76 strain BC14* minimum $6,5 \log_2$ sebelum inaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *IB (serotipe massachusetts dan D207/D274)*, *ND* dan *EDS'76*. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** *Penyuntikan* secara IM pada otot dada/otot paha atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04012716 VKC. Obat keras

**366. NOBILIS IB MULTI + G + ND Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif emulsi air dalam minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB strain M41* minimum EID_{50} , *IB strain D207/D274* minimum EID_{50} , *gumboro strain D78* minimum EID_{50} dan *ND strain clone 30* minimum EID_{50} sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *IB (serotipe massachusetts dan D207/D274)*, gumboro dan ND. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot dada/otot paha atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 02112461 VTC. Obat bebas terbatas

**367. NOBILIS IB MULTI + ND Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB strain M41* minimum 4log2 unit VN/dosis, *strain D274* minimum 4log2 unit VN/dosis dan virus inaktif *ND strain clone 30* minimum 4log2 unit HI/1/50 dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *layer* dan *breeder* untuk pengebalan terhadap *IB (serotipe massachusetts, D207/D274 (dan yang berhubungan))* dan ND **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot dada/otot paha atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05010030 VTC. 1. Obat bebas terbatas

**368. NOBILIS ILT BIOTRACH Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain tribio* minimum $10^{2,93}EID_{50}$ /dosis **Indikasi** Imunisasi aktif terhadap penyakit *Infectious laryngotracheitis* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara *spray*, air minum atau tetes mata **Deptan RI** No. I. 09062018 VKS. 1. Obat keras

**369. NOBILIS ILT Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimal $10^{2,5}EID_{50}$ virus *ILT strain serva* **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi laryngotracheitis dapat juga digunakan pada saat kondisi darurat dimana ayam terinfeksi laryngotracheitis. Vaksinasi direkomendasikan pada ayam umur 4-6 minggu dan revaksinasi pada umur 14-16 minggu **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian vaksin dengan cara tetes mata **Kemasan** Vial 1.000 dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 05027555 VKS. 2. Obat keras

**370. NOBILIS INFLUENZA H5 + ND Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Avian influenza tipe A, subtype H5N2 strain A/chicken/Mexico/232/94/CPA*, minimum 3,32

log₂ HI unit/dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Immunisasi aktif unggas sebagai salah satu strategi untuk mengontrol infeksi virus *Avian influenza tipe A, subtype H5* dan **ND Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diberikan dengan cara injeksi SC pada leher bagian bawah atau IM dengan dosis 0,5 ml untuk vial 1.000 dosis dan 0,25 ml untuk vial 2.000 dosis **Kemasan** Vial 1.000 (500 ml) dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05103017 VKC. Obat keras

371. NOBILIS INFLUENZA H5 **Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Avian influenza tipe A, subtype H5N2 strain*, minimum EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Immunisasi aktif unggas sebagai salah satu strategi untuk mengontrol infeksi virus *Avian influenza tipe A, subtype H5* **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara injeksi SC pada leher bagian bawah atau IM dengan dosis 0,5 ml untuk vial 1.000 dosis dan 0,25 ml untuk vial 2.000 dosis **Kemasan** Vial 1.000 (500 ml) dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. DPS. I. 0402063 VKC. Obat keras

372. NOBILIS MA5 + CLONE 30 **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10³EID₅₀ virus aktif *Infectious bronchitis strain Ma5 (tipe massachusetts)* dan 10⁶EID₅₀ *ND strain clone 30* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap infeksi yang disebabkan virus *Infectious bronchitis* dan *Newcastle disease* **Dosis dan Cara Pemakaian** Tetes mata/hidung, *spray* atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 06092398 VTS. 1. Obat bebas terbatas

373. NOBILIS MAREXINE CA126 **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif suspensi sel yang dibekukan dalam nitrogen cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10³PFU *turkey herpes virus* (virus aktif *Marek's disease*) strain FC-126 **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *Marek's disease* **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** pada DOC secara IM di paha atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,2 ml **Kemasan** Ampul 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06031140 VKM. 3. Obat keras

374. NOBILIS MG 6/85 **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10⁶CFU sel bakteri aktif *Mycoplasma gallisepticum strain 6/85* **Indikasi** Imunisasi aktif ayam untuk mengurangi gejala klinis infeksi *Mycoplasma gallisepticum* **Perhatian** Vaksin jangan diberikan pada saat ayam sudah 4 minggu bertelur atau masa bertelur, interval penggunaan vaksin ini dengan vaksin lain yang mempunyai target organ sama adalah 2 minggu, tidak melakukan tindakan medikasi terutama menggunakan obat anti mycoplasma 5

hari sebelum vaksinasi atau 2 minggu setelah vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara aerosol **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03072624 VKS. Obat keras

375. NOBILIS MG INAC

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Mengandung bakteri *Mycoplasma gallisepticum* inaktif *strain S6* minimum CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Vaksinasi terhadap infeksi *Mycoplasma gallisepticum* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06020454 VKC. 1. Obat keras

376. NOBILIS ND + EDS

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain clone 30* dan virus *EDS'76* inaktif *strain BC14* **Indikasi** Pengebalan ayam *layer* dan *breeder* terhadap *ND* dan *EDS'76* **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM di paha atau secara SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml. Vaksinasi dilakukan pada umur tidak kurang dari 4 minggu sebelum bertelur **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0502556 VKC. 2. Obat keras

377. NOBILIS ND BROILER

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Mengandung virus inaktif *ND strain clone 30* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *ND* **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM atau secara SC pada bagian leher sebanyak 0,1 ml ayam umur sehari (DOC) **Kemasan** Botol 200 ml **Deptan RI** No. I. 04081371 VTC. 2. Obat bebas terbatas

378. NOBILIS ND C2

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{5,7}$ EID₅₀ virus *ND* aktif *tipe B1 strain C2* **Indikasi** Pengebalan aktif terhadap penyakit *ND* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui tetes mata/hidung atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis atau 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 05022900 VTS. Obat bebas terbatas

379. NOBILIS ND CLONE 30

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{6,0}$ ELD₅₀ virus *ND* aktif *strain clone 30* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap *ND* **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum, tetes mata/hidung atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0502234 VTS. 3. Obat bebas terbatas

380. NOBILIS ND HITCHNER

Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{6.0}$ ELD₅₀ virus *ND* aktif *strain hitchner* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum, tetes mata/hidung atau *spray* Kemasan Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0502231 VTS. 3. Obat bebas terbatas

381. NOBILIS ND LA SOTA

Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{6.0}$ ELD₅₀ virus *ND* aktif *strain lasota* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum, tetes mata/hidung atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 0502230 VTS. 3. Obat bebas terbatas

382. NOBILIS NEWCAVAC

Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain clone 30* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap ND **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM di paha atau dada atau secara SC pada bagian leher sengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0408228 VKC.3. Obat bebas terbatas

383. NOBILIS REO + IB + G + ND

Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung *reovirus* inaktif *strain 1733* dan *2408* minimum 5log₂ VN units/dosis, virus *IBD* inaktif *strain D78* minimum 12,5log₂ VN units/dosis, virus *IB* inaktif *strain M41* minimum 6Log₂ HI unit/dosis dan virus *ND* inaktif *strain clone 30* minimum 50 PD₅₀ units/dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap infeksi *IB tipe massachusetts* dan *ND*. Imunisasi terhadap infeksi reovirus pada anak ayam melalui antibodi maternal dan menginduksi MDA gumboro yang tinggi. Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM pada otot paha/dada atau SC pada bagian leher **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) dengan pelarut khusus **Deptan RI** No. I. 0601195 VKC. 1. Obat keras

384. NOBILIS REO 1133

Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/

Intervet Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{3.1}$ TCID₅₀ *reo virus* aktif *strain 1133* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap infeksi reo virus pada *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara IM pada otot paha/dada atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,2 ml **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05021912 VKS. Obat keras

385. NOBILIS REO 2177

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{3,1}$ TCID₅₀ *reo virus* aktif *strain 2177* **Indikasi** Pengebalan aktif pada ayam terhadap penyakit tenosynovitis dan sejenisnya yang disebabkan oleh infeksi reovirus **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha/dada atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,2 ml **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07023178 VKC. Obat keras

386. NOBILIS REO ERS INAC

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Indikasi** Pengebalan ayam induk terhadap infeksi reovirus strain ERS **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin direkomendasikan untuk ayam *breeder* mulai umur 5 minggu injeksi secara IM atau SC dengan dosis 0,5 ml **Deptan RI** No. I. 07113354 VKC. Obat keras

387. NOBILIS REO INAC

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^9 TCID₅₀ *reovirus* aktif *strain 1733* dan *2408* sebelum inaktivasi **Indikasi** Vaksin direkomendasikan untuk vaksinasi *booster* pada *breeder* tidak kurang dari 4 minggu sebelum bertelur **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha/dada atau SC pada bagian leher dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05021915VKC. 1. Obat keras

388. NOBILIS RISMAVAC + CA 126

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif suspensi sel yang dibekukan dalam nitrogen cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^3 PFU *Chicken herpes virus* aktif *strain CVI-988* dan 10^3 PFU *turkey herpes virus* aktif *strain FC-126* **Indikasi** Imunisasi ayam terhadap infeksi vvMDV (virus *Marek's disease* yang ganas) **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha atau SC pada bagian leher dan vaksinasi hendaknya dilakukan pada umur sehari sebanyak 0,2 ml **Kemasan** Ampul 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0606205 VKM. 1. Obat keras

389. NOBILIS RISMAVAC

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif suspensi sel yang dibekukan dalam nitrogen cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^3 TCID₅₀ *Chicken herpes virus strain CVI-988* **Indikasi** Pengebalan ayam terhadap infeksi vvMDV (virus *marek's* yang ganas) **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha atau SC pada bagian leher dan vaksinasi hendaknya dilakukan pada umur sehari sebanyak 0,2 ml **Kemasan** Ampul 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05022394 VKS. 1. Obat keras

390. NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *TRT* inaktif *strain BUT 1 # 8544* minimum 9,5log₂ unit ELISA/dosis, *IB strain M41* minimum 4log₂ unit VN/dosis, *IB strain D207/274* minimum 4log₂ unit VN/dosis, *ND strain clone 30* minimum 4log₂ unit HI/1/50 dosis, dan *EDS'76 strain BC14* minimum 6,5log₂ unit HI/dosis sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, IB, EDS dan turkey rhinotracheitis (TRT) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha/dada atau SC pada bagian leher **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06093127 VKC. Obat keras

391. NOBILIS RT INAC. **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *TRT* inaktif *strain BUT 1 # 8544* minimum 9,5log₂ unit ELISA/dosis **Indikasi** Imunisasi ayam dan kalkun terhadap SHS **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha/dada atau SC pada bagian leher **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0110461 VKC. Obat keras

392. NOBILIS RTV 8544 **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10³TCID₅₀ virus *TRT* aktif *strain BUT 1 # 8544* **Indikasi** Imunisasi ayam terhadap *swollen head syndrome* yang disebabkan oleh infeksi virus *TRT* **Dosis dan Cara Pemakaian** Spray atau tetes mata/hidung dan vaksinasi dapat dilakukan mulai umur satu hari **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 02112457 VKS. Obat keras

393. NOBILIS SALENVAC **Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* Al(OH)₃ **Komposisi** Setiap dosis mengandung antigen inaktif bakteri *Salmonella enteritidis phage type 4* yang ditumbuhkan dalam kondisi media "iron restriction" **Indikasi** Vaksinasi pada unggas untuk mengontrol infeksi *Salmonella enteritidis PT4* **Dosis dan Cara Pemakaian Penyuntikan** secara IM pada otot paha dan vaksinasi dapat dilakukan pada umur 1 hari dengan dosis 0,1 ml. Pada umur 4 minggu: 0,5 ml dan umur 18 minggu dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol (*collapsible polyethylene*) 500 ml **Deptan RI** No. I. 03072625 VKC. Obat keras

394. OL – VAC **FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain hertz* minimum 100PD₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan IM atau SC pada leher yang diberikan 0,5 ml/ekor. Mengikuti jadwal vaksinasi pertama, vaksinasi kedua pada minggu ke-18-20. Pada unggas yang telah beberapa

kali diberikan vaksin hidup, pemberian dilakukan dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 ml untuk ayam petelur sebelum masa produksi, dan dosis 0,3-0,5 ml untuk *broiler* umur 18-20 hari **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06081608 VTC. 1. Obat bebas terbatas

395. OLVAC 1000

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Mengandung virus *ND* inaktif *strain velogenic* minimum 100 PD₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Diinjeksikan lewat SC pada leher. Dosis diberikan 0,25 ml/ekor pada umur 18-20 hari. Tetes mata/hidung pada umur 3-4 hari **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 070411666 VTS. 1. Obat keras

396. OLVAC A + B

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain hertz 33* minimum 10^{8,5}EID₅₀ sebelum diinaktivasi, virus *EDS*'76 inaktif *strain 127 Mc ferran* minimum 10^{7,5}EID₅₀ sebelum diinaktivasi dan virus *IB* inaktif *strain M41, D207, dan D212* masing-masing minimum 10^{7,5}EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, EDS'76 dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diberikan dengan cara diinjeksikan sebanyak 0,5 ml lewat SC pada leher atau IM **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05102157 VKC. 1. Obat keras

397. OLVAC B + G

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain hertz 33* minimum 10^{8,5}EID₅₀ sebelum diinaktivasi, virus *IB* inaktif *strain M41, D207, dan D212* masing-masing minimum 10^{7,5}EID₅₀ sebelum diinaktivasi dan virus *IBD* inaktif *strain immunogenic* minimum 10^{5,5}EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, IB, dan IBD **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan pada belakang leher atau IM. Pengebalan terhadap IBD dengan vaksin hidup yang dilemahkan pada umur 6 minggu **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05102193 VKC. 1. Obat keras

398. OVO – 4

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,3 ml) mengandung *antigen ND*, titer sebelum diinaktivasi minimal 10⁸EID₅₀, *Antigen IB*, titer sebelum diinaktivasi minimal 10^{6,7}EID₅₀, *Antigen EDS*'76, titer sebelum diinaktivasi minimal 10⁶CCID₅₀, *Antigen swollen head syndrome*, titer sebelum diinaktivasi minimal 10⁵CCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND, IB, SHS dan EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara injeksi IM/SC dosis 0,3ml/ekor. Waktu vaksinasi pada 3-4 minggu sebelum periode bertelur **Kemasan** Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05121479 VKC. 2. Obat keras

399. PESTIKAL + EDS + IB

Genera, Inc., Croatia/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain lasota* inaktif, virus *EDS strain EDS/RS* inaktif dan virus *IB strain M-41* inaktif sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Newcastle disease, Infectious bronchitis* dan *EDS* pada ayam

Dosis dan Cara Pemakaian Kocok sebelum digunakan. Ayam betina umur 16-20 minggu: 0,5 ml secara IM pada otot dada dan paha atau secara SC pada leher **Deptan RI** No. I. 06093113 VKC. Obat keras

400. PESTIKAL

Genera, Inc., Croatia/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain Lasota* inaktif **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Newcastle disease* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok sebelum digunakan. DOC: 0,2 ml secara SC pada leher. Anak ayam berumur 10-18 hari: 0,5 ml secara IM pada otot dada/paha. Ayam umur 16-20 minggu: 0,5 ml secara IM pada otot dada/paha **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Kementan RI** No. I. 06043061 VTC. Obat bebas terbatas

401. PM – OLVAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Emulsi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida* minimum 100 PD₅₀ dan virus *ND strain hertz* minimum 10^{8,5}EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan fowl cholera **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan lewat injeksi SC pada dosis 0,5 ml pada umur 3-5 minggu. *Booster* 4 minggu kemudian **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06090394 VTC. 1. Obat bebas terbatas

402. POLYBRON N-63

Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif ND strain LaSota minimum 106,5EID₅₀ dan IB tipe Mass strain M41 minimum 103,77EID₅₀ dan tipe Conn strain L2 minimum 103,77EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND dan IB pada unggas **Perhatian** Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis tetes mata atau air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.500 dosis **Deptan RI** No. I. 03032545 VTS. Obat bebas terbatas

403. POULVAC BURSA F

Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/

Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain V877* **Indikasi** Untuk vaksinasi ayam sehat sebagai pencegahan terhadap penyakit IBD (gumboro) pada ayam *broiler*, *layer* dan *breeder* **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu) **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap vial 1.000 dosis berikan pada 1.000 ekor ayam, melalui air minum. Pada ayam *broiler*/pedaging diberikan pada umur ketika gangguan antibodi asal induk tidak menyebabkan masalah terhadap vaksin, pada ayam *layer*/petelur berikan dua kali vaksinasi pada umur 10-17 hari dan 21-28 hari. Pada ayam *breeder*/pembibit diberikan sebagaimana ayam *layer* dan berikan vaksinasi *priming* 6 minggu atau lebih sebelum pemberian vaksin IBD inaktif **Kemasan** Tiap kotak berisi 10 vial @ 500 dosis, 1.000 dosis, 2.000 dosis dan 5.000 dosis **Deptan RI** No. I. 05032907 VKS. Obat keras

404. POULVAC CORYZA ABC IC3

**Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *H. Paragallinarum serovar A strain 221*, *H. Paragallinarum serovar B strain spross* dan *H. Paragallinarum serovar C strain modesto* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit coryza pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi SC atau IM 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No.** I. 0811206 VTC. 1. Obat bebas terbatas

405. POULVAC E COLI

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung bakteri hidup *Escheria coli* **Indikasi** Direkomendasikan untuk mencegah penyakit yang disebabkan yang disebabkan oleh *E. Coli* **Perhatian** Jangan lakukan vaksinasi 21 hari menjelang pematangan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pemberian massal pada ayam sehat umur > 1 hari dengan menggunakan *spray*. Vaksinasi kedua diberikan pada unggas umur panjang umur 12-14 minggu **Kemasan** Vial 2.500 dosis, 5.000 dan 20.000 dosis **Kementan RI No.** I. 11034030 VTS. Obat bebas terbatas

406. POULVAC EDS NEW BRONZ VAC

**Fort Dodge Saude Animal Health Ltd.,
Brazil/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *EDS strain AD 127*, virus *ND strain LaSota type B1* dan virus *IB strain H-120* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit EDS, ND dan IB pada *layer* dan *breeder*. Diberikan pada ayam sehat umur 18-22 minggu yang sebelumnya sudah dipriming dengan vaksin aktif ND dan IB **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC dengan dosis 0,5 ml/ekor pada ayam umur 18-22 minggu **Kemasan** Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No.** I. 04122321 VKC. 1. Obat keras

407. POULVAC EDS VAC

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung minimum 160 HA unit *adeno strain adeno 127* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit EDS pada *layer* dan *breeder* **Perhatian** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi SC atau IM 0,5 ml pada ayam umur 14-18 minggu atau lebih **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI No.** I. 08123524 VKC. Obat keras

408. POULVAC IB H120

**Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/
Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Infectious bronchitis virus strain H120* **Indikasi** Untuk vaksinasi ayam dan kalkun sehat untuk pencegahan terhadap *Infectious bronchitis* **Perhatian** Vaksinasi hanya dilakukan pada unggas sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** Air minum: larutkan 1.000 dosis vaksin dalam air minum 7-10 L untuk umur 1-4 minggu, 20 L untuk umur 4-8 minggu, 40 L untuk umur >8 minggu. Aerosol (tidak pada vaksinasi awal): larutkan 1.000 dosis vaksin dalam 200 ml diluents AEROVAC untuk

umur 1-3 minggu dan ditambah dengan aquades 100 ml untuk umur 3-6 minggu, 200 ml untuk umur 6-8 minggu, 300 ml untuk umur 8-16 minggu dan 500 ml untuk umur > 16 minggu. Intranasal/tetes mata: larutkan 1.000 dosis vaksin dalam diluents PRO-OCULAR, gunakan special *dropper*. Teteskan satu tetes ke dalam lubang hidung atau mata **Kemasan** Box 10 vial masing-masing berisi 1.000 dosis, 2.000 dosis atau 5.000 dosis **Kementan RI** No. I. 12104374 VTS. Obat bebas terbatas

409. POULVAC IC ABC OIL**Fort Dodge Saude Animal Ltd., Brazil/****Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum strain 221 serovar A, strain spross serovar B dan strain serovar C* sebelum diinaktivkan dengan thimerosal **Indikasi** Untuk vaksinasi ayam sehat terhadap infeksi coryza yang disebabkan oleh *Haemophilus paragallinarum tipe A, B dan C* **Perhatian** Jangan lakukan vaksinasi pada ayam 21 hari sebelum dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam berumur > 5 minggu. Kocok dengan baik sebelum digunakan dan suntikkan 0,5 ml/ekor secara IM **Kemasan** Botol 500 dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 10053831 VTC. Obat bebas terbatas

410. POULVAC MAREK CVI**Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/****Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap dosis mengandung virus aktif *Marek strain CVI 988 (rispen)* **Indikasi** Untuk pencegahan ayam umur sehari (DOC) terhadap penyakit marek **Perhatian** Gunakan sesuai petunjuk dokter hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis/ekor DOC. Tiap 1.000 dosis disertai 200 atau 500 ml pelarut poulvac merek sehingga 1 dosis bervolume 0,2 atau 0,5 ml. Suntikkan secara IM pada paha atau secara SC pada leher **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07021600 VKS. 1. Obat keras

411. POULVAC MIX 6**Fort Dodge Saude Animal Ltd., Brazil/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis vaksin mengandung virus inaktif *ND strain LaSota IB strain H120, EDS strain AD 127, Haemophilus paragallinarum serovar A strain 221, serovar B strain spross, serovar C strain M* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Vaksinasi ayam sehat untuk pencegahan terhadap *Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome dan Infectious coryza A, B dan C* **Perhatian** Jangan lakukan vaksinasi pada ayam 21 hari sebelum dipotong **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada ayam umum 15-22 minggu. Kocok dengan baik sebelum digunakan dan suntikan 0,5 ml secara IM **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. I. 10073853 VTC. Obat bebas terbatas

412. POULVAC NDW**Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/****Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku Komposisi Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain ulster* minimum $10^{6,5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND (tetelo) **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat. Hentikan pengobatan, dan air minum harus bebas desinfektan

24 jam sebelum dan sesudah vaksinasi. Puaskan ayam agar tidak minum 1-2 jam sebelum vaksinasi. Air minum yang digunakan untuk vaksinasi harus bersih, dingin, bebas chlorine dan ditambah dengan *skim milk* (susu *skim*). Jangan mengkombinasikan vaksin ini dengan vaksin lain, kecuali vaksin POULVAC IB PRIMER **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui tetes mata/tetes hidung, air minum atau *spray*/semprot pada ayam umur 1 hari. Untuk vaksinasi di *hatchery* sebaiknya dilakukan dengan menggunakan *sprayer* otomatis pada ayam umur 1 hari Kemasan Kotak isi 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0011599 VTS. Obat bebas terbatas

**413. POULVAC OVOLINE CHI + HVT Fort Dodge Saude Animal Health Ltda., Brazil/
MAREK'S DISEASE VACCINE Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung sel virus *Marek's strain CVI 988* dan sel virus *Marek's strain HVT FC 126* **Indikasi** Pencegahan terhadap ayam terhadap penyakit merek **KontraIndikasi** Vaksinasi hanya diberikan pada ayam yang sehat. Jangan berikan vaksin 21 hari sebelum pembedahan untuk konsumsi manusia **Perhatian** Simpan dalam kondisi beku dalam nitrogen cair (-196°C). Jika tingkat nitrogen rendah lebih dari 20 cm, dengan persetujuan maka vaksin harus dimusnahkan. Jangan pindahkan atau bawa tangki dalam ruang tertutup tanpa ada ventilasi yang cukup. Hati-hati bahaya dalam penanganan nitrogen cair dan kemungkinan meledak vial gelas pada saat dipindahkan dari kanister atau selama pencairan **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC 0,2 ml atau in-ovo 0,05 ml. Gunakan pelarut spesifik untuk vaksin penyakit merek. Untuk pemberian secara SC pada ayam umur 1 hari maka gunakan 200 ml pelarut untuk vaksin 1.000 dosis. Untuk pemberian secara in-ovo, gunakan 50 ml pelarut untuk vaksin dosis 1.000 **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09053622 VKS. Obat keras

414. POULVAC PABAC IV Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakterin *Pasteurella multocida, isolate avian tipe 1, 3, 4* dan *3x4* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Untuk vaksinasi ayam dan kalkun sehat sebagai pencegahan terhadap *Fowl cholera tipe 1, 3, 4* dan *3x4* **Dosis dan Cara Pemakaian** Berikan 0,5 ml SC. Kalkun: vaksinasi pada umur 8-10 minggu, ulangi dengan interval 4-5 minggu kemudian. Ayam: vaksinasi pada umur 12 minggu dan ulangi dengan interval 4-5 minggu **Kemasan** Botol 500 ml **Kementan RI** No. I. 11034029 VTC. Obat bebas terbatas

415. POWL POX Indovax Private Limited, India/Otasindo Primasatwa

Bentuk Sediaan Pelet kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *powl pox live* yang diatenuasi, *CAM (chorio-allantoic membrane) adapted virus of chicken embryo origin* minimum $10^{3,0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan aktif terhadap penyakit fowl pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas satu dosis vaksin dengan injeksi IM **Kemasan** Vial 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09103738 VTS. Obat bebas terbatas

416. POWL POX

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Powl pox* aktif *strain komarov* minimum 10^3 EID₅₀ **Indikasi** Pencegahan penyakit fox unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 *dosing wing web* **Kemasan** 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042124 VTS. Obat bebas terbatas

417. POXIMUNE AE

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Fowl pox strain cutter* $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀ dan *AE strain calnek* $\geq 10^{2.7}$ EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit cacar (*Fowl pox*) dan AE pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara tusuk sayap dan diamati 6-8 hari setelah vaksinasi dengan adanya nodul/bekas pada tempat suntikan menunjukkan bahwa vaksinasi berhasil **Kemasan** Vial 1.000 dosis dengan pelarut dan aplikator **Deptan RI** No. I. 05103011 VTS. Obat bebas terbatas

418. POXIMUNE

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Fowl pox strain cutter* $\geq 10^{2.7}$ TCID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit cacar (*Fowl pox*) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian secara tusuk sayap dan diamati 6-8 hari setelah vaksinasi dengan adanya nodul/bekas pada tempat suntikan menunjukkan bahwa vaksinasi berhasil **Kemasan** Vial 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis dengan pelarut dan aplikator **Deptan RI** No. I. 04122843 VTC. Obat bebas terbatas

419. POXINE

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Powl pox* dan gentamisin sebagai pengawet **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Powl pox* (cacar unggas) pada ayam petelur, pembibit maupun kalkun **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 vial untuk 1.000 ekor ayam/kalkun dan diberikan melalui tusuk sayap (*wing web*) pada ayam umur 6 minggu atau paling lambat 1 bulan sebelum bertelur. Jika ayam telah divaksin dengan Chick N Pox TC pada umur dibawah 6 minggu, sebaiknya vaksinasi ulang dilakukan pada umur 12 minggu. Pada kalkun vaksinasi dilakukan pada umur 8 minggu atau lebih tua **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis dan dilengkapi dengan 4 buah alat penusuk (*stabvaccinator*). Tiap vial vaksin dilengkapi dengan pelarut **Kementan RI** No. I. 1204072 VTS. 2. Obat bebas terbatas

420. PRO VAC 3

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Infectious bronchitis tipe massachuset*, *ND strain kimber*, *IBD strain lukert* sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Newcastle disease*, *Infectious bronchitis* dan gumboro **Perhatian** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi SC atau IM 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 09081663 VTC. 2. Obat bebas terbatas

421. PRO VAC 4

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB strain M-41*, *IBD strain bursine-2 (lukert)*, *ND strain kimber* dan *reovirus strain 1733* dan *reovirus strain 1408* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit gumboro, ND, IB dan reovirus **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC dengan dosis 0,5 ml/ekor **Kemasan** Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 1112672 VKC. 1. Obat keras

422. PROTEK CORYZA KILL VACC

Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan suspensi **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *H. paragallinarum serotype A* minimum $10^{9.0}$ CFU, *H. paragallinarum serotype C* minimum $10^{9.0}$ CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Dipergunakan untuk vaksinasi dan revaksinasi ayam sehat umur 21 hari atau lebih. Sebagai pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit *Infectious coryza* **Perhatian** Penggunaan segera seluruh vaksin setelah dibuka, jangan menyimpan vaksin untuk dipergunakan keesokan hari, bakar botol vaksin dan sisa vaksin yang tidak terpakai, simpan di tempat yang gelap pada suhu 2-8°C, jangan dibekukan, penggunaan dengan cara aseptis, sterilkan jarum dan *syringe*, ganti jarum suntik setiap 1.000 kali suntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan kuat sebelum dan selama dipergunakan. Vaksinasi hanya dilakukan pada ayam sehat. Suntik tiap ekor sebanyak 0,25 ml SC di daerah leher pada umur 42 hari atau sebanyak 0,5 ml IM di daerah dada pada umur lebih tua. Program vaksinasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing peternakan **Kemasan** Botol 250 ml **Deptan RI** No. I. 07033180 VTC. Obat bebas terbatas

423. PROTEK IBD KILL VACC

Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan suspensi **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *IBD strain winterfield* inaktif minimum $10^{8.5}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Vaksin ini dipergunakan untuk mencegah penyakit IBD (Gumboro) **Perhatian** Penggunaan seluruh vaksin sejak pertama dibuka, jangan menyimpan vaksin botol vaksin dan sisa vaksin yang sudah tidak dipergunakan, bakar botol dan sisa vaksin yang tidak terpakai, simpan vaksin di tempat yang gelap pada suhu 2-8°C, jangan dibekukan. Lakukan vaksinasi dengan cara aseptis, sterilisasi jarum dan *syringe*, ganti jarum suntik setiap 1.000 kali suntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan kuat sebelum dan selama dipergunakan. Suntikan IM 0,5 ml/ekor pada ayam di daerah otot dada secara aseptis. Vaksin hanya untuk ayam *breeder*, *broiler* dan *layer* yang sehat secara IM, Program vaksinasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing peternakan **Kemasan** Botol 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 07033181 VTC. Obat bebas terbatas

424. PROTEK ND KILL VACC

Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/

Biotek Indonesia

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND inaktif strain LaSota* minimum $10^{9.0}$ EID₅₀ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Vaksin dipergunakan untuk ayam *breeder*,

broiler dan *layer*. Pada saat vaksin ini disuntikkan pada ayam yang telah memiliki antibodi dari vaksinasi dengan vaksin aktif, akan menstimulasi perlindungan yang lebih tinggi terhadap virus ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan kuat sebelum dan selama dipergunakan, vaksinasi hanya dilakukan pada ayam sehat. Suntik tiap ekor sebanyak 0,5 ml IM di daerah otot dada dengan cara aseptis, program vaksinasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing peternakan **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 07023176 VTC. Obat bebas terbatas

425. PROTEK ND LIVE VACC

**Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/
Biotek Indonesia**

Bentuk sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND tipe Lentogenik, strain LaSota* minimum $10^{7.0}$. **Indikasi** Vaksin digunakan untuk mencegah penyakit ND pada ayam. Vaksin dipergunakan untuk ayam *broiler, breeder* dan *layer* umur 2 minggu **Perhatian** Penggunaan seluruh isi vial vaksin yang telah tercampur. Jangan menyimpan sisa vaksin yang telah terpakai, bakar botol dan sisa vaksin yang telah dibuka serta simpan vaksin di tempat gelap pada suhu $< 7^{\circ}\text{C}$. Vaksinasi hanya pada ayam yang sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum campur vaksin dengan pelarut, kocok dengan baik, campur larutan vaksin dengan air minum, melalui intranasal/intraocular campur vaksin dengan $\frac{1}{2}$ pelarut. Kocok dengan baik, campurkan larutan vaksin dengan pelarut yang terisi. Kocok dengan baik, masuk larutan vaksin dalam botol tetes. Teteskan 1 tetes pada satu mata/hidung. Melalui semprot (revaksinasi) campur vaksin dengan 50-60 ml air untuk 1.000 ekor, masukkan larutan vaksin ke dalam alat semprot, lalu semprotkan pada ayam dalam kandang **Kemasan** Vial 1000 dosis, vial 2000 dosis **Deptan RI** No. I. 07083269 VTS. Obat bebas terbatas.

426. PROTEK ND – EDS – IB KILL VACC

**Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/
Biotek Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain lasota* minimum $10^{9.0}\text{EID}_{50}$, virus *EDS'76 strain 127* minimum 512 HA Unit dan virus *IB strain H120* minimum $10^{6.0}\text{EID}_{50}$ sebelum di inaktivasi **Indikasi** Pengebalan inaktif terhadap penyakit ND, EDS dan IB pada unggas **Perhatian** Vaksin hanya untuk hewan sehat. Vaksin tidak boleh dipakai bila ada kerusakan, benda asing atau emulsi pecah dan stratifikasi. Vaksin yang tidak terpakai harus dimusnahkan dan untuk hal-hal yang lebih khusus konsultasikan dengan dokter hewan. Vaksin yang telah digunakan harus habis dalam waktu 24 jam. Simpan vaksin pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$ dan terhindar dari sinar matahari **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan 0,5 ml secara IM pada otot dada/paha ayam atau SC pada bagian leher **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) **Deptan RI** No. I. 09033594 VKC. Obat keras

427. PROTEK ND – IB KILL VACC

**Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/
Biotek Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* sebelum diinaktivasi minimum $10^{8.5}\text{EID}_{50}$ dan virus *IB strain M41* sebelum diinaktivasi minimum

$10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Vaksin dipergunakan untuk mencegah terhadap penyakit ND dan IB **Perhatian** Penggunaan seluruh isi vaksin setelah dibuka. Jangan menyimpan isi vaksin untuk dipakai keesokan hari. Bakar botol dan sisa vaksin yang tidak terpakai. Simpan vaksin di tempat gelap pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$. Jangan dibekukan, pergunakan cara aseptis, sterilkan jarum dan syringe dan ganti jarum suntik setiap 1.000 kali suntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan kuat sebelum dan selama dipergunakan. Vaksinasi hanya dilakukan pada ayam sehat. Suntikan 0,3 ml/ekor untuk anak ayam secara SC pada leher atau IM. Untuk *broiler*: 0,3 ml/ekor, untuk ayam dewasa: 0,5 ml/ekor. Program vaksinasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing peternakan **Kemasan** Botol 250 ml dan 500 ml **KEMENTAN RI** No. I. 13014424 VTC. Obat bebas terbatas

428. PROTEK ND-IBD KILL VACC

**Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/
Biotech Indonesia**

Bentuk sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* sebelum diinaktivasi minimum $10^{9.0} \text{EID}_{50}$ dan virus *IBD strain Lukert* minimum $10^{6.0} \text{TCID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Vaksin dipergunakan untuk mencegah terhadap ND dan IBD (Gumboro) **Perhatian** Penggunaan seluruh isi vaksin sejak pertama dibuka. Jangan menyimpan botol vaksin dan sisa vaksin yang sudah dipergunakan, bakar botol dan sisa vaksin yang tidak terpakai. Simpan di tempat gelap pada suhu $2-8^{\circ}\text{C}$. Jangan dibekukan, lakukan vaksinasi dengan cara aseptis dan sterilisasi jarum dan *syringe*. Ganti jarum suntik setiap 1.000 kali suntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan kuat sebelum dan selama dipergunakan. Vaksin hanya untuk ayam sehat dan suntikan secara IM 0,5 ml/ekor pada ayam di daerah otot dada secara aseptis. Program vaksinasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing peternakan **Kemasan** Botol 250 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 07033179 VTC. Obat bebas terbatas.

429. PULLOGEN

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung suspensi inaktif *S. pullorum strain standard (S11)* dan *strain variant (AV)* dengan kepekatan 300 Mc. Farland No. 1 sebanyak 12,5% **Indikasi** Dipakai untuk mendeteksi adanya infeksi *S. pullorum* pada ayam terutama pada peternakan pembibitan **Dosis dan Cara Pemakaian** Setiap dosis 0,06 ml (2 tetes). Pada plat kaca teteskan 2 tetes Pullogen dan $\pm 0,02$ ml darah ayam, kemudian aduk. Pembacaan dilakukan tidak lebih dari 2 menit setelah diaduk **Kemasan** Botol @ 500 dosis **Deptan RI** No. D. 04041400 VKC. 1. Obat keras

430. REOMUNE 3

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *reovirus strain S1133, S2408 dan SS412* masing-masing $10^{7.3} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit reovirus pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5ml (1 dosis)/ekor diberikan secara SC **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. I. 05042365 VKS. 1. Obat keras

431. REPROMUNE 4

Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IBD strain Luckert*

SEDIAAN BILOGIK

Vaksin Unggas

minimum 10^7EID_{50} , *ND strain LaSota* minimum $10^{8.8} \text{EID}_{50}$, *IB strain M41* dan *H52* minimum $10^{7.3} \text{EID}_{50}$, *reo strain S1133* dan *2408* minimum $10^{7.3} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND, IBD IB dan reo pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5ml (1 dosis)/ekor aplikasi diberikan secara SC **Kemasan** Botol 500 ml **Deptan RI** No. I. 02102477 VKC. Obat keras

432. RESPIMUNE Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND tipe BI strain LaSota* minimum $10^{6.1} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** 1 dosis/ekor diberikan melalui air minum, *spray* atau tetes mata **Deptan RI** No. I. 06023037 VTS. Obat bebas terbatas

433. SOTASEC Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung paling sedikit 10^7EID_{50} virus *strain LaSota* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara tetes mata/hidung, air minum, *spray*, suntikan secara IM. Program vaksinasi lihat brosur **Kemasan** 1 vial 100 dosis, 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 0502009 VTS. 3. Obat bebas terbatas

434. TENO – VAXIN Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif Avian Tenosynovitis Strain S 1133 **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit Avian Tenosynovitis pada unggas Perhatian Ayam yang divaksin harus dalam kondisi sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03032535 VKS. Obat keras

435. TRANSVAC Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IBD strain winterfield 2512 G-61 0,1 CID₅₀* **Indikasi** Pengebalan terhadap infeksi penyakit IBD (gumboro) pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 1.000 dosis, 2.000 dosis, 2.500 dosis, 4.000 dosis, 5.000 dosis, 8.000 dosis dan 10.000 dosis **Deptan RI** No. I. 12054276 VKS. Obat keras

436. TREMORMUNE Ceva Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *AE strain calnek* $\geq 10^{2.7} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit AE pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian 1 dosis secara tusuk sayap **Kemasan** Vial 1.000 dosis dengan pelarut dan aplikator **Deptan RI** No. I. 05103010 VTS. Obat bebas terbatas

437. TRI – REO Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Avian reovirus strain 1133*, *Avian*

reovirus aktif strain 2408, Avian reovirus aktif strain 3005 sebelum diinaktifkan, gentamisin dan amphotericin B sebagai pengawet **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Avian reovirus* aktif yang menyebabkan sindrom malabsorpsi pada ayam dan diberikan sebagai vaksinasi ulangan pada ayam sehat umur 3 minggu atau lebih setelah sebelumnya *dipriming* dengan vaksin aktif **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 42 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam yang sehat dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC dengan dosis 0,5 ml/ekor **Kemasan** Botol berisi 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. I. 12071823 VKC. 2. Obat keras

438. V.A. CHICK VAC

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Reovirus strain 1133*, pengawet gentamicin dan amphotericin B **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit viral arthritis/radang sendi/tenosynovitis pada anak ayam **KontraIndikasi** Mengurangi efikasi vaksin merek jika digunakan pada umur 1 hari **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC 0,2 ml pada ayam umur 1-10 hari **Kemasan** Box 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09051681 VKS. 2. Obat keras

439. VA VAC

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari $10^{4.4}$ EID₅₀ *Reovirus strain 1133* dan gentamisin sebagai pengawetnya **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit viral arthritis/radang sendi/tenosynovitis ayam **KontraIndikasi** Mengurangi efikasi vaksin merek jika digunakan pada umur 1 hari **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC dengan dosis 0,2 ml pada ayam umur 3-18 minggu **Kemasan** Tiap boks berisi 10 vial @ 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09051621 VKS. 2. Obat keras

440. VAIOL – VAC

FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Avian pox strain HP2* minimum 10^4 EID₅₀ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Fowl pox* atau cacar unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan isi vial ke dalam pelarut yang tersedia, vaksinasi dilakukan pada umur tidak kurang dari 6 minggu **Kemasan** Vial 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 06081609 VTKC.

441. VAKSIMUNE AI

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Avian influenza inaktif subtype H5N1 strain A/Ck/WestJava(Nagrak)/30/2007* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit *Avian influenza subtype H5* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC atau IM dengan dosis pada ayam yang berumur 7-21 hari: 0,2 ml dan ayam yang berumur diatas 21 hari: 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 12034237 VKC. Obat keras

442. VAKSIMUNE CLONE IB

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain clone* dan virus *IB strain H120* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 07082143 **VTS.** 1. Obat bebas terbatas

443. VAKSIMUNE CLONE

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND clone* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Kementan RI** No. D. 12051951 **VTS.** 2. Obat bebas terbatas

444. VAKSIMUNE CORYZA L

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis (0,5 ml) mengandung bakteri *Haemophyllus paragallinarum* inaktif *type A strain 0083*, *type B strain spross*, *type B strain V1* dan *type C strain modesto* **Indikasi** Untuk memberikan kekebalan yang tinggi dan berlangsung lama terhadap penyakit coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi I: pada umur 5-6 minggu dengan dosis 0,5 ml. Vaksinasi II: pada umur 14-16 minggu dengan dosis 0,5-1,0 ml. Vaksinasi III: pada umur 22-24 minggu dengan dosis 0,5 ml. Penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 11034022 **VTC.** Obat bebas terbatas

445. VAKSIMUNE CORYZA N

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *Haemophyllus paragallinarum* inaktif *type A strain 0083*, *type B strain spross* dan *type C strain H-18* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan yang tinggi dan berlangsung lama terhadap penyakit coryza **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi I: pada umur 5-6 minggu dengan dosis 0,5 ml. Vaksinasi II: pada umur 14-16 minggu dengan dosis 0,5-1,0 ml. Vaksinasi III: pada umur 22-24 minggu dengan dosis 0,5 ml. Penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 11094154 **VTC.** Obat bebas terbatas

446. VAKSIMUNE CORYZA

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri *Haemophyllus paragallinarum* inaktif *type A strain 0083* 3×10^8 CFU, *type B strain spross* 3×10^8 CFU, *type C strain H-18* 3×10^8 CFU **Indikasi** Dipakai untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit coryza pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikkan secara IM atau SC. Vaksinasi I: pada umur 5-6 minggu dengan dosis 0,5 ml. Vaksinasi II: pada umur 14-16 minggu dengan dosis 0,5-1,0 ml. Vaksinasi III: pada umur 40 minggu dengan dosis 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 06120679 **VTC.** 1. Obat bebas terbatas

447. VAKSIMUNE EDS

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif dari *virus EDS'76*
Indikasi Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit EDS pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis: 0,5 ml dan penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 05041272 VKC. 1. Obat keras

448. VAKSIMUNE IB INAKTIF

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *IB type mass 41* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap penyakit *Infectious bronchitis* **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam yang berumur dibawah 3 minggu: dosis 0,2 ml. Ayam dengan umur diatas 3 minggu: dosis 0,5 ml. Penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 0701658 VTC. 1. Obat bebas terbatas

449. VAKSIMUNE IB

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *IB strain H120* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit *Infectious bronchitis* dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata, tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 06121669 VTS. 2. Obat bebas terbatas

450. VAKSIMUNE IBD D

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *gumboro* aktif *strain LZD 228* **Indikasi** Untuk melindungi ayam terhadap penyakit IBD (*gumboro*) dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 06072325 VKS. 1. Obat keras

451. VAKSIMUNE IBD L

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *gumboro* aktif *strain winterfield 2512* **Indikasi** Untuk melindungi ayam terhadap penyakit IBD (*gumboro*) dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 05102337 VKS. 1. Obat keras

452. VAKSIMUNE IBD M

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *gumboro strain moulthrop* **Indikasi** Untuk pengebalan ayam terhadap penyakit IBD (*gumboro*) dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 05102195 VKS. 1. Obat keras

453. VAKSIMUNE ILT

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ILT strain*

hudson **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ILT dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 05022875 VKS. Obat keras

454. VAKSIMUNE K

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain komarov* minimal $10^{5,0} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum, suntik atau *spray* **Kemasan** Vial 100 dosis, 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. D. 07031143 VTS. 1. Obat bebas terbatas

455. VAKSIMUNE ND AI

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif dari virus *Newcastle disease strain lasota* dan *Avian influenza sub tipe H5N1 strain A/Ck/WestJava(Nagrak)/30/2007* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan AI **Dosis dan Cara Pemakaian** **Penyuntikan** secara SC atau IM dengan dosis pada ayam yang berumur 7-21 hari: 0,2 ml dan ayam yang berumur diatas 21 hari: 0,5 ml **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 12034238 VKC. Obat keras

456. VAKSIMUNE ND AIN2

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease (ND) strain lasota* minimum $10^{8,5} \text{EID}_{50}$ dan virus *Avian influenza (AI) sub tipe H5N2 strain A/turkey/england/N28/73* minimum $10^{8,5} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Digunakan untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan *Avian influenza (AI) sub tipe H5* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk ayam berumur dibawah 3 minggu dengan dosis 0,2 ml, dan ayam berumur diatas 3 minggu dengan dosis 0,5 ml. **Penyuntikkan** dilakukan secara SC atau IM **Kemasan** Botol 250 ml (500 dosis) dan 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. DPS. D. 0709206 VKC. Obat keras

457. VAKSIMUNE ND CLONE

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND clone* minimal $10^{6,2} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND pada ayam dan unggas lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui air minum, suntik atau *spray* **Kemasan** Vial @ 100 dosis, 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. D. 02111951 VTS. 1. Obat bebas terbatas

458. VAKSIMUNE ND EDS IB

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif dari virus *ND*, virus *EDS '76* dan *IB* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap virus ND, EDS dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada ayam umur 16-18 minggu, dosis

0,5 ml dan penyuntikan dilakukan secara SC atau IM **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis)
Deptan RI No. D. 0601313 VKC. 1. Obat keras

459. VAKSIMUNE ND EDS

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif dari virus *ND* dan virus *EDS'76* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap virus *ND* dan *EDS* **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada ayam umur 16-18 minggu, dosis 0,5 ml dan penyuntikan dilakukan secara SC atau IM **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 0610827 VKC. 1. Obat keras

460. VAKSIMUNE ND IB INAKTIF

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif dan virus *IB strain M-41* **Indikasi** Menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap penyakit *ND* dan *IB* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam umur dibawah 3 minggu dengan dosis 0,2 ml. Untuk umur diatas 3 minggu dengan dosis 0,5 ml. Penyuntikan secara IM atau SC **Kemasan** 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 06031597 VTC. 1. Obat bebas terbatas

461. VAKSIMUNE ND IB PLUS

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain lasota*, virus *IB strain M-41*, virus *IB strain B003* dan virus *IB strain B004* **Indikasi** Menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap penyakit *ND* dan *IB* pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml) dan penyuntikan dilakukan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 12014207 VTC. Obat bebas terbatas

462. VAKSIMUNE ND IBD INAKTIF

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif dari virus *ND strain lasota* min $10^{8,5} \text{EID}_{50}$ dan virus *IBD strain winterfield 2512* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap penyakit *ND* dan *IBD* (gumboro) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,5 ml) dengan cara penyuntikkan IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 07031033 VTC. 1. Obat bebas terbatas

463. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,1

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *ND strain lasota* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit *ND* **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,1 ml) dengan penyuntikkan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 100 ml (1.000 dosis) dan botol 500 ml (5.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 11013992 VTC. Obat bebas terbatas

464. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,3

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain lasota* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit *ND* **Dosis dan Cara**

Pemakaian 1 dosis (0,3 ml) dengan penyuntikkan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 300 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 10033821 VTC. Obat bebas terbatas

465. VAKSIMUNE ND INAKTIF

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif *strain lasota* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan jangka panjang terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam berumur 4-21 hari: dosis 0,2 ml. Ayam berumur diatas 21 hari: dosis 0,5 ml. Penyuntikkan dilakukan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. D. 06041048 VTC. 2. Obat bebas terbatas

466. VAKSIMUNE ND L INAKTIF

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* inaktif isolat lokal *strain N018* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam berumur 4-21 hari: dosis 0,2 ml. Ayam berumur diatas 21 hari: 0,5 ml. Penyuntikkan dilakukan secara IM atau SC **Kemasan** Botol 500 ml (1.000 dosis) **Kementan RI** No. D. 12064290 VTC. Obat bebas terbatas

467. VAKSIMUNE NDB1 IB

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND* aktif *strain hitchner B1* dan virus *IB* aktif *strain H120* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND maupun IB dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Kementan RI** No. D. 1111104 VTS. 1. Obat bebas terbatas

468. VAKSIMUNE NDB1

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain hitchner B1* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan IB dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata, tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 0607962 VTS. 2. Obat bebas terbatas

469. VAKSIMUNE NDHV

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain ulster* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Kementan RI** No. D. 11064104 VTS. Obat bebas terbatas

470. VAKSIMUNE NDHV IB

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain ulster* dan *IB* aktif *strain H120* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit

ND dan IB dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Kementan RI** No. D. 12114388 VTS. Obat bebas terbatas

471. VAKSIMUNE NDLS IB

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain lasota* dan *IB aktif strain H120* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan IB dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Kementan RI** No. D. 12091668 VTS. 2. Obat bebas terbatas

472. VAKSIMUNE NDLS

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND aktif strain lasota* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit ND dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis melalui tetes mata atau tetes hidung, air minum atau *spray* **Kemasan** Vial 1.000 dosis (*styrofoam box* berisi 10 vial) **Deptan RI** No. D. 0604893 VTS. 2. Obat bebas terbatas

473. VAKSIMUNE POX

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Fowl pox strain beaudette* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap serangan cacar dan dengan penyimpanan 4-8°C **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (0,01 ml) melalui tusukan pada sayap (*wing web*) dengan jarum yang telah disediakan **Kemasan** Vial @ 1.000 dosis + jarum vaksinasi **Deptan RI** No. D. 0604861 VTC. 2. Obat bebas terbatas

474. VAKSIN ND LASOTA

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease strain LaSota* aktif minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap *Newcastle disease* pada ayam umur 7 hari **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin dilarutkan dalam air dingin dan bersih tanpa kandungan chlorine atau desinfektan lainnya **Kemasan** 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083692 VTS. Obat bebas terbatas

475. VAXSAFE MG VACCINE

Bioproperties Pte. Ltd.-Merial Australia/

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Mycoplasma gallisepticum* inaktif *strain TS-11* titer minimal $10^{7.5} \text{CCU}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh *Mycoplasma gallisepticum* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan dengan cara tetes mata. Program vaksinasi lihat brosur **Perhatian** Vaksinasi hanya pada hewan yang sehat **Kemasan** Botol 30 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 0502009 VTS. 3. Obat bebas terbatas

476. VAXSAFE MS VACCINE

Merial Australi/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Mycoplasma synoviae* aktif

Indikasi Untuk pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan mikoplasma sinovia pada unggas **KontraIndikasi** Pengebalan terhadap penyakit mycoplasma pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis/ekor diberikan melalui tetes mata **Kemasan** Botol 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 11094150 VKS.

477. VH + H – 120

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain VH* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ dan IB minimum $10^{3.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan penyakit ND dan IB

Dosis dan Cara Pemakaian Melalui air minum, tetes mata atau *spray* **Kemasan** 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042569 VKS. TML. Obat bebas terbatas

478. VH

AAKO BV-Belanda/SHS International

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *ND strain VH* minimum $10^{6.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Pencegahan penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui air minum, tetes mata atau *spray* **Kemasan** 500 dosis, 1.000 dosis dan 2.000 dosis **Deptan RI** No. I. 03042570 VKS. TML. Obat bebas terbatas

479. VOLVAC AC

Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/

PLUS BACTERIN KV

Boehringer Ingelheim Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum*, *serotype A strain A1*, *B strain B1*, dan *C strain C2*. *Adjuvant aluminum hydroxide*. Masing-masing minimum titer: $10^{8.0} \text{CFU}$ atau $10^{8.0} \text{CEID}_{50}$ /dosis sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi *Haemophilus paragallinarum*, *serotype A*, *B* dan *C*. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler* dan *layer* **Dosis dan cara pemakaia** 0.5 ml/ekor. Rute SC, sepertiga leher bagian bawah **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08033395 VKC. Obat keras.

480. VOLVAC AC PLUS EMUL

Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/

BACTERIN KV

Boehringer Ingelheim Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Haemophilus paragallinarum*, *serotype A strain A1*, *B strain B1*, dan *C strain C2*, *Adjuvant oil*. Masing-masing minimum titer: $10^{8.0} \text{CFU}$ atau $10^{8.0} \text{CEID}_{50}$ /dosis sebelum inaktivasi

Indikasi Pencegahan terhadap infeksi *Haemophilus paragallinarum*, *serotype A*, *B* dan *C*. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler* dan *layer*. **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.5 ml/ekor. Rute SC, sepertiga leher bagian bawah **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09103732 VTC. Obat bebas terbatas

481. VOLVAC AI KV

Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/

Boehringer Ingelheim Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Avian Influenza type*

A sub-type H2N2; strain A/CHICKEN/MEXICO/232/94/CP. Minimum titer: $10^{7.6} \text{EID}_{50}$ /dosis atau minimum 32 HAU sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus AI. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler*, *layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.5 ml/ekor. Rute SC, sepertiga leher bagian bawah atau IM pada otot bagian dada **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. DPS. I. 0407086 VKC. Obat keras

482. VOLVAC IBD MLV

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious Bursal Disease, strain Lukert Intermediate* minimum titer: $10^{4.5} \text{TCID}_{50}$ /ml of IBD **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus IBD. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler*, *layer* dan *breeder's replacement pullets* selama periode pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.03 ml/ekor. Pemberian melalui tetes mata, *spray* dan air minum **Kemasan** Vial 15 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08103499 VKS. Obat keras

483. VOLVAC LT MLV

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Laringotracheitis strain N-71851* minimum titer $10^{2.2} \text{EID}_{50}$ /dosis **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ILT. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler*, *layer pullets* dan *breeder pullets*. **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.03 ml/ekor. Pemberian melalui tetes mata, *spray* dan air minum **Kemasan** Vial 15 ml x 1000 dosis **Deptan RI** No. I. 09103733 VKS. Obat keras

484. VOLVAC ND CONC. KV

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Newcastle Disease strain Lasota* minimum titer $10^{8.6} \text{EID}_{50}$ /dosis sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ND dan IB. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler*, *layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.2 ml/ekor. Rute SC, sepertiga leher bagian bawah **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 07103316 VTC. Obat bebas terbatas.

485. VOLVAC ND KV

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Newcastle Disease strain Lasota* minimum titer $10^{8.2} \text{EID}_{50}$ /dosis sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ND. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler*, *layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.5 ml/ekor. Rute SC, sepertiga leher bagian bawah atau IM pada otot bagian dada **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 08023391 VTC. Obat bebas terbatas

**486. VOLVAC ND LASOTA MLV Boehringer Ingelheim Vetmedica, SA. DE CV. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Newcastle Disease strain Lasota* minimum titer $10^{6.5} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ND. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broilers, layer pullets, layers, breeder pullets, breeders* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.03 ml/ekor. Pemberian melalui tetes mata, *spray* dan air minum **Kemasan** Vial 15 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09103719 VTS Obat bebas terbatas

**487. VOLVAC ND + IB KV Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Newcastle Disease strain Lasota* dan virus *Infectious Bronchitis strain Massachusetts* minimum titer $10^{8.2} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ ND dan $10^{6.7} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ IB sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ND dan IB. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler, layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.5 ml/ekor. Rute SC, sepertiga leher bagian bawah atau IM pada otot bagian dada **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09083701 VTC. Obat bebas terbatas.

**488. VOLVAC ND + IB MLV Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Newcastle Disease strain Lasota* dan virus *Infectious Bronchitis strain Massachusetts* minimum titer $10^{6.5} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ ND dan $10^{2.5} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ IB **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ND dan IB. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler, replacement pullets, layer* dan *breeder flocks* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.03 ml/ekor. Pemberian melalui tetes mata, *spray* dan air minum **Kemasan** 10 glass vials x 1000 ds **Deptan RI** No. I. 09083685 VTS Obat bebas terbatas.

**489. VOLVAC ND + IB + EDS KV Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan/inaktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Newcastle Disease strain Lasota, Infectious Bronchitis strain Massachusetts, Egg Drop Syndrome strain 127* minimum titer $10^{8.2} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ ND, $10^{6.7} \text{EID}_{50}/\text{dosis}$ IB, 1.000 HAU/dosis EDS sebelum inaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus ND, IB dan EDS. Direkomendasikan untuk diberikan pada *broiler, layer* dan *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** 0.5 ml/ekor. Pemberian melalui injeksi SC dan IM **Kemasan** Botol plastik 500 ml x 1.000 dosis **Deptan RI** No. I. 09073659 VKC. Obat keras

490. VVMD – VAC Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 3×10^4 sel virus aktif *Marek's disease strain 301B/1* dan 2×10^4 sel virus aktif *Marek's disease HVT*

strain FC-126 (cell associated) dan gentamisin sebagai bahan pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Marek's disease* **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum unggas disembelih **Perhatian** Hanya untuk ayam sehat dan jangan dicampur dengan produk biologik lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap ampul untuk 1.000 ekor ayam dan diberikan melalui suntikan SC dengan dosis 0,2 ml/ekor pada ayam umur 1 hari (DOC) atau dengan vaksinasi in ovo pada umur pengeraman 18-19 hari **Kemasan** Canister isi 5 vial @ 1.000 dosis dalam *container* yang berisi nitrogen cair **Deptan RI** No. I. 03012099 VKS. Obat keras

491. WINVAC ND EDS IB

CA Laboratorios Asociados, Venezuela/

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease* inaktif minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$, virus *Egg drope syndrome* inaktif dengan titer minimal 1024 HAU dan virus *IB strain Mass M-41* inaktif minimal $10^{7.2} \text{EID}_{50}$ sebelum diinaktivasi **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND, IB, dan EDS **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis/ekor (0,25 ml) pada umur 16-20 minggu sebelum masa produksi secara IM dan SC **Kemasan** 250 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05032912 VKC. Obat keras

**492. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS GUMBORO
(ND – IB – IBD)**

CA Laboratorios

Asociados, Venezuela/

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Newcastle disease* inaktif minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$, Virus *IB strain mass M-41* inaktif minimal $10^{7.2} \text{EID}_{50}$, Virus *gumboro* inaktif *lukert intermediate* minimal $10^{6.7} \text{CID}_{50}$ **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis/ekor (0,25 ml) pada umur 16-20 minggu sebelum masa produksi. Secara IM atau SC **Kemasan** 250 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 05103008 VTC. Obat bebas terbatas

493. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS

CA Laboratorios Asociados, Venezuela/

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain Lasota* inaktif dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *Infectious bronchitis strain M-41* inaktif dengan titer minimal $10^{7.2} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND dan IB **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan sebanyak 1 dosis (0,25 ml) pada IM atau SC **Kemasan** 250 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04102826 VTC. Obat bebas terbatas

494. WINVAC NEWCASTLE CONCENTRATED CA Laboratorios Asociados, Venezuela/

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan 1 dosis vaksin atau 0,25 ml/ekor secara SC atau IM **Kemasan** 250 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 04092802 VTC. Obat bebas terbatas

495. WINVAC NEWCASTLE EDS

CA Laboratorios Asociados, Venezuela/

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung virus *ND strain LaSota* inaktif dengan titer minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan *Egg drop syndrome* inaktif dengan titer minimal 1024 HAU **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND dan EDS **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan sebanyak 1 dosis (0,25 ml) secara IM pada dada atau secara SC pada leher **Kemasan** 250 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No I. 05103009 VKC. Obat bebas terbatas

496. WINVAC NEWCASTLE GUMBORO (ND-IBD)

CA Laboratorios Asociados,

Venezuela/Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Setiap dosis mengandung virus *ND LaSota* inaktif minimal $10^{8.5} \text{EID}_{50}$ dan virus *gumboro strain lukert intermediate* minimal $10^{6.7} \text{TCID}_{50}$ sebelum diinaktifasi **Indikasi** Imunisasi aktif unggas sehat terhadap penyakit ND dan IBD **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikan vaksin sebanyak 1 dosis/ekor (0.25 ml) pada ayam umur 16-20 minggu secara IM atau SC **Kemasan** 250 ml (1.000 dosis) **Deptan RI** No. I. 06013033 VTC. Obat bebas terbatas. ****

WAKSIN TERNAK

02.02

1. ANTHRAXVET

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Setiap dosis vaksin (1 ml) mengandung tidak kurang dari 10 juta spora kuman *Bacillus anthracis starin 34 F2 weybridge* yang avirulen dan tidak berkapsul di dalam campuran garam faali dengan gliserin sama banyak serta mengandung tidak lebih dari 0,005% saponin **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit anthrax (radang limpa) pada sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara SC. Sapi, kerbau dan kuda: 1 ml. Domba, kambing dan babi: 0,5 ml **Perhatian** Jangan memberikan vaksin melalui suntikan IM, sebab dapat menimbulkan kematian. Sebelum digunakan tempatkan vaksin pada suhu kamar terlebih dahulu kemudian kocok sampai rata. Suntikan secara SC dilakukan pada pangkal leher depan scapula. Vaksinasi rutin sebaiknya diulang setiap 6 bulan **Kemasan** Botol 200 ml **Deptan RI** No. D. 0610534 VKC. 2. Obat keras

2. ANTHRAX SPORE VACCINE

**Colorado Serum Company, USA/
Paeco Agung**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung spora aktif bakteri *Bacillus anthracis strain 34F2* untuk dosis sapi dan kuda 10 juta CFU, untuk dosis kambing, domba dan babi 5 juta CFU **Indikasi** Untuk pencegahan penyakit anthrax pada sapi, kuda, kambing, domba dan babi **Perhatian** Jangan melakukan vaksinasi dalam kurun waktu 42 hari sebelum hewan dipotong. Pada hewan yang baru saja disuntik vaksin ini harus tidak memperoleh pengobatan dengan antibiotik. Jika terjadi reaksi anafilaksis berikan adrenalin atau yang sejenisnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan secara SC 1 ml vaksin pada hewan kambing, domba dan babi, 2 ml pada sapi dan kuda **Kemasan** Botol berisi 10 ml, 25 ml dan 50 ml **Deptan RI** No. DPS. I. 0812219 VKC. Obat keras

3. BOVI SHIELD 3

**Novartis Animal Health US, Inc/
Paeco Agung**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Cytopathic bovine viral diarrhea (BVD) - tipe 1 strain jencine IBP, type 1a strain KY22* minimum 6,1 logs (TCID₅₀) dan *Noncytopathic - tipe 2 strain TN 131* minimum 6,1 logs (TCID₅₀), amphotericin B, gentamicin, dan thimerosal sebagai tambahan **Indikasi** Untuk pencegahan penyakit yang disebabkan virus *Bovine diare tipe 1 dan tipe 2* **Perhatian** Jangan melakukan vaksinasi 60 hari sebelum hewan dipotong. Gunakan seluruh isi botol bila telah dibuka. Bengkak yang bersifat sementara dapat terjadi pada bagian yang disuntik. Reaksi anafilaksis dapat terjadi selama pemberian produk biologik ini. Pengobatan simtomatikepinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan baik sebelum digunakan, diberikan 2 ml/ekor melalui suntikan IM dan SC. Ulangi 4-5 minggu kemudian. Vaksin dapat diberikan pada hewan bunting pada setiap tahap kebuntingan. Vaksinasi sapi induk selama masa kering. Ulangi vaksinasi setiap tahun **Kemasan** Botol 20 ml (10 dosis) dan 100 ml (50 dosis) **Deptan RI** No. I. 04022728 VKC. Obat keras

4. **BRUCELLA ABORTUS STRAIN RB – 51** **Colorado Serum Company, USA/
Pacco Agung**
Bentuk Sediaan Serbuk + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri aktif *Brucella abortus strain RB-51* minimum 10×10^9 CFU **Indikasi** Untuk pencegahan penyakit keguguran/keluron menular/abortus yang disebabkan oleh bakteri *Brucella abortus strain RB-51* pada sapi umur 4-12 bulan atau lebih tua **Perhatian** Jangan melakukan vaksinasi dalam kurun waktu 3 minggu sebelum hewan dipotong. Jangan melakukan vaksinasi pada sapi bunting **Dosis dan Cara pemakaian** Sapi umur 4-12 bulan: suntikkan 2 ml vaksin/ekor. Untuk sapi diatas 12 bulan gunakan sesuai ijin dan petunjuk dokter hewan/petugas kesehatan hewan **Deptan RI** No. I. 08033393 VKC. Obat keras
5. **BRUCIVET** **Pusat Veterinaria Farma**
Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Vaksin berbentuk kering beku dan diformulasi dengan stabilizer yang mengandung tryptone 2,5%, saccharose 5% dan sodium glutamate 1%. Setiap dosis vaksin (1 ml) mengandung $40-120 \times 10^9$ kuman *Brucella abortus strain 19* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit brucellosis pada sapi betina **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi betina 3-8 bulan: 1 ml secara SC. Larutkan vaksin dengan garam faali 10 ml, kocok sampai rata sebelum dipakai. Vaksin harus habis dipakai setelah dilarutkan. Masa kekebalan berlangsung lebih dari 7 tahun **Kemasan** Vial berisi 10 dosis vaksin **Deptan RI** No. D. 0707544 VKS. 2. Obat keras
6. **HIMMVAC HOG CHOLERA (T/C) VACCINE** **KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Serbuk kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Hog cholera strain LOM-850*, titer minimum $10^{3.0}$ TCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Hog cholera* pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan secara SC atau IM setelah vaksin dilarutkan dengan pengencer dengan dosis tunggal 1 ml/ekor **Kemasan** Vial 10 dosis, 20 dosis dan 50 dosis **Kementan RI** No. I. 11044067 VKS. Obat keras
7. **HYORESP** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Mycoplasma hyopneumoniae* minimum 3.0 elisa unit sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh *Mycoplasma hyopneumoniae* pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan segera setelah dilarutkan. Vaksin diberikan dengan suntikan secara IM yang dalam pada muskulus di daerah otot leher. Satu dosis yaitu 2 ml/ekor sesuai yang dianjurkan **Deptan RI** No. I. 04022252 VKS. 1. Obat keras
8. **INGELVAC MYCOFLEX** **Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. USA/
Boehringer Ingelheim Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri aktif *Mycoplasma hyopneumoniae strain J*, minimum RP: 1.0-4.61 **Indikasi** Pencegahan penyakit enzootic pneumonia yang disebabkan oleh *Mycoplasma hyopneumoniae*. Vaksinasi direkomendasikan untuk babi yang sehat pada umur 3 minggu atau lebih **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ml/

ekor, rute injeksi secara IM **Kemasan** Botol plastik 50 ml x 50 dosis **Deptan RI** No. DPS. I. 0901222 VKC. Obat keras

9. INGELVAC PRRS MLV

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. USA/
Boehringer Ingelheim Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan/aktif **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Porcine reproductive and Respiratory syndrome (PRRS) strain ATCC VR-2332*, minimum $10^{5.7} \text{TCID}_{50}/\text{dose}$ **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi virus PRRS. Direkomendasikan untuk diberikan pada anak babi disemua umur, babi dara, betina bunting dan babi jantan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 ml/ekor, rute injeksi secara IM **Kemasan** Botol plastik 100 ml x 50 dosis **Deptan RI** No. I. 09103718 VKC. Obat keras

10. LIVE HOG CHOLERA VACCINE

Kitasato Institute, Jepang/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus *Hog cholera strain GPE* **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Hog cholera* pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 20 dosis, 50 dosis dan pelarutnya **Deptan RI** No. I. 04112243 VKS. 1. Obat keras

11. ORIVET

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Orf* diformulasikan dengan 5% skim milk **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Orf (Contagious ectyema, Contagious dermatitis)* pada kambing dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** Kambing dan domba segala umur. Vaksin dilarutkan kemudian dengan jarum penoreh ditorehkan pada kulit selangkang (lipatan paha) sebanyak 2x sehingga membentuk tanda silang sepanjang 2,5 cm **Perhatian** Garis torehan jangan sampai mengeluarkan darah. Vaksinasi yang baik ditandai dengan timbulnya pustula-pustula disepanjang garis torehan pada 5-7 hari sesudah vaksinasi **Kemasan** Vial berisi 50 dosis disertai pelarut dan jarum penoreh **Deptan RI** No. D. 07073256 VKS. Obat keras

12. PESTIFFA

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku dan pelarut vaksin **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Hog cholera strain Chinese* 100 PVD 50 **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Hog cholera* pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan segera setelah dilarutkan, vaksin diberikan dengan suntikan IM yang dalam pada muskulus di daerah otot leher. Satu dosis yaitu 2 ml/ekor sesuai yang dianjurkan **Kemasan** Vial 2 dosis, 10 dosis, 25 dosis dan 50 dosis **Deptan RI** No. I. 04022252 VKS. 1. Obat keras

13. PEST – VAC

Fort Dodge Saude Animal Health Ltd, Brazil/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Mengandung virus *Hog cholera strain china* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Hog cholera* (sampar babi) pada babi sehat **Perhatian** Hewan-hewan yang akan divaksin harus dalam keadaan sehat. *Syringe* dan jarum harus disterilisasi dalam air mendidih. Produk-produk kimia jangan digunakan untuk sterilisasi. Pada kejadian

reaksi anafilaksis berikan epinephrine atau atropine sulfat **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC yang aseptik dengan dosis 2 ml/ekor. Anak babi: anak babi yang berasal dari induk yang belum divaksin sebaiknya divaksinasi pada umur 14 hari. Anak babi yang berasal dari induk yang telah divaksinasi sebaiknya divaksinasi pada umur 60 hari. Babi induk dan babi dara: babi induk dan babi dara yang sehat divaksinasi antara hari ke 70-90 setiap kebuntingan. Vaksinasi pada induk atau dara bunting sebaiknya dilakukan apabila vaksinasi sangat dibutuhkan. Babi jantan: babi pejantan divaksinasi setiap tahun **Kemasan** Kotak berisi 10 vial @ 10 dosis, 25 dosis atau 50 dosis **Deptan RI** No. I. 03072257 VKS. 1. Obat keras

14. PORCILIS ART

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Pasteurella multocida* dan *Bordetella bronchiseptica* **Indikasi** Pengebalan (pasif) terhadap penyakit atropik rhinitis pada babi induk dan babi dara **KontraIndikasi** Setelah vaksinasi, temperatur tubuh akan meningkat untuk sementara waktu dan bengkak sementara di sekitar tempat penyuntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM dengan dosis 2 ml **Kemasan** Vial 20 ml (10 dosis) dan 50 ml (25 dosis) **Deptan RI** No. I. 04092818 VKC. Obat keras

15. PORCILIS ERY

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif dengan *adjuvant* minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung antigen *Erysipelothrix rhusiopathie strain M2 (serotype 2)* minimum 1 pig protective dose (ppd) **Indikasi** Pengebalan (aktif) terhadap penyakit *Swine erysipelas* pada babi **KontraIndikasi** Setelah vaksinasi, temperatur tubuh akan meningkat untuk sementara waktu dan bengkak sementara di sekitar tempat penyuntikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara IM dengan dosis 2 ml **Kemasan** Vial 10 dosis, 25 dosis atau 50 dosis **Deptan RI** No. I. 04092817 VKC. Obat keras

16. RESPISURE

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Mycoplasma hyopneumoniae strain P-5722-3* dengan *adjuvant* minyak (amphigen) yang meningkatkan dan memperpanjang respon kekebalan tanpa menyebabkan kerusakan jaringan pada lokasi penyuntikan **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh *Mycoplasma hyopneumoniae* pada babi **Perhatian** Penyuntikan hanya dilakukan pada hewan yang sehat **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Vaksinasi pertama dilakukan pada anak babi berumur 1 minggu: 2 ml secara IM. Vaksinasi kedua dilakukan dengan interval 2 minggu dari vaksinasi yang pertama: 2 ml secara IM. Pada babi bunting 2 minggu sebelum melahirkan: 2 ml secara IM. Pada babi jantan: 2 ml secara IM 1x/tahun **Kemasan** Botol 100 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. I. 06043060 VKC. Obat keras

- 17. RHINIFFA T** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Bordetella bronchiseptica strain toxinogenic* minimum 0,9 log 10 dan *Pasteurella multocida strain toxinogenic* minimum 0,9 log 10 **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Atrophic rhinitis* pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk babi dewasa dan bunting diberikan injeksi tunggal melalui suntikan secara IM. Satu dosis yaitu 2 ml/ekor sesuai yang dianjurkan **Kemasan** Botol **Deptan RI** No. I. 09103739 VKC. Obat keras
- 18. SEPTIVET** **Pusat Veterinaria Farma**
Bentuk Sediaan Emulsi Komposisi Setiap dosis vaksin (2 ml) mengandung tidak kurang dari 2 mg berat kering kuman. Vaksin merupakan bentuk emulsi air dalam minyak dengan susunan sbb: suspensi *Pasteurella multocida tipe b (katha)* sebelum diinaktivasi dengan 50% dan *adjuvant* minyak 50% **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit SE (*Septicemia epizootica*) pada sapi, kerbau dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk sapi, kerbau dan babi: 2 ml secara IM. Sebelum digunakan tempatkan vaksin pada suhu kamar terlebih dahulu kemudian kocok sampai rata. Gunakan kanul yang lebih besar dan tabung suntik (*syringe*) yang steril kuat dan tidak mengandung bahan karet. Vaksinasi ulangan jangan dilakukan pada tempat yang sama. Vaksinasi rutin sebaiknya dilakukan tiap tahun **Kemasan** Botol berisi 200 ml vaksin untuk 100 dosis **Deptan RI** No. D. 0612531 VKC. 2. Obat keras
- 19. SUVAXYN E** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri inaktif *Erysipelothrix rhusiopathiae strain CN-3461* dan strain *AN-4 serotipe 2* minimum 10 CFU sebelum diinaktivasi **Indikasi** Melindungi babi siap jual dari penyakit erysipelas akut dan kronit serta meminimalisasi kerugian ekonomi pada babi *grower* akibat arthritis dan gejala klinik yang lain. Vaksin ini juga melindungi kelompok *breeding* dari masalah yang berhubungan dengan infeksi *erysipelotheix rhusiopathiae* termasuk arthritis kronik dan keguguran (abortus) **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum hewan disembelih **Perhatian** Hanya digunakan untuk vaksinasi babi sehat dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan. Reaksi alergi mungkin terjadi dan antidotanya yaitu epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC yang aseptik dengan dosis 2 ml/ekor. Babi anak: vaksinasi pertama pada umur 7-10 hari atau sebelum disapih dan vaksinasi kedua antara 2-3 minggu setelah vaksinasi pertama. *Breeding*: babi untuk *breeding* divaksinasi pada saat seleksi dan diulang 3 minggu kemudian. Babi induk dan babi jantan divaksinasi ulang setiap 6 bulan sekali **Kemasan** Botol isi 100 ml (50 dosis) **Deptan RI** No. I. 0209056 VKC. 2. Obat keras
- 20. SUVAXYN RESPIFEND MH** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung bakteri *Mycoplasma hyopneumoniae strain P-5722-3* **Indikasi** Vaksin inaktif dan berajuvan untuk pencegahan terhadap penyakit pernafasan pada babi yang disebabkan oleh *Mycoplasma hyopneumoniae* dan mampu memberikan perlindungan pada periode kritis baik pada babi muda maupun dewasa **KontraIndikasi** Hentikan vaksinasi 21 hari sebelum hewan disembelih **Perhatian**

Hanya digunakan untuk vaksinasi babi sehat dan kocoklah baik-baik sebelum digunakan. Reaksi alergi mungkin terjadi dan antidotanya yaitu epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan IM atau SC yang aseptik dengan dosis 2 ml/ekor. Babi anak: vaksinasi pertama pada umur 10 hari atau sebelum disapih dan vaksinasi kedua antara 2- 3 minggu setelah vaksinasi pertama. *Breeding*: babi untuk *breeding* divaksinasi pada saat seleksi dan diulang 3 minggu kemudian. Babi induk dan babi jantan divaksinasi ulang setiap 6 bulan sekali **Kemasan** Botol isi 100 ml (50 dosis) **Deptan RI** No. I. 06083109 VKC. Obat keras

21. VAKSIMUNE ANTHRAX**Vaksindo Satwa Nusantara**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung spora kuman *Bacillus anthracis aktif strain 34 F2 weybridge* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit anthrax pada sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok vaksin sebelum dipakai dan penyuntikkan dilakukan secara SC. Dosis pada sapi, kerbau dan kuda: 1 ml. Pada domba, kambing dan babi: 0,5 ml **Kemasan** Botol 125 ml **Deptan RI** No. D. 07073249 VKC. Obat keras

22. VAKSIMUNE SE**Vaksindo Satwa Nusantara**

Bentuk Sediaan Emulsi minyak **Komposisi** Setiap dosis mengandung suspensi bakteri *Pasteurella multocida* **Indikasi** Untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit SE pada sapi, kerbau dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok vaksin sebelum dipakai dan penyuntikan dilakukan secara IM dengan dosis 3 ml **Kemasan** Botol 150 ml **Deptan RI** No. D. 0607737 VKC. 1. Obat keras

23. VIRA SHIELD 4**Novartis Animal Health US, Inc/Paeco Agung**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Infectious bovine rhinotracheitis strain GL 206* minimum 7,5 logs (TCID₅₀), *Cytopathic bovine viral diarrhea (BVD) - tipe 1 strain GL180* minimum 6,1 logs (TCID₅₀) dan *Noncytopathic - tipe 1 strain GL181* minimum 6,1 (FAID₅₀) dan *Parainfluenza 3 (PI3) strain GL232* minimum 7,5 logs (TCID₅₀) sebelum diinaktivasi, amphotericin B, gentamicin dan thimerosal sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan penyakit yang disebabkan virus *Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)*, *Cytopathic bovine viral diarrhea (BVD) - tipe 1* dan *Noncytopathic - tipe 2, Parainfluenza tipe 3 (PI3)* **Perhatian** Jangan melakukan vaksinasi dalam kurun waktu 60 hari sebelum hewan dipotong. Gunakan seluruh isinya sampai habis bila telah terbuka. Pembengkakan sementara dapat terjadi pada lokasi penyuntikan. Reaksi anafilaksis dapat terjadi mengikuti penggunaan bahan biologis ini. Pengobatan simptomatik epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok baik-baik sebelum digunakan dan diberikan 5 ml/ekor melalui suntikan IM atau SC dan ulangi 4-5 minggu kemudian. Vaksin dapat diberikan pada hewan bunting pada setiap tahap kebuntingan, Vaksinasi sapi laktasi pada masa kering. Ulangi vaksinasi setiap tahun **Kemasan** Botol 50 ml (10 dosis), 100 ml (20 dosis) dan 250 ml (50 dosis) **Deptan RI** No. I. 04032736 VKC. Obat keras

24. VIRA SHIELD 6

Novartis Animal Health US, Inc/Paeco Agung

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) strain GL206* minimum 7,5 logs (TCID₅₀), *Cytopathic bovine viral diarrhea (BVD) - tipe 1* dan *Noncytopathic - tipe 2 strain GL 180, GL 181, GL 760* masing-masing minimum 6,1 logs (TCID₅₀), *Parainfluenza 3 (PI3) strain GL232* minimum 7,5 logs (TCID₅₀) dan *Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) strain GL226* minimum 6,17 logs (TCID₅₀), ampotericin B, gentamicin dan thimerosal sebagai bahan pengawet **Indikasi** Untuk pencegahan penyakit yang disebabkan virus IBR, BVD, PI3 dan BRSV **Perhatian** Jangan melakukan vaksinasi dalam kurun waktu 60 hari sebelum hewan dipotong. Pembengkakan sementara dapat terjadi pada lokasi penyuntikan. Reaksi anafilaksis dapat terjadi mengikuti penggunaan bahan biologis ini. Pengobatan simptomatik epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok baik-baik sebelum digunakan, diberikan 5 ml/ekor melalui suntikan IM atau SC dan ulangi 4-5 minggu kemudian. Vaksin dapat diberikan pada hewan bunting pada setiap tahap kebuntingan, Vaksinasi sapi perah selama periode kandang. Ulangi vaksinasi setiap tahun **Kemasan** Botol 50 ml (10 dosis), 100 ml (20 dosis) dan 250 ml (50 dosis) **Deptan RI** No. I. 03122705 VKC. Obat keras.****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

WAKSIN HEWAN KESAYANGAN

02.03

- 1. BIOCAN DHPPI** **Bioveta, AS-Czech Republic/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung virus *Distemper* minimum $\geq 10^3 \text{CCID}_{50}$, *Canine parvo virus strain 154* minimum $\geq 10^{4.5} \text{CCID}_{50}$, *Canine adeno virus strain CAPM V-477 tipe 2* minimum $\geq 10^{3.5} \text{CCID}_{50}$, *Para influenza tipe 2 strain CAPM V-480* minimum $\geq 10^{3.0} \text{CCID}_{50}$ **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit *Distemper*, *Canine parvo virus*, *Canine adeno virus*, *Parainfluenza tipe 2* **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diberikan kepada anjing berumur ≥ 6 minggu melalui injeksi IM atau SC **Kemasan** $10 \times (1+1)$ dosis **Deptan RI** No. I. 07073253 VKC. Obat keras
- 2. BIOCAN M INJ** **Biovet AS, Czech Republic/Megan Gallus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung *Microsporum canis inaktif strain CCM 8211* minimum $5 \times 10^5 - 6 \times 10^6$ **Indikasi** Pencegahan dan pengobatan mikosis kulit yang disebabkan oleh *Microsporum canis* pada anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diberikan melalui injeksi. Anjing: Secara IM. Kucing: Secara SC **Kemasan** 20×1 dosis **Deptan RI** No. I. 09083683 VKC. Obat keras
- 3. BIOCAN R INJ** **Bioveta, Czech Republic/Megan Gallus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung virus *Rabies inaktif strain vnuovo-32* minimum 1 IU ($\leq 10^{7.6} \text{TCID}_{50}$) **Indikasi** Pengebalan terhadap penyakit rabies pada anjing, kucing dan kera **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksin diberikan melalui injeksi IM atau SC **Kemasan** Kotak isi 20 vial @ 1 ml (1 dosis) **Deptan RI** No. I. 06013036 VKC. Obat keras
- 4. CANIFFA** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Kering beku dan cairan Komposisi Setiap dosis mengandung virus *Canine distemper aktif strain modifikasi* minimum 1.000 CCID_{50} yang telah dimodifikasi. *Adeno virus aktif strain CAV2* minimum 300 CCID_{50} yang telah dimodifikasi. *Antigen inaktif L. canicola* minimum 100.000.000 mikroorganisme *antigen inaktif L. ichterohaemorrhagiae* minimum 100.000.000 mikroorganisme **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *distemper*, hepatitis dan leptospirosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Buat larutan dengan cara mencampur vaksin kering beku dan vaksin cair yang terdapat dalam masing-masing vial, kemudian disuntikkan secara IM/SC. Program vaksinasi awal umur 6-7 minggu. Vaksinasi II, 4 minggu kemudian (11-12 minggu). Pada booster pertama umur satu tahun dan pada booster berikutnya diberikan tiap tahun sekali **Kemasan** Kotak berisi 1 vial vaksin distemper hepatitis dan 1 vial vaksin leptospirosis cair serta 1 *disposable syringe* **Deptan RI** No. I. 0206005 VKS. 2. Obat keras
- 5. CANIGEN DHA 2 P/L** **Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku dan pelarutnya **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Canine distemper virus (live)* minimal 10^3TCID_{50} , *Canine contagious hepatitis virus CAV (live)* minimal 300TCID_{50} , *Canine parvo virus (live)* minimal 10^3TCID_{50} , *Leptospira interrogans canicola (inactivated)* minimal 800×10^6 bakteri sebelum diinaktivasi, *Leptospira interrogans*

icterohaemorrhagiae (inactivated) minimal 800×10^6 bakteri sebelum diinaktivasi **Indikasi** Pencegahan/Pengebalaan terhadap penyakit *distemper*, hepatitis, *parvo virus* dan leptospira pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (1 ml) pada umur 3 bulan atau lebih (tidak tergantung pada berat badan). Disuntikkan secara SC atau IM **Kemasan** Vial 1 dosis dan pelarutnya **Deptan RI** No. I. 05021453 VKS. 2. Obat keras

6. **CANISHOT RV – F** **ChoongAng Vaccines Labs. Korea/Mitravet**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *Rabies strain Pasteur* minimum $10^{7.0}$ FAID₅₀ **Indikasi** Pencegahan anjing, kucing, monyet dan hewan berdarah panas lainnya terhadap penyakit rabies **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan dengan melarutkan CANISHOT® RV-F dengan pengencernya dalam kondisi tertutup. Dosis yang diberikan yaitu 1,0 ml secara subkutan. Program vaksinasi awal pada umur 3-4 bulan dan selanjutnya setiap 1 tahun sekali **Kemasan** Box 10 vial @ 1 dosis dengan diluent **Kementan RI** No. I. 12034243 VKS. Obat keras
7. **DEFENSOR 3** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *Rabies* inaktif **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit rabies pada anjing, kucing, sapi dan domba **Perhatian** Pemberian vaksin dalam jangka 21 hari sebelum dilakukan pemotongan tidak dianjurkan **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok dengan baik sebelum digunakan. Dosis tunggal dapat diberikan pada hewan usia 3 bulan ke atas. Untuk vaksinasi ulang dapat dilakukan 1 tahun sekali. Anjing: secara aseptis 1 ml disuntikkan secara IM atau SC. Kucing: secara aseptis 1 ml disuntikkan secara SC. Sapi dan domba: secara aseptis 2 ml disuntikkan secara IM **Kemasan** Vial 1 dosis dan 10 dosis **Deptan RI** No. I. 06033057 VKC. Obat keras
8. **DHPPL – VAC** **ChoongAng Vaccines Labs. Korea/Mitravet**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap dosis vaksin mengandung virus aktif *Canine distemper* dan *Canine hepatitis*, virus *Canine parvo virus* dan virus *Canine para influenza*. LEPTO-VAC: cairan biakan *Leptospira canicola* dan cairan biakan *Leptospira icterohaemorrhagiae* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *Canine distemper (CD)*, *Infectious canine hepatitis (ICH)*, *Canine parvo virus (CPV)*, *Canine para influenza (CPiV)* dan leptospirosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi pada anjing dengan 1,0 ml larutan vaksin secara SC. Program vaksinasi awal pada umur 6-9 minggu, vaksinasi kedua umur 12-16 minggu dan selanjutnya setiap 1 tahun sekali. Kekebalan berkembang dalam 7 hari setelah vaksinasi **Kemasan** Box 10 vial @ 1 dosis dengan LEPTO-VAC @ 1 dosis sebagai diluent **Kementan RI** No. I. 09073663 VKS. Obat keras
9. **DURAMUNE DA2L** **Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *CDV strain onderstepoort* minimum $10^{6.0}$ TCID₅₀, *CAV strain V197* minimum $10^{6.0}$ TCID₅₀, *Leptospira canicola strain hond utrecht* minimum 0,42 protein/ml dan *Leptospira icterohaemorrhagiae strain copenhageni* minimum 0,42 protein/ml. Mengandung gentamisin dan thimerosal

sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *distemper*, hepatitis, *adeno virus* dan leptospirosis pada anjing **Perhatian** Reaksi alergi mungkin terjadi dan antidotanya adalah epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan secara IM atau SC dengan dosis 1 ml/ekor (1 dosis) pada anjing sehat umur 6 minggu atau lebih tua. Vaksinasi ulang sebaiknya setiap 2-3 minggu sampai anjing umur 12 minggu. Anjing yang berumur diatas 12 minggu sebaiknya vaksinasi awal diberikan dengan satu dosis dan divaksinasi ulang 2-3 minggu kemudian. Dianjurkan untuk vaksinasi ulang setiap tahun **Kemasan** Kotak isi 25 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 03032553 VKC. Obat keras

10. DURAMUNE MAX 5/4L

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku disertai dengan pelarutnya **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Canine distemper virus strain onderstepoort*, *Canine adeno virus tipe 2 (CAV-2) strain V197*, *Canine para influenza strain 91880*, *Canine parvovirus strain SP99*, *Leptospira canicola strain hond utrecht*, *Leptospira grippothyposa strain F4397*, *Leptospira icterohaemorrhagiae strain compenhageni* dan *Leptospira pomona strain kennewicki* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit parvovirosis, hepatitis, *para influenza*, adenovirosis, *distemper* dan leptospirosis, penyakit *Feline rhinotracheitis*, *Feline calicivirosis* dan panleukopenia pada kucing **Perhatian** Hanya untuk vaksinasi anjing sehat. Kocok dengan baik sebelum digunakan. Reaksi alergi mungkin terjadi. Antidotanya yaitu epinephrine. Bakarlah wadah vaksin dan semua isinya yang tidak digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan secara SC dengan dosis: 1 ml/ekor (1 dosis) pada anjing sehat umur 6 minggu atau lebih tua. Vaksinasi ulang sebaiknya setiap 2-3 minggu sampai anjing umur 12 minggu. Anjing yang berumur diatas 12 minggu sebaiknya vaksinasi awal diberikan dengan 1 dosis dan divaksinasi ulang 2-3 minggu kemudian dan dianjurkan untuk vaksinasi ulang setiap tahun **Kemasan** Kotak isi 25 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 03052584 VKS. Obat keras

11. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku disertai dengan pelarutnya **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Canine distemper virus strain onderstepoort*, *Canine adeno virus tipe 2 (CAV-2) strain V197*, *Canine para influenza strain 91880*, *Canine parvo virus strain SP99*, *Canine coronavirus strain TN449*, *Leptospira canicola strain hond utrecht*, *Leptospira grippothyposa strain F4397*, *Leptospira icterohaemorrhagiae strain compenhageni* dan *Leptospira pomona strain kennewicki* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit parvovirosis, hepatitis, *para influenza*, adenovirosis, *distemper*, coronavirosis dan leptospirosis **Perhatian** Hanya untuk vaksinasi anjing sehat dan kocok dengan baik sebelum digunakan. Reaksi alergi mungkin terjadi dan antidotanya yaitu epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan secara SC dengan dosis 1 ml/ekor (1 dosis) pada anjing sehat umur 6 minggu atau lebih tua. Vaksinasi ulang sebaiknya setiap 2-3 minggu sampai anjing umur 12 minggu. Anjing yang berumur diatas 12 minggu sebaiknya vaksinasi awal diberikan dengan satu dosis dan divaksinasi ulang 2-3 minggu kemudian. Dianjurkan untuk vaksinasi ulang setiap tahun **Kemasan** Kotak isi 25 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 04012708 VKS. Obat keras

12. DURAMUNE MAX PV**Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *CPV strain SP99* minimum $10^{6.1} \text{TCID}_{50}$ dan gentamisin serta thimerosal sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *parvo virus* yang disebabkan oleh *CPV* **Perhatian** Reaksi alergi mungkin terjadi dan antidotnya adalah epinephrine. Bakarlah wadah vaksin dan semua isinya yang tidak digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan secara SC dengan dosis 1 ml/ekor (1 dosis) pada anjing sehat umur 6 minggu atau lebih tua. Vaksinasi ulang sebaiknya setiap 2-3 minggu sampai anjing umur 12 minggu. Anjing yang berumur diatas 12 minggu sebaiknya vaksinasi awal diberikan dengan satu dosis dan divaksinasi ulang 2-3 minggu kemudian. Dianjurkan untuk vaksinasi ulang setiap tahun **Kemasan** Kotak isi 25 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 03032552 VKC. Obat keras

13. EURICAN DHPPi – 2 L**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Kering beku dan cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Distemper strain modified* minimum 10^4CCID_{50} , *Adeno virus strain CAV* minimum $10^{2.5} \text{CCID}_{50}$, *Canine parvovirus strain CAG* minimum $10^{4.9} \text{CCID}_{50}$, dan *Para influenza tipe 2 strain C6F 2004/75* minimum $10^{4.7} \text{CCID}_{50}$ serta pelarut yang berisi *Leptospira canicola strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme dan *Leptospira ichterohaemorrhagiae inaktif strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *distemper*, hepatitis, *parvo virus*, *para influenza* dan leptospirosis pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Buat larutan dengan cara mencampur vial vaksin aktif kering beku dan pelarut yang mengandung vaksin inaktif cair, kemudian disuntikkan secara IM/SC. Vaksinasi pertama umur 8 minggu, vaksinasi kedua umur 12 minggu. Pada booster pertama umur 1 tahun dan booster berikutnya tiap tahun **Kemasan** Kotak berisi vial 1 dosis vaksin aktif + pelarut (vaksin inaktif) 1 ml + disposable syringe **Deptan RI** No. I. 03032561 VKS. Obat keras

14. EURICAN DHPPi – 2 LR**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Kering beku dan cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Distemper strain modified* minimum 10^4CCID_{50} , *Adeno virus strain CAV* minimum $10^{2.5} \text{CCID}_{50}$, *Canine parvo virus strain CAG* minimum $10^{4.9} \text{CCID}_{50}$, dan *Para influenza tipe 2 strain C6F 2004/75* minimum $10^{4.7} \text{CCID}_{50}$ serta pelarut yang berisi *Leptospira canicola strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme dan *Leptospira ichterohaemorrhagiae inaktif strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme dan *Rabies inaktif strain G52* minimum 1 IU **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit *distemper*, hepatitis, *parvo virus*, *para influenza*, leptospirosis dan rabies pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Buat larutan dengan cara mencampur vial vaksin aktif kering beku dan pelarut yang mengandung vaksin inaktif cair, kemudian disuntikkan secara IM/SC. Vaksinasi pertama umur 8 minggu, vaksinasi kedua umur 12 minggu. Pada booster pertama umur 1 tahun dan booster berikutnya tiap tahun **Kemasan** Kotak berisi vial 1 dosis vaksin aktif + pelarut (vaksin inaktif) 1 ml + disposable syringe **Deptan RI** No. I. 03032562 VKS. Obat keras

15. EURICAN DHPPi – 2

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *distemper strain modified* minimum 10^4 CCID₅₀, *Adeno virus strain CAV* minimum $10^{2.5}$ CCID₅₀, *Canine parvo virus strain CAG* minimum $10^{4.9}$ CCID₅₀, dan Parainfluenza tipe 2 strain C6F 2004/75 minimum $10^{4.7}$ CCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit distemper, hepatitis, parvovirus dan parainfluenza pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Buat larutan dengan cara mencampur vaksin kering beku dan pelarut, kemudian disuntikkan secara IM/SC. Vaksinasi pertama pada umur 8 minggu, vaksinasi kedua pada umur 12 minggu. Pada booster pertama umur 1 tahun dan pada booster berikutnya tiap tahun **Kemasan** Kotak berisi vial 1 dosis vaksin + pelarut 1 ml + 1 disposable syringe **Deptan RI** No. I. 03032560 VKS. Obat keras

16. FELLINIFFA

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus panleucopenia strain PLI-IV minimum 10^3 CCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit panleucopenia pada kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Suntikkan secara SC/IM dengan program vaksinasi umur 6-8 minggu, kemudian umur 12 minggu dan pada booster umur 1 tahun serta booster berikutnya tiap tahun sekali **Kemasan** 1 vial vaksin kering beku + pelarut + disposable syringe **Deptan RI** No. I. 05091566 VKS. 2. Obat keras

17. FELOCELL 3

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis Vaksin mengandung virus aktif feline herpesvirus-1 (FHV), feline calicivirus dan feline parvo virus (FPV) strain johnson snow leopard **Indikasi** Vaksinasi untuk mencegah kucing sehat terhadap infeksi feline viral rhinotracheitis (FVR) yang disebabkan oleh FHV-1, gangguan pernafasan yang disebabkan oleh FCV dan FPL yang disebabkan oleh FPV **Perhatian** Vaksinasi hanya boleh dilakukan pada kucing yang sehat dan kucing yang sedang tidak bunting **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan pada kucing yang sehat. Secara aseptis campurkan pelarut yang sudah disediakan ke dalam vaksin kering beku, kocok hingga rata dan berikan 1 ml secara SC atau IM. Untuk vaksinasi primer: kucing sehat berumur 12 minggu atau lebih harus disuntikkan 2 dosis vaksin secara terpisah dengan jangka waktu 3-4 minggu. Kucing yang telah divaksinasi pada umur kurang dari 12 minggu sebaiknya divaksinasi ulang pada usia 12 minggu. Untuk vaksinasi ulang, dilakukan setiap tahun dengan menggunakan dosis tunggal **Kemasan** Vial 1 ml (1 dosis) **Deptan RI** No. I. 07033187 VKS. Obat keras

18. FELOCELL 4

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Modified live virus dan chlamydia, feline rhinotracheitis virus strain FVRm, feline calicivirus strain F-9, feline panleukopenia virus strain snow leopard dan feline chlamydia psittaci strain baker **Indikasi** Vaksinasi pada kucing untuk mencegah feline viral rhinotracheitis yang disebabkan oleh feline herpesvirus-1, feline respiratory disease yang disebabkan oleh feline calicivirus, feline panleukopenia yang disebabkan oleh feline parvovirus dan feline chlamydiosis yang disebabkan oleh chlamydia psittaci **Perhatian** Vaksinasi hanya boleh dilakukan pada kucing yang sehat dan kucing yang

sedang tidak bunting **Dosis dan Cara Pemakaian** Vaksinasi dilakukan pada kucing yang sehat. Secara aseptis campuran pelarut yang sudah disediakan ke dalam vaksin kering beku, kocong hingga rata dan berikan 1 ml secara SC atau IM. Untuk vaksinasi primer: kucing sehat berumur 12 minggu atau lebih harus disuntikkan 2 dosis vaksin secara terpisah dengan jangka waktu 3-4 minggu. Kucing yang telah divaksinasi pada umur kurang dari 12 minggu sebaiknya divaksinasi ulang pada usia 12 minggu. Untuk vaksinasi ulang, dilakukan setiap tahun dengan menggunakan dosis tunggal **Kemasan** 1 dose 1 lyophilized vial + 1 sterile diluent, box 25x 1 dosis **Kementan RI** No. I. 11054081 VKS. Obat keras

19. FEL – O – GUARD PLUS 3**Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku disertai pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus feline rhinotracheitis strain FVR-PM, feline calicivirus strain FCV-PM dan virus feline panleukopenia strain FPV-E dengan gentamisin dan polymyxin B sebagai pengawet **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit feline rhinotracheitis, feline calicivirolosis dan panleukopenia pada kucing **Perhatian** Penggunaan bahan biologik dapat menimbulkan reaksi alergi dan antidotanya yaitu epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan secara SC dengan dosis 1 ml/ekor (1 dosis) pada kucing umur 8 minggu atau lebih tua dan diulang 3-4 minggu kemudian. Vaksinasi ulang dianjurkan setiap tahun sekali **Kemasan** Kotak berisi 25 vial @ 1 dosis dilengkapi dengan pelarut **Deptan RI** No. I. 03042573 VKS. Obat keras

20. HEXADOG**Merial/Romindo Primavetcom**

Bentuk Sediaan Kering beku dan cairan **Komposisi** Tiap dosis mengandung vaksin kering beku yang terdiri dari virus *Distemper aktif strain modified* minimum 10^3 CCID₅₀ yang telah dimodifikasi. *Adeno virus strain CAV 2* minimum $10^{2.5}$ CCID₅₀ yang telah dimodifikasi. *Canine parvo virus aktif strain CAG* minimum 10^3 CCID₅₀ yang telah dimodifikasi. Vaksin cair leptorab (LR) yang terdiri dari virus *rabies strain fixed inaktif*. Antigen inaktif *L. canicola strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme dan *Leptospira ichteroheomorrhagiae inaktif strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme **Indikasi** Untuk Pencegahan terhadap distemper, HCC, parvovirolosis, leptospirosis dan *rabies strain G52* **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IM/SC. Buat larutan dengan cara mencampur vaksin kering beku dan vaksin cair. Program vaksinasi pada umur 12 minggu sebagai kelanjutan dari program vaksin sebelumnya. Pada booster dilakukan umur 1 tahun dan setiap tahun **Kemasan** 1 vial vaksin kering beku, 1 vial vaksin cair + disposable syringe **Deptan RI** No. I. 0509225 VKS. 2. Obat keras

21. NEO RABIVAK TC**Vaksindo Satwa Nusantara**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus inaktif *rabies galur pasteur* minimum $10^{7.0}$ MLD₅₀ **Indikasi** Dipakai untuk melindungi anjing, kucing, monyet dan hewan berdarah panas lainnya terhadap serangan rabies **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (1 ml), pemakaian dengan cara suntikkan vaksin dibawah kulit pada punggung atau kedalam otot paha **Kemasan** Kotak berisi 1 botol @ 10 dosis **Deptan RI** No. D. 0607864 VKC. 2. Obat bebas terbatas

22. NOBIVAC DH

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^4 TCID₅₀ virus aktif *Canine distemper strain onderstepoort* dan 10^4 TCID₅₀ virus aktif *Canine adeno virus tipe 2 strain manhattan LPV3* **Indikasi** Pengebalan anjing terhadap distemper dan adeno virus tipe 1 dan 2 **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC dengan dosis 1 ml **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 0508932 VKS. 3. Obat keras

23. NOBIVAC DHP

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^4 TCID₅₀ *Canine distemper virus aktif strain onderstepoort*, 10^4 TCID₅₀ *Canine adeno virus aktif tipe 2 strain manhattan LPV3*, 10^7 TCID₅₀ *Canine parvo virus aktif strain 154* **Indikasi** Pengebalan anjing terhadap *Canine distemper virus*, *Canine adeno virus tipe 1*, 2 dan *Canine parvo virus* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC dengan dosis 1 ml **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 0509507 VKS. 1. Obat keras

24. NOBIVAC DHPPi

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^4 TCID₅₀ virus aktif *Canine distemper strain onderstepoort*, 10^4 TCID₅₀ virus aktif *Canine adeno virus tipe 2 strain manhattan LPV3*, 10^7 TCID₅₀ *Canine parvo virus strain 154*, $10^{5.5}$ TCID₅₀ *Canine para influenza virus strain cornell* **Indikasi** Pengebalan anjing terhadap distemper, adeno virus tipe 1 dan 2, parvo virus dan para influenza virus **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC dengan dosis 1 ml **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis + 10 vial pelarut **Deptan RI** No. I. 0010212 VKS. Obat keras

25. NOBIVAC PARVO – C

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^7 TCID₅₀ *Canine parvo virus strain 154* **Indikasi** Pengebalan anjing terhadap infeksi *Canine parvo virus (CPV)* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC dengan dosis 1 ml **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 0501927 VKS. 2. Obat keras

26. NOBIVAC PUPPY DP

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10^7 TCID₅₀ *Canine parvo virus strain 154* dan 10^5 TCID₅₀ *Canine distemper virus strain onderstepoort* **Indikasi** Pengebalan anjing terhadap infeksi *Canine parvo virus (CPV)* dan *CDV* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 0604161 VKS. 1. Obat keras

27. NOBIVAC RABIES

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif cair dengan adjuvant aluminium phosfate **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 2 *mouse potency IU* virus *rabies inaktif strain pasteur* **Indikasi** Pengebalan anjing dan kucing terhadap rabies **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 05091102 VKC. 2. Obat keras

28. NOBIVAC RL

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif cair dengan adjuvant aluminiumphosphate **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 40 hamster PD₈₀ bakteri inaktif *Leptospira canicola strain Ca-12-000* dan 40 hamster PD₈₀ bakteri inaktif *Leptospira icterohaemorrhagiae strain 820K* dan 2 *mouse potency IU* virus *rabies strain pasteur* **Indikasi** Pengebalan anjing terhadap rabies dan leptospirosis yang disebabkan oleh *L. canicola* dan *L. Ichterohaemorrhagiae* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC **Kemasan** Karton isi 10 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 05122217 VKC. Obat keras

29. NOBIVAC TRICAT

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku + pelarut **Komposisi** Setiap dosis mengandung tidak kurang dari 10⁴TCID₅₀ *Feline herpes virus strain G2620A*, 10⁴TCID₅₀ *Feline calici virus strain F9* dan 10⁷TCID₅₀ *Feline panleukopenia virus strain bristol* **Indikasi** Pengebalan kucing terhadap *Feline herpes virus (FHV)*, *Feline calici virus (FCV)* dan *Feline panleucopenia (FPL)*. Komponen FPL mempunyai proteksi silang terhadap *CPV tipe 2a* dan *tipe 2b* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan secara SC **Kemasan** Karton isi 5 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 060433077 VKS. Obat keras

30. PARVIGEN

Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Vaksin aktif kering beku dan pelarutnya **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Canine parvovirus* minimal 10³TCID₅₀ **Indikasi** Pencegahan untuk melawan penyakit parvo virus pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (1 ml), dan tidak tergantung pada berat badan atau umur hewan. Disuntikkan secara SC atau IM **Kemasan** Vial 1 dosis dan pelarutnya **Deptan RI** No. I. 05021454 VKS. 2. Obat keras

31. PENTADOG

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku + cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *rabies inaktif strain G52* minimum IU, virus *Distemper canine strain modified* minimum 10³CCID₅₀, *adeno virus strain CAV* minimum 10^{2.5}CCID₅₀, virus hepatitis dari antigen inaktif dari *L. canicola strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme dan *Leptospira icterohaemorrhagiae inaktif strain 86 500 16 070* minimum 100.000.000 mikroorganisme **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit distemper, *contagious canine hepatitis*, rabies,

dan leptospirosis pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan vaksin beku dalam vial dengan vaksin lepto yang terdapat dalam syringe, penyuntikan secara aseptis IM atau SC **Kemasan** 1 vial vaksin kering beku + pelarut + disposable syringe **Deptan RI** No. I. 0206024 VKS. 2. Obat keras

32. PNEUMODOG

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Tiap dosis vaksin mengandung *Bordetella bronchiseptica* minimum 1,6 log 10 dan *virus para influenza tipe 2* minimum 1,6 log 10 **Indikasi** Pencegahan disebabkan oleh *Bordetella bronchiseptica* dan *Para influenza tipe 2* **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan vaksin beku dalam vial (1 dosis) dengan pelarut (1 ml) yang terdapat dalam syringe, penyuntikan secara aseptis IM atau SC. Vaksinasi awal umur 6 minggu untuk anak anjing dari induk yang divaksinasi, vaksinasi awal umur 4 minggu untuk anak anjing dari induk yang tidak divaksinasi. Vaksinasi kedua, pada umur 2–3 minggu setelah vaksinasi pertama, pada booster tiap tahun setelah vaksinasi kedua **Kemasan** Vial 1 dosis dan syringe **Deptan RI** No. I. 04062756 VKC. Obat keras

33. PRIMODOG

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus aktif *Canine parvo virus strain CAG* minimum 10^6 CCID₅₀ pada anjing **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit parvovirus pada anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu dosis (1 ml)/ekor suntikkan secara SC **Kemasan** Kotak isi vial 1 dosis dan syringe **Deptan RI** No. I. 03012278 VKC. 1. Obat keras

34. PUREVAX

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Kering beku dan cairan **Komposisi** Tiap dosis mengandung vaksin kering beku felinifra yang mengandung virus aktif *Feline panleucopenia strain PLI-IV* minimum 10^3 CCID₅₀ dan vaksin cair corifelin (HC) sebagai pelarut yang mengandung *Feline herpesvirus* dan *Feline calcivirus* **Indikasi** Untuk pencegahan terhadap penyakit panleucopenia, herpesvirus dan calcivirus pada kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secara IM/SC buat larutan dengan cara mencampur vaksin kering beku dan vaksin cair. Vaksinasi pertama umur 6-8 minggu, vaksinasi kedua umur 12 minggu. Pada booster dilakukan pada umur 1 tahun dan setiap tahun **Kemasan** Vial 1 dosis beserta pelarutnya + 1 disposable syringe **Deptan RI** No. I. 03062607 VKS. Obat keras

35. RABIGEN MONO

Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *rabies inaktif strain pasteur minimal 12 I IU/dosis* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit rabies untuk anjing dan kucing **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 dosis (1 ml), dan tidak tergantung pada berat badan atau umur hewan **Kemasan** Vial 1 ml **Deptan RI** No. I. 06011543 VKC. 2. Obat keras

36. RABISIN

Merial/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap dosis (1ml) mengandung virus *rabies* inaktif **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit rabies **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara SC atau

IM dengan dosis 1 ml tiap hewan **Kemasan** Kotak isi vial 1 dosis + syringe **Deptan RI** No. I. 1202040 VKC. 3.

37. RABIVET SUPRA[®]92**Pusat Veterinaria Farma**

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Setiap dosis vaksin (1 ml) mengandung paling sedikit $10^{7.5}$ virus *rabies strain pasteur* yang diinaktivasi dengan b-Propiolactone. Vaksin disuspensikan dalam adjuvant aluminium hidroksida yang mengandung bahan pengawet thiomersal **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit rabies, khususnya untuk anjing **Dosis dan Cara Pemakaian** Anjing umur 3 bulan ke atas 1 ml intramuskular atau subcutan. Sebelum digunakan tempatkan vaksin pada suhu kamar terlebih dahulu kemudian kocok sampai rata. Vaksin ulang sebaiknya dilakukan setiap tahun, untuk semua umur **Kemasan** Vial berisi 10 ml (10 dosis) **Deptan RI** No. D. 06121430 VKC. 1. Obat keras

38. RABVAC 3 TF**Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *rabies inaktif-high cell passage-street alabama dufferin (HCP-SAD)* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit rabies pada anjing, kucing dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi secara IM atau SC 1 ml pada anjing dan kucing dan 2 ml pada kuda. Anjing dan kucing divaksin umur 3 bulan atau lebih dan di booster 1 tahun kemudian, vaksin ulang dilakukan setiap 3 tahun. Untuk kuda divaksin umur 3 bulan atau lebih dan diulang 1 tahun kemudian, vaksinasi ulang setiap 2 tahun sekali **Kemasan** Vial 50 ml (50 dosis) **Deptan RI** No. I. 08093497 VKC. Obat keras

39. RABVAC 3**Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung virus *rabies strain street alabama dufferin (SAD)* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit rabies pada anjing, kucing dan kuda **Perhatian** Hanya untuk hewan yang sehat dan tidak berparasit. Penggunaan bahan biologik dapat menimbulkan reaksi alergi. Antidotanya yaitu epinephrine **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui suntikan secara IM atau SC dengan dosis 1 ml/ekor (1 dosis) pada anjing dan kucing serta 2 ml/ekor (2 dosis) pada kuda. Untuk anjing dan kucing vaksinasi dilakukan pada umur 3 bulan atau lebih tua dan diulang 1 tahun kemudian. Setelah itu, vaksinasi ulang setiap 3 tahun sekali. Untuk kuda vaksinasi dilakukan pada umur 3 bulan atau lebih tua dan diulang 1 tahun kemudian. Setelah itu, vaksinasi ulang setiap tahun sekali dengan 2 dosis **Kemasan** Kotak berisi 50 vial @ 1 dosis **Deptan RI** No. I. 0307790 VKC. 2. Obat keras

40. VANGUARD PLUS 5 L4 CV**Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia**

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis modified live dan killed virus. LYOPHILIZED: *Canine distemper virus strain snyder hill*, *Canine adeno virus tipe 2 strain manhattan*, *Canine para influenza virus strain NL-CPI-5*, *Parvo virus strain NL-35-D*, *Leptospira canicola strain C-51*, *Leptospira grippotyphosa strain MAL 1540*, *Leptospira icterohaemorrhagiae strain NADL 11403*, *Leptospira pomona strain T262* LIQUID: *Canine coronavirus strain NL-18* **Indikasi** Vaksinasi pada anjing untuk mencegah *Canine distemper* yang disebabkan oleh *Canine distemper virus (CDV)*. *Infectious canine hepatitis (ICH)* yang

disebabkan oleh *Canine adeno virus tipe 1 (CAV-1)*. *Respiratory disease* yang disebabkan oleh *Canine adeno virus tipe 2 (CAV-2)*. *Canine para influenza* yang disebabkan oleh *Canine para influenza virus (CPI)*. Enteritis yang disebabkan oleh *Canine corona virus (CCV)* dan *Canine parvo virus (CPV)* serta leptospirosis yang disebabkan oleh *Leptospira canicola*, *L. grippityphosa*, *L. icterohaemorrhagiae* dan *L. pomona* **Perhatian** Vaksinasi hanya boleh dilakukan pada anjing yang sehat dan anjing yang sedang tidak bunting **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara aseptis campurkan pelarut yang sudah disediakan ke dalam vaksin kering beku, kocok hingga rata dan berikan 1 ml secara SC atau IM. Untuk vaksinasi primer: anjing yang sehat berumur 6 minggu atau lebih seharusnya menerima 3 dosis, dengan jangka waktu 3 minggu untuk pemberian/dosis. Revaksinasi direkomendasikan 1x tiap tahunnya dengan dosis tunggal **Kemasan** 1 dose 1 lyophilized vial + 1 liquid (CCV) vial, box 25x1 dosis **Kementan RI** No. I. 11044040 VKS. Obat keras

41. VANGUARD PLUS 5/CV – L

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis mengandung *Canine distemper virus strain snyder hill*, *Canine adeno virus tipe 2 strain manhattan*, *Canine para influenza virus strain NL-CPI-5*, *Parvo virus strain NL-35-D*, *Leptospira canicola strain C-51*, *Leptospira icterohaemorrhagiae strain NADL 11403* dan *Canine corona virus strain NL-18* **Indikasi** Pencegahan terhadap penyakit distemper, hepatitis, respirasi, para influenza, parvo virus, leptospirosis dan enteritis pada anjing **Perhatian** Vaksinasi hanya boleh dilakukan pada anjing yang sehat dan anjing yang tidak bunting **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara aseptis campurkan pelarut yang sudah disediakan ke dalam vaksin kering beku, kocok hingga rata. Berikan 1 ml secara SC atau IM secara aseptis. Untuk vaksinasi primer, anjing yang sehat berumur 6 minggu atau lebih seharusnya menerima 3 dosis, dengan jangka waktu 3 minggu untuk pemberian/dosis. Revaksinasi direkomendasikan 1x tiap tahunnya dengan dosis tunggal **Kemasan** Vial 1 ml (1 dosis) **Deptan RI** No. I. 09023561 VKS. Obat keras

42. VANGUARD PLUS 5/L

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Setiap dosis modified live virus-*Leptospira bacterine*, *Canine distemper virus strain snyder hill*, *Adeno virus tipe-2 strain manhattan*, *Canine para influenza virus strain NL-CPI*, *Parvo virus strain NL-35D*, *Leptospira canicola strain C-51* dan *Leptospira icterohaemorrhagiae strain NADL* **Indikasi** Pencegahan pada anjing terhadap *Canine distemper virus*, *Canine adeno virus tipe 1*, *Canine adeno virus tipe 2*, *Canine para influenza virus*, *Canine parvo virus*, *Leptospira canicola* dan *L. icterohaemorrhagiae* **Perhatian** Vaksinasi hanya boleh dilakukan pada anjing yang sehat dan anjing yang sedang tidak bunting **Dosis dan Cara Pemakaian** Secara aseptis campurkan pelarut yang sudah disediakan ke dalam vaksin kering beku, kocok hingga rata dan berikan 1 ml secara SC atau IM secara aseptis. Untuk vaksinasi primer: anjing yang sehat berumur 6 minggu atau lebih seharusnya menerima 3 dosis, dengan jangka waktu 3 minggu untuk pemberian/dosis. Revaksinasi direkomendasikan 1x tiap tahunnya dengan dosis tunggal **Kemasan** 1 dose 1 vial (vanguard puppy 5) dan 1 vial diluent 1 ml (leptoform C-1®), box 25x 1 dosis **Deptan RI** No. I. 10013774 VKS. Obat keras

43. VANGUARD PLUS CPV

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung virus *Parvo strain NL-35-D*

Indikasi Melindungi anjing terhadap *enteritic haemorrhagic acute* yang disebabkan oleh *Canine parvo virus* **Perhatian** Vaksinasi hanya boleh dilakukan pada anjing yang sehat dan anjing yang sedang tidak bunting **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok hingga rata, secara aseptis berikan 1 ml secara SC atau IM. Untuk vaksinasi primer, anjing yang sehat berumur 6 minggu atau lebih seharusnya menerima 3 dosis. Dengan jangka waktu 3 minggu untuk pemberian/dosis. Revaksinasi direkomendasikan untuk dilakukan 1x setiap tahunnya dengan dosis tunggal **Kemasan** Vial 1 ml (1 dosis) **Deptan RI** No. I. 06093122 VKC. Obat keras

44. VANGUARD PLUS CPV/CV

Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Setiap dosis mengandung *Canine corona virus strain NL-18*

dan *Parvo virus strain NL-35-D* **Indikasi** Untuk vaksinasi pada anjing umur 6 minggu atau lebih sebagai pencegahan terhadap penyakit enteritis yang disebabkan oleh *Canine corona virus (CCV)* dan *Canine parvo virus (CPV)* **Dosis dan Cara Pemakaian** Kocok sebelum digunakan dan berikan 1 ml secara SC atau IM. Vaksinasi primer: anjing sehat umur 6 minggu atau lebih seharusnya menerima 3 dosis dengan interval waktu 3 minggu untuk pemberian/dosisnya. Re-vaksinasi: direkomendasikan 1x tiap tahunnya dengan dosis tunggal **Kemasan** Vial 1 ml **Kementan RI** No. I. 12014209 VKC. Obat keras. ****

VAKSIN HEWAN AIR

02.04

1. AQUAVAC STREPSa

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk cairan emulsi **Komposisi** Setiap ml mengandung *Streptococcus agalactiae* T1 513: $1,36 \times 10^8$ ael bakteri **Indikasi** Imunisasi aktif untuk spesies ikan yang rentan terhadap *Streptococcus* akibat *Streptococcus agalactiae* **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi intraperitoneal dengan dosis 0,05 ml untuk ikan dengan BB minimum 15 mg. Keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam brosur **Kemasan** Botol 50 ml (1.000 dosis), 100 ml (2.000 dosis), 250 ml (5.000 dosis), 500 ml (10.000 dosis) dan 1.000 ml (20.000 dosis) **KKP RI** No. I. 1105166 VKC. Obat keras

2. AQUAVACIRIDOV

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk cairan emulsi **Komposisi** Setiap ml mengandung iridovirus ikan inaktif 2×10^7 TCID₅₀/ml **Indikasi** Pencegahan terhadap infeksi iridovirus pada spesies ikan yang peka **Dosis dan Cara Pemakaian** Injeksi intraperitoneal dengan dosis 0,05 ml untuk ikan dengan BB minimum 15 mg. Keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam brosur **Kemasan** Botol 50 ml (1.000 dosis), 100 ml (2.000 dosis), 250 ml (5.000 dosis), dan 500 ml (10.000 dosis) **KKP RI** No. I. 1211221 BKC. Obat keras

3. NORVAX STREPSi

**Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/
Intervet Indonesia**

Bentuk Sediaan Vaksin inaktif berbentuk cairan siap pakai **Komposisi** Setiap dosis mengandung sel bakteri inaktif *Streptococcus iniae* strain SB 430 **Indikasi** Menginduksi perlindungan ikan (asian seabass (baramundi/lates calcarifer) dan ikan sejenis) terhadap infeksi penyakit yang disebabkan oleh *Streptococcus iniae* **Dosis dan Cara Pemakaian** Penyuntikan dengan dosis 0,1 ml vaksin secara intraperitoneal atau 1 L vaksin dicampurkan dalam 9 L air laut untuk pencelupan. Keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam brosur **Kemasan** Botol 250 ml **DKPRI** No. I. 060606 VKC. Obat keras.***

BAHAN DIAGNOSTIKA

02.05

1. AG. BRUCELLA RBT

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Merupakan suspensi kuman *brucella strain 1119* yang diwarnai dengan pewarna rose bengal. Konsentrasi kuman diatur 8% pada buffer yang mempunyai pH 3,65 **Indikasi** Untuk diagnosa dengan cara uji aglutinasi cepat terhadap serum atau plasma dan merupakan screening test untuk diagnosa brucellosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Menggunakan WHO aglutinasi *plate*, caranya: tempatkan antigen pada suhu kamar dan kocok sampai homogen sebelum dipakai. Teteskan 1 tetes serum ke lubang cawan dengan memakai pipet eppendorf (0,025 ml). Teteskan 1 tetes antigen dengan cara yang sama. Letakkan pada mesin pengocok, goyang selama 4 menit kemudian baca hasilnya. Menggunakan lempeng kaca atau gelas obyek, caranya: tempatkan antigen pada suhu kamar dan kocok sampai homogen sebelum dipakai. Teteskan 1 tetes serum pada tiap petak lempeng kaca (0,003 ml). Teteskan 1 tetes antigen dengan cara yang sama. Aduk dengan batang korek api, goyang dengan gerakan berputar-putar selama 4 menit dan aca hasilnya **Kemasan** Vial berisi 9 ml antigen **Deptan RI** No. D. 0612530 VKC. 1. Obat keras

2. AG. MYCOPLASMA G.

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Merupakan suspensi *Mycoplasma gallisepticum strain S6* yang diwarnai dengan kristal violet **Indikasi** Untuk diagnosa penyakit respirasi kronis (*CRD*) pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ambil darah dengan memakai tabung suntik dan pindahkan pada tabung reaksi untuk memisahkan serumnya. Kocok antigen sampai homogen dan sebelum dipakai teteskan 1 tetes serum pada lempeng kaca. Kemudian ditambahkan dengan 1 tetes antigen, campur dan aduk rata sambil digoyang-goyang selama 2 menit. Pembacaan hasil sesudah 2 menit sejak selesainya mencampur serum dan antigen dan bila reaksi sudah lebih dari 2 menit maka tidak terbaca **Kemasan** Botol 10 ml antigen **Deptan RI** No. D. 0707540 VKC. 2. Obat keras

3. AG. ND

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Kering beku **Komposisi** Antigen yang diformulasi dalam bentuk kering beku dan terdiri dari chorio allantois telur ayam bertunas yang ditulari virus *ND*. Diinaktifasi dengan B-propiolactone kemudian ditambah pengawet glukosa dan thiomersal **Indikasi** Untuk mengukur derajat kekebalan terhadap penyakit tetelo (*ND*) dengan cara uji hambatan hemaglutinasi (HI test) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Vial 2 ml **Deptan RI** No. D. 0707142 VKC

4. AG. PULLORUM

Pusat Veterinaria Farma

Bentuk Sediaan Suspensi **Komposisi** Merupakan suspensi kuman *Salmonella pullorum* yang diwarnai dengan kristal violet. Merupakan suspensi kuman *Salmonella pullorum* yang diwarnai dengan kristal violet **Indikasi** Untuk diagnosa penyakit pullorum pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ambil darah memakai tabung suntik dan pindahkan pada tabung reaksi untuk memisahkan serumnya. Kocok antigen sampai homogen sebelum dipakai dan

teteskan 1 tetes serum pada lempeng kaca, kemudian tambah dengan 1 tetes antigen. Campur dan aduk rata, kemudian lempeng kaca di goyang-goyang selama 2 menit dan bila reaksi sudah lebih dari 2 menit maka reaksi tidak terbaca **Kemasan** Botol 10 ml **Deptan RI** No. D. 0612528 VKC. Obat keras

5. FLU DETECT TYPE A AG TEST STRIP

France via Frontera San Diego,

Synbiotics Corporation, USA/Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan *Rapid test* **Komposisi** Test strip dilapisi AI monoclonal antibodi tipe A, *buffer* pemisah, *swab*, tabung uji polypropylene beserta tutupnya, rak tabung uji dan panduan penggunaan *kit* **Indikasi** Untuk mendeteksi kualitatif virus AI tipe A pada spesimen tracheal dan cloacal unggas atau flock yang menunjukkan gejala AI **Dosis dan Cara Pemakaian** Masukkan 8 tetes *buffer* ($\pm 250 \mu\text{l}$) ke dalam tabung uji. *Swab* trachea atau kloaka unggas, lalu celupkan *swab* ke dalam tabung uji dan putar *swab* 5 hingga 10 kali hingga tercampur dengan *buffer*. Angkat *swab* dari larutan *buffer*, tempel dan tekan *swab* pada dinding tabung uji hingga tidak ada lagi larutan yang menetes, lalu keluarkan *swab* dari tabung uji. Masukkan test strip ke dalam tabung uji hingga bagian pink pad terendam pada sampel. Diamkan selama 15 menit, lalu lakukan pembacaan. Hasil dinyatakan positif terhadap virus influenza tipe A jika terbentuk garis pada bagian atas (C) dan bagian bawah (T), dan dinyatakan negatif jika garis hanya terbentuk pada bagian atas (C) **Kemasan** Box isi 20 *kit* **Deptan RI** No. I. 10043827 VKCD – KIT. Obat keras.****

Bab III.

Paparan Pemerian Sediaan **Premiks**

Paparan pemerian (*Description*) obat hewan disusun sesuai dengan golongan obat hewan berdasarkan farmakologi. Dalam setiap kelompok, sediaan obat hewan disusun menurut alfabetis nama dagangnya. Secara umum penyusunan materi ini dimulai dari nama obat hewan, nama produsen, nama importir (bila ada), nama distributor, **Bentuk Sediaan**, **Komposisi**, **Indikasi**, kontra **Indikasi** (bila ada), peringatan (bila ada), dosis, cara pemakaian, **Kemasan**, nomor pendaftaran dan klasifikasi obat hewan. Paparan sediaan ini disusun sejauh mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

BAB III. SEDIAAN PREMIKS

03

IMBUHAN PAKAN (FEED ADDITIVE)

03.01

1. **A – MAX CONCENTRATE** **Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *crude protein* 18%, *crude fat* 1% dan *crude fiber* 12% **Indikasi** Untuk memacu pertumbuhan berat badan/ADG. Merangsang nafsu makan dan palatabilitas. Mempercepat *recovery*. Menurunkan tingkat stress. Menstabilkan dan memelihara bakteri rumen serta menjaga keseimbangan pH dan mikroflora pada pencernaan **Dosis dan Cara Pemakaian** *Beef cattle*: 15-25 g/head/day. *Dairy*: 40-50 g/head/day. *Poultry* dan *swine*: 2,5-5 kg/ton dan dicampur kedalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044070 FTS.
2. **AB 20** **Prince Agri Products, Amerika Serikat/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung natural HSCAS 100% **Indikasi** Mikotoksin *binder* pada ayam, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 1-2 kg/MT pakan atau 5 kg/MT pakan untuk kasus kontaminasi berat **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12084319 FTS. Obat bebas terbatas
3. **ACID LAC DRY** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam fumarat 45%, asam propionat, asam sitrat, asam formic dan asam laktat **Indikasi** Meningkatkan kesehatan usus, menurunkan pH dalam saluran pencernaan sehingga mengurangi masalah diare pada anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 3-5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0106819 FTS. Obat bebas terbatas
4. **ACID LAC LIQUID** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam fumarat 3,37%, asam propionat 30%, asam sitrat 2%, asam formic 6,4%, asam laktat 20% dan air deionisasi 38,23% **Indikasi** Menurunkan pH dalam saluran pencernaan dan meningkatkan kesehatan usus halus serta mengurangi kasus diare **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 ml/L air minum **Kemasan** Derigen 5 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 1302256 FTC. 1. Obat bebas terbatas
5. **ACIDAL NC** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam laktat **Indikasi** Feed additive pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04112833 FTS. Obat bebas terbatas

6. **ACIDBAC** **Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung ortofosforat, asam format dan propionate serta garamnya dengan ekstrak alami antiurease saponin **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak. Untuk meningkatkan faktor konversi pakan dan daily weight gain **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan. Dosis antara: 1 kg/TM dan 3 kg/TM **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 11044066 FTS. Obat bebas terbatas

7. **ACID – PAK 4 – WAY 2X WATER SOLUBLE** **Alltech Inc-USA/
Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Asam sitrat, garam, maltodekstrin, kalium klorida, silikon dioksida, perisa alami dan buatan, natrium sakarin, asam sorbic, natrium sitrat, zinc sulfate, magnesium sulfate, ekstrak fermentasi *Aspergillus niger* yang dikeringkan, ekstrak fermentasi *Bacillus subtilis* yang dikeringkan, produk fermentasi *Lactobacillus acidophilus* yang dikeringkan dan produk fermentasi *Enterococcus faecium* yang dikeringkan **Indikasi** Acidifier organik yang ditambahkan dalam air minum untuk hewan ternak dan unggas serta ke dalam susu sebagai susu pengganti pada anak sapi atau babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi dan unggas: tambahkan produk ke dalam air minum sebanyak 0,5 g/L. Anak sapi (susu pengganti): 1,27 g/L **Kemasan** Dus 25 kg @ 1 kg aluminium foil **Deptan RI** No. I. 09013544 FTS. Obat bebas terbatas

8. **ACID-PAK 4-WAY LIQUID** **Alltech Inc-USA; Alltech Biotechnology Corp.**
HARD WATER FORMULA **Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung air, asam sitrat, natrium sitrat, asam asetat, natrium klorida, kalium klorida, ethyl vanillin, zinc sulfate, iron sulfate, magnesium sulfate, ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger* dan ekstrak fermentasi kering *Bacillus subtilis* **Indikasi** Acidifier organik yang mengandung asam sitrat/sodium sitrat, enzim dan bahan perisa yang ditambahkan ke dalam air minum hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 ml/L air minum **Kemasan** 1 L, 5 L, 20 L, 25 L, 200 kg **Kementan RI** No. I. 12024224 FTC. Obat bebas terbatas

9. **ACIDTEC 401** **Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung asam laktat, asam fumarat, asam format, asam propionat dan asam sitrat **Indikasi** Sebagai bahan pengasam (acidifier) pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** Kantong HDPE 25 kg **Deptan RI** No. I. 08053426 FTS. Obat bebas terbatas

10. **ACTIGEN** **Alltech Inc-USA; Alltech do Brasil-Brazil/
Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung brewers dried yeast dan fermentasi soluble *Saccharomyces cerevisiae* yang dikeringkan **Indikasi** Feed supplement yang diperlukan untuk memelihara pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi pakan dan menjaga kesehatan pencernaan hewan ternak, unggas dan hewan kesayangan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,4-2

kg/ton pakan hewan ternak, unggas dan hewan kesayangan **Kemasan** Sak 25 kg **Kementan RI** No. I. 10123957 FTS. Obat bebas terbatas

- 11. ACTISAF SC47** **LFA Lesaffre, Perancis/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *saccharomyces cerevisiae* strain SC 47
Indikasi Feed additive pada babi, dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di dalam pakan. Sapi perah: 0,04-0,2 kg/ton pakan. Sapi potong: 0,4-0,8 kg/ton pakan. Babi betina: 0,5-1 kg/ton pakan. Anak babi hingga berumur 4 bulan: 0,5-1 kg/ton pakan. Babi potong: 0,125-1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg/bag **Kementan RI** No. I. 11104173 FTS. Obat bebas terbatas
- 12. ACTIVATE DA** **Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung methionine hydroxy analogue-Ca, fumaric acid dan benzoic acid **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Kementan RI** No. I. 12114387 FTS.
- 13. ADSORBATE DRY** **Nutri-Ad International bvba, Belgia/Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung hydrate magnesium silicate dengan kandungan sepiolitte dan monthmorillomite **Indikasi** Toxin *binder* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan: 2-50 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03122707 FTS. Obat bebas terbatas
- 14. ALBAC 10% P** **Alpharma Animal Health (Shenzhou) Co. Ltd., China/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc bacitracin **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12074306 FTS Obat bebas terbatas
- 15. ALBAC** **Alpharma Animal Health (Shenzhou) Co.Ltd., China/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung zinc bacitracin 15% **Indikasi** Memperbaiki feed efficiency (efisiensi makanan). Memperbaiki pertumbuhan berat badan ayam dan produksi telur. Memperbaiki egg hatchability. Sebagai kontrol terhadap heat stress, dan necrotic enteritis yang disebabkan oleh clostridium perfringens **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 4-50 ppm/ton pakan. 50 ppm (pencegah necrotic enteritis). Layer, breeder: 15-100 ppm/ton makanan. Babi: 50 ppm/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0404263 FTS. Obat bebas terbatas
- 16. ALL-LAC 100 X** **Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung produk fermentasi kering *Lactobacillus acidophilus*, produk fermentasi kering *Enterococcus faecium*, dekstrosa dan sodium aluminosilicate **Indikasi** Imbuhan pakan untuk mencegah diare pada hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dengan BB 150-200 kg dan anak sapi/menyusu: 20 ml. Biri-

biri/kambing (muda/dewasa): 10-15 ml. Anak babi/menyusui: 2-5 ml. Babi dengan BB 20 kg: 10 ml. Ayam/kalkun: tambahkan pada air minum 25 g/1.000 ekor. Kuda muda: 15 ml. Kuda dewasa: 20 ml **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033596 FTS. Obat bebas terbatas

17. ALLPLEX B **Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate, manganese proteinate, selenium yeast, copper proteinate, chromium yeast dan ethylenediamine dihydriodide (EDDI) **Indikasi** Premiks mikro-mineral khusus yang diformulasikan untuk pakan broiler dan breeder **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 700 g/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 04012711 OHK. Obat bebas terbatas

18. ALLPLEX LS **Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron proteinate, zinc proteinate, selenium yeast dan chromium yeast **Indikasi** Premiks mikromineral khusus diformulasikan untuk pakan babi betina yang sedang menyusui **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 1,2 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033598 FTS. Obat bebas terbatas

19. ALLPLEX S **Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate, iron proteinate, manganese proteinate, selenium yeast dan chromium yeast **Indikasi** Feed additive pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 1 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063628 FTS. Obat bebas terbatas

20. ALLPLEX W **Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast dan chromium yeast **Indikasi** Premik mikromineral khusus diformulasikan untuk pakan babi creep dan starter **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 1 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033597 FTS. Obat bebas terbatas

21. ALLZYME FD™ **Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim protease **Indikasi** Merupakan product yang terbuat dari enzim yang digunakan untuk mempercepat proses pengolahan bulu ayam dalam pembuatan pakan bulu ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan sebanyak 0,5 kg/ton bahan baku bulu ayam **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 06083100 FTS. Obat bebas terbatas

22. ALLZYME PS **Alltech China/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kalsium karbonat, kalsium sulfat, silikon dioksida, brewers dried yeast, ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger*, ekstrak fermentasi kering *Trichoderma longibrachiatum*, ekstrak fermentasi kering *Bacillus subtilis* dan ekstrak fermentasi kering *Aspergillus oryzae* **Indikasi** Suplemen enzim yang digunakan pada pakan unggas dan babi yang mengandung jagung, kedelai atau protein nabati **Dosis dan**

Cara Pemakaian Tambahkan pada pakan jadi sebanyak 1 kg/ton **Kemasan** Kantung 25 kg
Kementan RI No. I. 11013979 FTS. Obat bebas terbatas

23. ALLZYME PT CONCENTRATE WS

**Alltech Inc-USA/
Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ekstrak fermentasi *Trichoderma longibrachiatum* yang dikeringkan **Indikasi** Sebagai sumber enzim xylanase yang digunakan pada pakan hewan ternak dan unggas yang mengandung gandum atau rye **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 2,7 g/ton pakan post pelleting **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09013545 FTS. Obat bebas terbatas

24. ALLZYME SSF E

Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kalsium karbonat dan ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger* **Indikasi** Kompleks multi-enzim untuk digunakan dalam pakan unggas dan babi yang berfungsi meningkatkan pencernaan fosfor yang diikat oleh phytate, pelepasan energi dan pencernaan protein **Dosis dan Cara Pemakaian** 150 g/ton pakan layer atau 200 g/ton pakan broiler dan babi semua umur. 200 g/ton pakan udang dan ikan. Penggunaannya dicampurkan kedalam pakan secara on top atau diformulasikan ke dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12124408 FTS. Obat bebas terbatas

25. ALLZYME SSF™ LIQUID 500 ML

**Alltech Inc-USA; Alltech
Biotechnology Corp. Ltd-Thailand/
Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung air, glycerine, sodium chloride, ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger* dan potassium sorbate **Indikasi** Kompleks multi enzim yang digunakan untuk meningkatkan pencernaan phosphor yang diikat oleh phytat, yang digunakan untuk pakan unggas, kalkun dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 ml/ton pakan babi atau unggas **Kemasan** 1 L, 5 L, 20 L, Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 11044072 FTC. Obat bebas terbatas

26. ALLZYME SSF™ LIQUID

**Alltech Inc-USA; Alltech Biotechnology Corp.
Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung air, glycerine, sodium chloride, ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger* dan potassium sorbate **Indikasi** Kompleks multi enzim yang digunakan untuk meningkatkan pencernaan phosphor yang diikat oleh phytat, yang digunakan untuk pakan unggas, kalkun dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 ml/ton pakan babi atau unggas **Kemasan** 1 L, 5 L, 20 L, Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 10123959 FTC. Obat bebas terbatas

27. ALLZYME SSF™

Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung komplek enzim alami yang berasal dari jamur strain *Aspergillus niger* yang dibuat melalui proses solid state fermentation **Indikasi**

Meningkatkan kecernaan raw material dan mengoptimalkan penggunaan nutrisi **Dosis dan Cara Pemakaian** 150 g/ton pakan layer atau 200 g/ton pakan broiler dan babi semua umur. 200 g/ton pakan udang dan ikan. Penggunaannya dicampurkan kedalam pakan secara on top atau diformulasikan ke dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07073255 FTS. Obat bebas terbatas

28. ALLZYME VEGPRO CONCENTRATE

Alltech Inc-USA/

Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger*, *Trichoderma longibrachiatum*, *Bacillus subtilis*, garam dan potasium sorbate **Indikasi** Suplemen enzim untuk membantu proses pencernaan protein nabati pada pakan hewan ternak, unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan sebanyak 25 kg/ton carrier yang cocok **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09083680 FTS. Obat bebas terbatas

29. ALLZYME VEGPRO LIQUID™

Alltech Inc-USA/

Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan/liquid **Komposisi** Mengandung enzim protease dan selulase **Indikasi** Membantu proses pencernaan pakan protein nabati seperti bungkil kedelai pada hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 1 L dalam setiap ton pakan ternak atau unggas. Tambahkan ke dalam pakan melalui aplikasi post pelleting **Kemasan** Drum 200 kg **Deptan RI** No. I. 06083098 FTC. Obat bebas terbatas

30. ALLZYME VEGPRO™

Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim protease dan selulase **Indikasi** Membantu proses pencernaan pakan protein nabati seperti bungkil kedelai pada hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 500-1.000 g/ton pakan ternak atau unggas **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 06083099 FTS. Obat bebas terbatas

31. ALPHAMUNE G

Alpharma Inc, Belgia/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *saccharomyces cerevisiae* **Indikasi** Sebagai feed additive pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian melalui pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 11084134 FTS. Obat bebas terbatas

32. AMILYTE

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, biotin, nicotinic acid, pantothenic acid, folic acid, lysine HCl, methionine, Mg, K dan Na **Indikasi** Suplemen vitamin, asam amino dan elektrolit pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air, peningkatan produksi telur 1 g/4 L air **Kemasan** Sachet 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 02082112 FTS. 1. Obat bebas terbatas

33. ANASOL

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2,

vit B6, vit B12, vit K3, biotin, nicotinic acid, pantothenic acid, folic acid, Mg, K, Na dan Cl
Indikasi Suplemen vitamin, dan elektrolit pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian**
Pemberian secara kontinyu pada unggas: 1 g/2 L air minum. Babi: 1 g/3 L air minum. Pemberian
intensif pada unggas: 1 g/L air minum. Babi 1 g/1,5 L air minum. Dapat diberikan pada DOC
dan setelah vaksinasi **Kemasan** Sachet 100 g dan 500 g **Deptan RI** No. I. 06012008 FTS.1.
Obat bebas terbatas

34. ANAVITE *POULTRY BREEDER* **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/**
MINERALS **Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Fe, Zn, I, Co, Mg dan Se **Indikasi** Tambahan
pakan untuk defisiensi mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,8-1 kg/MT pakan
unggas **Kemasan** Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063639 FTS. Obat bebas terbatas
35. ANAVITE *POULTRY BREEDER* **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/**
VITAMINS **Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B2, vit K3,
nicotinic acid, calcium panthothenate, folic acid, vit B1, vit B6, biotin dan vit B12 **Indikasi**
Tambahan pakan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,8-1 kg/MT pakan unggas
Kemasan Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 07033190 FTS. Obat bebas terbatas
36. ANAVITE *POULTRY CHICK/* **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/**
BROILER MINERALS **Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Fe, Zn, I, Co, Mg dan Se **Indikasi** Tambahan
pakan untuk defisiensi mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,8-1 kg/MT pakan
unggas **Kemasan** Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103312 FTS. Obat bebas terbatas
37. ANAVITE *POULTRY CHICK/* **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/**
BROILER VITAMINS **Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit
B6, vit B12, nicotinic acid, panthothenic acid, folic acid, vit B1, vit B6, biotin dan vit B12
Indikasi Tambahan pakan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,8-1 kg/MT pakan
unggas **Kemasan** Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 07033191 FTS. Obat bebas terbatas
38. ANAVITE *POULTRY LAYER* **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/**
MINERALS **Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Fe, Zn, I, Co, Mg dan Se **Indikasi**
Tambahan pakan untuk defisiensi mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,8-1
kg/MT pakan unggas **Kemasan** Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 07093282 FTS.
Obat bebas terbatas

39. ANAVITE POULTRY LAYER VITAMINS **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/
Zagro Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B2, vit K3, nicotinic acid, calcium panthothenate, folic acid, vit B1, vit B6, biotin dan vit B12 **Indikasi** Tambahan pakan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,8–1 kg/MT pakan unggas **Kemasan** Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103311 FTS. Obat bebas terbatas

40. ANER C **Beijing Enhakor International Tech. Co., Ltd/Fenanza Putera**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung L-ascorbic acid-2-phosphate 500 g setara dengan asam askorbat 350 g, calcium hydroxide 57 g, calcium chloride 101 g dan sodium trimetaphosphate 339 g **Indikasi** Untuk menurunkan stress dan meningkatkan kekebalan tubuh (imunitas) pada unggas dan hewan ternak lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan. Udang/kepiting: 600-1.500 g/ton pakan. Ikan laut: 500-1.000 g/ton pakan. Ikan air tawar: 200-800 g/ton pakan. Kura-kura: 500-900: g/ton pakan. Babi: 150-600 g/ton pakan. Unggas: 200-700 g/ton pakan **Kemasan** Sachet 1 kg dan bag 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12074307 FTS.

41. ANILOX P – 10 **Norel SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung ethoxyquin 36 g, BHT 31 g, BHA 5 g, PGA 5 g, citric acid (monohydrate) 20 g dan orthosiphoric acid 5 g **Indikasi** Antioksidan untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur dengan pakan atau bahan baku pakan dengan dosis 100-500 g/ton pakan. Campur dengan premiks vitamin dan suplemen dengan dosis 2.500 g/ton pakan **Kemasan** Sak @ 25 kg **Deptan RI** No. 03072132 PTS. 1. Obat bebas terbatas

42. ANILOX P – 20 **Norel SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung ethoxyquin 64 g, BHT 60 g, BHA 6 g, PGA 6 g, citric acid (monohydrate) 36 g dan orthosiphoric acid 10 g **Indikasi** Antioksidan untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur dengan pakan secara merata dengan dosis 0,2 kg/ton pakan **Kemasan** Sak @ 25 kg **Kementan RI** No. 11084122 FTS. Obat bebas terbatas

43. AOXTEC 101 **Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung BHA, etoksikuin dan EDTA **Indikasi** Antioksidan pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantong HDPE 25 kg **Deptan RI** No. I. 08053434 FTS. Obat bebas terbatas

44. AOXTEC 111 **Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung BHA, BHT dan ethoxyquin **Indikasi** Antioksidan pada pakan ternak **Kemasan** Drum 200 kg **Deptan RI** No. I. 08083469 FTC. Obat bebas terbatas

45. **APENTENZYMA 66** **Norel SA, Spanyol/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung sodium saccharin **Indikasi** Feed additive pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 11044060 FTS. Obat bebas terbatas
46. **ARSOMIX** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung 5% 3-nitro 4-hydroxyphenylarsenic acid **Indikasi** Peningkatan efisiensi makanan, peningkatan warna kuning telur, peningkatan kualitas daging, perangsang pertumbuhan, peningkatan produksi telur serta peningkatan daya tahan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 500-1.000 g/ton makanan. Babi: 500-750 g/ton makanan **Kemasan** Dos 25 kg @ 5 kg **Deptan RI** No. D. 0604170 FTS. 2. Obat bebas terbatas
47. **AVATEC 20%** **Alpharma Inc, USA/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung lasalocid sodium **Indikasi** Pencegahan coccidiosis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 375-625 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 08083477 FTS. Obat bebas terbatas
48. **AVIAX 5%** **Phibro AH, Amerika Serikat/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung semduramisin 50 g **Indikasi** Sebagai feed additive pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg/zak **Kementan RI** No. I. 12061842 FTS. 2. Obat bebas terbatas
49. **AVILAC C** **Nutrifeed BV, Netherland/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung glyceryl polyethyleneglycol ricinoleate (E484) **Indikasi** Emulsifier pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,01% **Kemasan** Paper bags 25 kg/zak **Deptan RI** No. I. 09033567 FTS. Obat bebas terbatas
50. **AVILAC E CONCENTRATED** **Nutrifeed BV, Netherlands/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung gliseril polietilen risinoleat (E484) **Indikasi** Emulsifier pada pakan ternak **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 08123534 FTS. Obat bebas terbatas
51. **AVIPROB** **Diasham-Singapura/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung lactobacillus acidophilus, bifidobacterium termophilus, bifidobacterium longum, streptococcus faecium **Indikasi** Mencegah stress, penyakit pencernaan dan meningkatkan pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur air minum dengan dosis 50 g/10.000 ekor. Ayam berumur 1 hari: 4 mg, dan dosis 50 g/5.000 ekor untuk ayam diatas 4 minggu **Kemasan** Aluminium foil 50 g **Deptan RI** No. I. 03122685 FTS. Obat bebas terbatas

- 52. AVIZYME 1502** **Finnfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung endo-1,4-beta-xylanase, proteinase dan alfa amylase **Indikasi** Feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Paper zak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063633 FTS. TM Obat bebas terbatas
- 53. AVIZYME 1505** **Finfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd., Finlandia/Megasetia Agung Kimia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung xylanase, amylase dan protease **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094355 FTS. Obat bebas terbatas
- 54. AZOMITE** **Peak Minerals-Azomite Inc., USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung azomite (hydrated sodium calcium alumina silicate) **Indikasi** Sebagai bahan anticaking dan pellet *binder* dalam pakan ternak dan aquaculture **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 500 g-2 kg/ton pakan **Kemasan Kantung** 20 kg **Deptan RI** No. I. 04022722 FTS. Obat bebas terbatas
- 55. BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE 10%** **Pucheng Lifechome Biochemistry, China/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung basitrasin **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan Kantung** 25 kg **Deptan RI** No. I. 08083473 FTS. Obat bebas terbatas
- 56. BACTOCELL** **Lallemand SAS France/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung freeze dried *Pediococcus acidilactici* **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi atau unggas 0,1 kg/ton pakan **Kemasan Box** 20 kg **Kementan RI** No. I. 13074581 FTS. Obat bebas terbatas
- 57. BAMBER 20** **Meriden Animal Health Ltd, Inggris/Swadesi Candrasentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung 20 g bambermycin (favo-phospolipol) **Indikasi** Untuk memperbaiki pertumbuhan dan efisiensi feed konversi pada unggas, babi, dan sapi **KontraIndikasi** Jangan dicampur dengan pakan yang mengandung antibiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan oral dalam makanan **Kemasan Kantung** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06042308 PTS. 1. Obat bebas terbatas
- 58. BAMBERCIN – 20** **Zhejiang University Sunny Nutrition Tech Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung bambermycin 2% **Indikasi** Sebagai

antikoksidia untuk ternak unggas, babi, sapi, kelinci, dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 200-500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04092805 FTS. Obat bebas terbatas

59. **BAMBERCIN – 40** **Jiangsu Sel Biochem Co, Ltd., China/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bambermycin 4% **Indikasi** Sebagai antikoksidia untuk ternak unggas, babi, sapi, kelinci, dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 100-200 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04092806 FTS. Obat bebas terbatas
60. **BAMBERCIN – 80** **Zhejiang University Sunny Nutrition Tech Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bambermycin 8% **Indikasi** Sebagai antikoksidia untuk ternak unggas, babi, sapi, kelinci, dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 50-100 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04092807 FTS. Obat bebas terbatas
61. **BANOX™E** **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung BHT, BHA, propyl gallate, citric acid dan ethoxyquin **Indikasi** Merupakan antioksidan yang diformulasikan khusus untuk pakan hewan ternak dan akuakultur **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan ternak dan akuakultur: 75–125 g/ton pakan yang mengandung 5-7% fat. 1,25 kg/ton produk yang mengandung 100% lemak atau minyak. Penggunaannya dicampurkan ke dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 06123157 FTS. Obat bebas terbatas
62. **BAROX** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Larutan **Komposisi** Mengandung BHT, BHA dan ethoxyquin **Dosis dan Cara Pemakaian** 250-500 g/ton pakan ditambahkan dalam lemak (fat) atau minyak **Kemasan** Drum 190 kg **Deptan RI** No. I. 05071338 FTC. 1. Obat bebas terbatas
63. **BERGAFAT** **Berg & Schmidt/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung palm fat fraction dan soy lecithin **Indikasi** Feed suplemen pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur pada pakan aduk hingga merata. Dosis pada unggas layer: 1-3 % pakan, pada broiler: 3-6% pakan. Itik: 3-5% pakan. Pada Babi induk: 3-5% pakan, anak babi: 2-4% pakan. Untuk penggemukan: 1-3% pakan **Kemasan** Dos 25 kg **Deptan RI** No. I. 08123535 FTS. Obat bebas terbatas
64. **BERGAPRIME** **Berg & Schmidt/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung soy lecithin, medium chain fatty acid dan casein **Indikasi** Feed suplemen pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur pada pakan, aduk hingga merata. Dosis pada unggas: 500-1.000 g/ton pakan. Pada babi: 500-1.000 g/ton pakan **Kemasan** Dos 15 kg **Deptan RI** No. I. 08123536 FTS. Obat bebas terbatas

- 65. BEDGEN 40 PREMIKS** **Bedson S.A. Argentina/Pakan Serasi**
Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung ekstrak chinara, choline chloride dan antitoksin hepatic factor **Indikasi** Intoksikasi, fatty liver syndrome, toxic infections, mikotoksikosis dan sebagai hepatomodulator **Dosis dan Cara Pemakaian** 100-500 g/ton pakan **Kemasan** 5 kg/ember **Deptan RI** No. I. 03022525 FTS. Obat bebas terbatas
- 66. BERGAZYM P** **Berg & Schmidt/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim endo 1,4-B-xylanase **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan ke dalam pakan unggas **Kemasan** Kantung @ 20 kg **Deptan RI** No. I. 11124197 FTS.
- 67. BETAINE HYDROCHLORIDE** **Beijing Enhalar International
Tech. Co., Ltd/Fenanza Putera**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung betaine hydrochloride 985 g setara dengan betaine 740 g, residu on ignition 10 g dan moisture 5 g **Indikasi** Untuk menurunkan stress dan menghemat penggunaan methionine serta mengurangi cost. Mengefektifkan penggunaan coccidiostat sebagai carcass modifier (menurunkan lemak dna meningkatkan berat daging). Bertindak sebagai attractant pada ikan dan sejenisnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan. Layer 500-1.000 g/ton pakan. Ayam broiler: 200-800 g/ton pakan. Anak babi: 200-1.000 g/ton pakan. Babi finisher: 300-800 g/ton pakan. Pedet 500-1.500 g/ton pakan. Ikan dan udang: 500-2.000 g/ton pakan **Kemasan** Sachet 1 kg dan bag 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg **Kementan RI** No. I. 12074313 FTS.
- 68. BETAPRO 1000** **Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Bacillus subtilis dan betain **Indikasi** Sebagai feed additive pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan dengan dosis 1 kg/ton pakan unggas **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 12114385 FTS. Obat bebas terbatas
- 69. BETAPRO 300** **Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Bacillus subtilis dan betain **Indikasi** Sebagai feed additive pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan unggas 200-300 g/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094344 FTS. Obat bebas terbatas
- 70. BG – MAX** **Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *crude protein* 17,5%, *crude fat* 1% dan *crude fiber* 9% **Indikasi** Untuk meningkatkan kekebalan usus, mengikat mycotoksin dan melindungi kesehatan usus **Dosis dan Cara Pemakaian** *Beef cattle* dan *Dairy*: 1-2 kg/ton. *Poultry, swine* dan aquaculture: 0,5-1 kg/ton dan dicampur kedalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044069 FTS.

71. BIO ADD SOLID

**Kemira ChemSolution b.v.,
The Netherlands/Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung formic acid dan propionic acid **Indikasi** Sebagai anti jamur dan mengontrol bakteri g negatif dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 1-10 kg/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05123026 FTS. Obat bebas terbatas

72. BIO – CHICKS

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Sebuk **Komposisi** Mengandung virginiamycin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B2, vit B12, nicotinamide, Ca-d-pantothenate dan folic acid **Indikasi** Multivit dan antibiotika untuk mempercepat pertumbuhan badan **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 1g/2 L air minum diberikan selama 5-7 hari. Babi pre starter: 1,5 kg/ton pakan, starter: 0,5 kg/ton pakan dan diberikan selama 5-7 hari **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 0102949 FTS. 1. Obat bebas terbatas

73. BIO – CHROME 5000

Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung chromium dan brewers dried yeast **Indikasi** Sumber kromium organik untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan pada pakan ternak dan unggas sebanyak 40-80 g/ton **Kemasan** Sak 25 kg **Kementan RI** No. I. 12054278 FTS. Obat bebas terbatas

74. BIO – CHROME

Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung chromium dan brewers dried yeast **Indikasi** Sumber chromium organic pada pakan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 200-400 g/ton pakan babi dan unggas **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033599 FTS. Obat bebas terbatas

75. BIOLYSE

Laboratorium Biove, Perancis/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung silicum oxide **Indikasi** Menurunkan bau ammonia dan mengeringkan litter serta meningkatkan persentase oksigen pada air **Kemasan** Boks plastic 1 kg **Deptan RI** No. I. 08063446 PTS. Obat bebas terbatas

76. BIOMIN CLEANFEED

Biomin Holding, GmbH. Austria/Biomin Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam format dan asam propionat **Indikasi** Sebagai *feed additive* (dekontaminasi dan preservasi) pada pakan unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk preservasi: 1-2 kg dicampur per ton pakan. Untuk dekontaminasi: 2-3 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 13094600 FTS Obat bebas terbatas

77. BIOMIN CLEANGRAIN FORTE LIQUID

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung propionic acid dan sodium benzoat **Indikasi** Memelihara bahan baku pakan dan pakan jadi pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian**

Lihat pada **Kemasan Kemasan** Jerigen 25 L, 28 kg, 240 kg, dan 1.100 kg **Deptan RI** No. D. 07123361 FTC. Obat bebas terbatas

- 78. BIOMIN CLEANGRAIN** **Biomin, Austria/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung propionic acid dan formic acid **Indikasi** Pencegah pertumbuhan jamur pada bahan baku pakan dan pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantong kertas ukuran 25 kg **Deptan RI** No. I. 08083485 FTC. Obat bebas terbatas
- 79. BIOMIN PEP 1000** **Biomin/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung fructooligosaccharide dan essential oil **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan ke dalam pakan unggas **Kemasan** Kantung @ 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 11114174 FTS.
- 80. BIOMIN PEP 125 POULTRY** **Biomin/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung fructooligosaccharide dan essential oil **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan ke dalam pakan unggas **Kemasan** Kantung @ 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 11114175 FTS.
- 81. BIOMIN PHYTASE 5000** **Biomin, Singapore/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung phytase **Indikasi** Imbuhan pakan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat **Kemasan Kemasan** Karton 25 kg **Deptan RI** No. I. 09053621 FKC. Obat keras
- 82. BIOMIN** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung colistin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B2, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate dan nicotinamide **Indikasi** Pemacu pertumbuhan badan dan meningkatkan produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum diberikan selama 5-7 hari **Kemasan** 10 g, 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 01072055 FTS. 1. Obat bebas terbatas
- 83. BIO – MOS** **Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung brewer's dried yeast dan saccharomices cerevisiae fermentation solubles **Indikasi** Suplemen pakan untuk hewan ternak, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g–4 kg/ton pakan. Campurkan ke dalam pakan secara on top atau diformulasikan ke dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04062761 FTS. Obat bebas terbatas
- 84. BIONTRONIC TOP3** **Biomin Singapore Pte. Ltd/Biomin Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung formic acid, ammonium formate, propionic acid, acetic acid, vermiculite dan silicic acid **Indikasi** Sebagai feed additive (acidifier) pada

pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg dicampur/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 13034495 FTS. Obat bebas terbatas

85. BIO – OX

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk kering **Komposisi** Tiap kg mengandung ethoxyquin, BHA dan BHT
Indikasi Memperbaiki kualitas dan meningkatkan daya tahan bahan baku/pakan ternak. Mencegah terjadinya ketengikan, penurunan energi serta kerusakan pigmen. Melindungi palatabilitas dan kesegaran bahan baku/pakan ternak serta melindungi mutu feed supplement
Dosis dan Cara Pemakaian Pakan ternak: 125 g/ton. Bahan baku: 250 g/ton **Kemasan** Zak 25 Kg **Deptan RI** No. D. 06023045 FTS. Obat bebas terbatas

86. BIOPLEX C

Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate, iron proteinate, selenium yeast, manganese proteinate, copper proteinate, chromium yeast dan ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) **Indikasi** Premiks mikro mineral untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi betina, induk babi, babi jantan, anak babi dan babi: dalam masa sapih 1,2 kg/ton. Babi growing-finishing (berat badan >25 kg): 1,0 kg/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044050 FTS. Obat bebas terbatas

87. BIOPLEX HIGH FIVE

Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate, selenium yeast, manganese proteinate, cooper proteinate dan cobalt protinate **Indikasi** Merupakan kombinasi trace mineral organic untuk meningkatkan produksi pada sapi potong dan sapi perah **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 5 g/ekor/hari **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073649 FTS. Obat bebas terbatas

88. BIOPLEX MQP

Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung magnesium proteinate, ekstrak yeast, selenium yeast, brewers dried yeast, tepung algae kering, asam askorbat (Vitamin C) dan ekstrak fermentasi kering *Aspergillus niger* **Indikasi** Premiks suplemen pakan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas daging babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 10 kg/ton dalam pakan babi dan waktu henti obat 3-5 hari sebelum pemotongan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11054088 FTS. Obat bebas terbatas

89. BIOPLEX POULTRY PAK

Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate, manganese proteinate, selenium yeast, brewers dried yeast, iron proteinate, copper proteinate, chromium yeast dan ethylenediamine dihydriodide (EDDI) **Indikasi** Kombinasi trace mineral organic untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Breeders: 1 kg/ton. Broilers: 500-750 g/ton. Layers: 500-750 g/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 10123958 FTS. Obat bebas terbatas

- 90. BIOSOL** **Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Enterococcus faecium **Indikasi** Feed additive pada unggas, untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme menguntungkan di dalam saluran pencernaan pada anak ayam umur 1-3 hari. Meningkatkan kekebalan tubuh unggas terhadap penyakit dan mengurangi kematian dan mengoptimalkan pertumbuhan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 600 g/1.000 L air minum. Hatchery: 100 g/hari/10.000 anak ayam. Diberikan pada ayam umur 1-3 hari secara berturut-turut **Kemasan** Kantung @ 1 kg **Kementan RI** No. I. 11013994 FTS. Obat bebas terbatas

- 91. BIOTECTOR** **Cheil Jedang Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung bacteriophage min 1×10^8 pfu/g **Indikasi** Feed additive pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada layer: 0,5-1 kg/ton pakan. Pada broiler: 0,5-1 kg/ton pakan. Pada breeder: 1 kg/ton pakan **Kemasan** Kraft paper @ 20 kg **Kementan RI** No. I. 11064102 FTS.

- 92. BIOTIN 2% FEED GRADE** **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/
Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung biotin (vitamin H2) **Indikasi** Antidefisiensi vitamin H-2 (biotin pada ternak) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam premiks atau pakan ternak **Kemasan** Sachet 1 kg dan kantong kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 08043403 FTS. Obat bebas terbatas

- 93. BIOTOX** **Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung calcium silicate, sodium aluminosilicate dan silicic acid **Indikasi** Sebagai toxin binder dalam pakan hewan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan dengan dosis untuk kontaminasi rendah 0,5-1 kg/ton pakan. Kontaminasi sedang 1-2 kg/ton pakan. Kontaminasi tinggi 2-3 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 13014428 FTS. Obat bebas terbatas

- 94. BIOTRONIC SE** **Biomim/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung formic acid dan propionic acid **Indikasi** Anti jamur pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan unggas dan babi **Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05072957 FTS. Obat bebas terbatas

- 95. BIOTRONIC TOP3** **Biomim Singapore Pte. Ltd/Biomim Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung formic acid, ammonium formate, propionic acid, acetic acid, vermiculite dan silicic acid **Indikasi** Sebagai feed additive (acidifier) pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg dicampur/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 13034495 FTS. Obat bebas terbatas

- 96. BIOTRONIC SE FORTE LIQUID** **Biomin/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung formic acid, propionic acid dan lactic acid
Indikasi Anti jamur pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan unggas dan babi **Kemasan** Container 25 L, 200 L dan 1.000 L **Deptan RI** No. I. 05072958 FTS. Obat bebas terbatas
- 97. BMD** **Alpha, Inc, USA/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung bacitracin methylene disalicylate 10%
Indikasi Memperbaiki feed efficiency (efisiensi makanan). Memperbaiki pertumbuhan berat badan ayam dan produksi telur. Memperbaiki egg hatchability. Sebagai kontrol terhadap necrotic enteritis yang disebabkan oleh clostridium perfringens **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 4-50 ppm/ton pakan, 50 ppm (pencegah necrotic enteritis). Layer: 10-25 ppm/ton makanan **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 05061591 BOH. 2. Obat keras
- 98. BOSPRO** **Pet Ag Inc., USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tepung aspergillus yang terdiri dari protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan abu, serta mineral dan asam amino **Indikasi** Sebagai feed additive untuk ternak sapi dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan. Sapi perah dengan dosis 30 g/ekor/hari atau 4-5 kg/ton konsentrat, dan domba atau kambing dengan dosis 15 g/ekor/hari **Kemasan** Kantong 1 kg, 10 kg, dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 04052753 FTS. Obat bebas terbatas
- 99. BREDOL** **Diasham Resources Pte, Ltd, Singapura/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung glyceryl polyethyleneglycol ricinoleate
Indikasi Emulsifier pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 ppm **Kemasan** Drum HDPE 1 L, 5 L, 200 L dan 1.000 L **Deptan RI** No. I. 09043602 FTC. Obat bebas terbatas
- 100. CALIBRIN A** **Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/Agri Trading Investment**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung 100% calcium montmorillonite clay (sejenis tanah liat) **Indikasi** Mengikat aflatoxin dan molekul mikotoksin polar lainnya (Fumonisin, Ochratoxin, Ergotamine, Citrinin, DON) pada saluran pencernaan dengan cara menurunkan bioavailabilitas toksin **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 Kg **Deptan RI** No. I. 10073849 FTS. Obat bebas terbatas
- 101. CALIBRIN Z** **Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/Agri Trading Investment**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap Kg mengandung 100% calcium montmorillonite clay (sejenis tanah liat) **Indikasi** Mengikat zearalenone dan multi molekul mikotoksin polar dan non polar lainnya (Aflatoxin, Fumonisin, DON, Ochratoxin, Ergotamine, Citrinin, T-2 toxin) pada saluran pencernaan dengan cara menurunkan bioavailabilitas toksin **Dosis dan**

Cara Pemakaian 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 Kg **Deptan RI** No. I. 10073849
FTS. Obat bebas terbatas

102. CALPRONA MD

**Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung propionic acid, citric acid dan calcium
Indikasi Antifungi pada pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian**
Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 1-15 kg/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan**
Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 06083101 FTM. Obat bebas terbatas

103. CALPRONA P4

Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung formic acid, acetic acid, phosphoric acid,
lactic acid dan citric acid **Indikasi** Sebagai acidifier (penurun pH) dan antibacterial dalam
pakan babi atau anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan
dosis 3-20 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07093302 PTS. Obat
bebas terbatas

104. CANTHACOL

Novus Carotenoid S.A./Novus Indonesia

Bentuk Serbuk **Komposisi** Mengandung canthaxantin, ethoxyquin dan ascorbyl palmitate
Indikasi Untuk pigmentasi pada warna kuning telur dan kulit ayam broiler **Dosis dan Cara**
Pemakaian Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Alufoil 1 kg, bag 5 kg dan 25
kg **Deptan RI** No. I. 09073657 FTS.

105. CAPRI – EGG

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bacitracin MD, vit A, vit D3, vit E, vit
K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, Ca-d-panthothenate, nicotinic acid, folic acid **Indikasi**
Meningkatkan produksi telur. Mencegah menurunnya produksi telur pada keadaan sakit/
stress, pindah kandang dan perubahan iklim. Memperbaiki mutu pakan dan meningkatkan
efisiensi penggunaan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2,2-10 L air minum atau 1
g/1,1-5 kg pakan **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 07113353 PTS.
Obat bebas terbatas

106. CAPSANTAL EBS 30 NT

**Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/
Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung marigold oleoresin 35%,
ethoxyquin 3%, silicic acid 40% dan calcium carbonat 22% **Indikasi** Untuk pigmentasi
pada broiler dan kuning telur (layer) **Dosis dan Cara Pemakaian** 200-2650 g/ton pakan,
tambahkan ke dalam pakan dan campur secara merata **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI**
No. I. 07043201 FTS. Obat bebas terbatas

107. CAPSANTAL EBS 40 NT

**Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/
Agrinusa Jaya Santosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung marigold oleoresin 45%, ethoxyquin 3%, silicic acid 50% dan calcium carbonat 2% **Indikasi** Untuk pigmentasi pada broiler dan kuning telur (layer) **Dosis dan Cara Pemakaian** 100-2.000 g/ton pakan, tambahkan ke dalam pakan dan campur secara merata **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07043202 FTS. Obat bebas terbatas

108. CAPSOQUIN N

Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ethoxyquin 66,6% dan vermiculite 33,4% **Indikasi** Antioksidan untuk bahan baku dan pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 190-1.500 g/ton pakan tambahkan ke dalam pakan dan campur secara merata **Kemasan** Drum 25 kg, 200 kg dan kontainer 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 07043200 FTS. Obat bebas terbatas

109. CHEIL BIO MYCOSTATIN 50 WS

Cheil Bio, Korea/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung nistatin **Indikasi** Sebagai toksin *binder* pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 1 kg, 5 kg, 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I. 13014429 FTS. Obat bebas terbatas

110. CHEIL COLISTIN 100

Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung colistin sulfate 100 g/kg **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan sebanyak 20-200 g dengan 1 ton pakan **Kemasan** Sak 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12054275 FTS. Obat bebas terbatas

111. CHEIL TYLOSIN 220

Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung colistin sulfate 220 g/kg **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk dicampurkan pada pakan ayam: 0,02-0,23 kg/ton pakan. Untuk dicampurkan pada pakan babi: 100-500 g/ton pakan. Untuk dicampurkan dengan pakan sapi: 40-50 g/ton pakan **Kemasan** Sak 10 kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12114379 FTS. Obat bebas terbatas

112. CLINACOX

Elanco Animal Health, Belgia/Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung diclazuril 0,5% **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur pakan 200 g/ton pakan (1 ppm) **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 03051360 FTS. 2. Obat bebas terbatas

113. CLOSTAT HC DRY

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/

Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bacillus subtilis, kalsium karbonat, silika

dan sodium propionat **Indikasi** Meningkatkan kesehatan usus halus, menghambat pertumbuhan bakteri clostridium perfringens serta membantu pemeliharaan kesehatan dan produktivitas unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 250 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 13044524 FTS. Obat bebas terbatas

114. CLOSTAT™ 11 DRY

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/

Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bacillus subtilis, kalsium karbonat, silika dan sodium propionat **Indikasi** Meningkatkan kesehatan usus halus, menghambat pertumbuhan bakteri clostridium perfringens serta membantu pemeliharaan kesehatan dan produktivitas unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 kg/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044049 FTS. Obat bebas terbatas

115. COLIMAX 100 PREMIX

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung colistin sulfat 100 g/kg **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Campuran sebanyak 20-200 g dengan 1 ton pakan **Kemasan** Sak 10kg, 20 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12074308 PKS. Obat keras

116. COLIMPEX 8%

Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung colistin sulphate **Indikasi** Pemacu pertumbuhan pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 62,5-125 g/ton pakan (5-10 ppm). Babi: 125-250 g/ton pakan (10-20 ppm) **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 12044258 FTS. Obat bebas terbatas

117. COLISTAMIN

Caprifarmindo Labs.

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung colistin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B2, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, nicotinic acid **Indikasi** Meningkatkan produksi telur. Memacu pertumbuhan. Memperbaiki konversi pakan. Meningkatkan daya tahan tubuh. Mencegah defisiensi vitamin dan mengatasi stress. Kontrol infectious enteritis dan menekan amonia dalam feses **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g/2 L air minum atau 1 g/1 kg pakan ayam. Berikan selama 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 15 kg dan 50 kg **Depkan RI** No. D. 07063229 PTS. Obat bebas terbatas

118. COLIZAG 100

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung colistin sulphate 100 g **Indikasi** Mencegah dan mengobati infeksi saluran pencernaan pada ayam dan babi yang disebabkan oleh colibacillosis dan salmonellosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam dan babi: 1-2 kg colizag 100/MT pakan selama 5-7 hari **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 13024455 FTS.

119. COSCAT – 666 WATER

Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd.,

SOLUBLE POWDER

Malaysia/Yung Shin Pharmaceutical Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung colistine sulphate 1.900.000 IU **Indikasi** Pengobatan penyakit infeksius pada babi fase pertumbuhan seperti hemolytic diarrhea (vibronic dan *swine* dysentery), bacterial enteritis yang disebabkan oleh *Salmonella* spp. dan *E.coli* dan *Mycoplasma pneumonia* serta pengobatan terhadap CRD dan CCRD **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: Larutkan 75 g obat ke dalam 200 L air minum dan diberikan selama 7 hari. Babi: larutkan 19 g obat ke dalam 200 L air minum dan diberikan selama 7 hari **Kemasan** Botol 750 g **Kementan RI** No. I. 13034466 FTS. Obat keras

120. COXISTAC 12%

Phibro AH, Amerika Serikat/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung salinomisin 120 g **Indikasi** Antikoksidia yang mudah dicerna dan stabil **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg/zak **Deptan RI** No. I. 02011846 FTS. 1. Obat bebas terbatas

121. CROMAX – 0,5%

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung cyromazine (feed grade) 0,5%, silicone dioxide (aerosil 200) 2% dan carrier qs 97,5% **Indikasi** Membasmi lalat sampai pada stadium larva. Membantu mengeringkan kotoran unggas serta mengurangi bau amoniak yang sangat mengganggu kesehatan unggas dan lingkungan. Menekan angka kematian serta mengurangi biaya pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton ransum **Deptan D.** 0104676 FTS. Obat bebas terbatas

122. CROMAX – 10%

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung cyromazine (feed grade) 10,2%, silicone dioxide (aerosil 200) 2% dan carrier qs 87,8% **Indikasi** Membasmi lalat sampai pada stadium larva. Membantu mengeringkan kotoran unggas serta mengurangi bau amoniak yang sangat mengganggu kesehatan unggas dan lingkungan. Menekan angka kematian serta mengurangi biaya pengobatan **Dosis dan Cara Pemakaian** 50 g/ton ransum **Deptan RI** No. D. 0104613 FTS. Obat bebas terbatas

123. CTCZYME

CTCBIO Inc. Korea Selatan/Agri Trading Investment

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung β -mannanase 800.000 U **Indikasi** Meningkatkan utilisasi nutrisi pada pakan, bakteri patogen *binder* disalurkan pencernaan serta meningkatkan berat badan dan efisiensi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 Kg **Deptan RI** No. I. 08123543 FTS. Obat bebas terbatas

124. CYC – 100

Choong Ang Biotech, Korea/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung live yeast cell (*Saccharomyces cerevisiae*) $\geq 1,5 \times 10^{11}$ CFU **Indikasi** Meningkatkan produksi telur, menambah berat telur dan meningkatkan kualitas telur. Mencegah diare dengan mengatur keseimbangan bakteri dalam usus, serta menambah nafsu makan **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi perah: 1,0-2,5 kg. Sapi

potong: 1,5-2,0 kg. Unggas petelur dan breeder: 1,5-2,5 kg. Broiler stater: 2,0-2,5 kg. Grower, finisher: 1,0-1,5 kg. Babi: 1,0-1,5 kg. Ikan atau udang: 2 kg/ton **Kemasan 25 kg Deptan RI No. I. 02022008 PTS. 1. Obat bebas terbatas**

125. CYGRO

Alpharma Inc. Henan, RRC/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung maduramycin 1% **Indikasi** Untuk pengendalian infeksi koksi pada unggas yang disebabkan oleh Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti dan E. mivati pada ayam pedaging, ayam pejantan, dan ayam pengganti pada bibit dan petelur **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-600 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 20 kg **Deptan RI No. I. 05071146 FTM. 3. Obat bebas terbatas**

126. CYLACTIN LBC ME 10

Cerbios-Pharma SA., Switzerland/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bakteri enterococcus faecium strain NCIMB 10415, kultur enterococcus faecium dan polisakarida **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam, babi, dan ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Drum @ 10 kg dan 25 kg **Kementan RI No. I. 12054274 FTS. Obat bebas terbatas**

127. CYROTEK – 1

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung cyromazine 1% **Indikasi** Mengendalikan dan membasmi larva lalat, memperbaiki absorpsi dan konversi pakan serta membuat feses ayam yang dihasilkan menjadi kering **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan ternak: 0,5 kg/ton pakan selama 4 minggu berturut-turut **Kemasan** Zak 25 kg **Deptan RI No. D. 09053620 FTS. Obat bebas terbatas.**

128. DANISCO ANIMAL NUTRITON

Genencor International BVBA, Belgia

LIQUID ALPHA – AMYLASE

untuk Danisco (UK) Ltd., Belgia/

Megasetia Agung Kimia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung enzim α -amylase **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Drum @ 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI No. I. 12034235 FTC. Obat bebas terbatas**

129. DANISCO ANIMAL NUTRITON

Genencor International Ltd., Finland

LIQUID SUBTILISIN (PROTEASE)

untuk Danisco (UK) Ltd., Finland/

Megasetia Agung Kimia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung enzim subtilisin (protease) **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Drum @ 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI No. I. 12034236 FTC. Obat bebas terbatas**

- 130. DANISCO XYLANASE 40.000 G** **Genencor International Ltd., Finland**
untuk Danisco (UK) Ltd., Finland/Megasetia Agung Kimia
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung xylanase **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan Kantung 25 kg Kementan RI No. I. 12074298 FTS.** Obat bebas terbatas
- 131. DANISCO XYLANASE 40.000 L** **Genencor International Ltd., Finland**
untuk Danisco (UK) Ltd., Finland/Megasetia Agung Kimia
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung enzim endo-1,4- β -xylanase **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan Drum @ 200 kg dan 1.000 kg Kementan RI No. I. 12034234 FTC.** Obat bebas terbatas
- 132. DECCOX 6%** **Alpharma Inc., USA/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung decoquinat **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas, sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur dalam pakan **Kemasan Kantung 25 kg Kementan RI No. I. 12114377 FTS.** Obat bebas terbatas
- 133. DEMP** **Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung produk protein nabati **Indikasi** Sumber protein pakan yang berasal dari yeast untuk ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan pada ransum sapi pedaging dan sapi perah sebanyak 200-800 g/ekor/hari **Kemasan Kantung 25 kg Kementan RI No. I. 12064289 FTS.** Obat bebas terbatas
- 134. DEMYTOX** **Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung propionic acid, sodium propionate, Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO, MgO, Na_2O , K_2O , TiO_2 , P_2O_5 dan SiO_2 **Indikasi** Antimycotoxin pada pakan unggas, babi, sapi dan domba **Dosis dan Cara Pemakaian** 150-400 g/ton pakan dan pemberian tergantung dari tingkat kontaminasi **Kemasan Kantung 25 kg Deptan RI No. D. 05061571 FTS. 2.** Obat bebas terbatas
- 135. DENAGARD 10% COATED** **Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tiamulin hidrogen fumarat **Indikasi** Pada babi untuk pengobatan dan control *swine* dysentery. Membantu mengontrol porcine respiratory disease complex (PRDC). Pada unggas, untuk penggetak pertumbuhan, pengobatan CRD dan infeksi synovitis. Pencegahan dan kontrol CRD serta memperbaiki produksi telur pada layer dan breeder **KontraIndikasi** Antikoksidia golongan ionophor seperti monensin, salinomycin dan narasin **Perhatian** Unggas dan babi yang sedang diberikan pengobatan tiamulin jangan diberikan antikoksi golongan ionophor seperti monensin, salinomycin dan narasin **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur dalam pakan. Pada babi untuk pengobatan *swine* dysentery: 100-150 ppm. Untuk control *swine* dysentery: 30-40 ppm. Pada unggas untuk

CRD: 25-50 mg/kg BB (3-5 hari). Untuk pencegahan dan kontrol CRD serta memperbaiki produksi telur dengan dosis: 50 ppm selama 1 minggu setiap bulan atau 20 ppm secara terus menerus selama periode bertelur **Kemasan Kantung 10 kg Deptan RI No. I. 12081880 FTS.**

2. Obat bebas terbatas

136. DENAGARD 80% COATED

Novartis Animal Health Austria/

Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tiamulin hidrogen fumarat **Indikasi** Pada babi untuk pencegahan dan pengobatan disentri, colitis, ileitis dan enzootic pneumonia. Pada Unggas untuk pencegahan dan pengobatan CRD dan infeksi synovitis **KontraIndikasi** Antikoksidia golongan ionophor seperti monensin, salinomycin dan narasin **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada babi untuk pencegahan disentri, colitis, ileitis dan enzootic pneumonia gunakan: 100 ppm selama 5 hari. Untuk pengobatan dientri, colitis, ileitis dan enzootic pneumonia gunakan: 200 ppm selama 7 hari. Pada unggas untuk pencegahan dan pengobatan CRD dan infeksi synovitis gunakan: 50 ppm selama 3-5 hari **Kemasan Kantung 25 kg Deptan RI No. I. 07093289 FTS.** Obat bebas terbatas

137. DE – ODORASE

Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung ekstrak tanaman yucca schidigera, ekstrak fermentasi kering bacillus subtilis, silikon dioksida **Indikasi** Sebagai makanan tambahan. Untuk mengendalikan bau terhadap system penanganan sisa pembuangan pada hewan ternak, unggas, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** 120 g/ton pakan untuk dicampurkan di dalam pakan. 0,3 ppm dapat dilarutkan dalam air kolam akuakultur **Kemasan Kantung 1 kg dan kantung 25 kg Deptan RI No. I. 04062783 FTS.** Obat bebas terbatas

138. DIACOX - 0,5% PREMIX

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung diclazuril 0,5%, polyiodone K30 0,2%, liqnosulfonate 4 dan calcium sulfat dihydrate (gypsum) qs 100% **Indikasi** Antioksidia yang berkhasiat untuk mencegah coccidiosis pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 200 g/ton ransum, diberikan terus menerus sampai 5 hari sebelum ayam dipotong **Deptan RI No. D. 0206993 PTS.** Obat bebas terbatas

139. DK SARSAPONIN 30

Desert King, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung ekstrak yucca schidegera **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan Kantung 20 kg dan 25 kg Deptan RI No. I. 06123153 FTS.** Obat bebas terbatas

140. ECOCELL

Impextraco, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung sacharomyces cerevisiae **Indikasi** Meningkatkan performa **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton **Kemasan Zak 25 kg Deptan RI No. I. 07043212 FTS.** Obat bebas terbatas

141. ECONASE XT 25

AB Vista, UK/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung endo-1,4-beta-xylanase 160.000 BXU **Indikasi** Feed additive untuk pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 50-150 g/kg pakan. Babi: 100-150 g/kg pakan. Kalkun: 37,5-150 g/kg pakan **Kemasan** Sak @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 12034244 FTS. Obat bebas terbatas

142. ECONOMASE

Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selenium yeast, brewers dried yeast, tepung rumput laut yang dikeringkan, asam askorbat (vitamin C), ethoxyquin dan fermentasi kering aspergillus niger **Indikasi** Imbuhan pakan ternak yang mengandung selenium yeast dan dried tepung rumput laut yang dikeringkan, diformulasikan untuk memaksimalkan status antioksidan yang digunakan untuk pakan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan sebanyak 200 g/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073648 FTS. Obat bebas terbatas

143. ECOSTAT

Biomin, Australia/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selected fermented plant & herbal roots extracts (seperti alfalfa meal, caroub meal dan horseradish) dan specially treated adsorptive mineral blend based on caolinitics clay **Indikasi** Antifungi pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Karton 30 kg **Deptan RI** No. I. 08053430 FTS. Obat bebas terbatas

144. ECOX 200

ECO Animal Health, United Kingdom/

Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung monensin natrium 200 g **Indikasi** Sebagai coccidiostat **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan. Unggas: 0,5 kg/ton pakan. Sapi: 0,1-0,2 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 02081402 FTS. Obat bebas terbatas

145. EGGOSTIM

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung bacitracin MD, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B2, vit B12, vit C, nicotinamide dan Ca-d-pantothenate **Indikasi** Meningkatkan produksi telur dan mencegah menurunnya produksi telur pada keadaan sakit atau stress, pindah kandang, perubahan iklim serta memperbaiki mutu pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 2 L air minum dan diberikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 0102944 FTS. 1. Obat bebas terbatas

146. EGGSHELL 49 2X

Alltech Inc, USA/

Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung kalsium karbonat, kalsium phosphate, kultur yeast (*Saccharomyces cerevisiae* yang ditumbuhkan dalam media yang mengandung jagung, diastatic malt & cane molasses, dikeringkan untuk mempertahankan kemampuan fermentasi),

zinc proteinate, manganese proteinate dan copper proteinate **Indikasi** Supplement trace mineral untuk pakan ayam petelur **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan pada pakan layer sebanyak 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033600 FTS. Obat bebas terbatas

147. ELANCOBAN – 200

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung monensin **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12112107 FTS. 2. Obat bebas terbatas

148. ELANCOBAN 100 PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung monensin sodium **Indikasi** Antikoksi **KontraIndikasi** Tiamulin dan troleandomycin **Perhatian** Tidak untuk kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** 90-120 ppm **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 0204492 FTS. 2. Obat bebas terbatas

149. ELANCOBAN 200 PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung monensin sodium **Indikasi** Antikoksi **KontraIndikasi** Tiamulin dan troleandomycin **Perhatian** Tidak untuk kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** 90-120 ppm **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 02082107 FTS. 1. Obat bebas terbatas

150. ELITOX

Impextraco, Belgia/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzyme dan chitosan **Indikasi** Anti mikotoksin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton **Kemasan** PE 25 kg **Deptan RI** No. I. 07053218 FTS. Obat bebas terbatas

151. EM – PETERNAKAN

Songgolangit Persada

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung molase, lectobacillus casei, rhodopseudomonas palustis dan saccharomyces cerevisiae **Indikasi** Sebagai feed additive pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemberian dicampur dalam pakan atau air minum **Kemasan** Botol 1 L, 5 L, 10 L dan 20 L **Kementan RI** No. D. 11064101 FTC. Obat bebas terbatas

152. ENDO – POWER BETA

Easy Bio System, Inc./Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung galactosidase min 35 (U/g), galactomannanase min 110 (U/g), xylanase min 1.500 (U/g), â-glucanase min 1.100 (U/g) **Indikasi** Meningkatkan nilai nutrisi pakan asal jagung dan kedelai, inaktivasi faktor anti nutrisi dari pakan asal kedelai dan biji padi-padian seperti â-galaktosida, galaktomanan, stachyosa dan raffinosa serta meningkatkan berat badan dan efisiensi konversi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan pada pakan ternak. Ayam: 100-200 g/ton pakan. Babi: 100-200 g/ton pakan. Ikan dan udang: 300-500 g/ton pakan **Kemasan** Sak 20 kg **Deptan RI** No. I. 05032906 FTS. Obat bebas terbatas

- 153. ENDOX DRY** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung BHA, ethoxyquin, kalsium karbonat dan letchitin **Indikasi** Antioksidan serbuk yang digunakan pakan ternak dan premiks **Dosis dan Cara Pemakaian** Ternak: 125 g/ton pakan. Udang/ikan: 250 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 1304989 FTS. 3. Obat bebas terbatas
- 154. ENDURA F40** **Anji Fengmu Veterinary Drugs co. Ltd., China
untuk Zhejiang Share Bio-Pharm co. Lid., China/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enramycine 4% **Indikasi** Meningkatkan efisiensi pakan pada pakan babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 25–250 g/ton pakan untuk ayam. 62,5–500 g/ton pakan pada babi **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12124398 FTS. Obat bebas terbatas
- 155. ENDURA F80** **Anji Fengmu Veterinary Drugs co. Ltd., China
untuk Zhejiang Share Bio-Pharm co. Lid., China/
Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enramycine 8% **Indikasi** Meningkatkan efisiensi pakan pada pakan babi dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 12,5–125 g/ton pakan untuk ayam. 31,25–250 g/ton pakan pada babi **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12124397 FTS. Obat bebas terbatas
- 156. ENHALOR PHYTASE** **Beijing Enhakor International Tech. Co., Ltd/
Fenanza Putera**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung phytase 50 g dan pati jagung 950 g **Indikasi** Untuk meningkatkan bioavailabilitas fosfor, meningkatkan daya cerna bahan organik dan unsur mineral. Memberikan ruang formula dan meningkatkan kualitas pakan. Meningkatkan asupan pakan, berat badan, produksi telur serta mengurangi polusi fosfor **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan. Layer 60–100 g/ton pakan. Broiler 100 g/ton pakan. Bebek 80–100 g/ton pakan. Babi: 100 g/ton pakan **Kemasan** Sachet 1 kg dan bag 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg **Kementan RI** No. I. 13014419 FTS.
- 157. ENRAMYCIN F – 40** **Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/Pimaimas Citra**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung dried enramycin mycelia **Indikasi** Feed additive pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 125–250 g/ton pakan dan dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 05061095 FTS. 2. Obat bebas terbatas
- 158. ESSENTIAL** **OligoBasics Agroindustrial Ltda., Brazil/Catur Nawa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung 90 g ricinoleic acid, 200 g cardanoldan dan 40 g cardol **Indikasi** Antimikrobal, penghemat kalori dan antioksidan **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk unggas dan babi: campurkan 1.500 g ke dalam 1 ton pakan. Untuk sapi: Campurkan 400 g ke dalam 1 ton pakan **Kemasan** Zak @ 15 kg **Deptan RI** No. I. 11124193 ATS.

- 159. FEEDOX DRY** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung butylhydroxyanisol **Indikasi** Antioksidan pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 12122458 FTS. 1. Obat bebas terbatas
- 160. FERMACTO** **Pet Ag Inc., USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung ekstrak kering fermentasi tepung aspergillus yang terdiri dari protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan abu **Indikasi** Sebagai feed supplement (prebiotik) untuk bahan baku pakan ternak monogastrik dan aquaculture **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 1-5 kg/ton bahan baku pakan **Kemasan** Kantung 1 kg, 10 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102637 FTS. Obat bebas terbatas
- 161. FIBOSEL** **Lallemand, Estonia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung saccharomyces cerevisiae **Indikasi** Sebagai suplementasi beta glucan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 20 kg **Deptan RI** No. DPS. I. 1001239 PTS Obat bebas terbatas
- 162. FINASE EC 40P** **AB Enzymes GmbH, Finland/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enzim phytase min. 40.000 PPU/g **Indikasi** Sebagai enzim pengurai phytic acid (phytate) dalam pakan atau bahan baku pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 125-1.000 PPU/kg pakan **Kemasan** Kantung 15 kg **Kementan RI** No. I. 11044053 FTS. Obat bebas terbatas
- 163. FORMYCINE GOLD PREMIX** **Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung formaldehyde, propionic acid dan formic acid **Indikasi** Menghambat pertumbuhan jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian ditambahkan ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg, jerigen 5 L dan drum 200 L **Deptan RI** No. I. 03072609 PTS. Obat bebas terbatas
- 164. FORMYCINE LIQUIDO** **Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung formaldehyde, propionic acid dan formic acid **Indikasi** Menghambat pertumbuhan jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian ditambahkan ke dalam pakan **Kemasan** Container 1.000 L **Deptan RI** No. I. 03072610 PTC. Obat bebas terbatas
- 165. FORTICOAT – NL** **Selko BV, Belanda/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung sorbic acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, ammonium formate, L-Ascorbic acid, citric acid, asam lemak mono dan gliserida **Indikasi** Pemeliharaan dan pengasaman pakan basah dan air minum. Mempunyai efek antibakteri yang luas dan daya kerja preservatif dapat mencegah perkembangan mikroorganisme patogen pada unggas dan babi **Kemasan** Jerigen 25 L dan drum 220 L **Deptan RI** No. I. 07073238 FTC. Obat bebas terbatas

166. FUNGINAT FP – 51

Norel SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung propionic acid 15 g, sorbic acid 13 g, sodium formiate 15 g, sodium propionate 85 g, calcium propionate 160 g dan calcium formiate 30 kg **Indikasi** Antijamur untuk pakan ternak dan bahan baku pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Campur 400-1.000 g/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Sak @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 03092135 PTS. 1. Obat bebas terbatas

167. FUNGISAL MIX P

Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung formic acid, propionic acid dan ammonium formate **Indikasi** Bakteriostatik dan fungistatik. Efektif melindungi bahan pakan dan bahan baku dari kontaminasi bakteri dan jamur **Perhatian** Penanganan dengan menggunakan sarung tangan. Hindari terkena kontak langsung dan termakan. Bila terkena kontak langsung bilas dengan air yang banyak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis yang direkomendasikan 0,5-3 kg/ton pakan. Ditambahkan dalam pakan kemudian campur secara merata **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103314 FTS. Obat bebas terbatas

168. FUNGISAL MIX

Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung formic acid, propionic acid dan ammonium formate **Indikasi** Bakteriostatik dan fungistatik. Efektif melindungi bahan pakan dan bahan baku dari kontaminasi bakteri dan jamur **Perhatian** Penanganan dengan menggunakan sarung tangan. Hindari terkena kontak langsung dan termakan. Bila terkena kontak langsung bilas dengan air yang banyak **Dosis dan penggunaan** Dosis yang direkomendasikan 0,5-3 kg/ton pakan. Ditambahkan dalam pakan kemudian campur secara merata **Kemasan** 200 kg dalam drum plastik atau 1000 kg dalam kontainer **Deptan RI** No. I. 07103313 FTS. Obat bebas terbatas

169. FUNGIZAL

AVICO Jordan/Maju Farma Indonesia

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Setiap 1 g mengandung thymol 0,4 mg, benzoic acid 60 mg, sorbic acid 30 mg, kaolin 250 mg dan talc 150 mg **Indikasi** Antifungi dan pengikat mikotoksin yang efektif. Mengeliminasi pertumbuhan jamur pada pakan unggas dan hewan ternak lainnya. Menetralisir pengaruh aflatoksin dan mikotoksin lainnya pada pakan ternak melalui penyerapan dan pengikatan toksin. Di**Indikasikan** sebagai anti-fungi dan pengikat toksin. Untuk preservasi pakan selama kurang lebih satu bulan setelah dicampur, jika tersimpan dengan benar. Anti jamur, anti mycotoxin, efek detoksifikasi, antelmintic (anti cacing), antiseptik dan antibiotik dan dengan unsur pembawa calcium carbonate memberikan efek positif terhadap pertumbuhan tulang dan telur **Perhatian** Hanya digunakan sebagai premiks pakan. Tidak boleh diberikan melalui air minum atau langsung secara oral **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan, campur dengan baik dan digunakan selama 24 jam dimulai dari umur 1 hari **Kemasan** 1,5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 06043063 FTS. Obat bebas terbatas

- 170. FYLAX DRY SP** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai mold inhibitor pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 03112678 FTS. Obat bebas terbatas
- 171. FYLAX FORTE HC LIQUID** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai mold inhibitor pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,35-3,75 kg/ton pakan **Kemasan** Can 25 kg **Kementan RI** No. I. 11054077 FTS. Obat bebas terbatas
- 172. FYLAX FORTE HC SP** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai mold inhibitor pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-4 kg/ton pakan **Kemasan** Can 25 kg **Kementan RI** No. I. 11064110 FTS. Obat bebas terbatas
- 173. FYLAX LIQUID** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai mold inhibitor pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,4-1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 03112679 FTS. Obat bebas terbatas
- 174. FYSAL FIT4** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai acidifier pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-3 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 12064286 FTS. Obat bebas terbatas
- 175. FYSAL LIQUID** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Feed additive pada bahan baku dan makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-4 kg/ton pakan **Kemasan** Can 25 kg **Deptan RI** No. I. 10123946 FTS. Obat bebas terbatas
- 176. FYSAL SP** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Feed additive pada bahan baku dan makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 3-5 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10123945 FTS. Obat bebas terbatas
- 177. GALLIACID** **Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung protected organic acid **Indikasi** Memperbaiki produksi dan efisiensi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan pada pakan dengan dosis 600 g/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033566 FTS. Obat bebas terbatas

178. GENEX POULTRY

Optivite International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung beta glucanase, xylanase dan carrier (CaCO₃) **Indikasi** Peningkatan performance secara alamiah, melalui pengontrolan mikroba. Mempromosikan sistem pencernaan yang sehat, nutrisi lebih sedikit diperlukan untuk bahan bakar respon immune dan dapat digunakan untuk memperbaiki pertumbuhan dan performance reproduksi **Dosis dan Cara Pemakaian** Growing *Poultry*: pakan starter: 2-4 kg/ton, pakan grower/finisher: 2 kg/ton. Babi: pakan pre-starter: 5 kg/ton, pakan starter: 4 kg/ton, weaner feeds: 4 kg/ton, grower feeds: 3 kg/ton, finisher feeds: 2 kg/ton, breeding animals: 4 kg/ton. Kelinci: breeding animals: 2-3 kg/ton, growing animals: 2-4 kg/ton. Burung unta: breeding birds: 4 kg/ton, growing birds: 4 kg/ton **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 12124399 FTS.

179. GENOPHOS – 5000G

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim phytase **Indikasi** Untuk meningkatkan daya cerna pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Campuran pada pakan dengan dosis 100 g/ton pakan **Kemasan** Sak 20 kg **Deptan RI** No. I. 10043830 PTS. Obat bebas terbatas

180. GOLDEN GUARD

Ceracom AG., Switzerland/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung hydrated sodium calcium alumina silicate (HSCAS) dan ekstrak jeruk **Indikasi** Sebagai mycotoxin *binder* atau untuk menyerap ammonia dalam pakan ternak unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan pellet, extruded, atau mash dengan dosis 500 g-1 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103323 FTS. Obat bebas terbatas

181. GROGEL

Bio Science, USA/Pimaimas Citra

Bentuk Sediaan Granule **Komposisi** Mengandung super absorbent polymer **Indikasi** Menjaga kelembaban selama transportasi unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g campuran/ekor DOC **Kemasan** Sachet 80 g, 200 g, 400 g dan 1.000 g **Deptan RI** No. I. 03012519 PTM. Obat bebas terbatas

182. GROW MAX

Easy Bio System, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung chromium picolinate 0,03% **Indikasi** Meningkatkan nilai pemanfaatan energy. Meningkatkan jumlah kelahiran babi per tahun. Memperbaiki kualitas karkas (meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak karkas). Mempertinggi kekebalan tubuh, pertumbuhan dan efisiensi pakan pada ayam dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Campuran pada pakan dengan dosis 500 g/ton pakan **Kemasan** Sak 20 kg **Deptan RI** No. I. 04112835 FTS. Obat bebas terbatas

183. GUSTOR BP 70

Norel SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung sodium butyrate 80 g **Indikasi**

Feed additive untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 1-1,5 kg/ton pakan **Kemasan** Sak @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 11104159 FTS. Obat bebas terbatas

184. HALOR C **Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/Fenanza Putera**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung ascorbic acid 900.000 g, polypropylene resin 7.100 g, alkohol 64.552 g, air 26.650 g, tartrazine 0,048 g dan diethyl phthalate 1.650 g **Indikasi** Untuk menurunkan stress dan meningkatkan kekebalan tubuh (imunitas) pada unggas dan hewan ternak lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan. Udang: 200-1.000 g/ton pakan. Ikan laut: 400-900 g/ton pakan. Ikan air tawar: 100-400 g/ton pakan. Babi starter: 100-200 g/ton pakan. Babi jantan: 150-500 g/ton pakan. Ayam broiler/layer: 50-200 g/ton pakan. Ayam breeder: 150-250 **Kemasan** Sachet 1 kg dan bag 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg **Kementan RI** No. I. 12064292 FTS.

185. HALTOX **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung butylated hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA) dan ethoxyquin **Indikasi** Antioksidan pada pakan dan bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan 125 g/ton pakan, tepung bulu 250 g/ton **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 06033059 FTS. Obat bebas terbatas

186. HEMICELL – D **Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim Beta-mannanase 30 g min. 140 juta unit/kg **Indikasi** Untuk mengurai anti nutrisi Beta-mannan dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11021268 FTS. 1. Obat bebas terbatas

187. HEMICELL – HT **Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim beta-mannanase min. 160 juta unit/kg **Indikasi** Meningkatkan performa pertumbuhan pada semua hewan monogastrik termasuk babi dan unggas dengan cara mengurai faktor anti nutrisi β -mannan di dalam pakan melalui cara kerja β -mannanase **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan sebanyak 0,11–0,33 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg/bag **Kementan RI** No. I. 11044051 FTS. Obat bebas terbatas

188. HEMICELL – L **Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enzim beta-mannanase min. 720 juta unit/L **Indikasi** Untuk memperbaiki daya cerna, karena dapat menghidrolisa beta-mannan dalam pakan ternak unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 110 ml/ton pakan **Kemasan** Drum 104 L **Deptan RI** No. I. 03112647 FK. Obat keras

- 189. HEMICELL – MP** **Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim beta-mannanase min. 360 juta unit/kg **Indikasi** Untuk mengurai anti nutrisi beta-mannan dalam pakan ternak unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 200 g/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Kantung 10 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 08103512 FTS. Obat bebas terbatas
- 190. HEMICELL W LIQUID** **Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enzim beta-mannanase min. 720 juta unit/L dan enzim xylanase min. 800 juta unit/L **Indikasi** Meningkatkan performa pertumbuhan pada semua hewan monogastrik termasuk babi dan unggas dengan cara mengurai dua faktor anti nutrisi β-mannan dan xylan di dalam pakan melalui cara kerja β-mannanase dan xylanase **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan sebanyak 65-110 ml/ton pakan. Larutkan 110 ml ke dalam 890 ml air. Kemudian semprotkan 1.000 ml dari larutan ini ke dalam 1 ton pakan pellet **Kemasan** Drum 104 L **Kementan RI** No. I. 11044055 FTC. Obat bebas terbatas
- 191. HOSTAZYM C 250 MICROGRANULATE** **Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim endo-1,4-beta-glukanase **Indikasi** Untuk meningkatkan bobot badan dan efisiensi konversi pakan pada ayam broiler, layer, kalkun, anak babi dan babi serta berguna untuk penggemukan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033568 FTS. Obat bebas terbatas
- 192. HOSTAZYM P 10000** **Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim 6-phytase **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103730 FTM. Obat bebas terbatas
- 193. HOSTAZYM P 5000** **Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim 6-phytase **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103729 FTM. Obat bebas terbatas
- 194. HOSTAZYM X 250 MICROGRANULATE** **Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim endo-1,4-beta-xylanase **Indikasi** Untuk meningkatkan bobot badan dan efisiensi konversi pakan pada ayam broiler, layer, kalkun, anak babi dan babi serta untuk penggemukan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033569 FTS. Obat bebas terbatas
- 195. HP 300** **Hamlet Protein AS/Jebsen and Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung dehulled dan deffatted soya bean meal

Indikasi Sebagai feed additive pada pakan ayam **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI**
No. I. 13104653 FTS. Obat bebas terbatas

196. INMUNAIR 17.5 **Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Setiap dosis mengandung bakteri propionibacterium acnes 0,17 mg dan lipopolisakarida dari sel bakteri escherichia coli 0,05 mg **Indikasi** Meningkatkan daya tahan unggas secara tidak langsung (non-spesifik) pada saat kondisi stres dan saat sensitive terhadap infeksi penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum untuk unggas (broiler, pullet, layer dan breeder). Tidak dicampur dengan vaksin. 0,5-1,0 ml/10 kg BB. Setiap 24 jam selama 3 hari berturut-turut. Minimum pemberian pada umur unggas 1 hari. Broiler dan pullet: 0,5-1,0 ml/10 kg BB/hari pada umur 3 hari pertama, dan diulangi pada umur 21 hari. Layer dan breeder: 0,5-1,0 ml/10 kg BB/hari pada umur 3 hari pertama, antara umur 10-12 minggu, dan diulang pada umur minggu ke-18 dan ke-23 **Kemasan** 500 ml **Deptan RI** No. I. 05072959 VKC. Obat bebas terbatas

197. IRON – G **China Bestar Laboratories Ltd, Taiwan/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ferrous sulfat **Indikasi** Antidefisiensi Fe pada unggas, babi, sapi, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12104368 PTS. Obat bebas terbatas

198. KEMIRA BACTERIA **Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals**
CONTROL LF2 NC
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung formic acid, propionic acid dan ammonium **Indikasi** Sebagai pengontrol salmonella dan mikroba berbahaya lainnya dalam komponen pakan dan bahan baku pakan, mencegah terjadinya rekontaminan dan sebagai mould inhibitor yang potensial **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam bahan baku pakan sebesar 5–30 kg/1.000 kg bahan baku pakan. Ke dalam pakan sebesar 2-10 kg/1.000 kg pakan. Dosis tergantung pada jenis bahan yang digunakan, kondisi penyimpanan, dan tingkat kontaminasi salmonella **Kemasan** 225 kg/drum **Deptan RI** No. I. 10103916 FTC. Obat bebas terbatas

199. KEMIRA BACTERIA **Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals**
CONTROL SFI
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung formic acid, propionic acid dan citric acid **Indikasi** Sebagai anti microbial untuk mengontrol salmonella dan kontaminasi microbial berbahaya lainnya pada bahan baku pakan dan pakan jadi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam bahan baku pakan: 6–35 kg/1.000 kg bahan baku pakan. Pakan jadi: 4-15 kg/1.000 kg pakan jadi **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10103915 FTS. Obat bebas terbatas

200. KEMIRA MOULD **Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals**
CONTROL LP 1 NC
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung propionic acid dan ammonium **Indikasi**

Sebagai anti jamur dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 500 g-10 kg/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Kaleng 25 L **Deptan RI** No. I. 07093300 FTC. Obat bebas terbatas

**201. KEMIRA MOULD
CONTROL LP 3 NC**

**Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung ammonium propionate dengan total propionic acid min 70% **Indikasi** Sebagai anti jamur dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 500 g-2 kg/ton pakan atau bahan baku pakan. Untuk pakan jagung dengan moisture 16-20%: dosis 4 kg/ton jagung. Untuk pakan jagung dengan moisture < 16%: dosis 1 kg/ton jagung **Kemasan Bulk 1 ton Deptan RI** No. I. 09023559 FTC. Obat bebas terbatas

**202. KEMIRA MOULD
CONTROL SP 1**

**Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung propionic acid **Indikasi** Sebagai anti jamur dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 500 g-10 kg/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan Kantung 25 kg Deptan RI** No. I. 05123025 FTS. Obat bebas terbatas

203. KEMIRA PRO GIT SF1

**Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung formic acid, acetic acid, lactic acid dan citric acid **Indikasi** Sebagai acidifier (penurun pH) dan antibacterial dalam pakan anak babi atau babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi atau anak babi sebesar 3-20 kg/ton pakan **Kemasan Kantung 25 kg Kementan RI** No. I. 11054089 FTS. Obat bebas terbatas

204. KEMIRA PRO GIT SF3

**Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung formic acid, lactic acid, citric acid dan medium chain fatty acid **Indikasi** Sebagai acidifier (penurun pH) dan antibacterial dalam pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan unggas 2-5 kg/ton pakan **Kemasan Kantung 25 kg Kementan RI** No. I. 12084320 FTS. Obat bebas terbatas

**205. KEMTRACE CHROMIUM
DRY 0,04%**

**Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung chromium propionate, asam propionat dan natrium chlorida **Indikasi** Meningkatkan penampilan reproduksi dan mengurangi lemak pada punggung babi. Memperbaiki efisiensi reproduksi sapi dan produksi susu **Dosis dan Cara Pemakaian Babi:** 500 g/ton pakan. Sapi: 1,25 kg/ton pakan **Kemasan Kantung 25 kg Kementan RI** No. I. 12024216 FTS. Obat bebas terbatas

206. KEMZYME DRY

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/

Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enzim alpha amylase, beta amylase, beta glukonase, pullunase, cellulose, pektinase, endo dan ekso protease **Indikasi** Sumber enzim tambahan dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-1.000 g/ton pakan ternak **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 06021026 FTS. 2. Obat bebas terbatas

207. KEMZYME V DRY

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/Satwa Jawa Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enzim alpha amylase, protease, xylanase, cellulase, kalsium propionat dan kalsium karbonat **Indikasi** Membantu meningkatkan daya cerna pakan. Meningkatkan pencernaan energi pakan. Meningkatkan efisiensi pakan. Mengurangi biaya pakan, kekentalan cairan pada usus dan kotoran basah **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-1.000 g/ton pakan ternak **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063640 FTS. Obat bebas terbatas

208. KLINOFEED

Unipoint AG., Switzerland/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , K_2O , Fe_2O_3 , MgO , TiO_2 , Na_2O , SO_3 , P_2O_5 , MnO dan H_2O **Indikasi** Untuk mengikat mycotoxin dan ammonia pada pakan ayam, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-3 kg/ton pakan sebagai pencegahan, jika mycotoxin tidak terdeteksi pada bahan baku. 3-5 kg/ton pakan sebagai pengobatan, jika mycotoxin terdeteksi pada bahan baku **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11102500 FTS.1 Obat bebas terbatas

209. KLINOSAN

Unipoint AG., Switzerland/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung clinoptilolite (HSCAS) serta yeast ekstrak dari *saccharomyces cerevisiae* **Indikasi** Sebagai toksin *binder* pada pakan babi, ayam, sapi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada babi dan unggas: 0,5 %. Pada sapi dan kuda: 100 g/hari **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11124181 FTS. Obat bebas terbatas

210. KOFA GRAIN -pH 5-

ADDCON, Jerman/Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung propionic acid, sodium benzoate dan sodium propionate **Indikasi** Mencegah pertumbuhan jamur, bakteri dan yeast pada bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kondisi kelembaban dan lama penyimpanan bahan baku pakan dengan kisaran pemberian 2-13 L/ton **Kemasan** Drum 240 kg dan jerigen 29 kg **Kementan RI** No. I. 11044064 FTC. Obat bebas terbatas

211. KOKCISAN 120 G

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung sodium salinomycin 120 g/kg **Indikasi** Sebagai anti koksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044054 PTS. Obat bebas terbatas

212. KULACTIC

Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *crude protein* 18%, *crude fat* 1% dan *crude fiber* 7,5% **Indikasi** Sebagai sumber metabolit khusus kaya asam laktat. Menurunkan pH lambung, menghambat pertumbuhan bakteri patogen/berbahaya dan memperkaya mikroflora pencernaan dalam usus **Dosis dan Cara Pemakaian** *Beef cattle, Dairy, Poultry dan swine*: 0,5-1 kg/head/day dan dicampur kedalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044071 FTS.

213. LARSIDEX

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung cyromazine 10 g **Indikasi** Sangat efektif membasmi larva lalat, sehingga mengurangi populasi lalat di kandang dan sekitarnya. Mengurangi resiko timbulnya penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat seperti coccidiosis, salmonellosis, dll serta mengurangi kadar amoniak dan menjaga kotoran tetap kering. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 300-500 g/ton pakan. Gunakan sistem 5-5-5. 5 minggu obat diberi, 5 minggu tanpa obat dan 5 minggu diberi obat lagi **Kemasan** 20 kg dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 07093277 FTS. Obat bebas terbatas

214. LARVAZINE

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung cyromazine 10 g **Indikasi** Menghambat pertumbuhan larva lalat yang berkembang pada kotoran unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campuran sebanyak 250-500 g/ton pakan (2,5-5 ppm dalam pakan) **Kemasan** 1 kg dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 12072492 FTS. 1. Obat bebas terbatas

215. LEVUCCELL SB 20

Lallemand SAS France/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *saccharomyces cerevisiae* **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan atau bahan baku pakan sebesar 2 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0609712 FTS. Obat bebas terbatas

216. LIFEFORCE FORMULA

Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung hydrolyzed yeast, *saccharomyces cerevisiae* yeast culture, zinc proteinate, manganese proteinate, copper proteinate dan selenium yeast **Indikasi** Kultur yeast dan trace mineral yang diformulasikan untuk semua kelas kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan dua sendok ke dalam ransum harian kuda **Kemasan** 800 g, 1,5 kg, 1,7 kg, 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 10083885 FTS. Obat bebas terbatas

217. LIGNOBOND DD

Borregaard Norway/Fenanza Putera

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung calcium lignosulphonate 930 g dan air 70 g **Indikasi** Merupakan pellet binder yang dapat meningkatkan daya tahan pellet pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan ternak dengan dosis

1-10 kg/1.000 kg pakan ternak, tergantung dari apa yang dibutuhkan, peralatan pabrik, kondisi pencampuran, bahan baku dan formula **Kemasan** Bag 25 kg, 500 kg, 600 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 13104661 FTS.

218. LINCOMIX 110

Pfizer Suzhou Animal Health, China/PT. Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung 110 g lyncomycin hydrochloride **Indikasi** Pada unggas: Memperbaiki efisiensi pakan dan mengontrol penyakit nekrotik enteritis. Babi: Mengobati dan mengontrol penyakit disentri. Pencegahan dan pengobatan enteritis yang disebabkan oleh *Lawsonia intracellularis* **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dengan bahan pakan. Untuk perbaikan efisiensi pakan: 20-40 g/ton pakan. Kontrol penyakit nekrotik enteritis: 20 g/ton pakan. Untuk kontrol penyakit swine disentri: 0,4 kg/ton pakan. Untuk pengobatan swine disentri: 1 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 5 kg **Deptan RI** No. I. 0707487 FTS.3. Obat bebas terbatas

219. LUMIPHYTASE 5 XG

**Lumis Biotech Pvt Ltd., India/
Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung phytase, starch dan magnesium oxide **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi atau unggas sebesar 100-150 g/ton pakan **Kemasan** Bag 20 kg **Kementan RI** No. I. 13024446 FTS. Obat bebas terbatas

220. LUPROSIL ADSORBATE

BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionat **Indikasi** Sebagai mold inhibitor pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 20 kg **Deptan RI** No. I. 07093285 FTS. Obat bebas terbatas

221. LYSOFORTE DRY

**Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lysolecithin dan tokopherol **Indikasi** Membantu meningkatkan daya cerna dan penyerapan asam lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Meningkatkan kualitas pellet dan membantu mengurangi penggunaan sumber lemak (CPO/fish oil/soya bean oil/tallow) pada pakan unggas dan babi. Mengurangi biaya pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063631 FTS. Obat bebas terbatas

222. MADUX 1%

DOX-AL Italia SpA. Italy/Catur Nawa

Bentuk Sediaan Serbuk granula **Komposisi** Setiap kg mengandung 10 g maduramicin ammonium **Indikasi** Antikoksidia untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04022727 FTM. Obat bebas terbatas

223. MANNANASE GRANULAR

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung mannanase **Indikasi** Memperbaiki

pencernaan dan feed concentration rate **Dosis dan Cara Pemakaian** 100-300 g/ton pakan
Kemasan 25 kg/zak kantung yang di dalamnya terdapat 5 aluminium foil @ 5 kg **Kementan**
RI No. I. 13034427 FTS. Obat bebas terbatas

224. MANNANASE POWDER

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung mannanase **Indikasi** Memperbaiki pencernaan dan feed concentration rate **Dosis dan Cara Pemakaian** 100-300 g/ton pakan
Kemasan 25 kg/zak kantung yang di dalamnya terdapat 5 aluminium foil @ 5 kg **Kementan**
RI No. I. 13034473 FTS. Obat bebas terbatas

225. MAXIBAN 72 PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung narasin dan nikarbazin **Indikasi** Antikoksidia
Dosis dan Cara Pemakaian 1 kg/ton pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan**
Kemasan 25 kg **Deptan RI** No. I. 04061618 PTM. 2. Obat bebas terbatas

226. MAXI – MIL HP

Anitox Corporation, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam propionate dan asam N-butirat **Indikasi**
Sebagai mold inhibitor pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan
Kemasan Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 12084326 FTC. Obat bebas terbatas

227. MAXI – MIL S

Anitox Corporation, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam propionate dan asam N-butirat
Indikasi Antijamur pada pakan dan bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian**
Dicampur dalam pakan **Kemasan** Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 05092995
FTC. Obat bebas terbatas

228. MAXUS 100 PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung avilamycin **Indikasi** Untuk mencegah dan kontrol nekrotik enteritis yang disebabkan Cl. Perfringens pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan**
Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05012857
FTM. Obat bebas terbatas

229. MAYYA TURBO TOX

Miavit GmbH, Jerman

untuk XVET GmbH, Jerman/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung saccharomyces cerevisiae, propionae acid dan MOS (manan oligosaccharide) **Indikasi** Feed preservative. Meningkatkan performa unggas dan ruminansia pada berbagai siklus produksi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton pakan **Kemasan** Paper bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073660 FTS. Obat bebas terbatas

230. MD – 09 Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/Agri Trading Investment

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung 100% bentonite **Indikasi**

Menyerap dan mengontrol kadar air dalam usus besar untuk perbaikan konsistensi pada kotoran hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5–5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 Kg **Kementan RI** No. I. 13014420 FTS. Obat bebas terbatas

231. MFEED

Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung montmorillonite, copper sulphate, diatomaceous earth, clinoptilolite, yeasts extract, ekstrak rumput laut dan essential oils (oregano oil) **Indikasi** Feed additive pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan. Produk ini harus digunakan dengan mencampurkan pada pakan sesuai dengan dosis sebagai berikut. Unggas: ayam, bebek: starter feed: 2,5-5 kg/ton, grower feed: 2,5 kg/ton, finisher feed: 1 kg/ton, laying hens: 2,5 kg/ton. Babi: creep and weaner feed: 2,5-5 kg/ton, grower feed: 2-3 kg/ton, finisher feed: 1 kg/ton. Ikan dan udang: creep and weaner feed: 2,5-5 kg/ton, grower feed: 2,5 kg/ton, finisher feed: 1 kg/ton. Anak sapi (sebelum mulai masa ruminasi): sebagai pengganti susu atau pakan lengkap lainnya 3 kg/ton **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094333 FTS. Obat bebas terbatas

232. MIA – OVODUR

Miavit GmbH, Jerman/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung coated butyric acid dan algal limestone **Indikasi** Memperbaiki kualitas cangkang telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 1 kg/ton pakan **Kemasan** Kantong 10 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12054263 FTS. Obat bebas terbatas

233. MICOFUNG

Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam asetat, asam propionat, kalsium propionat, asam format, asam sorbet dan ekstrak biji sitrat **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak. Mencegah kontaminasi jamur pada pakan dan mencegah masalah mikosis serta mikotoksikosis **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan. Dosis pencegahan yang biasanya digunakan adalah antara 250 g/ton dan 500 g/ton, bergantung pada biji-bijian atau pakan yang akan diberikan perlakuan. Untuk perlakuan pada produk yang terkontaminasi, dosis bergantung pada kontaminasi dan tingkat kelembaban dengan dosis hingga 2.000 g/ton yang diperlukan pada beberapa kasus **Kemasan** Kantong 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044065 FTS. Obat bebas terbatas

234. MICRO AID FEED GRADE

Distributor Processing Inc., USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung yucca schidigera (sarsaponin) dan verxite granule **Indikasi** Mengendalikan bau ammoniak pada kotoran hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 12101962 PTM. 2. Obat bebas terbatas

235. MICRO AID LIQUID 10%

Distributor Processing Inc., USA/SHS International

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung ekstrak yucca schidigera (sarsaponin) **Indikasi**

Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Gallon 8,6 Lbs **Deptan RI** No. I. 10033814 FTC. Obat bebas terbatas

236. MICROTECH 5000 GRANUL

Guangdong VTR Bio-Trch Co. Ltd., China/

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung phytase, corn starch dan soybean powder
Indikasi Memperbaiki pencernaan dan feed conversion rate **Dosis dan Cara Pemakaian**
Pakan layer: 60-80 g/ton pakan. Pakan babi dan *Poultry*: 80-100 g/ton pakan **Kemasan** Drum
20 Kg **Deptan RI** No. I. 09053623 FTS. Obat bebas terbatas

237. MICROTECH 5000 LIQUID

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap g mengandung phytase ≥ 5000 U/g **Indikasi** Sebagai
feed additive **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk layer: 60-80 g/ton pakan dan untuk *Poultry*
atau babi: 80-100 g/ton pakan **Kemasan** Tangki jerigen polyethylene dengan berat bersih 25
kg **Kementan RI** No. I. 13024464 FTC. Obat bebas terbatas

238. MICROTECH 5000 POWDER

Guangdong VTR Bio-Trch Co. Ltd., China/

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung phytase, corn starch, dan soybean powder
Indikasi Memperbaiki pencernaan dan feed conversion rate **Dosis dan Cara Pemakaian**
Pakan layer: 60-80 g/ton pakan; pakan babi dan *Poultry*: 80-100 g/ton pakan **Kemasan** Drum
20 Kg **Deptan RI** No. I. 09083689 FTS. Obat bebas terbatas

239. MILBOND TX

Milwhite, Inc., USA/PT. Pfizer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Megandung hydrated sodium calcium aluminosilicate
(HSCA) **Indikasi** Toksin binder yang mampu melindungi dari efek aflatoksin dan mikotoksin
lainnya dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,25-2% dari jumlah pakan yang
diberikan pada pakan hewan ternak, babi dan unggas **Kemasan** Paper bag 25 kg dan ember
plastik 50 kg **Deptan RI** No. I. 10053834 FTS. Obat bebas terbatas

240. MINTAI FEED ANTIMOLD

Mintai Perfume Chemicals Co, Ltd, China/

PROPIONIC ACID TYPE (1)

Tienyen International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung propionic acid, ammonium propionate,
sodium sulfate dan silicon dioxide **Indikasi** Antijamur pada pakan dan bahan baku pakan **Dosis**
dan **Cara Pemakaian** Lihat pada brosur **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09083679
FTS. Obat bebas terbatas

241. MINTREX Cu

Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu – methionine hydroxy analogue **Indikasi**
Sebagai feed additive pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam
pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 10023800 FTS. Obat bebas terbatas

- 242. MINTREX Mn** **Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Mn – methionine hydroxy analogue **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103743 FTS. Obat bebas terbatas
- 243. MINTREX POULTRY** **Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Zn, Cu dan Mn – methionine hydroxy analogue **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09123760 FTS. Obat bebas terbatas
- 244. MINTREX Pse** **Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Zn, Cu dan Mn – methionine hydroxy analogue dan selenium yeast **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103745 FTS. Obat bebas terbatas
- 245. MINTREX Zn** **Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Zn – methionine hydroxy analogue **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103744 FTS. Obat bebas terbatas
- 246. MIXBRO** **Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung virginiamisin, vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasinamid, Ca-d-panthotenat, kolin klorida, asam folat, methionin dan arginin **Indikasi** Imbuhan pakan untuk pencegahan dan pengobatan nekrotik enteritis serta memicu pertumbuhan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 5 g/10-13 L air minum **Kemasan** Ember plastik 12,5 kg @ 250 g **Deptan RI** No. D. 0403760 FTS. 3. Obat bebas terbatas
- 247. MOLD BAND INHIBITOR** **Odyssey, Amerika Serikat/Indovetraco Makmur Abadi**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap 1 kg mengandung asam propionat 500 g **Indikasi** Anti jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Kelembaban 15% untuk 455 g/ton pakan. Kelembaban 16-17% untuk 910 g/ton pakan. Kelembaban 18% untuk 1.365 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 07061025 FTS. 3. Obat bebas terbatas
- 248. MOLD NIL DRY** **Nutri-Ad International bvba, Belgia/Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung calcium propionat, calcium citrate dan sorbic acid **Indikasi** Anti jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan: 0,5-1 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. D. 1206475 PTS. 1. Obat bebas terbatas
- 249. MOLDSTOP ML** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung propionic acid, formic acid, sorbic acid, lactic

acid, citric acid dan ortho-phosphoric acid **Indikasi** Anti jamur pada pakan ternak **Kemasan** Drum 20 kg **Deptan RI** No. I. 05092990 FTC. Obat bebas terbatas

- 250. MOLDSTOP MYCO PLUS** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionat **Indikasi** Anti jamur pada pakan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12122463 FTS. 1. Obat bebas terbatas
- 251. MOLDSTOP SD PLUS** **Impextraco, Belgia/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionat **Indikasi** Anti jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12122455 FTS. 1. Obat bebas terbatas
- 252. MOLDTEC 201** **Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionat, asam benzoat, asam asetat dan asam sorbat **Indikasi** Pencegah pertumbuhan jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung HDPE 25 kg **Deptan RI** No. I. 08053427 FTS. Obat bebas terbatas
- 253. MOLDTEC 202** **Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionat **Indikasi** Pencegah pertumbuhan jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung HDPE 25 kg **Deptan RI** No. I. 08053424 FTS. Obat bebas terbatas
- 254. MOLD – ZAP LIQUID** **Alltech Inc., USA; Alltech China/ Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam propionic, ammonium hydroxide dan air **Indikasi** Asam propionic buffer yang digunakan untuk mencegah pembentukan jamur dalam penyimpanan pakan ternak dan biji-bijian yang telah diolah **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan biji-bijian yang disimpan 0,5 kg/ton. Pakan biji-bijian yang diolah (dikupas) 1 kg/ton. Pakan jadi: 0,5 kg/ton. Ground ear corn (kurang dari 15%): 0,5 kg/ton. Brewers grain: 1 kg/ton. Pakan hewan kesayangan: 0,5 kg/ton **Kemasan** Ember 18 kg, drum 200 kg, bulk tank 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 10103920 FTC. Obat bebas terbatas
- 255. MOLD – ZAP** **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Wheat bran, propionic acid, vermiculite, tongkol jagung giling, ammonium hidroksida, silikon dioksida, minyak dari jeruk, asam asetat, asam benzoate, asam sorbat dan asam tartar **Indikasi** Sebagai mold inhibitor yang digunakan untuk mencegah pembentukan jamur dalam penyimpanan pakan ternak dan biji-bijian yang telah diolah **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,75-1,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 06063084 FTS. Obat bebas terbatas

- 256. MOLTEC 211** **Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam propionat, asam fosfat, asam benzoat, asam asetat dan asam sorbat **Indikasi** Mencegah pertumbuhan jamur pada bahan pakan hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Drum 200 kg **Deptan RI** No. I. 08063462 FTS. Obat bebas terbatas
- 257. MONENDOX 200 BMP** **DOX-AL Italia SpA. Italy/Catur Nawa**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Setiap kg mengandung 200 g monensin sodium **Indikasi** Antikoksidia untuk unggas. Pemacu pertumbuhan untuk sapi potong **KontraIndikasi** Tiamulin dan troleandomycin **Perhatian** Tidak boleh digunakan untuk kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 500 g ke dalam 1 ton pakan **Kemasan** Zak @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 12084317 FTS.
- 258. MONEVAXE – 20** **Shandong Jinyang Biological pharmaceutical Co. Ltd.,
China untuk Hangzhou Invaxe Medical Technology Co. Ltd.,
China/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung monensin 20% **Indikasi** Sebagai antikoksidia dan meningkatkan efisiensi pakan pada sapi, kambing, dan unggas **Perhatian** Tidak boleh diberikan pada kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 11-33 mg/kg pakan pada sapi. 5-20 mg/kg pada pakan kambing dan 100-120 mg/kg pada pakan unggas **Kemasan** Kantong 10 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 12074316 FTS. Obat bebas terbatas
- 259. MONOPROP** **Anitox Corp-USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung propionic acid dan verxite granule **Indikasi** Anti jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-2.000 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 0503491 FTC. 3. Obat bebas terbatas
- 260. MONTEBAN 45** **Elanco Animal Health/SHS International**
Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung narasin **Indikasi** Mencegah koksidiosis yang disebabkan oleh eimeria necatrix, E. tenella, E. eccervulina, E. brunetti, E mivati dan E. maxima **Dosis dan Cara Pemakaian** 60-80 ppm atau 600-800 g/ton pakan **Kemasan** 50 lbs **Deptan RI** No. I. 04111646 FTM. 2. Obat bebas terbatas
- 261. MONVIT PREMIX** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Vitamin A 3.000.000 IU, vit D3 300.000 IU, vit E 30.000 IU, cobalt 0,5 g, copper 15 g, iodine 4 g, manganse 40 g, monensin 20 g, selenium 0,4 g dan zinc 80 g **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1–1,5 kg/ton pakan sapi **Kemasan** 1 kg dan 25 kg @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 10083898 FTS. Obat bebas terbatas

262. MT. X+

Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung montmorillonite, diatomaceous, yeast wall cells dan ekstrak rumput laut **Indikasi** Sebagai toksin *binder* dan dicampur secara homogen ke dalam pakan unggas, babi, sapi, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan tingkat pencemaran mycotoksin dalam pakan dan diantara 0,5 kg/ton sampai dengan 2,0 kg/ton pakan **Kemasan** Kantong multi layer polyethylene @ 15 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103720 FTS. Obat bebas terbatas

263. MULTICHICKS

Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung bacitracine MD 50.000 mg, vitamin A 6.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 10.000 mg, vit K3 1.000 mg, vit C 25.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 2.000 mcg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, niacine 15.000 mg dan folic acid 250 mg **Indikasi** Growth promotor pada unggas (DOC) **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan/pemeliharaan anakan ayam umur 1 hari-2 minggu: 5 g/10 L. Anak ayam 3-4 minggu: 5 g/15 L air minum **Kemasan** Sachet 100 g **Deptan RI** No. D. 06103138 GTS. Obat bebas terbatas

264. MYCOFIX PLUS 3.0

Biomim/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung biomin BBSH, silicates, diatomaceous earth, caolinite clay (free asbestos), inactivated saccharomyces (yeast), phycophitic substance dan ekstrak tumbuhan **Indikasi** Antimycotoksin untuk berbagai mycotoksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dengan pakan sampai merata, dengan dosis 1,5-2,5 kg/ton pakan **Kemasan** Dus 25 kg **Deptan RI** No. I. 06103141 FTS. Obat bebas terbatas

265. MYCOFIX SECURE

Biomim/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung silicate 80 g dan plant extracts 20 g **Indikasi** Antimycotoksin sebagai toksin *binder* **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dengan pakan sampai merata, dengan dosis 1,5-2,5 kg/ton pakan **Kemasan** Dus 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022871 FTS. Obat bebas terbatas

266. MYCOFIX SELECT 3.0

Biomim/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung biomin BBSH, silicates, diatomaceous earth, caolinite clay (free asbestos), phycophitic substance dan ekstrak tumbuhan **Indikasi** Antimycotoksin untuk berbagai jenis mycotoksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dengan pakan sampai merata. Dengan dosis 2-3 kg/ton pakan **Kemasan** Dus 25 kg **Deptan RI** No. I. 06103140 FTS. Obat bebas terbatas

267. MYCOSORB

**Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/
Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung glucomannan oligosakarida **Indikasi** Natural yeast produk yang ditambahkan pada pakan hewan untuk mengikat mycotoxin **Dosis**

dan Cara Pemakaian 0,5-2 kg/ton pakan. Penggunaannya dicampurkan ke dalam pakan
Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04062782 FTS. Obat bebas terbatas

268. MYCOSTAT **Kiotechagil, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung propionic acid, acetic acid, sorbic acid dan amomonium propionate **Indikasi** Antifungi pada bahan baku pakan ternak dan pakan ternak
Dosis dan Cara Pemakaian Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0801315 FTS. Obat bebas terbatas

269. MYCOTOX **Ceva Sante Animale SA, Perancis/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung oksiquinol **Indikasi** Antifungi pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan dengan dosis 1-3 kg/ton pakan tergantung dari tingkat infeksi atau konsentrasi mikotoksin dalam pakan. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 08091150 FTS. 1.

270. MYCOTOX NG **Ceva Sante Animale SA, Perancis/Ceva Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung thymol **Indikasi** Mendetoksifikasi pakan yang terkontaminasi mikotoksin. Mencegah dan mengendalikan mikotoksikosis pada ayam dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103322 PKC.

271. NATUPHOS 10.000 G **BASF Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap ke mengandung 10.000 FTU phytase **Indikasi** Memecah ikatan phytase pada makanan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan pada pakan dengan dosis 50 g/tom pakan **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 1301446 FTS.

272. NATUSTAT **Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung brewers dried, hasil fermentasi kering *saccaromyces cerevisiae* yang mudah larut, zinc proteinate, silicon dioksida dan Cu proteinate **Indikasi** Imbuhan pakan ternak alami untuk mengontrol agen protozoa yang digunakan untuk hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 1 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073651 FTS. Obat bebas terbatas

273. NATUZYME **Bioproton Pty. Ltd., Australia/Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung xylanase, cellulase, phytase, α -amylase, protease, lipase dan pectinase **Indikasi** Feed additive untuk unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 350-500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 03022534 FTS. Obat bebas terbatas

274. NEO – EGGOSTIM **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung spiramycin adipate, vitamin A, vit D3, vit

E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate dan nicotinic acid **Indikasi** Meningkatkan produksi telur, mengoptimalkan hasil vaksinasi, memperbaiki FCR serta memperbaiki kualitas telur ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 5 L air minum atau campuran 1 kg dalam 2,5 ton pakan dan diberikan 5-7 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1.000 g, 15 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 07123360 PTS. Obat bebas terbatas

275. NOPCOXYME II

Diasham Resources, Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung alpha-amylase dan protease **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas, babi dan sapi **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 05061626 FTS. 2. Obat bebas terbatas

276. NUOQIU PREMIX 5%

Shandong Luxi, China/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung diklazuril 0,5% **Indikasi** Antikoksidia **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 ppm yang dicampur dalam pakan **Kemasan** 15 kg **Deptan RI** No. I. 0203047 PTS. Obat bebas terbatas

277. NUTRASE XYLA 500

Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim endo – 1,4 – beta xylanase **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas dan babi. Menghidrolisis arabinosyln serta mengurangi kekentalan isi usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi serta pertumbuhan dan asupan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan dengan dosis 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 1 kg, 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 10083897 FTS. Obat bebas terbatas

278. NUTRASE XYLA LIQUID

Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung enzim endo – 1,4 – beta xylanase **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas dan babi. Menghidrolisis arabinosyln serta mengurangi kekentalan isi usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi serta pertumbuhan dan asupan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan **Kemasan** Dirigen 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 12024217 FTC. Obat bebas terbatas

279. NUTRASE XYLA

Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim endo – 1,4 – beta xylanase **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas dan babi. Menghidrolisis arabinosyln serta mengurangi kekentalan isi usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi serta pertumbuhan dan asupan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan dengan dosis 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 1 kg, 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 10083896 FTS. Obat bebas terbatas

280. NUTRI – SURE DWI

**Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/
Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung formic acid, acetic acid dan lactic acid **Indikasi** Sebagai acidifier (penurun pH) dan antibacterial dalam air minum ternak unggas, babi dan kelinci **Perhatian** Tidak untuk ternak ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian**

Ditambahkan ke dalam air minum dengan dosis 1-6 g/L air minum **Kemasan** Kaleng 25 L dan drum 200 L **Deptan RI** No. I. 07093301 PTC. Obat bebas terbatas

281. NUTRIAROMA MILKY – VANILLA

**Dex Iberica – Spanyol/
Tri Dinamika Nusantara**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung mixture flavouring agent, silicic acid precipitated dan dried, calcium carbonate dan lactose serbuk **Indikasi** Flavouring agent (zat perasa) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan, dosis umum yang direkomendasikan pada pakan adalah 300-500 g/ton pakan. Walaupun dosis ini sesuai dengan aroma pada pakan, praktisnya sebagian besar konsumen menggunakan dosis yang lebih tinggi sekitar 1-2 kg/ton pakan pada kasus pakan yang khusus, sesuai dengan hal berikut: Pada pakan “maternal” yang biasanya mengandung obat dan yang memiliki fungsi utama konsumsi pakan padat pada anak babi, dosis yang direkomendasikan hingga 2.000 g/ton pakan. Pada pakan “pre-starter”, hewan siap untuk mengkonsumsi dan mencerna pakan padat tetapi diet mereka diubah secara lengkap saat mereka weaned. Untuk alasan ini, pakan harus diberikan obat untuk mencegah masalah pencernaan dan pernapasan. Jadi dosis dapat ditingkatkan hingga 1.000 g/ton. Pada pakan yang diberi obat secara umum, dosis 1.000 g/ton pakan direkomendasikan. Pada pakan “starter”: dosis 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094334 FTS. Obat bebas terbatas

282. NUTRILAC IGA LIQUID

**Nutri-Ad International bvba, Belgia/
Kalbe Farma Tbk**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung lactic acid dan formic acid **Indikasi** Memperbaiki fungsi pencernaan pada unggas dan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dalam air minum: 3 cc/L selama 4-5 hari **Kemasan** Botol 1 L, drum 25 kg, 200 kg dan container 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 03122691 FTC. Obat bebas terbatas

283. NUZYME

Sinsui Inc, Jepang/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk putih kecoklatan **Komposisi** Mengandung sellulase (C1-ase), sellulase (CMC-ase), xylanase (hemi sellulase), alpha-amylase dan beta glucanase **Indikasi** Meningkatkan konversi pakan pada ayam broiler **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambahkan 500 g/metik ton pakan **Kemasan** Kantung kertas polynere 10 kg **Deptan RI** No. I. 09073654 FTS. Obat bebas terbatas

284. OPTAFLEXX 100

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ractopamin HCl **Indikasi** Meningkatkan berat badan, efisiensi pakan dan menambah kekebalan karkas pada sapi potong **Dosis dan Cara Pemakaian** 10-30 ppm **Kemasan** Sak 10 kg **Deptan RI** No. I. 09073661 FTS. Obat bebas terbatas

285. OPTIGEN II

Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Urea, minyak nabati, beta karoten, BHT dan asam

sitrat **Indikasi** Suplemen nitrogen non-protein untuk ternak ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** 90-240 g/ekor/hari **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073647 FTS. Obat bebas terbatas

286. OPTIGEN

**Alltech Inc, USA; Alltech Biotechnology
Private Limited-India/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung urea, minyak nabati, beta karoten dan BHT **Indikasi** Suplemen nitrogen non-protein untuk ternak ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** 90-240 g/ekor/hari **Kemasan** Sak 25 kg **Kementan RI** No. I. 13014423 FTS. Obat bebas terbatas

287. OPTIMIN COPPER 15%

Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung copper dan hydolized soy protein **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi copper pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073876 FTS. Obat bebas terbatas

288. OPTIMIN IRON 15%

Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron dan hydolized soy protein **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi iron pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10083894 FTS. Obat bebas terbatas

289. OPTIMIN MANGANESE 15%

Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung manganese dan hydolized soy protein **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi manganese pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073875 FTS. Obat bebas terbatas

290. OPTIMIN SEY 3000

Lallemand Inc, Canada/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung selenium **Indikasi** Sebagai suplementasi selenium **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 20 kg **Kementan RI** No. I. 11064108 FTS. Obat bebas terbatas

291. OPTIMIN ZINC 15%

Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc dan hydolized soy protein **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi zinc pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073874 FTS. Obat bebas terbatas

292. OPTIMIN ZINC METHIONINE 20%

**Great Plains Processing/
Trouw Nutrition Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc dan methionine **Indikasi** Sebagai

sumber suplementasi zinc dan methionine **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 12114392 FTS. Obat bebas terbatas

293. OPTIMIN ZMC

Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc, manganese, copper dan hydolized soy protein **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi manganese, zinc dan copper pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10083895 FTS. Obat bebas terbatas

294. OPTIMISE

Optivate International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung beta-glucanase, xylanase dan phytase **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas. Memperbaiki dalam digestibility *crude protein* dan asam amino hingga lebih dari 10%. Memperbaiki dalam phosphorus digestability lebih dari 20%. Memperbaiki dalam energi digestability lebih dari 10% **Dosis dan Cara Pemakaian** Melalui pakan. Layer: 0,5 kg/ton pakan. Broiler: 1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 11044044 FTS. Obat bebas terbatas

295. OPTIZYME

Optivate International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung protease, lipase, amilase, aminoglukosidase, xilanase, beta-glukanase, hemiselulase, selulase, pentosanase, selobiase dan alfa-galaktosidase **Indikasi** Memaksimalkan daya cerna dari total pakan. Meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan daya cerna dari bahan baku pakan yang berkualitas rendah dan mengurangi jumlah kotoran ternak. Mengurangi kandungan air dari kotoran ternak serta meningkatkan kondisi sekam menjadi lebih kering **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 01061955 FTS. 1. Obat bebas terbatas

296. OREGO – STIM LIQUID

**Meriden Animal Health Ltd, Inggris/
Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung carvacrol dan thymol (dari oreganum heracleoticum L) **Indikasi** Memperbaiki efisiensi pakan pada unggas, babi, sapi dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur pada pakan dengan dosis unggas: 150-300 ml/1.000 L air minum. Babi: 125-500 ml/1.000 L air minum. Sapi dan domba: 125 ml/1.000 L air minum selama 28 hari **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI** No. I. 12124409 FTC. Obat bebas terbatas

297. OREGO – STIM POWDER

**Meriden Animal Health Ltd, Inggris/
Swadesi Candrasentosa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung carvacrol dan thymol (dari oreganum heracleoticum L) **Indikasi** Memperbaiki efisiensi pakan pada unggas, babi, sapi dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur pada pakan dengan dosis unggas: 150-300 g/ton pakan. Babi: 250-500 g/ton pakan. Anak sapi dan domba: 1 g/10 kg BB/hari **Kemasan** Kantong 5 kg **Kementan RI** No. I. 12122470 FTS. 1. Obat bebas terbatas

- 298. ORO GLO DRY** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ekstrak xanthophyl dari bunga marigold (aktifitas 15 g/kg) **Indikasi** Pigmenter **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan target warna yang diinginkan **Kemasan** Kantong 20 kg **Deptan RI** No. I. 06021113 FTS. 2. Obat bebas terbatas
- 299. OVASTIM SP** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung spiramycin dipate 24.000.000 IU, vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit E 6.000 mg, vit K3 2.000 mg, vit B2 6.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 2.500 mg, vit C 20.000 mg, Ca-d-pantothenate 8.000 mg dan niasin 20.000 mg **Indikasi** Meningkatkan produksi telur, mempercepat start awal produksi, mengoptimalkan dan mempertahankan produksi puncak. Menanggulangi stress berat akibat serangan penyakit infeksius dan pada masa awal periode produksi serta membantu mengoptimalkan hasil vaksinasi **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g kedalam 2-4 L air selama 5-7 hari **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. D. 04012715 FTS. Obat bebas terbatas
- 300. OVASTIM** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung virginiamycine 20.000 mg, carnitine 20.000 mg, vitamin A 20.000.000 IU, vit D3 4.000.000 IU, vit E 15.000 mg, vit K3 7.000 mg, vit B2 12.000 mg, vit B6 8.000 mg, vit B12 60 mg, Ca-d-panthotenate 20.000 mg, niasin 40.000 mg dan asam folat 500 mg **Indikasi** Mempercepat masa pertumbuhan dan meningkatkan produksi serta berat telur. Memperbaiki kualitas kerabang dan karkas serta mempertahankan produksi puncak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2-4 L air minum selama 5-7 hari atau 500 g/ton pakan **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. D. 02081238 FTS. Obat bebas terbatas
- 301. OXICAPE 2** **Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung ethoxyquin 6,6%, BHT 2,5%, orthophosphoric acid 1,5%, citric acid 2,0%, silicic acid 3,4% dan calcium carbonat 84,0% **Indikasi** Antioksidan untuk bahan baku dan pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 125-1.000 g/ton pakan, tambahkan ke dalam pakan dan campur secara merata **Kemasan** Drum 25 kg, 200 kg dan kontainer 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 07043199 FTS. Obat bebas terbatas
- 302. OXIHOLD** **Kiotechagil, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung butylated hydroxyanisole, ethoxyquin, propyl gallate dan calcium carbonate **Indikasi** Sebagai antioksidan dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,1-0,2 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103324 FTS. Obat bebas terbatas
- 303. OXISTAT** **Agil, Callevark Park, Inggris/Bioadi Sasana**
Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung ethoxyquin, BHT dan BHA **Indikasi**

Antioksidan pada bahan baku pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 125 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 03052579 FTS. Obat bebas terbatas

- 304. OXY NIL RX DRY** **Nutri-Ad International bvba, Belgia/Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung ethoxyquin, BHT dan citric acid **Indikasi** Antioksidan pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan: 0,125 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 1209350 FTS. 1. Obat bebas terbatas

- 305. PAYLEAN PREMIX** **Elanco Animal Health, USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ractopamine HCl **Indikasi** Memperbaiki efisiensi pakan dan mengurangi kadar lemak didalam dan disekitar jaringan otot babi **Kemasan** Kantung 10 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102642 PKS. Obat keras

- 306. PELLTECH** **Borregaard Norway/Fenanza Putera**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung calcium lignosulphonate 850 g, magnesium 80 g dan air 70 g **Indikasi** Merupakan pellet binder yang dapat meningkatkan daya tahan pellet pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan ternak dengan dosis 1-10 kg/1.000 kg pakan ternak, tergantung dari apa yang dibutuhkan, peralatan pabrik, kondisi pencampuran, bahan baku dan formula **Kemasan** Bag 25 kg, 30 kg, 600 kg dan 750 kg **Kementan RI** No. I. 13104662 FTS.

- 307. PENERGETIC – T** **Penergetic International AG., Switzerlan/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Natural calcium carbonate **Indikasi** Sebagai antidefisiensi mineral untuk ternak sapi, babi, kuda, kambing, unggas dan hewan kecil **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan. Sapi: 1-2 g/hari/LSU (Live Stock Unit, dimana 1 ekor sapi = 1 LSU). Babi: dosis 20 g/ton pakan basah atau 50 g/ton pakan kering. Unggas: 20-50 g/ton pakan atau 2 mg/L air minum. Kuda: 3-5 g/hari. Kambing: 1 g/hari/LSU (1 ekor kambing dewasa = 0,1 LSU). Hewan kecil: 1-3 g/minggu **Kemasan** Karton box 2 kg **Deptan RI** No. I. 07083257 FTS. Obat bebas terbatas

- 308. PHARMASIN 10 PREMIX** **Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tilosin **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 09033571 FTS. Obat bebas terbatas

- 309. PHORCE** **Kiotechagil, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung propionic acid dan formic acid **Indikasi** Sebagai antijamur dalam pakan bahan baku pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,5-1 kg/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** **Deptan RI**. No. I. 11084121. FTS

- 310. PHYZYME XP 1.000 TPT** **Danisco Argentina SA Argentina untuk**
Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung 6-phytase **Indikasi** Feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Paper zak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063637 FTS. TM. Obat bebas terbatas
- 311. PHYZYME XP 10.000 TPT** **Danisco Argentina SA Argentina untuk**
Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung 6-phytase **Indikasi** Feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Paper zak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063636 FTS. TM. Obat bebas terbatas
- 312. PHYZYME XP 5.000 G** **Finnfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd,**
United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung 6-phytase **Indikasi** Feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Paper zak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09063634 FTS. TM. Obat bebas terbatas
- 313. PHYZYME XP 5.000 L** **Femic SA De CV, Mexico untuk Danisco (UK) Ltd,**
United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung 6-phytase **Indikasi** Feed additive pada pakan ayam, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Drum plastik 200 kg dan 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 09063635 FTC. TM. Obat bebas terbatas
- 314. POULTRY GROW** **Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung enzim protease dan yeast ekstrak **Indikasi** Memperbaiki produksi dan efisiensi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan pada pakan dengan dosis 150 g/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103315 FTS. Obat bebas terbatas
- 315. POULTRY MINERAL 2000** **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung iron, cobalt, manganese, copper, zinc, iodine dan selenium **Indikasi** Feed supplement pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1–1,5 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg **Deptan RI** No. I. 03112677 FTS. Obat bebas terbatas
- 316. POULTRY VITAMIN 21270** **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, nicotinic acid dan panthothenic acid **Dosis dan Cara Pemakaian** 350 g-1 kg/MT pakan unggas **Kemasan** Zak 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102640 FTS. Obat bebas terbatas
- 317. POULTRY SAR ME** **Biomim Singapore Pte. Ltd/Biomim Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Enterococcus sp., Pediococcus sp.,

Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp., silicate mineral dan fructooligosaccharida **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 kg dicampur/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 13034494 FTS. Obat bebas terbatas

318. POWER CHICKS

Hendy Pharmindo Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung virginiamycin 17.000 mg, vitamin A6.000.000 IU, vit D3 600.000 IU, vit E 2.500 mg, vit K3 1.000 mg, vit C 20.000 mg, vit B1 2.000 mg, vit B2 4.000 mg, vit B6 1.000 mg, vit B12 1 mg, Ca-d-Pantothenat 5.000 mg, nicotinamida 15.000 mg, asam folat 150 mg dan biotin 50 mg **Indikasi** Meningkatkan bobot badan, meningkatkan produksi telur, memperkuat daya tahan tubuh serta mempercepat kesembuhan setelah terserang penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari berturut-turut. Babi: 1 g/L air minum atau 1 g/kg pakan **Kemasan** 100 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 0203358 FTS. Obat bebas terbatas

319. PERFECT

Kiotechagil, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung organic acids **Indikasi** Sebagai acidifier dalam pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 1-10 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07103325 FTS. Obat bebas terbatas

320. PROCHICKGRIN

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sweet whey powder, soy concentrated dan delactosed whey powder **Indikasi** Sebagai skimmed milk powder replacer untuk anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 150 g/kg pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. D. 04092800 PTS. Obat bebas terbatas

321. PROCID

Morningbio, Korea/Bright International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung organic acid **Indikasi** Sebagai feed additive **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12084322 FTS. Obat bebas terbatas

322. PROFISH Ω POULTRY

Hendrix NV/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung corn gluten meal, soybean meal, yeast, salmon oil, methionine, lysin dan threonin **Indikasi** Sebagai feed supplement pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2-8% disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg dan 50 kg **Kementan RI** No. I. 12064284 FTS. Obat bebas terbatas

323. PROTEXIN CONCENTRATE

Probiotics International, Inggris/

Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lactobacillus acidophilus, lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus, lactobacillus rhamnosus, streptococcus salivarius subsp,

thermophilus dan enterococcus faecium **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas dan babi
Dosis dan Cara Pemakaian Pada unggas melalui pakan dosis: 50-150 g/ton. Pada babi dosis: 10-200 g/ton. Pada sapi dosis 75 g/ton melalui air minum dengan dosis: 1 g/L pada 5 hari pertama dan 1 g/4 L pada saat stress **Kemasan** Sachet 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 05103012 FTS. Obat bebas terbatas

324. PROVITA – 20

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung virginiamycine 20 g, vitamin A 2.500.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 1.000 IU, vit K3 500 mg, vit C 20.000 mg, vit B2 3.000 mg, vit B12 2.000 mcg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, niacinamide 1.500 mg dan laktosa ad 1.000 g **Indikasi** Dipakai pada ayam dan burung puyuh untuk mempercepat pertumbuhan. Membantu mengatasi stress, dan memperbaiki *feed efficiency*. Merangsang nafsu makan. Mempercepat proses penyembuhan setelah sakit. Meningkatkan produksi dan daya tetas telur serta memperpanjang masa bertelur **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g PROVITA-20® kedalam 2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 04092812 FTS. TM. Obat bebas terbatas

325. PULMOTIL PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tilmikosin **Indikasi** Pengobatan pneumonia pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04022067 FKS. 1. Obat keras

326. PUNCH LIQUID MOLD INHIBITOR

**Anitox Corporation, USA/
SHS International**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam propionate **Indikasi** Anti jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Drum 200 g dan 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 05061298 FTC. 2. Obat bebas terbatas

327. PUNCH

Anitox Corp-USA/SHS International

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam propionate **Indikasi** Anti jamur **Dosis dan Cara Pemakaian** Disemprot ke ransum 1-2 pounds/ton pakan **Kemasan** 200 L **Deptan RI** No. I. 05061298 FTC. 2. Obat bebas terbatas

328. PX – X4DM

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, Se dan flavomycin **Indikasi** Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082983 FTS. Obat bebas terbatas

329. PX – X5BM

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, Se dan zinc bacitracin **Indikasi** Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082980 FTS. Obat bebas terbatas

- 330. PX – Y1AM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Mn, Zn I, Se dan monensin **Indikasi**
Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan**
Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082979 FTS. Obat bebas terbatas
- 331. PX – Y1ATM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, Se, 3-nitro dan zinc
bacitracin **Indikasi** Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian**
Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082982 FTS. Obat
bebas terbatas
- 332. PX – Y1CM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Mn, Zn I, Se dan monensin **Indikasi**
Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan**
Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082976 FTS. Obat bebas terbatas
- 333. PX – Y20TM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, Se dan zinc bacitracin
Indikasi Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada
Kemasan Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082978 FTS. Obat bebas terbatas
- 334. PX – Y2AM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Mn, Zn I, Se dan salinomycin **Indikasi**
Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan**
Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082975 FTS. Obat bebas terbatas
- 335. PX – Y2DM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, Se dan zinc bacitracin
Indikasi Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada
Kemasan Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082987 FTS. Obat bebas terbatas
- 336. PX – Y3AM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Mn, Zn, I, Se dan zinc bacitracin
Indikasi Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada
Kemasan Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082985 FTS. Obat bebas terbatas
- 337. PX – Y3DM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Mn, Zn, I, Se dan zinc bacitracin
Indikasi Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada
Kemasan Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082981 FTS. Obat bebas terbatas

- 338. PX – Z5AM** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, Se dan zinc bacitracin
Indikasi Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082986 FTS. Obat bebas terbatas
- 339. QUANTUM 2500 TR** **AB Vista, UK/Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung phytase 2.500 FTU **Indikasi** Feed additive untuk pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk ayam dan babi campuran 100-1.000 g/ton pakan **Kemasan Sak @ 25 kg Kementan RI** No. I. 11104157 FTS. Obat bebas terbatas
- 340. QUIXALUD** **Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung chlorhydroxyquinoline (halquinol) **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas, babi dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas, untuk meningkatkan dan memperbaiki konversi pakan dosis: 75-100 g/ton pakan. Untuk babi dosis: 50-200 g/ton pakan. Untuk pengobatan wet dropping (diare non spesifik) dosis: 1 kg/ton pakan selama 7-10 hari dan lanjutkan pengobatan selama 24 jam setelah diare berhenti **Kemasan** Kantong 20 kg **Deptan RI** No. I. 0506141 FTS. 2. Obat bebas terbatas
- 341. REDOX T** **Industrial Kern, Spain/Waris**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap kg mengandung ethoxyquin 98% 50 g, butil hidroksi toluen (BHT) 20 g, mono-digliserid 30 g, propil galate 10 g, asam sitrat 20 g, asam posfat 60 g dan mineral carrier 810 g **Indikasi** Sebagai antioksidan **Dosis dan Cara Pemakaian** 125 g dicampur merata dalam 1 ton pakan ternak/bahan baku **Kemasan** 25 kg kantong aluminium **Deptan RI** No. I. 04022725 FTS. Obat bebas terbatas
- 342. RHODEGG** **Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Spiramisin adipat, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, asam nikotinat dan Ca-d-pantotenat **Indikasi** Penggertak pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Sachet 100 g dan kantong 1 kg **Deptan RI** No. D. 0801455 FTS. 3. Obat bebas terbatas
- 343. RICAN PREMIX POWDER** **Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/Yung Shin Pharmaceutical Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung colistine sulphate 1.900.000 IU **Indikasi** Untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: starte 100g/ton pakan. Finisher 20-50g/ton pakan. Babi: starter 200-400g/ton pakan. Grower 50-100g/ton pakan. Finisher 20-50g/ton pakan **Kemasan** Kantong 20 kg **Kementan RI** No. I. 13034465 FTS. Obat keras

344. RONOZYME AX (CT)

**Rovithai Limited, Thailand/
DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung α -amylase, endo-xylanase dan endo- β -glukanase **Indikasi** Sebagai feed additive pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung @ 20 kg **Kementan RI** No. I. 11104172 FTS. Obat keras

345. RONOZYME PROACT (CT) **Novozyme Latin America Ltda., Brazil dan Novozyme A/S, Denmark/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung protease **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung @ 20 kg **Kementan RI** No. I. 12024214 FTS.

346. ROSAN PREMIX

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bacitracin MD, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B6, vit C, nicotinamide, methionine, lysine, Fe, Mg, Mn, Cu dan antioxidant **Indikasi** Meningkatkan produksi telur dan memacu pertumbuhan serta meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 2-3 kg/ton pakan. Layer dan breeder: 3,5-5 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg: isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 0501120 FTS. 1. Obat bebas terbatas

347. ROVABIO MAX AP

Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim xylanase, glucanase dan phytase **Indikasi** Premiks pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Karton 25 kg **Deptan RI** No. I. 09013546 FTS. Obat bebas terbatas

348. ROVABIO™ EXCEL AP

Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung endo-1,4-b-xylanase N EC 3.2.1.8 dan endo-1,3 (4)-b-glukanase N EC 3.2.1.6 **Indikasi** Feed suplemen pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur pada pakan aduk hingga merata. Dosis starter, grower, finisher 500 g/ton pakan **Kemasan** Dos 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102659 FTS. Obat bebas terbatas

349. ROVABIO™ EXCEL LC

Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung endo-1,4-b-xylanase N EC 3.2.1.8 dan endo-1,3 (4)-b-glukanase N EC 3.2.1.6 **Indikasi** Feed suplemen pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur pada pakan dan air minum. Dosis 1 ml/10 L air minum dan diberikan mulai umur 1 hari sampai panen **Kemasan** Drum 200 L **Deptan RI** No. I. 03102660 FTC. Obat bebas terbatas

350. RUMENSIN 200 PREMIX

Elanco Animal Health-USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung monensin **Indikasi** Memperbaiki feed

efficiency dan mencegah koksidirosis **KontraIndikasi** Tidak untuk kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** 50 mg-30 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 04042245 FTS. 1. Obat bebas terbatas

351. SALINDOX 120 BMP

DOX-AL Italia SpA. Italy/Catur Nawa

Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Setiap kg mengandung 120 g salinomycin sodium **Indikasi** Antikoksidia untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 500 g ke dalam 1 ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 04022726 FTM. Obat bebas terbatas

352. SALKIL

Kiotechagil, United Kingdom/Jebesen & Jessen Chemicals Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ammonium propionate, ammonium formate, formic acid dan propionic acid **Indikasi** Sebagai antimold dalam pakan atau bahan baku pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan atau bahan baku pakan sebesar 2 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0609712 FTS. Obat bebas terbatas

353. SALTEC 501

Linq Technology Corporation, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kalsium fosfat, asam propionat, asam format, asam benzoat dan asam fosfat **Indikasi** Pencegah pertumbuhan jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung HDPE 25 kg **Deptan RI** No. I. 08053425 FTS. Obat bebas terbatas

354. SALTEC 511

Linq Technology Corpiration, Thailand/Tirta Niaga Sejahtera

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam propionat **Indikasi** Pencegah pertumbuhan jamur pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Drum 200 Kg **Deptan RI** No. I. 08083470 FTC Obat bebas terbatas

355. SANBE – MIX A

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Zn bacitracin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, choline chloride, nicotinic acid, manganese, iron, iodine, zinc, cobalt, copper, methionine, lysine dan antioxidant qs **Indikasi** Meningkatkan produksi dan daya tetas telur. Meningkatkan pertumbuhan dan pertambahan berat badan. Melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino. Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan serta membuat warna kuning telur lebih cerah dan bulu lebih mengkilap **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 2 g/kg pakan. Layer: 5 g/kg pakan. Breeder: 5-7 g/kg pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 06083102 FTS. Obat bebas terbatas

356. SANBE – MIX B

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Zn bacitracin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, choline chloride, nicotinic acid,

manganese, iron, iodine, zinc, cobalt, copper, methionine, lysine dan antioxidant qs **Indikasi** Meningkatkan produksi telur (layer) dan pertumbuhan badan (broiler). Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino. Meningkatkan nafsu makan serta mencegah iritasi usus dan kelumpuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 2 g/kg pakan. Layer: 5 g/kg pakan. Breeder: 5-7 g/kg pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 06083103 FTS. Obat bebas terbatas

357. SANBE – MIX C

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Zn bacitracin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, choline chloride, nicotinic acid, manganese, iron, iodine, zinc, cobalt, copper, methionine, lysine dan antioxidant qs **Indikasi** Meningkatkan produksi telur (layer) dan pertumbuhan badan (broiler). Melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino dan meningkatkan daya tahan tubuh serta mengatasi stress. Membuat warna kerabang telur lebih baik dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 2 g/kg pakan. Layer: 5 g/kg pakan. Breeder: 5-7 g/kg pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 06083104 FTS. Obat bebas terbatas

358. SANBE – MIX D

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Zn bacitracin, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, choline chloride, nicotinic acid, manganese, iron, iodine, zinc, cobalt, copper, methionine, lysine dan antioxidant qs **Indikasi** Meningkatkan produksi telur (layer) dan pertumbuhan badan (broiler). Melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino. Membantu pembentukan tulang dan kulit telur menjadi lebih baik dan kuat dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 2 g/kg pakan. Layer: 5 g/kg pakan. Breeder: 5-7 g/kg pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 06083105 FTS. Obat bebas terbatas

359. SANMIX – B

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bacitracin MD, vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, niacin, methionine, lysine, manganese, iron, iodine, zinc, cobalt, copper dan antioxidant **Indikasi** Meningkatkan produksi telur dan memacu pertumbuhan. Melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino. Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan meningkatkan daya tahan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 1-2 kg/ton pakan. Layer dan breeder: 2-3 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 0104695 FTS. Obat bebas terbatas

360. SANTOQUIN LIQUID

Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ethoxyquin 91% **Indikasi** Sebagai

antioksidan cair pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 12114386 FTS.

361. SANTOQUIN MIXTURE 6 **Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ethoxyquin 66,6% **Indikasi** Sebagai antioksidan pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Kementan RI** No. I. 12094356 FTS.

362. SELACID DRY **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai feed additive **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,75-7,0 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 11074117 FTS. Obat bebas terbatas

363. SELACID GREEN GROWTH P LIQUID **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai acidifier pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,4-1 kg/ton pakan **Kemasan** Can 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073859 FTS. Obat bebas terbatas

364. SELACID GREEN GROWTH P MP **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik **Indikasi** Sebagai acidifier pada makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,4-1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073859 FTS. Obat bebas terbatas

365. SELKO PH **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung asam organik dan copper **Indikasi** Sebagai feed additive **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-3 L/1.000 L air minum **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 11074118 FTS. Obat bebas terbatas

366. SELDOX HM DRY **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ethoxyquin, BHT dan BHA **Indikasi** Sebagai antioksidan pada bahan baku dan makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 07093285 FTS. Obat bebas terbatas

367. SELFEED CF **Sinsui Inc, Jepang/Farmadika Sejahtera Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk putih hingga kecoklatan **Komposisi** Mengandung protease, amylase, cellulase, lipase dan pectinase **Indikasi** Untuk memfasilitasi pencernaan dari pakan hewan ternak **Perhatian** Simpan dalam ruang sejuk kering serta hindari dari kelembaban. Gunakan seluruhnya sesegera mungkin setelah **Kemasan** dibuka pertama kali **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi: campurkan 0,05 % ke dalam pakan, tambahkan 500 g pada 1 ton pakan **Kemasan** 5 kg **Deptan RI** No. I. 10013768 FTS. Obat bebas terbatas

- 368. SEL – PLEX 2000** **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selenium yeast dan brewers dried yeast
Indikasi Sumber selenium organik untuk pakan ternak, unggas dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,15-0,3 ppm pada pakan jadi. Penggunaannya dicampurkan ke dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 10053836 FTS. Obat bebas terbatas
- 369. SEL – PLEX 2700** **Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selenium yeast dan brewers dried yeast
Indikasi Sumber selenium organik untuk pakan ternak, unggas dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 111 g/ton pakan. Penggunaannya dicampurkan ke dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11054087 FTS. Obat bebas terbatas
- 370. SEL – PLEX 3000** **Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selenium yeast dan brewers dried yeast
Indikasi Sumber selenium organik untuk pakan ternak, unggas dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 100 g/ton pakan. Penggunaannya dicampurkan ke dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11124185 FTS. Obat bebas terbatas
- 371. SEL – PLEX** **Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selenium yeast **Indikasi** Sumber selenium organik untuk pakan ternak, unggas dan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** 300 g/ton pakan. Penggunaannya dicampurkan ke dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102670 FTS. Obat bebas terbatas
- 372. SIL – ALL WATER SOLUBLE** **Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung fermentasi kering: *Lactobacillus plantarum*, *Enterococcus faecium* dan *Pediococcus acidilactici*, dextrose, sodium aluminosilicate, serta ekstrak fermentasi kering: *Aspergillus niger* dan *Bacillus subtilis* **Indikasi** Bahan campuran bakteri untuk persiapan pembuatan silase untuk ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** Satu kantung (250 g) cukup untuk 25 ton legume jenis alfalfa, silase biji-bijian kecil atau biji-bijian dengan kadar air tinggi. Satu kantung (250 g) untuk perlakuan 50 ton silase jagung atau sorghum. Campurkan satu kantung (250 g) ke dalam 5–10 L air dan encerkan sampai 50 L – campur sampai homogen. Tambahkan ke silase sebanyak 2 L/ton legume, biji-bijian kecil atau biji-bijian dengan kadar air tinggi. 1 L/ton jagung atau sorghum **Kemasan** Sak 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073650 FTS. Obat bebas terbatas
- 373. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g GRANULAR** **Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/Brenntag**
Bentuk Sediaan Granular Komposisi Mengandung phytase, corn cob meal dan corn starch

Indikasi Feed additive untuk unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan babi, broiler dan bebek pedaging: 100 g/ton pakan. Ayam petelur: 50-70 g/ton. Bebek petelur : 70-90 g/ton pakan **Kemasan** Kraft paper bag 20 kg **Kementan RI** No. I. 11094151 FTM. Obat bebas terbatas

374. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g LIQUID

Beijing Smile Feed SCI

& Tech. Co., Ltd, China/Brenntag

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung phytase **Indikasi** Feed additive untuk unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan babi, broiler dan bebek pedaging: 100 g/ton pakan. Ayam petelur: 60-80 g/ton. Bebek petelur: 80-100 g/ton pakan **Kemasan** Jerigen 20 kg dan drum 200 kg **Kementan RI** No. I. 1124190 FTC. Obat bebas terbatas

375. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g POWDER

Beijing Smile Feed SCI

& Tech. Co., Ltd, China/Brenntag

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung phytase dan corn cob meal **Indikasi** Feed additive untuk unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Pakan babi, broiler dan bebek pedaging: 100 g/ton pakan. Ayam petelur: 60-80 g/ton. Bebek petelur: 80-100 g/ton pakan **Kemasan** Kraft paper bag 20 kg **Kementan RI** No. I. 11094152 FTS. Obat bebas terbatas

376. SOLUBLE ORGANIC GREEN CULTURE

HanPoong-Korea/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *saccharomyces cerevisiae* dan *lactobacillus acidophilus* **Indikasi** Feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-3 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 1 kg dan 20 kg **Deptan RI** No. I. 03112684 FTS. Obat bebas terbatas

377. SORB – IT

Anitox Corp-USA/SHS International

Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung Al, Mg dan Si **Indikasi** Menetralkan aflatoksin **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-5 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 05021428 FTS. 2. Obat bebas terbatas

378. SORBATOX

Kiotechagil, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung hydrated aluminium silicate **Indikasi** Sebagai adsorben mycotoxin pada pakan ternak dan aquaculture **Dosis dan Cara Pemakaian** Tingkatan umum penggunaan sorbatox yang terkontaminasi ringan adalah 2,5 kg/ton. Jika diperkirakan jumlah aflatoksin telah diketahui maka dosis yang digunakan adalah alfatoxin < 20 ppb sorbatox 1 kg/ton, 20-40 ppb sorbatox 2 kg/ton, 40-60 ppb sorbatox 3 kg/ton, 60-80 ppb sorbatox 4 kg/ton, > 80 ppb sorbatox 5 kg/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 02112459 FTS. Obat bebas terbatas

379. SPECILAC 41% LACTOSA

LNB, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung protein, lemak, serat kasar, mineral, laktosa, lisin, metionin, cistin, triptofan, treonin, kalsium dan fosfor **Indikasi** Sebagai susu

pengganti **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di dalam pakan 1-25% **Kemasan** 25 kg/zak **Kementan RI** No. I. 12051869 OHK. 2. Obat bebas terbatas

380. SPECILAC RED

LNB, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung protein, lemak, serat kasar, mineral, laktosa, lisin, metionin, cistin, triptofan, treonin, kalsium dan fosfor **Indikasi** Sebagai susu pengganti **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di dalam pakan. Babi: 5-25%. Sapi: 10-20%. Kambing: 10-20% **Kemasan** 25 kg/bag **Kementan RI** No. I. 1205159 OHK. 1. Obat bebas terbatas

381. SPIRADEGG

Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung spiramicine adipate 50 g, vitamin A 6.500.000 IU, vitamin D3 1.000.000 IU, vitamin E 10.000 mg, vitamin K3 1.000 mg, vitamin C 30.000 mg, vitamin B1 2.000 mg, vitamin B2 4.000 mg, vitamin B6. 2.000 mg, vitamin B12 5.000 mg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, niacine 15.000 mg dan folic acid 250 mg **Indikasi** **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 5 g/10 L air minum, selama 5 hari berturut-turut dalam sebulan bertujuan meningkatkan produksi telur. Babi: 1 g/10 L air minum dicampur ransum basah selama 5 hari berturut-turut dalam sebulan **Kemasan** Sachet 250 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 06013032 GTS. Obat bebas terbatas

382. STAFAC – 500

Phibro Animal Health, USA/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung virginamisin **Indikasi** Pemacu pertumbuhan pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler starter: 10-40 g/ton pakan. Broiler finisher: 10-20 g/ton pakan. Layer: 10-40 g/ton pakan. Babi prestarter: 80 g/ton pakan. Babi starter-grower: 40 g/ton pakan. Babi finisher: 20 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 1110502 FTS. 3. Obat bebas terbatas

383. STAMIX 20

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung virginiamisin **Indikasi** Penggertak pertumbuhan growth promoter pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 250-500 g/100 kg pakan. Babi: 250-1.000 g/100 kg pakan **Kemasan** Kantung plastik 500 g **Deptan RI** No. D. 0509675 FTS. 3. Obat bebas terbatas

384. STAMIX SP 500

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung virginiamisin **Indikasi** Meningkatkan penampilan produksi ternak dan mengendalikan kasus nekrotik enteritis **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 100-200 g/ton pakan. Babi/sapi: 100-400 g/ton pakan. Ikan: 200-300 g/ton pakan. Udang: 400-600 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. D. 12101190 FTS. 1. Obat bebas terbatas

385. STRONG – VIT

Multifarma Satwa Maju

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit C

100.000 mg, vit D3 1.200.000 IU, vit E 12.000 mg, vit K3 1.200 mg, vit B1 1.200 mg, vit B2 3.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 5.000 mcg, Ca-d-pantothenate 5.000 mg, niacine 15.00 mg, folic acid 250 mg dan biotin 150 mg **Indikasi** Untuk peningkatan kualitas ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pertumbuhan dan produktivitas: 1 g/2 L air minum diberikan setiap hari. Saat wabah penyakit: 1 g/6 L air minum **Kemasan** 250 g **Deptan RI** No. D. 07103333 PTS.

386. SUNNY BINDER

Zhejiang University Sunny Nutrition Technology Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung polymethylolcarbamide (PMC) **Indikasi** Sebagai bahan pengikat pakan sebelum proses pelleting **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebelum proses pelleting dengan dosis: Pakan ikan: 2–4 kg/ton. Pakan udang: 2–5 kg/ton. Pakan ayam: 1–2 kg/ton. Pakan babi: 1–2 kg/ton. Pakan kelinci: 1–2 kg/ton **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 11044052 FTS. Obat bebas terbatas

387. SUNPHASE G

Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. - China/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung phytase min. 5.000 U/g **Indikasi** Sebagai enzim pengurai phytic acid (phytate) dalam pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan komplet sebesar 100–200 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10103928 FTS. Obat bebas terbatas

388. SUNPHASE L

Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. – China/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung phytase min. 5.000 U/ml **Indikasi** Sebagai enzim pengurai phytic acid (phytate) dalam pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan komplet sebesar 100 ml/ton pakan **Kemasan** Drum 25 kg **Deptan RI** No. I. 10103927 FTC. Obat bebas terbatas

389. SUPER – LUBE

Uniscope Inc., USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sodium salts of fatty acids (yang berasal dari minyak tumbuh-tumbuhan) **Indikasi** Sebagai lubricant (pelicin) untuk membantu proses pembuatan pellet **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 1–2 kg/ton pakan atau bahan baku pakan yang akan dibentuk menjadi pellet **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05062934 FTS. Obat bebas terbatas

390. SURMAX 100 PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung avilamycin **Indikasi** Growth promoter **Dosis dan Cara Pemakaian** 50–400 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 04091645 FTM. 2. Obat bebas terbatas

391. SURMAX – 200 PREMIX

Elanco Animal Health, USA/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung avilamycin **Indikasi** Feed additive pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 06063082 FTM. Obat bebas terbatas

- 392. TECHNOMOS** **Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *saccharomyces cerevisiae* kering **Indikasi** Sebagai pada unggas untuk meningkatkan populasi mikroflora menguntungkan dalam saluran pencernaan. Meningkatkan efisiensi absorpsi zat makanan di dalam usus, mengoptimalkan performa unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan 0,5-1,0 kg/ton pakan unggas (layer, broiler, kalkun) **Kemasan** Kantung @ 20 kg **Kementan RI** No. I. 11044056 FTS. Obat bebas terbatas
- 393. TERMIN 8 LIQUID** **Anitox Corporation, USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung formaldehid, asam propionat dan natural terpenes **Indikasi** Antifungi pada bahan baku pakan ternak dan pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Drum HDPE 200 kg dan 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 07116123 FTS. 2. Obat bebas terbatas
- 394. TERMIN 8 POWDER** **Anitox Corporation, USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung asam propionat dan verxite granul **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05091423 FTS. 2. Obat bebas terbatas
- 395. TERMITOX** **Cevasa SA, Argentina/Biotek Sarana Industri**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ambrosit (aluminosilikat) **Indikasi** Mengatasi masalah mikotoksin pada pakan unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur ke pakan dengan dosis 1-4 kg/ton pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073672 FTS. Obat bebas terbatas
- 396. TIMING GOLD** **Kofavet Special, Korea/Bright International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung tylosin phosphate **Indikasi** Sebagai feed additive **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan: Babi sebesar 0,2-0,4 kg/ton pakan. Unggas sebesar 0,05-0,5 kg/ton pakan. Sapi pedaging sebesar 0,08-0,1 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 13014422 FTS. Obat bebas terbatas
- 397. TN OX** **Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ethoxyquin, BHT dan BHA **Indikasi** Sebagai antioksidan pada bahan baku dan makanan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 11064109 FTS. Obat bebas terbatas
- 398. TOXFIN™ DRY** **Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Kemin Indonesia/Satwa Jawa Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sepiolite, bentonite, Ca propionate, sod chloride, silica dan BHA **Indikasi** Peningkatan toksin untuk mengurangi kontaminasi semia

jenis mikotoksin pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan ternak **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 09033573 FTS. Obat bebas terbatas

399. TOXIBAN AM

Novus Carotenoid S.A./Novus Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bentonite montmorillonite, ammonium karbonat dan gelling agent **Indikasi** Mengatasi masalah mikotoksin pada pakan unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur ke pakan dengan dosis 0,5-2 kg/ton pakan **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 03052578 FTS. Obat bebas terbatas

400. TOXIBOND

Biomix SA, Columbia untuk Vitusa Corp USA/

Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Al HSCAS **Indikasi** Toxin binder **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 kg/ton **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 09053616 FTS. Obat bebas terbatas

401. TOXIDEX

Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sodium dan alumino silikat **Indikasi** Feed additive pada pakan dan bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan dan bahan baku pakan. Bergantung pada tingkatan kontaminasi dari sereal atau pakan. Dosis biasanya 1-3 kg/ton dari produk yang diberikan perlakuan **Kemasan** Kantong 1 kg, 5 kg, 15 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. I. 11034018 FTS. Obat bebas terbatas

402. TOXISORB CLASSIC

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman/

Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bentonite **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Serbuk dicampurkan ke dalam pakan. 1-4 kg/ton pakan tergaantung pada tingkat kontaminasi mycotoxin dan intensitas gejala mycotoxicosis pada hewan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Kementan RI** No.I. 10113940 PTS. Obat bebas terbatas

403. TOXISORB PREMIUM

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman/

Bayer Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung alkaline activated bentonite EXM 1454 dan organophilic activated bentonite EX 0473 **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Serbuk dicampurkan ke dalam pakan. 1-4 kg/ton pakan tergantung pada tingkat kontaminasi mycotoxin dan intensitas gejala mycotoxicosis pada hewan **Kemasan** Kantung @ 25 Kg **Kementan RI** No. I. 11104163 FTS. Obat bebas terbatas

404. TOXO MX

Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung bentonite-montmorillonite **Indikasi** Sebagai toxin binder pada pakan unggas, babi dan ruminansia **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas dan babi: 1-5 kg/ton pakan. Ruminansia: 50-200 g/ekor/hari **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 13084594 FTS. Obat bebas terbatas

- 405. TOXO XL** **Selko BV., The Netherlands/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung bentonite-montmorillonite **Indikasi** Sebagai toxin binder pada pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2,5 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. I. 12064285 FTS. Obat bebas terbatas
- 406. TYLAN 100 PREMIX** **Elanco Animal Health, USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tilosin fosfat **Indikasi** Sebagai penggertak pertumbuhan pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 50 lbs (22,7 kg) **Deptan RI** No. I. 1102817 FTS. 1. Obat bebas terbatas
- 407. TYLAN 40 PREMIX** **Elanco Animal Health, USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tilosin **Indikasi** Feed additive pada pakan babi, sapi dan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 50 lbs **Kementan RI** No. I. 11111001 FTS. 3. Obat bebas terbatas
- 408. TYLOGRIMIX** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tylosin phosphat **Indikasi** Meningkatkan berat badan dan memperbaiki FCR unggas dan babi **KontraIndikasi** Pada pasien yang hypersensitif terhadap tylosin **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam: 100 g-250 g/ton pakan. Babi: 0,5 kg/ton pakan diberikan 14 hari lepas masa sapih **Kemasan** Aluminium foil 1 kg, sak 25 kg **Deptan RI** No. D. 08103517 FTS. Obat bebas terbatas
- 409. VALOSIN FG 50** **ECO Animal Health, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tylvalosin tartrate **Indikasi** Untuk pencegahan penyakit enzootic pneumonia pada babi dan untuk pencegahan mycoplasma pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan. Ayam: 0,2 kg/ton pakan. Babi: 0,4 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 08083476 FTS. Obat bebas terbatas
- 410. VALOSIN WATER SOLUBLE** **ECO Animal Health, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung tylvalosin tartrate **Indikasi** Untuk pencegahan penyakit enzootic pneumonia pada babi dan untuk pencegahan mycoplasma pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam air minum. Ayam: 25 g/400 L air. Babi: 25 g/250 L air **Kemasan** Sachet 25 g **Deptan RI** No. I. 11044075 PKS. Obat keras
- 411. VANNAGEN** **Chemo Forma AG, Switzerland/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung *S. Cerevisiae* **Indikasi** Untuk pertumbuhan, fertilitas dan pembenihan pada ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Drum 25 kg **DKP RI** No. I. 060742 PTS. Obat bebas terbatas

412. VETILAC 41% LACTOSA

Joosten, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung protein, lemak, serat kasar, mineral, laktosa, lisin, metionin, cistin, triptofan, treonin, kalsium dan fosfor **Indikasi** Sebagai susu pengganti pada semua pakan ternak. Sebagai sumber protein dalam campuran pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di dalam pakan. Babi: 5-30%. Anak sapi: 10-30%. Broiler: 3-7%. Bebek: 4-7%. Kalkun: 3-8%. Kambing: 15-20%. Udang: 3-8% **Kemasan** 25 kg/zak **Deptan RI** No. I.02071865 OHK. 1.

413. VITAEGGS

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung virginiamisin, vitamin A, vit D, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, niasinamid, Ca-d-panthotenat dan asam folat **Indikasi** Pemicu pertumbuhan dan menekan kasus nekrotik enteritis pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 g/6 L air minum **Kemasan** Ember plastik 5 kg @ sachet 250 g **Deptan RI** No. D. 0310456 FTS. 2. Obat bebas terbatas

414. VITAKUR

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk larut air Komposisi Setiap 1.000 g mengandung ekstrak *Curcuma domestica* (kunyit) 20.000 mg, ekstrak *Curcuma xanthoriza* (temulawak) 5.000 mg, vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 2.000 IU, vit K3 1.000 mg, vit B12 2.000 mcg, vit C 10.000 mg, methionine 30.000 mg dan lysine 20.000 mg **Indikasi** Meningkatkan nafsu makan. Memperbaiki pencernaan. Memperbaiki/memulihkan kesegaran tubuh dan mencegah defisiensi vitamin **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan dalam air minum: 1 g dalam 2 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** Sachet 250 g, kemasan induk 1 kg dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 03042572 PTS. TM Obat bebas terbatas

415. VITAMINOACIDOS

Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, vit K3, kalsium pantotenat, nikotinamida, kolin klorida, L – Lisin, DL – Metionin, L – Threonin dan L – Triptofan **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan asam amino pada semua jenis hewan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam air minum dengan dosis 0,25-0,50 cc/L air minum **Kemasan** Botol 1 L dan 5 L **Kementan RI** No. I. 11074121 PTC. Obat bebas terbatas

416. V – MAX

Phibro Animal Health Corp., USA/Indovetraco Makmur Abadi

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung virginiamycin dan sodium carboxymethylcellulose **Indikasi** Feed additive pada pakan ayam petelur, kalkun, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di dalam pakan. Ayam petelur: 40 g/ton. Babi: 10-40 g/ton, Kalkun: 10-14 g/ton. Sapi: 30-80 g/ton **Kemasan** 25 kg/bag **Kementan RI** No. I. 13014434 FTS. Obat bebas terbatas

417. WATER TREATMENT

Nutri-Ad International bvba, Belgia/Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung lactic acid, formic acid, propionic acid dan

acetic acid **Indikasi** Meningkatkan aktivitas antimikroba pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Botol 1 L, drum 25 kg, 200 kg dan container 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 03122692 FTC. Obat bebas terbatas

418. WHEAT EASE – M (LIQUID) Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enzim beta-mannanase dan enzim xylanase **Indikasi** Untuk mengurai anti nutrisi dari golongan NSP (Non Starch Polysacharida) dalam pakan ternak unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 0,110 L ke dalam 0,890 L air kemudian semprotkan 1 L dari campuran larutan ini ke dalam 1 ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Drum 104 L **Deptan RI** No. I. 09123759 FTC. Obat bebas terbatas

419. WHEAT EASE – M (POWDER) Elanco Animal Health, USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim beta-mannanase dan enzim xylanase **Indikasi** Untuk mengurai anti nutrisi dari golongan NSP (Non Starch Polysacharida) dalam pakan ternak unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 120-200 g/ton pakan atau bahan baku pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 08123529 FTS. Obat bebas terbatas

420. WISEDEM GOLDEN Y – 20 Guangzhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd – China/

Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung saponified marigold oleoresin, defatted rice bran, ethoxyquin dan SiO_2 **Indikasi** Sebagai bahan tambahan alami dalam pakan (feed additive) untuk meningkatkan kualitas warna kuning telur (egg yolk) **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan unggas sebesar 300-2.000 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 10123961 FTS. Obat bebas terbatas

421. WISEDEM RED

Guangzhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd – China/

Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung canthaxanthin, white sugar, gluten, ethoxyquin dan corn starch **Indikasi** Untuk pigmentasi optimum pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan dengan dosis 5–250 g/ton pakan ke dalam pakan ayam broiler, ayam petelur ataupun bebek layer. Produk akan lebih berkhasiat jika dicampur dengan pigmen kuning alami **Kemasan** Kantung 5 kg **Deptan RI** No. I. 10103914 FTS. Obat bebas terbatas

422. WONDER POULTRY EGG FORMULA

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit E, vit K3, kalsium pantotenat, NaCl, KCl, DL-methionine, MgSO_4 dan MnSO_4 **Indikasi** Mencegah dan mengatasi defisiensi vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan melalui air minum. Stress dan gangguan penyakit: 1 g dilarutkan ke dalam 1 L air minum. Memperbaiki pertumbuhan: 1 g dilarutkan ke dalam 2 L air minum. Kestabilan produksi: 1 g

dilartukan ke dalam 4 L air minum **Kemasan** 5 g, 10 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 09103726 PTS. Obat bebas terbatas

423. WONDER ZEOLIT

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Ca, Mg, Na_2O , K_2O , TiO_2 dan P_2O_5 **Indikasi** Meningkatkan fisiensi penggunaan pakan 5-10%. Kotoran yang mengandung wonder zeolit dapat dipergunakan untuk pupuk tanaman. Telur lebih kuat, tidak mudah pecah **Dosis dan Cara Pemakaian** 2-4 kg/100 kg pakan. Pada system kandang postal dengan cara memberi wonder zeolit pada tempat pakan ekstra sebanyak 10 buah/1.000 ekor. Pada system kandang batere zeolit ditaburkan pada tempat pakan. Dianjurkan memakai wonder zeolit jenis tepung 60-7 mesh **Kemasan** 50 kg **Deptan RI** No. D. 05101246 PTS. 1. Obat bebas terbatas

424. WOOGENE COLISTIN 150

WooGene B&G, Korea/Novindo Agritech Utama

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung colistin sulfate 15% **Indikasi** Feed additive. Pencegahan dan pengobatan penyakit saluran pencernaan pada ayam, babi dan sapi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yang sensitif terhadap colistin **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas melalui pakan dosis: 2-20 ppm. Pada babi dosis: 5-40 ppm. Pada sapi dosis: 2-40 ppm **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 11044042 FTS. Obat bebas terbatas

425. XAMACOL – 40

Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung marigold (*tagetes erecta*) ekstrak dan ethoxyquin **Indikasi** Untuk pigmentasi pada warna kuning telur dan kulit ayam broiler **Dosis dan Cara Pemakaian** Pemakaian dicampur ke dalam pakan **Kemasan** Alufoil 1 kg, bag 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073670 FTS.

426. YEA – SACC 1026

**Alltech Inc., USA; Alltech Biotechnology Corp. Ltd-Thailand/
Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *saccharomyces cerevisiae* yang ditumbuhkan pada media jagung. Diastatic malt dan molasses, dikeringkan untuk mengawetkan aktifitas fermentasinya **Indikasi** Sediaan kultur yeast hidup berkonsentrat yang digunakan sebagai suplemen pakan pada hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi potong receiving rations: 2 kg/ton. Growing calves: 1 kg/ton. Finishing rations: 0,5 kg/ton. Sapi perah calf starter: 2 kg/ton. Grower: 1 kg/ton. Lactating/dry cows: 1 kg/ton. Babi prestarter/starter: 2 kg/ton. Starter/grower: 0,25 kg/ton. Grower: 2 kg/ton. Finisher: 1 kg/ton. Gestation: 1 kg/ton. Pre-farrowing/laktasi: 2-3 kg/ton. Unggas broiler/layer/kalkun: 2 kg/ton **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 06061492 FTS. 1. Obat bebas terbatas

427. YEA – SACC TS

Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung kultur yeast *saccharomyces cerevisiae* **Indikasi** Yeast yang berkonsentrat untuk ditambahkan pada pakan hewan ternak dan unggas

Dosis dan Cara Pemakaian Tambahkan sebanyak 1,0-2,5 g/ekor/hari pada pakan hewan ternak dan unggas **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11104162 FTS. Obat bebas terbatas

428. YIDUOZYME 9180

Guangdong VTR Bio-tech Co. Ltd. China/

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung xylanase, acidic protease, alpha amylase dan malt mineral **Indikasi** Memperbaiki pencernaan dan konversi pakan pada babi **Perhatian** Jika masih ada sisa setelah dibuka, tutup kembali dan hindari kelembaban **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton pakan, dosis dapat dirubah sesuai formula pakan dengan range berkisar antara 0,5-1,2 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung tinfoil 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073646 FTS. Obat bebas terbatas

429. YIDUOZYME 9681

Guangdong VTR Bio-tech Co. Ltd.China/

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung xylanase, acidic protease, alpha amylase dan malt mineral **Indikasi** Memperbaiki pencernaan dan konversi pakan pada unggas **Perhatian** Jika masih ada sisa setelah dibuka, tutup kembali dan hindari kelembaban **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton pakan, dosis dapat dirubah sesuai formula pakan dengan range berkisar antara 0,5-1,2 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung tinfoil 25 kg **Deptan RI** No. I. 09073645 FTS. Obat bebas terbatas

430. YIDUOZYME P – 8601

Agrinusa Jaya Santosa

Bentuk Sediaan Granul **Komposisi** Mengandung xylanase, cellulase, acid protease, neutral proteinase, β mannanase dan α -amylase **Indikasi** Sebagai feed additive pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 150-180 g ke dalam setiap ton pakan ternak unggas **Kemasan** 25 kg/zak kantung yang didalamnya terdapat 5 aluminium foil @ 5 kg **Kementan RI** No. I. 12094360 FTS. Obat bebas terbatas

431. YUMAMYCIN 1%

Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung maduramisin, kalsium karbonat alami, kapur makan dan gandum **Indikasi** Feed additive pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 13014427 FTS. Obat bebas terbatas

432. ZAGRIBIND

Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung HCAS (aluminium silikat) min 56% **Indikasi** Toxin binder yang dicampur dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak **Kemasan** Kantung kertas 25 kg **Deptan RI** No. I. 08043404 FTS. Obat bebas terbatas

- 433. ZAGROMIN 369** **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung cobalt, copper, iodine, iron, manganese, selenium dan zinc **Indikasi** Konsentrat mineral premix yang diformulasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi telur dan reproduksi pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 500 g/MT pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 13024454 FTS.
- 434. ZAGROMIX 368** **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, pantothenic acid, folic acid dan nicotinic acid **Indikasi** Konsentrat vitamin premix yang diformulasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi telur dan reproduksi pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 250 g/MT pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 13034467 FTS.
- 435. ZAGROSOL B – COMPLEX** **Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, pantothenic acid dan nicotinamide **Indikasi** Mencegah defisiensi vitamin B complex pada ayam, babi, domba, kambing dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam, babi, domba, kambing dan sapi: campurkan 1 ml Zagrosol B-Complex dalam 2 L air minum **Kemasan** Botol 1 L dan 5 L **Kementan RI** No. I. 13014438 FTC.
- 436. ZAGROVIT E – 50** **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap g mengandung vitamin E min 50% **Indikasi** Suplemen vitamin pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak atau premiks **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09113745 FTS. Obat bebas terbatas
- 437. ZAGROVIT ES** **Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/Zagro Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin E dan selenium **Indikasi** Feed supplement untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat **Kemasan** **Kemasan** 100 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 07093283 FTS. Obat bebas terbatas
- 438. ZAMBAC ZN 150** **Zamira Life Sciences Pty. Ltd., Australia/Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung zinc bacitracin 150 mg **Indikasi** Growth promotor pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 267 g/ton pakan **Kemasan** Sak @ 25 kg **Kementan RI** No. I. 11104158 FTS. Obat bebas terbatas
- 439. ZETOX** **Optivite International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung propionic acid, ammonium propionate, acetic acid, sorbic acid dan carrier (aluminosilicate) **Indikasi** Premiks yang digunakan dalam pakan dan bahan baku pakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri,

jamur, dan mikotoksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pada pakan dengan dosis 2 kg/ton pakan. Pakan dengan tingkat kontaminasi tinggi dan sensitif: 4 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 11044043 FTS. Obat bebas terbatas

440. ZIBAGRAN G150

Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung zinc bacitracin **Indikasi** Feed additive pada unggas, babi, sapi, domba dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Broiler: 0,35-0,65 kg/ton, pakan umur > 2 minggu. Layer: 0,35 kg/ton, pakan 4-6 minggu pertama periode laying. Layer: 0,2-0,5 kg/ton, pakan > 6 minggu periode laying. Babi: 0,35-0,65 kg/ton, pakan umur > 3 bulan. Sapi/domba/kambing: 0,35-0,5 kg/ton pakan umur > 16 minggu, dicampur dalam milk replacer **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04042750 FTS. Obat bebas terbatas

441. ZINC BACITRACIN PREMIX 15%

Pucheng Lifechome

Biochemistry, China/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung basitrasin **Indikasi** Feed additive pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 08083472 FTS. Obat bebas terbatas

442. ZYMPEX 006

Impextraco NV, Belgia/SHS International

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Endo-1,4- β -xylanase activity **Indikasi** Meningkatkan daya cerna terhadap pakan sehingga kandungan gizi dalam pakan digunakan maksimal pada unggas dan babi **Kemasan** Kantong PE 25 kg **DEPTAN RI** No. I. 07033184 FTS. Obat bebas terbatas.

443. ZYMPEX 008

Impextraco NV, Belgia/SHS International

Bentuk sediaan Serbuk **Komposisi** Alpha galactosidase activity dan beta mannase activity **Indikasi** Feed additive pada unggas dan babi **Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082988 FTS. Obat bebas terbatas. ****

PELENGKAP PAKAN (FEED SUPPLEMENT)

03.02

- 1. 0.05% VITAMIN PREMIX** **Qingdao Mingzhu Pharmaceutical Co., Ltd/ Lito Prima Mandiri**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 30.000.000 IU, vit. E 30.000 mg, vit. B2 5.000 mg, vit B12 12 mg, calcium panthotenate 15.000 mg, niacin 35.000 mg, DL-Methionine 50.000 mg, zinc sulfat 9.000 mg, vit. D3 6.000.000 IU, vit. B1 2.000 mg, vit. B6 2.000 mg, vit. C 50.000 mg, vit K3 2.000 mg, asam folat 100 mg, L-Lysine 50.000 mg dan MnSO₄ 20.000 mg **Indikasi** Antidefisiensi vitamin. Meningkatkan produksi telur dan memperpanjang periode puncak produksi telur. Memperbaiki kualitas kerabang telur. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2 L air minum selama 3-5 hari. Babi dan sapi: 1 g/3 L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 10 kg @ 250 g/karton **Deptan RI** No. I. 10073872 PTS. Obat bebas terbatas
- 2. ADE SOLE** **Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3 dan vit E **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10103923 FTS. Obat bebas terbatas
- 3. AGNERAL** **Agro Makmur Sentosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung Mn oxide 250 mg, ferrous sulphate 150 g, copper sulphate 62,5 g, cobalt sulphate 0,5 g, potassium iodate 1,25 g, sodium selenite 0,5 g, magnesium sulphate 20 g dan calcium carbonate 1.000 g **Indikasi** *Supplement* mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter chick*: 300 g/ton pakan. *Grower*: 150 g/ton pakan. *Layer*: 200 g/ ton pakan. *Broiler finisher*: 175 g/ton pakan **Kemasan** Kantong 50 kg **Deptan RI** No. D. 02081241 FTS. Obat bebas terbatas
- 4. AGRIMIX BRO** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 2.500.000 IU, vit D3 400.000 IU, vit E 2 g, vit B1 mononitrate 0,2 g, vit B2 1 g, vit B12 4 mg, calcium pantothenate 0,5 g, biotin 0,2 g, asam folat 0,10 g, niacin 1,5 g, L-lysine hydrochloride 20 g, DL-methionine 10,8 g, choline chloride 5 g, ferrosus 5 g, manganese 6 g, copper 1 g, iodium 0,02 g, magnesium 10 g dan calcium carbonate ad 1.000 g **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* **Kemasan** 1 kg sachet alufoil dan kantong zat polyethylene 25 kg **Kementan RI** No. 13074579 FTS. Obat bebas terbatas
- 5. AGRIMIX** **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 2.000.000 IU, vit D3 400.000 IU, vit E 600 mg, vit B1 200 mg, vit B12 2 mg, vit B2 1.000 mg, vit K3 200 mg, niacinamid 1.500 mg, Ca-d-Pantotenat 500 mg, folic acid 100 mg, choline chloride 20.000 mg, lysine 15.000 mg, metionin 20.000 mg, ferrous sulfat 5.000 mg, manganese oxide 10.000

mg, copper sulfat 1.000 mg, zinc sulfat 2.000 mg, magnesium sulfat 10.800 mg, potasium iodida 20 mg dan calcium carbonat ad 1.000 g **Indikasi** Menekan FCR. Mempertahankan produksi telur, meningkatkan produksi telur serta meningkatkan daya tahan tubuh **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. 06043065 FTS. Obat bebas terbatas

6. AGROMALAC

Nutrifeed, Netherlands/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung *delactose whey Powder*, *soy concentrate* dan premix **Indikasi** Sebagai pengganti susu *skim* untuk anak sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 3-25%/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 1104820 FTS. 1. Obat bebas terbatas

7. AMIVIT – E

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap 1 kg mengandung vitamin A 7.000.000 IU, vit D3 625.000 IU, vit E 3.750 IU, MSBC (vit K) 1.000 mg, niacine 15.000 mg, folic acid 125 mg, D-calcium-panthothenate 3.750 mg, histidine 1.480 mg, arginine 6.625 mg, threonine 2.560 mg, serine 3.820 mg, glutamic acid 14.890 mg, proline 16.800 mg, glycine 22.860 mg, alanine 8.550 mg, cystine 520 mg, thiamine HCl 625 mg, riboflavin 1.250 mg, pyridoxine HCl 1.500 mg, vit B12 6.250 mcg, biotin 2.500 mcg, vit C 3.750 mg, lysine 8.050 mg, valine 3.300 mg, methionine 1.350 mg, isoleucine 2.060 mg, tyrosine 1.500 mg, phenylalanine 6,52 mg, tryptophan 1,12 mg, aspartic acid 16,90 mg dan elektrolit 100.000 mg **Indikasi** Vitamin khusus untuk stabilitas kondisi tubuh hewan ternak. Suplemen asam amino esensial dan non esensial. Suplemen vitamin yang sangat lengkap **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g AMIVIT-E® ke dalam 2-3 L air minum **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 05012853 PTS. TM. Obat bebas terbatas

8. ASCOGEN

Chemo Forma AG, Switzerland/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung protein, serat, lemak dan mineral **Indikasi** Meningkatkan performa **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 kg/ton **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 07033185 FTS. Obat bebas terbatas

9. AVAILA 4

Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung zinc amino acid complex, copper amino acid complex, manganese amino acid complex, cobalt glucoheptonate, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebagai pakan sapi pada kisaran 7 g/ekor/hari atau 1 kg/140 ekor/hari. Sebagai pakan kuda pada kisaran 7 g/ekor/hari **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11054091 FTS. Obat bebas terbatas

10. AVAILA Cr 1000

Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung chromium methionine complex, calcium carbonate dan mineral oil **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambah ke dalam pakan: *Starter* babi: 200 g/ton pakan. *Grower dan*

Finisher babi: 400 g/ton pakan. Sapi perah: 400 g/ton pakan. Sapi pedaging: 400 g/ton pakan. Unggas: 100 g/ton pakan. Kambing: 400 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10103918 FTS. Obat bebas terbatas

11. AVAILA Cu 100

Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung copper amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi sebesar 200 g/ton pakan komplit. Ditambahkan ke dalam pakan ayam *layer, broiler* dan kalkun: 250 g/ton pakan komplit. Sebagai pakan sapi perah: 1,25 g/ekor/hari. Sebagai pakan sapi pedaging: 1,25 g/ekor/hari. Sebagai pakan kuda: 1,25 g/ekor/hari **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11054090 FTS. Obat bebas terbatas

12. AVAILA Fe 100

Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan induk babi sebesar 300 g/ton pakan *gestation-lactation*. Ditambahkan ke dalam pakan *starter* babi: 300-900 g/ton pakan komplit. Ditambahkan ke dalam pakan *grower* dan *finisher* babi: 300 g/ton pakan komplit. Sebagai pakan sapi perah: 6 g/ekor/hari. Sebagai pakan sapi pedaging: 6 g/ekor/hari. Sebagai pakan anak sapi: 454 g/375 ekor/hari. Sebagai pakan domba: 454 g/375 ekor/hari. Ditambahkan ke dalam pakan ayam dan kalkun: 300 g/ton pakan komplit. Sebagai pakan kuda: 6 g/ekor/hari **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 11044073 FTS. Obat bebas terbatas

13. AVAILA Mn 80

Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung manganese amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi: 500 g/ton pakan komplit. Ditambahkan ke dalam pakan ayam *layer, broiler* dan kalkun: 500 g/ton pakan komplit. Sebagai pakan sapi perah: 2,5 g/ekor/hari atau 100 g/40 ekor/hari. Sebagai pakan sapi pedaging: 2,5 g/ekor/hari atau 100 g/40 ekor/hari. Sebagai pakan domba: 0,5 g/ekor/hari atau 100 g/200 ekor/hari. Sebagai pakan kuda: 2,5 g/ekor/hari **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073879 FTS. Obat bebas terbatas

14. AVAILA Se 1000

Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan induk babi: 300 g/ton pakan *gestation-lactation*. Ditambahkan ke dalam pakan *starter* babi: 300-900 g/ton pakan komplit. Ditambahkan ke dalam pakan *grower* dan *finisher* babi: 300 g/ton pakan komplit. Sebagai pakan sapi perah: 6 g/ekor/hari. Sebagai pakan sapi pedaging: 6 g/ekor/hari. Sebagai pakan anak sapi: 454 g/375 ekor/hari. Sebagai pakan domba: 454 g/375 ekor/hari. Ditambahkan ke

dalam pakan ayam dan kalkun: 300 g/ton pakan komplit. Sebagai pakan kuda: 6 g/ekor/hari
Kemasan Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10033818 FTS. Obat bebas terbatas

- 15. AVAILA SOW FEET FIRST** **Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc amino acid complex, manganese amino acid complex, copper amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi pada kisaran 750 g/ton pakan komplit **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 10123960 FTS. Obat bebas terbatas
- 16. AVAILA STARTER 123** **Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc amino acid complex, manganese amino acid complex, copper amino acid complex, iron amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan *creep/starter/nursery* ternak pada kisaran 1,75 kg/ton pakan komplit **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10103917 FTS. Obat bebas terbatas
- 17. AVAILA Z/M** **Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc amino acid complex, manganese amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan unggas sebesar 1 kg/ton pakan komplit **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073878 FTS. Obat bebas terbatas
- 18. AVAILA ZN 120** **Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc amino acid complex, calcium carbonate dan *ground corn cob* **Indikasi** Sebagai *trace mineral Supplement* untuk pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan babi: 333 g/ton pakan komplit. Ditambahkan ke dalam pakan ayam *layer, broiler* dan kalkun: 333 gr/ton pakan komplit. Sebagai pakan sapi perah: 3 g/ekor/hari. Sebagai pakan sapi pedaging: 3 g/ekor/hari. Sebagai pakan domba: 0,33 g/ekor/hari. Sebagai pakan kuda: 3 g/ekor/hari **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 10073877 FTS. Obat bebas terbatas
- 19. AVIEGG EXTRA** **Avindo Perdana Bahtera Mulia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung virginiamycine 40.000 mg, carnitine 40.000mg, vitamin A 10.000.000 IU, vit D3 2.000.000 IU, vit E 30.000 mg, vit K3 3.500 mg, vit B2 12.000 mg, vit B12 30 mg, Ca-d-panthotenat 15.000 mg, vit C 20.000 mg, nicotinic acid 30.000 mg, potasium iodate 200 mg dan sodium selenite 100 mg **Indikasi** Mempercepat *start* produksi telur. Sebagai *growth promotor* untuk meningkatkan produksi dan berat telur. Mempertahankan produksi puncak, memperbaiki kualitas kerabang dan daya tetas telur **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 30 g dalam 100 L air minum selama 5-7 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan pot 500 g **Deptan RI** No. 02071070 FTS. TM. Obat bebas terbatas

20. **AVILAC HE** **Nutrifeed BV, Netherlands/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *sweet whey Powder, lactose dan emulsifier*
Indikasi *Feed Supplement* pada pakan unggas **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04032742 FTS. Obat bebas terbatas
21. **BIO – SELEVIT E FEED ADDITIVE** **Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama**
Bentuk Sediaan Cairan spray dalam botol **Komposisi** Setiap 1.000 g mengandung vitamin E 50.000 mg, sodium selenite 100 mg, flavor, strawberry (apetenzyma 7 concentrated) 6,0 mg, limestone 785, 40 mg, rice hull dengan minyak 88,38 mg **Indikasi** Untuk pencegahan dan pengobatan defisiensi vitamin E dan selenium. Pada unggas: *encephalomalacia, exudative diathesis, myopathies*, daya tetas rendah dan mortalitas tinggi pada ayam muda. Babi dan ruminansia: *dystrophies*, otot infertil, keguguran, *mummified stillborn* dan intoksikasi iron **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk pencegahan: 1 kg/ton pakan. Untuk pengobatan: 2 kg/ton pakan **Kemasan** 1 kg dalam **Kemasan** sachet **Kementan RI** No. I. 12114382 PTS. Obat bebas terbatas
22. **BIOGREEN** **Laboratories Biove, USA/SHS International**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung L-lysin HCl, sorbitol dan ekstrak tanaman (*Kinkeliba artichoke, Java tea, Boldo, rosemary*) **Indikasi** Pemeliharaan sistem hati, pencernaan dan urinaria pada unggas, burung, sapi, babi, anjing dan kucing **Kemasan** 1 L **Deptan RI** No. I. 02112082 PTC. 1. Obat bebas terbatas
23. **BIOMIN IMBO** **Biomim/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1.000 g mengandung *Pycophytic substances* 500 g, *Phytogene formula* dengan kandungan fructo-oligosaccharides (*soluble inulin*) 480 g, *organic cell wall polymers extracted* 20 g dan *stabilized lactic acid bacteria* (strain *Enterococcus faecium biomin IMB 52*) 5×10^{11} CFU/kg 20 g **Indikasi** Sebagai probiotik **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan **Kemasan** 25 kg dalam **Kemasan** box karton **Deptan RI** No. I. 05062943 FTS. Obat bebas terbatas
24. **BIOPLEX COPPER** **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung copper proteinate **Indikasi** Sebagai sumber organik tembaga untuk digunakan dalam pakan hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi menyusui: 0,0056 kg/ton. Sapi dara: 0,0056 kg/ton. Anak sapi: 0,028 kg/ton. Kuda: 0,110 kg/ton. Babi *starter*: 0,055 kg/ton. Babi *grower/finisher*: 0,055 kg/ton. *Broiler/layer*: 0,055 kg/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102666 FTS. Obat bebas terbatas
25. **BIOPLEX IRON** **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron proteinate **Indikasi** Sebagai sumber organik besi untuk digunakan dalam pakan hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Berikan terhadap pakan hewan ternak dan unggas untuk memenuhi kebutuhan

zat besi tambahan 30% **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102669 FTS. Obat bebas terbatas

26. BIOPLEX MANGANESE **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung manganese proteinate **Indikasi** Sebagai sumber organik manganese untuk digunakan dalam pakan hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi menyusui: 375 g/ton. Sapi dara: 187,5 g/ton. Anak sapi: 375 g/ton. Kuda: 0,225/kg grain mix. Babi *starter*: 150 g/ton. Babi *grower/finisher*: 75 g/ton. *Broiler/layer*: 187,5 g/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102667 FTS. Obat bebas terbatas

27. BIOPLEX ZINC **Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc proteinate **Indikasi** Sebagai sumber organik zinc untuk digunakan dalam pakan hewan ternak dan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis harian untuk sapi menyusui: 3,6 g. Dosis harian untuk sapi tumbuh: 3,6 g. Dosis harian untuk anak sapi: 0,45 g. Kuda: 0,028 kg/ton dalam campuran biji-bijian. Babi *starter*: 0,34 kg/ton. Babi *grower/finisher*: 0,23 kg/ton. *Broiler/layer*: 0,375 kg/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03102668 FTS. Obat bebas terbatas

28. BIOPLUS@YC **Evonik Industries AG/PT Evonik Indonesia**

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung *Bacillus subtilis* dan *Bacillus licheniformis* dalam bentuk spora **Indikasi** Sebagai suplemen pada pakan babi. Menurunkan angka kematian anak babi, mengurangi problem enteritis, memperbaiki penyerapan nutrisi dan kecernaannya, meningkatkan berat badan dan memperbaiki FCR, serta mengurangi penggunaan Antibiotic Growth Promotor (AGP) Dosis 400gram per ton pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak **Kemasan** Bag 20 kg **Deptan RI** No. I. 13094619 FTS. Obat bebas terbatas

29. BIO – PLUS **Mitravet**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 10.000 mg, vit K3 1.000 mg, vit C 20.000 mg, vit B1 1.000 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 4.000 mcg, Ca-d-Panthothenate 3.000 mg, niacin 10.000 mg, folic acid 250.000 mcg, NaCl 100.000 mg, KCl 90.000 mg, MgSO₄ 60.000 mg dan laktosa ad 1.000.000 mg **Indikasi** Membantu pertumbuhan anak ayam. Meningkatkan berat badan pada ayam pedaging. Meningkatkan nafsu makan unggas. Membantu mengatasi problem kekerdilan anak ayam. Menekan *feed converse* dan mencegah stress serta menekan angka kematian pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g BIO-PLUS® ke dalam 1-2 L air minum unggas dan berikan selama 5-7 hari berturut-turut saat DOC datang, ulangi pemberian 2 minggu kemudian **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 05012852 PTS. TM. Obat bebas terbatas

30. BIOZINK WSL **Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung zink kelat (Eco Trace®), copper kelat (Eco Trace®), mangan kelat (Eco Trace®), betain, vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12,

vit K3 (menadion), nikotinamid dan Ca panthotenat **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* pada unggas untuk mengoptimalkan pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum dengan dosis 1 kg/1.000 L air minum **Kemasan** Kantung @ 1 kg, pemberian dicampur dalam air minum **Kementan RI** No. I. 11013993 FTS. Obat bebas terbatas

31. BROILER FORMULA

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vit A, vit D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, niacin, Ca-d-pantothenate, arginine, lysine, methionine, glycine, sodium salicylate, zinc sulfate, magnesium sulfate, manganese sulfate, copper sulfate, cobalt sulfate 200 mg dan *inert ingredient* qs 1 kg **Indikasi** Mempercepat pertumbuhan dan peningkatan BB ayam *broiler*. Meningkatkan daya tahan tubuh unggas dan mencegah stress. Membantu meningkatkan nafsu makan unggas. Meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. Menekan angka kematian *broiler*. Meningkatkan kualitas daging **Dosis dan Cara Pemakaian** 0-4 minggu: 5 g dilarutkan dalam 6 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. 4-9 minggu: 5 g dilarutkan dalam 9 L air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut **Deptan RI** No. D. 01021294 FTS. 1. Obat bebas terbatas

32. CARVITA – 15

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung carnitine HCl 15 g, vitamin A 12.500.000 IU, vit D3 1.500.000 IU, vit E 2.000 mg, vit B12 10 mg, vit C 15.000 mg, vit B6 1.500 mg, folic acid 170 mg, NaCl 2.500 mg, KCl 2.500 mg, MgSO₄ 125 g, calcium asetat 2.500 mg, menadion sodium bisulfite 3.500 mg dan laktosa ad 1.000 g **Indikasi** Mengatasi stress dan merangsang nafsu makan. Mempercepat proses penyembuhan serta meningkatkan produksi dan daya tetas telur. Mempercepat pertumbuhan dan berat badan. Mempercepat masa bertelur dan meningkatkan spermatogenesis pada ayam, burung puyuh, sapi dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ayam/burung puyuh: 1 g/L air minum. Sapi: 10 g/L air minum. Babi: 5 g/L air minum. Berikan selama 3-5 hari (2 minggu sekali) **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 04012709 PTS. TM. Obat bebas terbatas

33. CATTLEVET

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D 1.000.000 IU, vit E 1.600 mg, vit B1 600 mg, vit B2 2.400 mg, vit B12 2.400 mcg, vit K 600 mg, niacinamide 3.000 mg, Ca-d-Panthenate 1.000 mg, folic acid 200 mg, magnesium oxide 13.600 mg, ferrous sulfat 10.000 mg, manganese oxide 20.000 mg, copper sulfat 200 mg, zinc oxide 4.000 mg, potassium iodine 40 mg, antioxidant dan *carrier* ad 1.000.000 mg **Indikasi** Melengkapi kebutuhan sapi akan vitamin dan mineral. Mengatasi defisiensi vitamin dan mineral. Mencegah terjadinya *hypocalcemia* dan *grass tetany* serta meningkatkan kesehatan dan produktivitas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 2 kg CATTLEVET® ke dalam 1 ton pakan dan diberikan setiap hari **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 12084321 FTS. Obat bebas terbatas

34. **CHOLINE CHLORIDE 50%** **Kolin Chemical, Korea/Bright International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung choline chloride min. 50% **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 10073881 FTS. Obat bebas terbatas
35. **CHOLINE CHLORIDE 60%** **Kolin Chemical, Korea/Bright International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung choline chloride min. 60% **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 10073882 FTS. Obat bebas terbatas
36. **CHOLINE CHLORIDE 75%** **Kolin Chemical, Korea/Bright International**
Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung choline chloride min. 75% **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 0,5 L/ton pakan **Kemasan** Drum 230 kg **Deptan RI** No. I. 10073880 FTC. Obat bebas terbatas
37. **CJ PROSIN** **Cheil Jedang Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung crude protein, lysine dan threonin **Indikasi** *Feed Supplement* pada unggas, ternak dan aquaculture **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 3 plykraft paper bag 25 kg, woven bag 25 kg dan yycan bag 1.000 kg **Deptan RI** No. D. 07063231 FTS. Obat bebas terbatas
38. **CJ PROTIDE** **Cheil Jedang Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung protein kasar minimal 55%, kadar air maksimal 10%, abu 15% dan nukleotida (IMP) minimal 1,5 **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Pada unggas: 1-2 kg/ton pakan. Pada sapi pedaging: 1-2 kg/ton pakan. Pada sapi perah: 1-2 kg/ton pakan. Pada aquakultur (ikan dan udang): 3-5 kg/ton pakan. Pada babi: 1,5-3 kg/ton pakan **Kemasan** Kraft paper @ 25 kg **Kementan RI** No. D. 11084127 FTS. **KKP RI** No. D. 1101153 PBS.
39. **CM – PREMIX** **Sanbe Farma**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Fe, Mn, Zn, Cu, I, Co dan Se **Indikasi** Meningkatkan produksi, kualitas dan daya tetas telur. Meningkatkan pertumbuhan dan penambahan BB. Membantu memperlancar proses metabolisme tubuh dan mencegah kekurangan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** *Broiler*: 250-300 g/ton pakan. *Layer*: 400-500 g/ton pakan. *Breeder* : 400-600 g/ton pakan. Babi *starter* dan induk: 500 g/ton pakan, *grower*: 350 g/ton pakan, *finisher*: 250 g/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 0102399 FTS. Obat bebas terbatas
40. **COLISTIN 10% MEIJI** **Thai Meiji Pharmaceuticals Co, Ltd, Thailand/ Halim Sakti Pratama**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung colistin sulphate **Indikasi** *Feed additive* yang dicampur ke dalam pakan pada ternak unggas, babi dan ruminansia **Dosis dan Cara**

Pemakaian Lihat pada **Kemasan Kemasan Sak @ 20 kg Deptan RI No. I. 08013374 FTS.**
Obat bebas terbatas

41. COMFEED BROILER PREMIX 396 R

**Centralys, Perancis/
Japfa Comfeed Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, niacin, panthotenic acid, Vit B12, folic acid, iodine dan selenium **Indikasi** Meningkatkan konversi pakan dan bobot badan pada unggas (ayam pedaging) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan Karung plastik 25 kg Deptan RI No. I. 09043605 FTS.** Obat bebas terbatas

42. COMFEED LAYER PREMIX 2962 R

**Centralys, Perancis/
Japfa Comfeed Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, niacin, panthotenic acid, vit B12, folic acid, iodine dan selenium **Indikasi** Meningkatkan konversi pakan dan produksi telur pada unggas (ayam petelur) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan Karung plastik 25 kg Deptan RI No. I. 09043604 FTS.** Obat bebas terbatas

43. CONC M 35

Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd, China/SHS International

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung Cu, Mn, I, Se dan sulfur **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan Kantung 20 kg Deptan RI No. I. 05082974 FTS.** Obat bebas terbatas

44. CULINDO PIG BREEDER CL – 5

DSM Nutritional Products

Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia **Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folate, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan Kantung 20 kg Deptan RI No. I. 0112815 OHK.**

45. CULINDO PIG FINISHER CL – 4

**DSM Nutritional ProductsRovithai Limited,
Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folate, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan Kantung 20 kg Kementan RI No. I. 1301633 OHK. 1.**

46. CULINDO PIG FINISHER CL – 4 M

**DSM Nutritional Products Rovithai Limited,
Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folate, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement*

vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 0112703 OHK.

47. CULINDO PIG WEANER CL – 2 **DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folat, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Kementan RI** No. I. 0112519 OHK.

48. CULINDO PIG WEANER CL – 3 **DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folat, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Kementan RI** No. I. 0112591 OHK.

49. DIAMIX MINERAL PREMIX **Diasham, Singapore/SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu, Fe, Iodin, Mn, Zn dan Co **Indikasi** *Supplement* mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05021248 FTS. 2. Obat bebas terbatas

50. DIAMIX SUPER LAYER PREMIX **Diasham, Singapore/SHS International**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit D3, vit E, vit K3, asam nicotinat, asam folat dan D-calcium pantotenat **Indikasi** *Feed Supplement* pada unggas (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04121249 FTS. 2. Obat bebas terbatas

51. FEEDMIX – B **Kalbe Farma Tbk**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B12, vit K, niacinamide, Ca-d-panthotenate, folic acid, choline chloride, L-Lysine, DL-Methionine, $MgSO_4$, Fe_2SO_4 , $MnSO_4$, $CuSO_4$, $ZnSO_4$ dan KI **Indikasi** Pelengkap pakan untuk mencapai produksi yang optimum pada unggas, babi dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 2-4 kg/ton pakan. Babi: 2,5-3 kg/ton pakan. Sapi: 1-1,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** D. 0411046 FTS. 2. Obat bebas terbatas

52. FLS LIQUID **Trouw Nutrition Indonesia**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung vitamin E, vit B1, vit B12, biotin dan selenium **Indikasi** Untuk pencegahan atau pengobatan Fatty Liver Syndrome **Dosis dan Cara Pemakaian** FLS Liquid diberikan untuk dosis pengobatan 2,5 L/1.000 L air minum dan dosis pencegahan 1,0 L/1000 L dan diberikan selama 14 hari **Kemasan** 5 L dan 20 L **Kementan RI** No. D. 11084123 PTC. Obat bebas terbatas

53. FOKKAMEL EXTRA

Nukamel B.V., Belanda/Brenntag

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *whey* Powder, *palm oil*, soya concentrate dan *wheat protein* **Indikasi** Sebagai *milk replacer* pada anak sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11013987 FTS. Obat bebas terbatas

54. FOKKAMEL PLUS

Nukamel B.V., Belanda/Brenntag

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *whey Powder*, *palm oil*, soya concentrate dan *wheat protein* **Indikasi** Sebagai *milk replacer* pada anak sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 11013986 FTS. Obat bebas terbatas

55. FOKKAMIX 9

Nukamel,B.V, Belanda/Brenntag

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung soya concentrate, *whey protein* dan *palm oil* **Indikasi** Sebagai sumber protein dan *lactose, feed Supplement* pada piglet **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur didalam pakan 5-25% **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 09093712 FTS. Obat bebas terbatas

56. FV 2 A

Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd, China/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin C, vit E dan inositol **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantong 20 kg **Deptan RI** No. I. 05082972 FTS. Obat bebas terbatas

57. GALLIPRO®

Evonik Industries AG/PT Evonik Indonesia

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung *Bacillus subtilis* dalam bentuk spora **Indikasi** Sebagai suplemen pada pakan broiler dan layer. Meningkatkan berat badan dan efisiensi pakan, meningkatkan penyerapan nutrien, membantu menstabilkan mikro flora usus, serta mengurangi penggunaan Antibiotic Growth Promotor (AGP) **Dosis dan Cara Pemakaian** 500gram per ton pakan dicampur dalam pakan ternak **Kemasan** Bag 20 kg **Deptan RI** No. I. 13094620 FTS. Obat bebas terbatas

58. GROWVIT

Eka Farma

Bentuk Sediaan Powder **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, Ca pantotenat, nicotinamide dan lysine **Indikasi** Mencegah bulu agar tidak mudah rontok. Bulu menjadi halus dan mengkilap. Mempercepat pertumbuhan bulu **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Botol 10 g **Deptan RI** No. D. 09103731 FTS. Obat bebas terbatas

59. IRON – G

China Bestar Laboratories Ltd, Taiwan/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ferrous sulfat **Indikasi** Antidefisiensi Fe pada unggas, babi, sapi, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantong 25 kg **Kementan RI** No. I. 12104368 PTS. Obat bebas terbatas

60. **KALMIRAL** **Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Fe, Cu, Mn, Co, I dan Se **Indikasi** Pelengkap mineral dalam pakan untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 250-400 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI D.** 1108734 FTS. 1. Obat bebas terbatas
61. **KALVIMIX – RX** **Kalbe Farma Tbk**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, nikotinamid, Ca-d-panthotenate, asam folat dan biotin **Indikasi** Pelengkap vitamin dalam pakan untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 150-200 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI D.** 12092462 FTS. 1. Obat bebas terbatas
62. **KALVOLAC** **Nutrifeed, Netherland/Behn Meyer Chemicals**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung *sweet whey Powder, fatfilled whey Powder, partly delactosed whey Powder, dan soy protein concentrate* **Indikasi** Sebagai milk replacer **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam air minum dengan dosis 1 kg/8-10 L air minum **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI No. I.** 04052755 FTS. Obat bebas terbatas
63. **KATRAMIX 325** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung multivitamin **Indikasi** Memacu pertumbuhan. Meningkatkan efisiensi penggunaan makanan. Meningkatkan produksi telur. Memperpanjang masa produksi telur dan berat telur. Meningkatkan fertilitas dan daya tetas telur pada *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** *Layer, broiler, finisher*: 175–200 g/ton makanan. *Starter, breeder* : 200–250 g/ton makanan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI No. D.** 0307801 FTS. 2. Obat bebas terbatas
64. **KATRAMIX I** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung multivitamin, *trace mineral* dan asam amino **Indikasi** Memacu pertumbuhan. Meningkatkan efisiensi penggunaan makanan. Meningkatkan produksi telur. Fertilitas dan daya tetas telur pada *breeder* **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter, broiler, breeder* : 3,5–5 kg/ton makanan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI No. D.** 0609776 FTS. 2. Obat bebas terbatas
65. **KATRAMIX II** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung multivitamin dan *trace mineral* **Indikasi** Memacu pertumbuhan. Meningkatkan efisiensi penggunaan makanan dan produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** *Grower dan layer*: 1,5-2,5 kg/ton makanan. *Broiler finisher*: 2,0-2,5 kg/ton makanan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI No. D.** 0609814 FTS. 2. Obat bebas terbatas
66. **KATRAMIX III** **Katraco Santika**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung multivitamin, *trace mineral* dan asam amino **Indikasi** Meningkatkan efisiensi penggunaan makanan dan produksi telur. Memperpanjang masa bertelur dan puncak produksi telur **Dosis dan Cara Pemakaian** *Layer dan breeder* : 2,5-5 kg/ton makanan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI No. D.** 0609777 FTS. 2. Obat bebas terbatas

67. KC – POL

Korchin, China/Farmadika Sejahtera Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk granul kuning pucat **Komposisi** Mengandung multivitamin **Indikasi** Untuk pencegahan defisiensi nutrisi, anti-stress. Untuk meningkatkan efisiensi pakan, penetasan, fertilitas dan produksi telur. Untuk meningkatkan imunitas terhadap penyakit **Perhatian** Simpan di tempat dingin, kering dan gelap. Gunakan sesegera mungkin dan tutup kembali setelah digunakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Desinfeksi: berdasarkan pada jumlah air (g/1.000 L air minum). Ruminansia: 5 g/100 kg BB/hari. Ikan: 5-10 kg/ton pakan **Kemasan** 5 kg dan 10 kg **Deptan RI** No. I. 10073852 PTS. Obat bebas terbatas

68. KLINO – MINERAL

Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung cobalt sulfate, copper sulfate, ferrous sulfate, potassium iodide, manganese oxide, zinc oxide, sodium selenite dan calcium carbonate (*heavy*) **Indikasi** Sebagai *Supplement* mineral untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 300 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. D. 06073085 FTS. TM. Obat bebas terbatas

69. KURKUMAVIT

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung ekstrak *Curcuma longa* 20.000 mg, ekstrak *Curcuma xanthoriza* 5.000 mg, selenium 36 mg, vitamin A 3.000.000 IU, vitamin D3 600.000 IU, vit E 800 mg, vit K 2.500 mg, vit B1 1.050 mg, vit B2 250 mg, vit B6 250 mg, vit B12 750 mcg, vit C 250 mg, Ca-d-panthotenat 1.000 mg, niacinamide 3.000 mg, folic acid 50 mg dan elektrolit 123.000 mg **Indikasi** Menambah nafsu makan, mencegah defisiensi vitamin dan sebagai antistress **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 g KURKUMAVIT® dalam 2-4 L air minum dan berikan selama 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 05042928 PTS. TM. Obat bebas terbatas

70. LAGANTOR F 1 CUSTOMIX

Kalbe Farma Tbk

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B12, vit K, niacinamide, Ca-d-panthotenate, folic acid, choline chloride, L-Lysine, DL-Methionine, MgSO₄, Fe₂SO₄, MnSO₄, CuSO₄, ZnSO₄ dan KI **Indikasi** Melengkapi kebutuhan vitamin asam amino dan *trace mineral*. Mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki efisiensi penggunaan pakan. Meningkatkan fertilitas dan meningkatkan produksi air susu **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis pemeliharaan: 1-2 kg/ton pakan. Dosis perbaikan: 5-10 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 25 kg **Kementan RI** No. D. 11013975 PTS. Obat bebas terbatas

71. LIPTOBAC – L

Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung copper sulfat, propionic acid dan formic acid **Indikasi** *Acidifier* pada saluran cerna unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 0,5-3 ml/1.000 L air minum **Kemasan** Botol 1 L, jerigen 5 L, 10 L, 25 L dan wadah 1.000 L **Deptan RI** No. I. 10083889 PTC. Obat bebas terbatas.

- 72. LIPTOSAFE – L** **Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung nicotinic acid, citric acid, lactic acid, propionic acid, formic acid, ammonium hydroxide, betaine, ekstrak *Saccharomyces cerevisiae*, xylanase dan phytase **Indikasi** *Feed additive* untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 0,5-1 ml/L air minum **Kemasan** Botol 250 ml, 1 L, jerigen 5 L, 10 L, 25 L dan wadah 1.000 L **Deptan RI No. I. 11104160 FTC.** Obat bebas terbatas
- 73. LUCAROTIN 10% FEED** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung β carotene 10% **Indikasi** Menjamin kecukupan vitamin A pada hewan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Deptan RI No. I. 07093284 FTS** Obat bebas terbatas.
- 74. MADIMPEX 10G** **Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk granulat Komposisi Mengandung maduramycin ammonium **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI No. I. 04042749 FTS.** Obat bebas terbatas
- 75. MAMIMUNE** **Sunzen Biotech Berhad – Malaysia/Sunzen Indonesia**
Bentuk Sediaan Emulsi Komposisi Mengandung medium *chain triacyl glycerols*, curcumin, sorbiton monooleate dan polyglycerol *ester fatty acids* **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* pada anak babi dan anak kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** 4 ml/anak babi dan anak kambing dan diberikan secara per oral **Kemasan** Botol @ 200 ml **Deptan RI No. I. 13014421 FTC.** Obat bebas terbatas
- 76. MASAMIX** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-panthothenate, niacin, cobalt, ferrous, iodine, mangan dan zinc **Indikasi** Antidefisiensi vitamin dan mineral pada unggas, sapi, babi dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan Zak 25 kg Deptan RI No. D. 08061125 FTS. 2.**
- 77. MASAMIX SUPER** **Mensana Aneka Satwa**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-panthothenate, niacin, choline, cobalt, methionine, lysine, manganese, ferrous, iodine, zinc, copper dan zinc bacitracin **Indikasi** Memacu pertumbuhan ayam petelur. Meningkatkan produksi dan berat telur. Mencegah terjadinya telur tipis dan mudah pecah pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian Layer:** 2,5-5,0 kg/ton pakan **Kemasan Zak 25 kg Kementan RI No. D. 12124406 FTS.**
- 78. MAXCARE** **Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung zat besi, copper, zinc, manganese, iodine, cobalt dan selenium **Indikasi** Sebagai sumber mineral untuk pakan unggas dan babi **Dosis**

dan Cara Pemakaian Lihat pada Kemasan Kemasan 25 kg Deptan RI No. D. 0609029
FTS. 2. Obat bebas terbatas

79. MAXCARE BROILER

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid, nicotinic acid, choline chloride, iron, copper, zinc, manganese, selenium, lysin dan methionine **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk dicampur dalam pakan Kemasan 25 kg Deptan RI No. D. 10073863 PTS. Obat bebas terbatas

80. MAXCARE

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, Ca-d-panthotenate, asam folat, niacin, betain, copper sulfat, zinc sulfat, manganese oxide, potassium iodide, sodium selenite, choline chloride, methionine, lysine dan threonine **Indikasi** Feed *Supplement* untuk hewan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk dicampur dalam pakan Kemasan Paper bag @ 25 kg Deptan RI No. D. 09093709 FTS. Obat bebas terbatas

81. MAXCARE BEEF ECO

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B12, iron, copper, zinc, manganese, selenium, cobalt, iodine dan magnesium **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi vitamin mineral untuk sapi potong **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 kg/ton pakan Kemasan 25 kg Kementan RI No. D. 12114389 Obat bebas terbatas

82. MELODY

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung protein min. 16%, lemak min. 3%, serat maks. 6%, vitamin A 10.000 IU, vit D3 2.000 IU, vit E 7,5 mg, vit K 1 mg, vit B1 1,8 mg, vit B2 5 mg, vit B6 2,5 mg, vit B12 15 µg, vit C 80 mg, nicotinic acid 30 mg dan Ca-D-Pantothenate 8 mg **Indikasi** Menjadikan burung sehat dan ceria, membuat bulu mengkilap dan cerah. Membuat burung cepat berkicau kembali setelah ganti bulu serta mengandung multivitamin yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Perhatian** Sediakan air minum yang bersih dan cukup. Bersihkan tempat makan tiap 2-3 hari untuk menghindari tumbuhnya bakteri dan jamur. Setiap hari sebaiknya burung dimandikan kemudian dijemur selama ½-1 jam agar terhindar dari kutu, sangkar ditaruh pada ruangan yang cukup sirkulasi udaranya **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan secukupnya sebagai pakan Kemasan Sachet 250 g dan 500 g Deptan RI No. D. 09073669 FTM. Obat bebas terbatas

83. METAMINO

Evonik Industries AG/PT Evonik Indonesia

Bentuk Sediaan Powder kristalin berwarna putih kekuningan **Komposisi** Mengandung DL-methionine 99,0-100% **Indikasi** Sebagai suplemen DL-methionine dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak Kemasan Bag 25 kg dan Big bag 1.000 kg Deptan RI No. I. 11084124 FTS. Obat bebas terbatas

84. MICROMINERAL POULTRY**Vetindo Citrapersada**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung cobalt, copper, iodine, manganese, selenium dan zinc **Indikasi** Memenuhi kebutuhan pokok dari unggas yang mana tidak diperolehhanya dari bahan baku pakan saja. Menjaga supaya ternak selalu mendapatkan zat nutrisi *trace elements* yang lengkap dan seimbang sehingga produksi dapat stabil dan optimal. Micromineral *poultry* menjamin ternak unggas selalu mendapat *trace elements* secara lengkap. Membantu pertumbuhan secara normal untuk persiapan produksi maupun reproduksi. Meningkatkan kualitas daging dan telur. Menjaga produksi selalu stabil, aman untuk ternak unggas dan mudah dicampurkan (homogen) **Dosis dan Cara Pemakaian** 250-300 g/ton pakan unggas **Kemasan** 1 kg dan 40 kg **Deptan RI** No. D. 98061488 FTS. 1. Obat bebas terbatas

85. MINERAL BABI**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung calcium 225 g, phosphor 90 g, ferum 20 g, cuprum 0,3 g, manganese 2 g, iodine 0,09 g, magnesium 9 g, zincum 9 g, sodium chloride 30 g dan cyanocobalamin 1,5 mg **Indikasi** Memperbaiki pertumbuhan babi dan mengatasi penyakit kekurangan darah (anemia) pada anak babi dan babi dewasa. Memperbaiki dan menambah nafsu makan serta meningkatkan efisiensi ransum. Mencegah kelumpuhan pada babi yang sedang menyusui anaknya **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg tiap 100 kg ransum (10 kg tiap ton ransum) dan aduk sampai rata **Kemasan** Kantong plastik 1 kg **Deptan RI** No. D. 03021838 FTS. 1. Obat bebas terbatas

86. MINERAL FEED SUPPLEMENT – A**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung calcium 32,5%, phosphor 10%, iron 6 g, manganese 4 g, iodine 0,075 g, copper 0,3 g, zinc 3,75 g, vitamin B12 0,5 mg dan vit D3 50.000 IU **Indikasi** Memperbaiki produksi telur dan meningkatkan mutu telur. Membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan tulang dan bulu yang normal. Mempertinggi daya tetas telur. Mencegah dan menyembuhkan penyakit karena kekurangan mineral seperti lumpuh, kaki bengkok (perosis), kurang darah (anemia) dan lain-lain **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg tiap 50 kg ransum, aduk sampai rata **Kemasan** Kantong plastik 1 kg. Wadah plastik 5 kg. Kantong kertas 25 kg **Deptan RI** No. D. 08081607 FTS. 2. Obat bebas terbatas

87. MINERAL FEED SUPPLEMENT – S**Medion Farma Jaya**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung calcium 165.000 mg, phosphor 52.000 mg, sodium 157.000 mg, iron 2.500 mg, copper 2.500 mg, iodine 125 mg, manganese 2.000 mg, cobalt 50 mg, zincum 5.000 mg dan selenium 10 mg **Indikasi** Memperbaiki pertumbuhan sapi potong dan membuat sapi potong lebih gemuk. Mempertinggi produksi susu pada sapi perah dan mencegah keguguran serta kelumpuhan **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 kg tiap 100 kg ransum dan diberikan setiap hari **Kemasan** Kantong plastik 1.000 g **Deptan RI** No. D. 08081068 FTS. 2. Obat bebas terbatas

88. MIRAL 8

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Co 0,89 g, Cu 17,78 g, Fe 71,11 g, I 1,77 g, Mn 142,22 g, Zn 88,89 g, Se 0,35 g dan Ca 7,50 g **Indikasi** *Supplement* mineral untuk ayam dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan dan aduk hingga merata. Ayam *broiler starter, grower*: 450 g/ton pakan. *Breeder*: 575 g/ton pakan. Anak sapi dan sapi potong: 300 g/ton pakan. Sapi perah: 350 g/ton pakan **Kemasan** Dos 25 kg @ 5 kg **Deptan RI** No. D. 03102661 FTS. Obat bebas terbatas

89. MITRAMIX – C®

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 2.000.000 IU, vit D3 400.000 IU, vit E 3.000 mg, vit K 400 mg, thiamin HCl 400 mg, riboflavin HCl 1.200 mg, pyridoxin HCl 800 mg, vit B12 4 mcg, Ca-d-Panthenate 2.160 mg, niacinamide 8.000 mg, folic acid 200 mg, biotin 4 mg, L-carnitine 10.000 mg, copper sulfat 4.000 mg, cobalt sulfat 300 mg, ferro sulfat 10.000 mg, Mn okside 20.000 mg dan sodium selenite 150 mg **Indikasi** Meningkatkan kualitas kerabang telur dan berat telur serta meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 1 kg MITRAMIX – C® ke dalam 1 ton pakan **Kemasan** 1 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. D. 12104373 FTS. Obat bebas terbatas

90. MITRAVIT – 100®

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 3.000.000 IU, vit D3 600.000 IU, vit E 800 mg, vit K 2.500 mg, vit B1 1.050 mg, vit B2 250 mg, vit B12 750 mcg, vit C 250 mg, Ca-d-Panthenate 1.000 mg, niacinamide 3.000 mg, asam folat 50 mg dan elektrolit 20.000 mg **Indikasi** Untuk mengatasi stress akibat perubahan cuaca, vaksinasi, pergantian ransum, kepadatan ketika pengangkutan dan potong paruh. Meningkatkan nafsu makan dan mempercepat penyembuhan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi, ayam dan babi: larutkan 1 g MITRAVIT-100® ke dalam 4 L air minum dan berikan selama 3-5 hari **Kemasan** 100 g, 250 g dan 15 kg **Deptan RI** No. D. 13072634 PTS.1. Obat bebas terbatas

91. MIXOMEL

Nukamel,B.V, Belanda/Brenntag

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung soya *concentrate*, *whey Powder*, *wheat concentrate* dan *palm oil* **Indikasi** Sumber protein dan *lactose, feed Supplement* pada unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di pakan 5-25% **Kemasan** Kantong 25 kg **Deptan RI** No. I. 09083699 FTS. Obat bebas terbatas

92. MIXTROUVIT

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, calpant, folic acid dan niacin **Indikasi** Sebagai sumber vitamin untuk pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 0609336 FTS. 2. Obat bebas terbatas

93. MIXTROUVIT BLEND EGG 552

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2,

vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan nicotinic acid **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi vitamin untuk ayam peterlur **Dosis dan Cara Pemakaian** 150-250 g untuk periode layer dan 300-400 g/ton pakan pada periode starter **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 12114390 Obat bebas terbatas

94. MIXTROUVIT MINERAL LAYER

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron, copper, zinc, manganese, selenium, cobalt dan potasium **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk dicampur dalam pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10073863 PTS. Obat bebas terbatas

95. MIXTROUVIT MIN EGG 552

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron, copper, zinc, manganese, selenium, cobalt dan iodine **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi mineral untuk ayam petelur **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 13034492 FTS. Obat bebas terbatas

96. MIXTROUVIT VITAMIN LAYER

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan niacinamid **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10083891 FTS. Obat bebas terbatas

97. MP – 10003A

Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd., China/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Mn, Zn dan I **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 05082967 FTS. Obat bebas terbatas

98. NUKAMIX 10

Nukamel,N.V, Belgia/Brenntag

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung soya *concentratee*, *whew Powder* dan *palm oil* **Indikasi** Sumber *lactose*, *whew protein*, *feed Supplement* pada *piglet* **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur di pakan 5-25% **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09093711 FTS. Obat bebas terbatas

99. NUPRO

Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ekstrak yeast *Saccharomyces cerevisae* **Indikasi** Merupakan fungsional protein yang mengandung nutrient essensial dengan level konsentrasi yang tinggi untuk hewan muda bagi hewan ternak, unggas, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** 1–5% dari total pakan. Campurkan secara on top atau melalui reformulasi **Kemasan** Kantung 1 kg, kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07093278 FTS. Obat bebas terbatas

100. NUTRI – C

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin C **Indikasi** *Supplement* vitamin C unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam air minum dan disesuaikan dengan kebutuhan unggas **Kemasan** Paper bag @ 25 kg **Deptan RI** No. D. 09103722 FTS. Obat bebas terbatas

101. NUTRI – LACK

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Tiap 1 kg mengandung vitamin A 5.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 5.000 mg, vit K3 6.000 mg, vit B1 15.000 mg, vit B2 5.000 mg, vit B6 6.000 mg, vit B12 15.000 mcg, vit C 30.000 mg, asam pantotenat 10.000 mg, asam folat 500.000 mcg, niasin 40.000 mg, lisin 30.000 mg, metionin 10.000 mg, arginin 8000 mg, glisin 10.000 mg, leusin 8.500 mg, isoleusin 5.000 mg, histidin 2500 mg dan triptofan 1.000 mg **Indikasi** Mempercepat pemulihan kondisi dan disarankan diberikan pada ayam yang terserang penyakit bacterial dan parasit **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/2 L air minum dan berikan selama 5-7 atau 100 g/1.250-2.500 kg BB. Kasus defisiensi nutrisi yang parah: 1 g/L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. D. 0412639 PTS. 1. Obat bebas terbatas

102. NUTRIMIN FM518 FISH

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Zn, Fe, Mg, Manganese, Copper, I, Se dan cobalt **Indikasi** Suplemen mineral pada pakan ikan **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **KKP RI** No. I. 1111177 PBS. Obat bebas terbatas

**103. NUTRIMIN PM 518 POULTRY
MINERAL PREMIX**

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Fe, Zn, Mg, Copper, I, Se dan Co **Indikasi** *Supplement* mineral pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022880 FTS. Obat bebas terbatas

**104. NUTRIMIN SM 318 SWINE
MINERAL PREMIX**

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung Fe, Zn, Mg, Copper, I, Se dan cobalt **Indikasi** *Supplement* mineral pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022879 FTS. Obat bebas terbatas

105. OPTIMIN SE Y

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung selenomethionine dan silicon dioxide **Indikasi** *Supplement* selenium pada pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Paper bag @ 25 kg **Deptan RI** No. D. 09083686 FTS. Obat bebas terbatas

106. ORANGE

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit C, vit D3, vit E, vit B2, vit B6, vit B12, biotin dan niacinamid **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 g/L air minum selama 3-5 hari **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10033813 FTS. Obat bebas terbatas

107. OSTELIN

Eka Farma

Bentuk Sediaan Kapsul **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit B1, vit B2, vit B6 dan kalsium **Indikasi** Vitamin untuk mencegah kelumpuhan pada ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Sachet 10 kapsul **Deptan RI** No. D. 09073664 FTM. Obat bebas terbatas

108. OVULA EXTRA

Avindo Perdana Bahtera Mulia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung virginiamycine 10.000 mg, carnitine 20.000 mg, vitamin A 4.000.000 IU, vit D3 1.000.000 IU, vit E 8.000 mg, vit K3 2.500 mg, vit B2 5.000 mg, vit B12 15 mg, Ca-d-panthotenat 8.000 mg, nicotinic acid 10.000 mg, potasium iodate 100 mg dan sodium selenite 50 mg **Indikasi** Mempercepat *start* produksi telur. Sebagai *growth promotor* untuk meningkatkan produksi dan berat telur, mempertahankan produksi puncak, dan memperbaiki kualitas kerabang **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 50 g dalam 100 L air minum selama 5-7 hari **Kemasan** Sachet 100 g dan pot 500 g **Deptan RI** No. 05042929 FTS. TM. Obat bebas terbatas

109. PEPTIDA – G

KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung lysine HCl **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5-1 kg/ton pakan **Kemasan** Sak 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I. 12014206 FTS. Obat bebas terbatas

110. PERFEXOL – H

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin C, vit A, vit D, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, calpant, folic acid dan niacin **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 0607031 FTS. 2. Obat bebas terbatas

111. PERFEXOL – L

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin C, vit A, vit D, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, calpant, folic acid dan niacin **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 0607180 FTS. 2. Obat bebas terbatas

112. PHYLINK 5000

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 3-phytase **Indikasi** *Feed Supplement* pada

pakan unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 11044059 FTS. Obat bebas terbatas

113. PIG MINERAL POWDER

USFA, CV

Bentuk Sediaan *Powder* **Komposisi** Tiap 1 kg mengandung calcium carbonat 500 g, D-calcium phospat 100 g, natrium klorida 100 g, kalium klorida 3 g, zink sulfat 4 g, kalium klorida 4 g, cupprum sulfat 4 g dan magnesium sulfat 3,5 g **Indikasi** Sebagai *feed Supplement* pada babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 2 kg untuk 100 kg pakan **Kementan RI** No. D. 10123947 FTS. Obat bebas terbatas

114. PIGMIX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1 300 mg, vit B2, vit B6, vit B12, calcium D-pantothenate 2.500 mg, nicotinic acid, folic acid 75 mg, choline chloride, lysine, methionine, manganese, iron, zinc, copper, iodine, cobalt, BHT dan zinc bacitracin **Indikasi** Melengkapi segala kebutuhan vitamin asam amino dan mineral pada babi. Mempercepat pertumbuhan babi, meningkatkan kesuburan serta meningkatkan produksi daging. Memperbaiki konversi ransum sehingga biaya untuk ransum menjadi lebih murah **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan secara merata ke tiap 100 kg ransum **Kemasan** Kantong plastik 500 g dan 1 kg. Wadah plastik 5 kg. Kantong kertas 25 kg **Deptan RI** No. D. 07021063 FTS. 2. Obat bebas terbatas

115. PIGNOX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung olaquinox 40 mg, vitamin A 5.000 IU, vit D3 800 IU, vit E 2 mg, vit K3 0,8 mg, vit B1 0,4 mg, vit B2 0,8 mg, vit B6 0,4 mg, vit B12 8 mg, nicotinic acid 8 mg, calcium D-pantothenate 6 mg, choline chloride 200 mg, methionine 40 mg, manganese 8 mg, iodine 0,4 mg, iron 16 mg, cobalt 0,2 mg, copper 20 mg, zinc 20 mg dan BHT (antioxidant) 1,5 mg **Indikasi** Untuk merangsang pertumbuhan anak babi serta mencegah mencret pada anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan secara merata ke dalam ransum **Kemasan** Kantong plastik 500 g. Wadah plastik 5 kg. Kantong kertas 25 kg **Deptan RI** No. D. 06121109 FTS. 2. Obat bebas terbatas

116. PIG – PREMIX

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, Fe, Mn, Mg, Zn, Cu, I, Ca, P dan Se **Indikasi** Melengkapi kebutuhan ternak akan vitamin dan mineral. Mencegah defisiensi vitamin dan mineral serta meningkatkan daya tahan tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** Babi: 1-2 kg/ton pakan. Babi bunting: 2 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 0502444 FTS. 1. Obat bebas terbatas

117. POULTRY VITAMIN PREMIX

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan nicotinic acid **Indikasi** Sebagai sumber

suplementasi iron pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 12114391 FTS. Obat bebas terbatas

118. PREMULAC – L

Nutrifeed, Netherland/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *sweet whey Powder*; *soy concentrated* dan *delactosed whey Powder* **Indikasi** Sebagai *skimmed milk Powder replacer* untuk anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 150 g/kg pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 07083258 FTS. Obat bebas terbatas

119. PROCHAL – CU

China Bestar Laboratories, Taiwan/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung cupric sulphate dan glycine **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi, unggas, sapi, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12014204 FTS. Obat bebas terbatas

120. PROCHAL – MnS

China Bestar Laboratories, Taiwan/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung manganese dan glycine **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi, unggas, sapi, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12014205 FTS. Obat bebas terbatas

121. PROCHAL – Zn

China Bestar Laboratories, Taiwan/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung zinc dan glycine **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi, unggas, sapi, domba dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Kementan RI** No. I. 12014203 FTS. Obat bebas terbatas

122. PROGENOS

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung L-arginine, vitamin E dan calcium **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* nutrisi untuk babi **Dosis dan Cara Pemakaian** 40 g/hari diberikan pada hari 16-28 sebelum kebuntingan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10103925 FTS. Obat bebas terbatas

123. PRO – MIX LAYER

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, nicotinamide, Ca-d-pantothenate, folic acid dan santquin **Indikasi** Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, meningkatkan mutu pakan dan melengkapi kebutuhan akan vitamin serta memperbaiki kualitas daging dan telur **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan ayam dan berikan selama 5-7 hari pada setiap periode pemberian **Kemasan** 500 g **Deptan RI** No. D. 0404124 FTS. 3. Obat bebas terbatas

124. PROMIX PREMIX

**DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/
DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folate, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 1210510 OHK. 1.

125. PROTECTOR MINERAL PREMIX I

**Centralys Div. Protector, Perancis/
Tigaka Distrindo Perkasa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung copper 6.000 mg, iron 50.000 mg, manganese 90.000 mg, zinc 85.000 mg, iodine 750 mg, cobalt 200 mg dan selenium 175 mg **Indikasi** Pelengkap mineral pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 03062594 FTS. Obat bebas terbatas

126. PROTECTOR MINERAL PREMIX II

**Centralys Div Protector, Perancis/
Tigaka Distrindo Perkasa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung sodium selenite anhydrous, Se, copper sulfate pentahydrate, Cu, calcium iodate anhydrous, I, manganese oxide anhydrous, zinc oxide, Zn, iron carbonate, Fe, cobalt carbonate monohydrate dan Co **Indikasi** *Feed Supplement* pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 kg/ton **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05042926 FTS. Obat bebas terbatas

127. PROTECTOR MINERAL PREMIX III

**Centalys Division Protector, Perancis/
Tigaka Distrindo Perkasa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung copper, iron, manganese, zinc, iodine, cobalt dan selenium **Indikasi** Pelengkap mineral pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 0,5 kg/ton pakan, kantung @ 25 kg **Deptan RI** No. I. 08013372 FTS. Obat bebas terbatas

128. PROTECTOR VITAMIN PREMIX I

**Centalys Division Protector, Perancis/
Tigaka Distrindo Perkasa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 20.000 000 IU, vit D3 4.000.000 IU, vit E, 40.000 mg, vit K3 8.000 mg, vit B1 4.000 mg, vit B2 10.000 mg, pantothenic acid 24.000 mg, vit B6 5.000 mg, niacin 70.000 mg, folic acid 2.000 mg, vit B12 50 mg **Indikasi** Pelengkap vitamin pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 10 kg **Deptan RI** No. I. 03062592 FTS. Obat bebas terbatas

129. PROTECTOR VITAMIN PREMIX II

**Centalys Division Protector, Perancis/
Tigaka Distrindo Perkasa**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 20.000 000 IU, vit D3 4.000.000 IU, vit E 40.000 mg, vit K3 8.000 mg, vit B1 4.000 mg, vit B2 10.000 mg, pantothenic acid 24.000 mg, niacin 70.000 mg, folic acid 2.000 mg, vit B12 50 mg, biotin

400 mg dan vit C 200.000 mg **Indikasi** Pelengkap vitamin pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung @ 10 kg **Deptan RI** No. I. 03062593 FTS. Obat bebas terbatas

130. PROVYSOL

Diasham Resources, Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung multivitamin, mineral, asam amino dan selenium **Indikasi** Sebagai *Supplement* pertumbuhan, memperbaiki performa dan antidefisiensi vitamin dan mineral pada ayam *broiler* dan *layer* **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 100 g dan 1 kg **Deptan RI** No. I. 09043606 FTS. Obat bebas terbatas

131. PX – X6CM

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I, sulfur, Co, vitamin A, vit D, vit E dan asam pantotenat **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082962 FTS. Obat bebas terbatas

132. PX – Y1BM

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I dan Se **Indikasi** *Supplement* mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 05082966 FTS. Obat bebas terbatas

133. PX – Z88

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin E **Indikasi** *Supplement* vitamin E pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 05082965 FTS. Obat bebas terbatas

134. PX – Z9AM

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung Cu, Fe, Mn, Zn, I dan Se **Indikasi** Penguat pertumbuhan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082984 FTS. Obat bebas terbatas

135. R. P. MINERAL

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Co 0,89 g, Cu 17,78 g, Fe 71,11 g, I 1,77 g, Mn 142,22 g, Zn 88,89 g, Se 0,35 g dan Ca 7,50 g **Indikasi** *Supplement* mineral untuk ayam dan sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan dan aduk hingga merata. Ayam *broiler starter, grower*: 450 g/ton pakan. *Breeder* : 575 g/ton pakan. Anak sapi, sapi potong: 300 g/ton pakan. Sapi perah: 350 g/ton pakan **Kemasan** Dos 25 kg @ 5 kg **Deptan RI** No. D. 0602781 FTS. 2. Obat bebas terbatas

136. RAMIKAL TRACE MINERAL PREMIX

Katraco Santika

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung Fe 83,5 g, Mn 210,8 g, Mg 3,54

g, Cu 6,62 g, I 0,68 g, Co 0,33 gr, Zn 138,25 g dan Se 0,33 g **Indikasi** *Supplement* mineral untuk hewan. Diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan bulu yang normal. Pembentukan kulit telur **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter, grower, broiler*: 500 g/ton makanan. *Layer*: 300 g/ton makanan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 06033058 PTS. 1. Obat bebas terbatas

137. RED ROCKIES

**Tithebarn Limited, Inggris/
Ekasapta Wijayatangguh**

Bentuk Sediaan Balok garam mineral **Komposisi** Mengandung Mg, Fe, Mn, Co, I, Se, Zn, Cu dan Na **Indikasi** *Supplement* mineral pada sapi, kuda dan kambing untuk meningkatkan pertumbuhan dan fertilitas **Dosis dan Cara Pemakaian** Diletakkan pada wadah (holder) dan digantung/ditempatkan dekat tempat makan hewan yang mempermudah hewan untuk menjilatinya **Kemasan** Karton 2x10 kg balok garam mineral (Licks) **Deptan RI** No. I. 06023048 FTM. Obat bebas terbatas

138. RHISOMIX 208

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1 kg mengandung vitamin A 62.500.000 IU, vit D3 12.500.000 IU, vit E 75.000 mg, vit K3 15.000 mg, vit B1 10.000 mg, vit B2 20.000 mg, vit B6 15.000 mg, vit B12 100 mg, biotin 250 mg, asam pantotenat 50.000 mg, asam nikotinat 150.000 mg, asam folat 2.500 mg, anti oxidant 10.000 mg, anti mold 10.000 mg dan micronized soybean meal qs 1 kg **Indikasi** *Supplement* vitamin dan asam amino pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter*: 300 g/ton pakan, *grower*: 150 g/ton pakan, *layer*: 200 g/ton pakan **Kemasan** 1 kg **Deptan RI** No. D. 0109892 FTS. Obat bebas terbatas

139. RHISOMIX

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1 kg mengandung vitamin A 4.000.000 IU, vit D3 800.000 IU, vit E 5.000 mg, vit K3 800 mg, vit B1 400 mg, vit B2 2.000 mg, vit B6 80 mg, vit B12 2.000 mg, calcium carbonate 1.200 mg, kolin chloride 100.000 mg, asam nikotinat 2.000 mg, asam folat 200 mg, D-L-methionin 60 g, L-lisin 18 g, Mg karbonat 10 g, Mn karbonat 19.200 mg, Zn karbonat 10.000 mg, iron sulphate 8.000 mg, copper sulphate 2.400 mg, cobalt sulfate 40 mg dan potassium iodide 240 mg **Indikasi** Pengobatan dan pencegahan defisiensi akut dan kronis, anoreksia, malnutrisi, periode menjelang kesembuhan, rachitis serta penurunan pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2,5 kg/ton pakan **Kemasan** 20 kg **Deptan RI** No. D. 04120849 FTS.1 Obat bebas terbatas

140. RHODIMIX 22

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 2.000.000 IU, vit D3 400.000 IU, vit E 2.000 mg, vit B2 1.200 mg, vit B12 2 mg, vit B6 200 mg, vit K3 100 mg, calcium D-pantothenate 1.500 mg, choline chloride 5.000 mg, DL-Methionine 50.000 mg, nicotinic acid 3.000 mg, iron 6.400 mg, copper 1.600 mg, magnesium 10.000 mg, zinc 8.000 mg, manganese 6.000 mg, cobalt 20 mg, iodine 20 mg dan antioxydant qs **Indikasi** Meningkatkan mutu pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur sampai merata dalam pakan. *Starter*: 500

g/100 kg makanan. *Grower*: 400 g/100 kg pakan. *Broiler*: 400 g/100 kg pakan **Kemasan** Dos 25 @ 5 kg **Deptan RI** No. D. 0606051 FTS. 3. Obat bebas terbatas

141. RHODIMIX 273

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 1.200.000 IU, vit D3 400.000 IU, vit E 500 mg, vit B2 800 mg, vit B12 1 mg, vit B1 100 mg, vit B6 20 mg, vit K3 400 mg, vit C 500 mg, calcium d-pantothenate 1.000 mg, choline chloride 15.000 mg, DL-methionine 5.000 mg, nicotinic acid 1.600 mg, calcium 2.000 mg, iron 3.600 mg, copper 1.200 mg, magnesium 7.000 mg, manganese 9.600 mg, zinc 3.000 mg, coblat 60 mg, iodine 120 mg dan antihydrant qs **Indikasi** Meningkatkan mutu makanan serta melengkapi kebutuhan vitamin, mineral dan asam amino **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan 500 g rhodimix 273 dalam 100 kg pakan, kemudian aduk sampai merata **Kemasan** Dos 25 kg @ 5 kg **Deptan RI** No. D. 0506055 FTS. 3. Obat bebas terbatas

142. RHODIMIX 784

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vit A 60.000.000 IU, vit D3 12.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit B1 8.000 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 8.000 mg, vit B12 80 mg, vit K3 12.000 mg, nicotinic acid 120.000 mg, Ca-d-pantothenate 60.000 mg, folic acid 6.000 mg dan vit C 15.000 mg **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur merata dalam pakan. *Starter*: 250 g/1 ton pakan. *Broiler finisher*: 500 g/3 ton pakan. *Grower*: 500 g/3 ton pakan. *Layer*: 500 g/3 ton pakan. *Breeder*: 250 g/1 ton pakan **Kemasan** Dos 10 kg **Deptan RI** No. D. 0509204 FTS. 3. Obat bebas terbatas

143. RHODIMIX CFX

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 3.6000.000 UI, vit D3 1.2000.000 UI, vit E 1,5 g, vit B2 2,4 g, vit B12 3 mg, vit B1 300 mg, vit B6 60 mg, vit K3 1,2 mg, vit C 1,5 g, Ca-pantotenat 3 g, choline klorida 45 g, methionin 15 g, asam nikotinat 4,8 g, Ca 6 g, Fe 10,8 g, Cu 3,6 g, Mg 21 g, Mn 28,8 g, Co 180 mg **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g dalam 300 kg pakan ayam **Kemasan** Dos @ 25 kg **Deptan RI** No. D. 0606042 FTS. 3. Obat bebas terbatas

144. RHODIMIX MB 100

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 2.500.000 UI, vit D3 500.000 UI, vit E 4,8 g, vit K3 125 mg, vit B2 1 g, 6,25 mg, asam nikotinat 4,8 g, Ca pantotenat 3,2 g, kolin klorida 50 g, Fe, Cn, Mn, Co, I, Zn dan Ca **Indikasi** *Feed Supplement* vitamin dan mineral untuk meningkatkan pertumbuhan serta produksi daging **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter*: 4 kg/ton pakan. *Grower/finisher/breeder* : 2,5 kg/ton pakan **Kemasan** Dos 5 kg **Deptan RI** No. D 0602198 FTS. 2. Obat bebas terbatas

145. ROMINDO MICROMIX 2000

Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B2, vit B12, vit K3, vit B1, vit B6, vit C, biotin, asam nikotinat, Ca-d pantotenat dan asam folat **Indikasi**

Supplement vitamin pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan sampai merata. *Starter*: 1 kg/4 ton pakan. *Grower*: 1 kg/5 ton pakan. *Laying*: 1 kg/6 ton pakan. *Breeder* : 1 kg/4 ton pakan **Kemasan** Dos 25 kg **Deptan RI** No. D. 12104366 FTS. Obat bebas terbatas

146. ROSIGOLD – P **DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/**
DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, niacin, pantothenic acid dan folic acid **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 03032542 FTS.

147. ROSIGOLD – S **DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/**
DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, niacin, pantothenic acid dan folic acid **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 03032541 FTS.

148. ROSIGOLD WSP **DSM Vitamins (Shanghai) Ltd/**
DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niacin, panthotenic acid, folic acid dan vit C **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk unggas dan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I. 04062774 FTS. Obat bebas terbatas

149. ROVIMIX 528 **Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate dan asam folat **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 06041632 FTS. 2. Obat bebas terbatas

150. ROVIMIX AQUA VIT PREMIX **Rovithai Ltd, Thailand/**
DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folat, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 0011463 FTS. Obat bebas terbatas

151. ROVIMIX CP 3 DC **Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2,

vit B6, biotin, niacin, asam panthotenat dan asam folat **Indikasi Supplement** vitamin untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 0102381 FTS. Obat bebas terbatas

152. ROVIMIX 8188 **Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, menadion, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, asam panthotenat, asam folat dan niacin **Indikasi** Suplemen vitamin untuk babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 05022368 FTS. 1. Obat bebas terbatas

153. ROVISOL DM 295 **Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, asam panthotenat, asam folat dan niacin **Indikasi** Suplemen vitamin untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 0104549 FTS. 1. Obat bebas terbatas.

154. ROVISOL JCI 1000 **DSM Nutritional Products Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenat, asam folate, iodine dan selenium **Indikasi Supplement** vitamin untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung @ 20 kg **Kementan RI** No. I. 1210875 FTS. 1. Obat bebas terbatas

155. ROVISOL JCI 1002 **DSM Nutritional Products Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**
(Vitamin Concentrate)
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenat, asam folat, iodine dan selenium **Indikasi Supplement** vitamin untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 0106834 FTS. Obat bebas terbatas

156. ROVISOL SP – 802 **Rovithai Ltd, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenat, asam folat dan antioksidan **Indikasi Supplement** vitamin untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 03022524 OHK.

157. SALIGRAN G120 **Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk granul **Komposisi** Mengandung salinomycin sodium **Indikasi** Antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 500 g/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03112676 FTS. Obat bebas terbatas

158. SANMIX

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, Ca-d-pantothenate, niacin, methionine, lysine, manganese, iron, iodine, zinc, cobalt, copper dan antioxiidan **Indikasi** Meningkatkan produksi telur dan memacu pertumbuhan serta meningkatkan produktivitas dan stamina tubuh **Dosis dan Cara Pemakaian** *Broiler*: 2-3 kg/ton pakan. *Layer* dan *breeder* : 3-4 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg isi 25 kg langsung atau 25 kantong plastik @ 1 kg **Deptan RI** No. D. 02081311 FTS. Obat bebas terbatas

159. SANVIMIN

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, nicotinamide, Ca-d-pantothenate, folic acid, biotin, DL-Methionine dan L-Lysine HCl **Indikasi** Meningkatkan produktivitas pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g/10 L air minum **Kemasan** 100 g, 1 kg, 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 07113342 FTS. Obat bebas terbatas

160. SEROLAT HL

Nutrifeed, Netherland/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *sweet whey Powder, soy concentrated, delactosed whey Powder, lactose dan premix* **Indikasi** Sebagai *skimmed milk Powder replacer* untuk babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan untuk fase *prestarter*: 150-250 g/kg pakan. Fase *weaning*: 100-150 g/kg pakan. Fase *starter*: 50-100 g/kg pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 09053614 FTS. Obat bebas terbatas

161. SEROLAT PEP

Nutrifeed, The Netherlands/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *sweet whey Powder, fatfilled whey Powder, partly delactosed whey Powder* dan *soy protein concentrate* **Indikasi** *Skimmed milk replacer* untuk anak babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan sebesar 250 g/kg pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04052754 FTS. Obat bebas terbatas

162. SIERAMIX – A

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 62.000.000 IU, vit D3 12.400.000 IU, vit E 150.000 mg, vit K3 15.000 mg, vit B1 10.000 mg, vit B2 25.000 mg, vit B6 15.000 mg, vit B12 80 mg, vit C 20.000 mg, biotin 1.000 mg, folid acid 5.000 mg, Ca-d-Pantothenate 60.000 mg dan niacin 150.000 mg **Indikasi** Membantu melengkapi kebutuhan akan vitamin pada pakan ternak serta meningkatkan efisiensi dan mutu pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter* dan *breeder* : 250 g/ton pakan ternak. *Broiler, grower* dan *layer*: 500 g/3 ton pakan ternak **Kemasan** Kantong plastik 500 g, 1 kg dan zak 25 kg **Deptan RI** No. D. 00111830 FTS. 1. Obat bebas terbatas

163. SIERAMIX – B

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung vitamin A 15.500.000 IU, vit D3 3.100.000 IU, vit E 37.500 mg, vit K3 3.750 mg, vit B1 2.500 mg, vit B2 6.250 mg, vit B6

3.750 mg, vit B12 20 mg, vit C 5.000 mg, biotin 250 mg, folid acid 1250 mg, Ca-d-Pantothenate 15.000 mg dan niacin 37.500 mg **Indikasi** Membantu melengkapi kebutuhan vitamin pada pakan ternak serta meningkatkan efisiensi dan mutu pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter* dan *breeder* : 1 kg/ton pakan ternak. *Broiler, grower* dan *layer*: 700 g/ton pakan ternak **Kemasan** Zak 25 kg **Deptan RI** No. D. 00111831 FTS. 1. Obat bebas terbatas

164. SINDOMIX 17 EM

Otasindo Prima Satwa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 360 mg, vit D3 5 mg, vit E 800 mg, vit K3 200 mg, vit B1 200 mg, vit B2 500 mg, vit B6 50 mg, vit B12 1.200 mcg, vit C 2.500 mg, Ca-d-pantothenate 600 mg, niacin 4.000 mg, choline chloride 1.000 mg, DL-Methionine 3.000 mg, L-Lysine 3.000 mg, manganese 12.000 mg, ferrous 2.000 mg, iodida 20 mg, cobalt 20 mg, zinc 10.000 mg, copper 400 mg dan olaquinox 2.100 mg **Indikasi** Memacu pertumbuhan ayam petelur dan *broiler* sehingga tercapai berat badan standard. Meningkatkan produksi dan berat telur, serta mencegah terjadinya telur tipis dan mudah pecah **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: *starter* 3,5 kg/ton pakan, *grower*: 2- 4 kg/ton pakan, *layer*: 2,5 kg/ton pakan, *broiler*: 3,5 kg/ton pakan **Kemasan** Zak 25 kg (@ 2,5 kg) **Kementan RI** No. D. 13022490 FTS. 1. Obat bebas terbatas

165. SP – V5

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12 dan vit K3 **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082962 FTS. Obat bebas terbatas

166. SP FV – 1

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, asam pantotenat, asam folat dan asam nikotinat **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082968 FTS. Obat bebas terbatas

167. STRESS BLOCK

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap 1 kg mengandung vitamin A 7.500.000 IU, vit D3 1.500.000 IU, vit E 10.000 mg, vit K3 1.000 mg, vit B1 500 mg, vit B2 250 mg, vit B6 2.000 mg, vit B12 12.500 mcg, vit C 30.000 mg, asam pantotenat 5.000 mg, folic acid 250.000, niasin 5.000 mg, elektrolit (K, Na, Cl, Mg) 10.000 mg dan mikro mineral (Mn, Zn, Co, Fe, I) 10.000 mg **Indikasi** Menanggulangi stres umum seperti stres vaksinasi, perubahan cuaca yang ekstrim, pelebaran atau pindah kandang, potong paruh, pada saat tingkat amoniak dan kelembaban tinggi serta keadaan lain yang menyebabkan stres **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 1 g/2-3 L air minum selama 5-7 hari atau 100 g/1.250-2.500 kg BB. Babi/pedet: 100 g/30 kg BB dan berikan 3-5 hari berturut-turut **Kemasan** 100 g, 1 kg, 10 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. D. 04120453 PTS. 1. Obat bebas terbatas

168. SUPER MIX

Agro Makmur Sentosa

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 1.200.000 IU, vit D3 200.000 IU, vit E 800 mg, vit K3 200 mg, vit B1 200 mg, vit B2 500 mg, vit B6 50 mg, vit B12 1.000 mg, asam askorbat 2.500 mg, Ca-d-pantothenat 600 mg, asam nikotinat 4.000 mg, asam folat 10 mg, choline chloride 1.000 mg, metionin 5.000 mg, lysine 2.500 mg, olaquinox 2.000 mg, Mn oxide 12.000 mg, Zn oxide 10.000 mg, Fe sulphate 2.500 mg, cooper sulphate 400 mg, cobalt Oxide 20 mg, kalium iodate 30 mg dan sodium selenite 10 mg **Indikasi** Untuk pengobatan dan pencegahan defisiensi akut dan kronis, anoreksia, malnutrisi, periode menjelang kesembuhan, rachitis serta penurunan pertumbuhan **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter*: 300-500 g/100 kg pakan. *Grower*: 200-400 g/100 kg pakan. *Layer*: 250-500 g/100 kg pakan. *Starter broiler*: 400-500 g/100 kg pakan. *Broiler finisher*: 250-300 g/100 kg pakan **Kemasan** 20 kg **Deptan RI** No. D. 02081243 FTS. Obat bebas terbatas

169. SWINE MINERAL PREMIX

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung iron, copper, zinc, manganese, selenium, cobalt dan iodine **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi mineral untuk babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 12064287 FTS. Obat bebas terbatas

170. SWINE VITAMIN PREMIX

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan nicotinic acid **Indikasi** Sebagai sumber suplementasi vitamin untuk babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan ternak **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 12074305 FTS. Obat bebas terbatas

171. THREAMINO

Evonik Industries AG/ PT Evonik Indonesia

Bentuk Sediaan Powder kristalin berwarna cokelat terang **Komposisi** Mengandung L-threonine 98,5-100% **Indikasi** Sebagai suplemen L-threonine dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 11084125 FTS. Obat bebas terbatas

172. TOP MIX HC

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 60.000.000 IU, vit D3 24.000.000 IU, vit E 120.000 mg, vit K3 12.000 mg, vit B1 8.000 mg, vit B2 24.000 mg, vit B6 8.000 mg, vit B12 80 mg, vit C 30.000 mg, calcium-D-pantothenate 60.000 mg, niacin 120.000 mg dan folic acid 6.000 mg **Indikasi** Meningkatkan efisiensi ransum, biaya ransum menjadi lebih murah. Memperbaiki dan meningkatkan produksi telur. Mencegah penyakit dan menekan angka kematian **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 kg tiap 6 ton ransum **Kemasan** Kantong 5 kg dan 50 kg **Deptan RI** No. D. 07091007 FTS. 2. Obat bebas terbatas

173. TOP MIX

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap kg mengandung vitamin A 1.200.000 IU, vit D3

200.000 IU, vit E 800 IU, vit K 200 mg, vit B1 200 mg, vit B2 500 mg, vit B6 50 mg, vit B12 1,2 mg, vit C 2.500 mg, calcium D-pantothenate 600 mg, niacin 4.000 mg, choline chloride 1.000 g, methionine 3.000 mg, lysine 3.000 mg, manganese 12.000 mg, iron 2.000 mg, iodine 20 mg, zinc 10.000 mg, cobalt 20 mg, copper 400 mg, santoquin 1.000 mg dan zinc bacitracin 2.100 mg **Indikasi** Memperbaiki konversi ransum sehingga biaya ransum menjadi lebih rendah. Anak ayam tumbuh lebih cepat, dan sehat. Ayam daging lebih berbobot (berat) karena Top Mix mengandung 2 asam amino. Meningkatkan efisiensi ransum. Meningkatkan dan memperpanjang masa produksi telur serta mencegah penyakit sehingga angka kematian menjadi lebih rendah **Dosis dan Cara pemakaian** Campurkan untuk setiap kg ransum. Ayam umur 0-8 minggu: 3-5 g. Umur 9-18 minggu: 2-4 g. Ayam petelur (*layer*): 2-4 g. Ayam pedaging: 3-5 g. Ayam pembibit (*breeder*): 5-7 g **Kemasan** Kantong plastik 100 g, 250 g, 500 g dan 5 kg. Kantong kertas 25 kg **Deptan RI** No. D. 0204151 FTS. 2. Obat bebas terbatas

174. TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 430

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan nicotinic acid **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin untuk ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk dicampur dalam pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10073861 PTS. Obat bebas terbatas

175. TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 528

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan nicotinic acid **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin untuk ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Untuk dicampur dalam pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10073862 PTS. Obat bebas terbatas

176. TRYPAMINO

Evonik Industries AG/ PT Evonik Indonesia

Bentuk Sediaan Powder kristalin berwarna putih abu-abu terang **Komposisi** Mengandung L-tryptophan 98-100% **Indikasi** Sebagai suplemen L-tryptophan dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak **Kemasan** Bag 10 kg **Deptan RI** No. I. 11084126 FTS. Obat bebas terbatas

177. ULTRA - PEL

Uniscope Inc., USA/Behn Meyer Chemicals

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *food starch* (modified) dan sodium aluminosilicate **Indikasi** Sebagai *pellet binder* untuk pakan ternak dan *aquaculture* **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan setelah fase penggilingan pakan atau ditambahkan ke dalam bahan baku pakan yang akan dibentuk menjadi *pellet* dengan dosis 500 g-1,5 kg/ton pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05062948 FTS. Obat bebas terbatas

178. UNIMINERAL

Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung cobalt 400 mg, copper 8.700 mg,

ferrum 108.000 mg, iodine 900 mg, manganese 260.000 mg, zinc 173.000 mg dan selenium 500 mg **Indikasi** Membantu melengkapi kebutuhan mineral essensial pada ternak sehingga mencegah defisiensi mineral esensial dan memacu produktifitas ternak dan meningkatkan daya tahan terhadap stress. Bila dipakai bersama Sieramix A/B akan menyempurnakan kandungan vitamin mineral essensial dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 300 g/ton pakan ternak **Kemasan** Zak 25 Kg **Kementan RI** No. D. 11061804 FTS. 2. Obat bebas terbatas

- 179. VB – 1093 T** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, asam pantotenat, asam folat dan asam nikotinat **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082964 FTS. Obat bebas terbatas

- 180. VB – 1099 SL** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, asam pantotenat, asam folat dan asam nikotinat **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082970 FTS. Obat bebas terbatas

- 181. VBBR – 0899/SL** **Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, vit H2, vit C, asam pantotenat, asam folat dan asam nikotinat **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082969 FTS. Obat bebas terbatas

- 182. VETAMIX** **Vetindo Citrapersada**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1 kg mengandung *trace element* dan vitamin: Co, Cu, Fe, J2, Mn, Se, dan Zn, vitamin A, vit D3, vit E, mineral: calsium, fosfor, magnesium dan natrium **Indikasi** Umum: memenuhi kebutuhan nutrisi mineral dan *trace element* yang dilengkapi dengan vitamin A, vit D3 dan vit E. Meningkatkan dan memperbaiki efisensi pakan dan konversi pakan. Mempercepat dan memperbaiki pertumbuhan hewan muda dan meningkatkan produktivitas hewan dewasa. Mencegah dan mengobati defisiensi dan *trace element*. Khusus pada unggas: meningkatkan produksi dan kualitas daging dan telur. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stress dan infeksi penyakit serta memelihara kestabilan produksi yang optimal. Hewan besar (sapi, kuda, babi, kambing dan domba): meningkatkan produksi dan kualitas daging dan air susu. Mencegah penyakit milk fever atau hypocalsemia pada induk menjelang kelahiran atau seang menyusui terutama pada sapi perah yang produksinya tinggi. Mencegah penyakit grass tetani atau hypomagnesemia terutama pada sapi potong. Mencegah penyakit rachitis atau osteomalacia karena defisiensi kalsium, fosfor dan vitamin D3 **Dosis dan Cara Pemakaian** Hewan besar (dosis/ekor/hari): anak babi, kambing dan domba: 5-10 g. Anak sapi dan kuda: 25-50 g. Babi, kambing dan domba dewasa: 25-50

g. Sapi potong, sapi perah kering kandang dan kuda: 50-75 g. Sapi perah produksi: 75-100 g
Kemasan 1 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 99061594 FTS. 1. Obat bebas terbatas

183. VETMIX AQUAVIT

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap 1 kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, biotin, calsium D panthothenat, folic acid, nicotinamide, choline chloride-50%, anti jamur, antioksidan dan mikromineral (cobalt, copper, iodine, manganese, selenium, zinc) **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh pada udang dan ikan sehingga daya hidup (survival rate) tinggi. Merangsang pertumbuhan yang cepat terutama udang dan ikan muda, sekaligus memperbaiki konversi pakan. Meningkatkan mutu pakan dan membantu proses pembentukan warna pada kulit udang maupun ikan secara mantap. Membantu proses moulting secara teratur dan alami serta mengurangi jumlah udang yang kropos. Mencegah dan mngurangi stress yang disebabkan oleh perubahan cuaca, transportasi, perubahan pakan, mutu pakan yang jelek dan lain-lain. Membantu proses metabolisme tubuh sehingga pertumbuhan, produksi dan pekembangbiakan (reproduksi) tercapai secara optimal. Mengobati dan mencegah defisiensi vitamin dan micromineral **Dosis dan Cara Pemakaian** Tambak udang: 2 g/1 kg pakan udang setiap hari dan diberikan pada udang yang sudah mulai makan pakan jadi hingga panen. 4 g/1 kg pakan udang setiap hari hingga normal untuk udang yang mengalami stress, nafsu makan turun/ berkurang, angka kematian tinggi, perubahan lingkungan yang dratis dan udang sedang sakit maupun yang baru sembuh dari sakit. *Feedmill*: 2,5-5 kg/ton pakan udang dan 1,25-2,5 kg/ ton pakan ikan **Kemasan** 500 g **Deptan RI** No. D. 98071476 FTS. 1. Obat bebas terbatas

184. VETMIX POULTRY HIGH CONCENTRATES

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap 1 kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, calsium D panthothenat, folic acid, nicotinamide, antioksidan dan mikromineral (cobalt, copper, iodine, manganese, selenium, zinc) **Indikasi** Merupakan inti dari berbagai vitamin yang akan mempersiapkan dan mempertahankan tingkat prouksi optimum yang stabil dari ternak anda **Dosis dan Cara Pemakaian** Dosis/ton pakan. Unggas *broiler starter*: 275 g, *broiler finisher*: 200 g, *layer starter*: 275 g, *grower/developer layer*: 175 g **Kemasan** 15 kg **Deptan RI** No. D. 98071464 PKS. 1. Obat keras

185. VETMIX POULTRY PLUS

Vetindo Citrapersada

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap 1 kg mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, calsium D panthothenat, kolin klorid, folic acid, nicotinamide, metionine, dan mikromineral (cobalt, copper, iodine, manganese, selenium, zinc) **Indikasi** *Supplement* vitamin, asam amino dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter*: 3 kg/ton pakan. *Layer starter*: 2,5 kg/ton pakan. *Grower layer*: 2 kg/ton pakan. *Layer*: 2,5 kg/ton pakan. *Breeder* : 3 kg/ton pakan **Kemasan** 4 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 98071464 PKS. 1. Obat bebas terbatas

186. VET – MIX

Mitravet

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap kg mengandung vitamin A 1.200.000 IU, vit D3 240.000 IU, vit E 1.800 mg, vit K3 240 mg, vit B1 240 mg, vit B2 720 mg, vit B6 480 mg, vit B12 2.400 mcg, Ca-d-Pantothenate 1.296 mg, niacinamide 4.800 mg, folic acid 120 mg, biotin 2 mg, DL methionin 3.000 mg, L-Lysin 3.000 mg, choline chloride 1.000 mg, mangan oxide 12.000 mg, ferrous sulfate 2.000 mg, zinc oxide 10.000 mg, copper sulfate 400 mg, magnesium sulfate 5.000 mg, zinc bacitracin 2.100 mg, antioxidant dan *carrier* ad 1.000.000 mg **Indikasi** Memperbaiki pertumbuhan berat badan ayam (*broiler*, *starter* dan *grower*). Mengoptimalkan pertumbuhan dan pembentukan organ produksi telur (umur 8-17 minggu) serta memperbaiki efisiensi pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** *Starter* 0-8 minggu: 3-5 kg/ton pakan, umur 9-18 minggu: 2-4 kg/ton pakan. *Broiler*: 3-5 kg/ton pakan. *Layer*: 2-4 kg/ton pakan. *Breeder*: 5-7 kg/ton pakan **Kemasan** 1 kg dan 25 kg **Kementan RI** No. D. 12074315 FTS. Obat bebas terbatas

187. VIMMUNE

Jordan Golden Rose for Medical oils Ltd./Biotek Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung minyak almond, olive, soya bean, lavender, eucalyptus, coconut, peppermint, sesamun seeds, citrus dan *emulsifier* **Indikasi** Merupakan campuran minyak herbal (Essential oil) yang bermanfaat untuk: Memperbaiki fungsi kekebalan alami, ketidakseimbangan dalam tubuh, stress dan yang berhubungan dengan fisiologi reaksi pertahanan/kekebalan. Membantu memperbaiki sistem saraf pusat dan segera menghentikan infeksi mikroorganisme. Meningkatkan mekanisme pertahanan non-spesifik melawan mikroorganisme **Dosis dan Cara Pemakaian** 0,2 ml/kg BB melalui air minum selama 5 hari berturut-turut dan dilanjutkan dengan selang waktu 3 hari **Kemasan** Botol 1 L **Kementan RI** No. I. 12034245 FTC. Obat bebas terbatas

188. VITA SOLE

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit C, vit H2, vit K3, calpan, folic acid dan niacinamid **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10103924 FTS. Obat bebas terbatas

189. VITAL PREMIX

DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, biotin, niacin, asam panthotenate, asam folate, iodine dan selenium **Indikasi** *Supplement* vitamin untuk pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 1210591 OHK. 1.

190. VITALINK BV 218 BROILER

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

VITAMIN PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat dan D-biotin **Indikasi**

Supplement vitamin pada pakan unggas (*broiler*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022882 FTS. Obat bebas terbatas

191. VITALINK LV118 LAYER

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

VITAMIN PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat dan D-biotin **Indikasi** *Supplement* vitamin pada pakan unggas (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022878 FTS. Obat bebas terbatas

192. VITALINK LVM 102 LAYER

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

STARTER PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt dan L-lysine **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan unggas (*layer*) **Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022885 FTS. Obat bebas terbatas

193. VITALINK LVM 202 LAYER

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

PULLET PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan unggas (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022886 FTS. Obat bebas terbatas

194. VITALINK LVM 302 LAYER

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

PHASE I PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi** *Feed Supplement* vitamin pada pakan unggas (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022887 FTS. Obat bebas terbatas

195. VITALINK LVM 402 LAYER

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

PHASE II PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral pada pakan unggas (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022888 FTS. Obat bebas terbatas

- 196. VITALINK LVM 702** **Crown Pacific Biotechnology, Singapore/**
LAYER PREMIX **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi Supplement** vitamin dan mineral pada pakan unggas (*layer*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022889 FTS. Obat bebas terbatas
- 197. VITALINK PV5288 POULTRY** **Crown Pacific Biotechnology, Singapore/**
VITAMIN PREMIX **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat dan D-biotin **Indikasi Supplement** vitamin pada pakan unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022884 FTS. Obat bebas terbatas
- 198. VITALINK SV 318 SWINE** **Crown Pacific Biotechnology, Singapore/**
VITAMIN PREMIX **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat dan D-biotin **Indikasi Supplement** vitamin pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022883 FTS. Obat bebas terbatas
- 199. VITALINK SVM 105 SWINE PRE –** **Crown Pacific Biotechnology, Singapore/**
STARTER PREMIX **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi Feed Supplement** pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022890 FTS. Obat bebas terbatas
- 200. VITALINK SVM 205 SWINE** **Crown Pacific Biotechnology, Singapore/**
STARTER PREMIX **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi Feed Supplement** pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022891 FTS. Obat bebas terbatas
- 201. VITALINK SVM 305 SWINE** **Crown Pacific Biotechnology, Singapore/**
GROWER PREMIX **SHS International**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, copper, I,

Se, cobalt, L-lysine dan DL-methionine **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022892 FTS. Obat bebas terbatas

202. VITALINK SVM 405 SWINE

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

FINISHER PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, cooper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methione **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022893 FTS. Obat bebas terbatas

203. VITALINK SVM 505 SWINE

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

GESTATION PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, cooper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methione **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022894 FTS. Obat bebas terbatas

204. VITALINK SVM 605 SWINE

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

GESTATION PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, cooper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methione **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022895 FTS. Obat bebas terbatas

205. VITALINK SVM 705 SWINE

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

PREMIX

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, niasin, asam folat, asam D-pantotenat, D-biotin, Fe, Zn, Mn, cooper, I, Se, cobalt, L-lysine dan DL-methione **Indikasi** *Feed Supplement* pada pakan babi **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 25 kg dan 30 kg **Deptan RI** No. I. 05022896 FTS. Obat bebas terbatas

206. VITALINK VP 50180

Crown Pacific Biotechnology, Singapore/

SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D, vit E, vit K3, vit B1, vit B2, vit B6, niasin, asam folat, asam D-pantotenat dan D-biotin **Indikasi** Premiks pada ikan **Kemasan** Kantung 25 kg **KKP RI** No. I. 12102013 PKS. Obat bebas terbatas.

207. VITLECT XP

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit C, sodium dan kalium **Indikasi** Sebagai sumber *Supplement* vitamin dalam air minum **Dosis dan Cara Pemakaian** *Poultry*/babi: 1-2 g/L air minum **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. D. 10033812 FTS. Obat bebas terbatas

208. VITRAMIX – LC

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Tiap kg mengandung DL-methionine 10.000 mg, vitamin A 1.500.000 IU, vit D3 500.000 IU, vit E 600 IU, vit K-3 400 mg, vit B1 150 mg, vit B2 800 mg, vit B6 100 mg, vit B12 1.000 mcg, vit C 500 mg, folic acid 50 mg, Ca D-pantothenate 1.000 mg, nicotinamide 2.000 mg, iron 4.000 mg, manganese 10.000 mg, iodine 120 mg, zinc 5.000 mg, copper 1.200 mg, cobalt 60 mg dan magnesium 5.000 mg **Indikasi** Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan mutu pakan sehingga mempercepat pertumbuhan. Meningkatkan produksi telur, memperbaiki kualitas telur, fertilitas dan daya tetas telur. Mencegah stress dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: *starter* 1 kg/200 kg pakan, *grower* 0,6 kg/200 kg pakan, *layer* 0,8 kg/200 kg pakan, *broiler* dan *breeder* 1 kg/200 kg pakan **Kemasan** ½ kg, 1 kg, 5 kg dan 25 kg **Deptan RI** No. D. 04041175 FTS. 2. Obat bebas terbatas

209. VITRAVIT

Sumber Multivita

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 50.000.000 IU, vit D3 10.000.000 IU, vit E 100.000 mg, vit K3 10.000 mg, vit C 200.000 mg, vit B1 10.000 mg, vit B2 20.000 mg, vit B6 20.000 mg, vit B12 40.000 mcg, Ca-d-pantothenate 30.000 mg, niacine 100.000 mg dan folic acid 2.500 mg **Indikasi** Meningkatkan kesehatan dan produktivitas unggas. Membantu penyerapan sari makanan pada saluran pencernaan unggas. Mencegah penyakit unggas yang disebabkan oleh defisiensi vitamin primer. Meningkatkan produksi dan daya tetas telur pada ayam *breeder*. Dapat diberikan bersama dengan antibiotika dalam pengobatan. Untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** 1 g dilarutkan dalam 5 L air minum dan diberikan selama 5-7 hari berturut-turut **Deptan RI** No. D. 00111081 FTS. 1. Obat bebas terbatas

210. VL – 1093 T

Chai Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, vit H2, asam pantotenat, asam folat dan asam nikotinat **Indikasi** *Supplement* vitamin dan mineral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082971 FTS. Obat bebas terbatas

211. VS – 1093 T

Chai Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, vit K3, asam pantotenat, asam folat dan asam nikotinat **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082977 FTS. Obat bebas terbatas

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin E, vit C dan inositol **Indikasi** *Supplement* vitamin pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Kantung 20 kg **Deptan RI** No. I. 05082973 FTS. Obat bebas terbatas

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung cobalt, copper, iodine, iron, manganese, selenium dan zinc Indikasi Konsentrat mineral premix yang diformulasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi telur dan reproduksi pada ayam Dosis dan Cara Pemakaian Campuran 500 g/MT pakan Kemasan Kantong 25 kg Kementan RI No. I. 13024454 FTS.

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung vitamin A, vit D3, vit E, vit K, vit B1, vit B2, vit B6, vit B12, biotin, pantothenic acid, folic acid dan nicotinic acid Indikasi Konsentrat vitamin premix yang diformulasikan untuk meningkatkan pertumbuhan, produksi telur dan reproduksi pada ayam Dosis dan Cara Pemakaian Campuran 250 g/MT pakan Kemasan Kantong 25 kg Kementan RI No. 1. 13034467 FTS.

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/Zagro Indonesia

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung vitamin B1, vit B2, vit B6, vit B12, pantothenic acid dan nicotinamide Indikasi Mencegah defisiensi vitamin B complex pada ayam, babi, domba, kambing dan sapi Dosis dan Cara Pemakaian Ayam, babi, domba, kambing dan sapi: campurkan 1 ml Zagrosol B-Complex dalam 2 L air minum Kemasan Botol 1 L dan 5 L
Kementan RI No. 1. 13014438 FTC.****

Bab IV.

Paparan Pemerian Sediaan **Alami**

Paparan pemerian (*Description*) obat hewan disusun sesuai dengan golongan obat hewan berdasarkan farmakologi. Dalam setiap kelompok, sediaan obat hewan disusun menurut alfabetis nama dagangnya. Secara umum penyusunan materi ini dimulai dari nama obat hewan, nama produsen, nama importir (bila ada), nama distributor, bentuk sediaan, komposisi, indikasi, kontra indikasi (bila ada), peringatan (bila ada), dosis, cara pemakaian, kemasan, nomor pendaftaran dan klasifikasi obat hewan. Paparan sediaan ini disusun sejauh mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

BAB IV. SEDIAAN ALAMI

04

1. AMMOTROL

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap g mengandung ekstrak tanaman *Yucca schidigera* 100 mg **Indikasi** Pada unggas: Mengontrol kadar amonia dan bau di area peternakan. Meningkatkan FCR (*Feed Conversion Ratio*), meningkatkan berat badan, dan memperbaiki produksi telur. Pada babi: Mengontrol kadar amonia dan bau di area peternakan serta meningkatkan berat badan. Pada ruminansia: Mengontrol kadar amonia dan bau di area peternakan serta meningkatkan performa ternak **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari langsung **Dosis dan Cara Pemakaian** Unggas: 0,5-1 g/2 L air minum, diberikan setiap hari selama 3-6 minggu. Babi, sapi, kambing, dan domba: 1 g/kg pakan, diberikan setiap hari selama 3-6 minggu. Untuk disemprot ke feses: pemberian awal: 30 g dilarutkan dalam 1,5 L air (disemprot ke 1 m³ (1000 liter) feses, diulang tiap 3 hari selama 15 hari. Pengulangan: 15 g serbuk dilarutkan dalam 1,5 L (disemprot ke 1 m³ (1.000 L) feses seminggu sekali **Kemasan** Sachet 250 g **Kementan** No. D. 12104369 FTS. Obat bebas terbatas

2. AROMEX

Delacon Austria/Hannachemie Sugindra

Bentuk Sediaan Serbuk beraroma bumbu **Komposisi** Mengandung *Thyme extract* dan zat bitter **Indikasi** Pemacu pertumbuhan alami dan alternative untuk menggantikan *agp/antibiotic growth promoters* **Dosis dan Cara Pemakaian** 100-150 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg/bag **Deptan RI** No. I. 0109244 ATS. Obat bebas terbatas

3. DERMAVET CREAM

Cipla Ltd, India/Paeco Agung

Bentuk Sediaan Salep (krim topikal) **Komposisi** Mengandung sal (*Shorea robusta*) resin, neem (*Azadirachta indica*) patra, karanj (*Pongamia pinnata* beej), chakramarda (*Cassia tora*) beej, pakar (*Ficus infectoria*) bark, yashtimadhu (*Glycyrrhiza glabra*) root, malkangini (*Celastrus paniculatus*) beej dan jasad bhasma (Zinc oxide) **Indikasi** Untuk pengobatan luka. Luka *superficial* dan luka septik pada hewan anjing, kucing dan kuda **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan 2x sehari atau sesuai petunjuk dokter hewan. Gunakan diseluruh permukaan luka. Jika dalam 10 hari tidak menunjukkan kondisi yang membaik, silahkan konsultasikan ke dokter hewan anda **Kemasan** Tube 20 g dan 100 g **Kementan RI** No. I. 11054086 PTM. Obat bebas terbatas

4. FRESTA

Delacon Austria/Hannachemie Sugindra

Bentuk Sediaan Serbuk beraroma bumbu **Komposisi** Mengandung *Rosemarry extract* dan flavonoids **Indikasi** Pemacu pertumbuhan alami, alternative untuk menggantikan *agp/antibiotic growth promoters* **Dosis dan Cara Pemakaian** 250 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg/bag **Deptan RI** No. I. 03012520 FTS. Obat bebas terbatas

5. HERBAGRO 311

Vaksindo Satwa Nusantara

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Setiap 1.000 g mengandung ekstrak terstandarisasi *Curcuma domestica* 35%, *Zingiber officinale* 15%, *Phyllanthus niruri* 20%, *Andrographis paniculata* 10% dan *Piper bettle* L 10% **Indikasi** Meningkatkan nafsu makan, meningkatkan produksi daging dan telur. Menekan pertumbuhan bakteri patogen pada saluran pencernaan. Meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Meningkatkan daya tahan tubuh, tidak meninggalkan residu pada daging dan telur, aman dikonsumsi, ramah lingkungan serta mengurangi kadar amoniak pada kotoran **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan secara merata kedalam pakan ayam *starter*: 500g/ton pakan, *grower/finisher*: 250 g/ton pakan. Untuk mengatasi infeksi salmonella: 500 g/ton pakan **Kemasan** Sachet 500 g **Deptan RI** No. D. 06053080 PTS. TM. Obat bebas terbatas

6. KUMARUK HERBAL

Degepharm

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung daun pepaya (*Caricae folium*), rimpang kunyit (*Curcuma domestica rhizoma*), rimpang temu hitam (*Curcuma aeruginosae rhizoma*), rimpang temulawak (*Curcuma rhizoma*), umbi bawang putih (*Alii sativi bulbus*) dan *Echinacea purpurea* ekstrak kering **Indikasi** Untuk meningkatkan nafsu makan pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Sachet 250 g, 500 g dan 1 kg **Deptan RI** No. D. 06083092 ATS. Obat bebas terbatas

7. MENTOFIN

**EWABO CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG, Germany/
Sehat Cerah Indonesia**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung mentol dan cineol (eucalyptol) **Indikasi** Mengurangi efek yang timbul pada saluran pernafasan setelah vaksinasi IB dan ND pada unggas **Perhatian** Jangan diberikan bersamaan dengan antibiotika atau kemoterapika lainnya **Dosis dan Cara Pemakaian** Pencegahan umum: campuran 200 ml dalam 1.000 L air minum dan diberikan 2x seminggu tiap 12 jam/hari. Atau encerkan 100 ml dalam 5 L air untuk 10.000 ekor unggas dan diberikan 2x seminggu atau jika diperlukan untuk pemberian melalui penyemprotan. Pencegahan khusus untuk mengatasi reaksi setelah vaksinasi: campuran 200 ml dalam 1.000 L air dan diberikan 2 hari setelah vaksinasi ND/IB selama 3 hari tiap 24 jam. Pencegahan khusus terhadap masalah pernafasan pada akhir siklus produksi: campuran 200 ml dengan 1.000 L air dan berikan pada hari ke 26-28 tiap 12 jam/hari **Kemasan** Botol 1 L dan 250 ml **Deptan RI** No. I. 08043415 PTC. Obat bebas terbatas

8. PROMOZEN – L

**ELT Science Corporation, Korea/
Blue Sky Biotech**

Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung extract *Artemisia capilaris thumb* **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki konversi pakan serta memperbaiki produksi dan kualitas telur ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Campurkan dalam air minum dengan dosis 10-50 ml/1.000 ekor/hari selama 5-7 hari **Kemasan** Sachet 50 ml dan Botol HDPE 100 ml, 1 L dan 5 L **Deptan RI** No. I. 09043611 FTC. Obat bebas terbatas

9. PUMA (PUTU MACAN)

Kusuma Makmur, UD

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung *Curcuma xanthoriza roxb*, *Curcuma aegruginosa*, *Zingiber zerumbet* dan sulfur crudum **Indikasi** Meningkatkan efisiensi pakan pada kuda, sapi, kerbau dan kambing **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Kantung 50 g **Deptan RI No. D. 05082960 ATS.** Obat bebas terbatas

10. SGT MUAANDHI DEWE

Jamu Ayam Serba Guna

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung *Curcuma heiyana*, *Phayllanthus niruri*, *Andrographis paniculata*, carbon dan chlor **Indikasi** Menambah nafsu makan dan sebagai roboransia untuk unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada kemasan **Kemasan** Kantung plastik 100 g **Deptan RI No. D. 05092994 JTS.** Obat bebas terbatas

11. SUPLEMEN HERBAL SENIOR

Monrad Lumban Holbung

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung *Pandanus amaryllifolius roxb* 10 g, *Phyllanthus niruri* L 50 g, *Amomum cardamomum willd* 10 g, *Zingiber zerumbet* L 27 g, *Apium graveolens* L 30 g, *Anethum graveolens* L 25 g, *Ocimum americanum* L 10 g, *Cinnamomum burmannii* (Nees & T. Nees) Blume 10 g, *Myristica fragrans houtt* 10 g dan *Zingiber officinale rosae* 20 g **Indikasi** Meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kualitas daging, mengurangi bau kotoran serta jumlah frekuensi kotoran **Dosis dan Cara Pemakaian** Diberikan pertama kali pada saat ayam berumur 0 hari sampai panen (1 L dicampur 500 L air). Apabila ayam mengalami suatu penyakit flu, stress, dll., maka lakukan pemberian dengan cara ditetaskan ke mulut ayam sebanyak 2 cc tanpa dicampur dengan air. Apabila terjadi kasus wabah flu burung pemakaian dosis menjadi 1 L dicampur dengan 100 L air **Kemasan** Sachet, botol 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L dan gallon **Kementan RI No. D. 13034480 ATS. ******

Bab V.

Paparan Pemerian Sediaan **Lain-lain**

Paparan pemerian (*Description*) obat hewan disusun sesuai dengan golongan obat hewan berdasarkan farmakologi. Dalam setiap kelompok, sediaan obat hewan disusun menurut alfabetis nama dagangnya. Secara umum penyusunan materi ini dimulai dari nama obat hewan, nama produsen, nama importir (bila ada), nama distributor, **Bentuk Sediaan**, **Komposisi**, **Indikasi**, kontra **Indikasi** (bila ada), peringatan (bila ada), dosis, cara pemakaian, **Kemasan**, nomor pendaftaran dan klasifikasi obat hewan. Paparan sediaan ini disusun sejauh mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

BAB V. SEDIAAN LAIN-LAIN

05

KOSMETIKA (SHAMPO, DEODORANSIA, PARFUM)

05.01

1. MEDILAN

Pyridam Veteriner

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Tiap L mengandung cethyltrimethyl-ammonium bromide 40 mg dan non ionic detergent 30 ml **Indikasi** Sebagai shampoo untuk memandikan anjing, kucing dan kuda. Menjadikan bulu hewan bersih, bebas ketombe dan dilengkapi dengan parfum sehingga memberikan aroma wangi pada hewan peliharaan **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 20 ml ke dalam 1 L air hangat, usapkan pada hewan yang sudah dibasahi pada sepanjang punggung hewan. Ratakan ke seluruh tubuh hewan sambil menggosok kulit hewan. Bilas dengan air bersih dan ulangi sekali lagi, kemudian keringkan dengan handuk atau hair dryer **Kemasan** 240 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 0503662 PTC. 2. Obat bebas terbatas

2. SEBOLYTIC

Virba SA., Perancis/Emvi Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung salicyl acid, sulfur, soluble coal tar, sodium lauryl sulphate, triethanolamine, magnesium aluminium silicate, hydroxypropylmethylcellulose, perfume jasmine PG dan sebolytic microcapsule **Indikasi** Shampo dengan aktivitas keratoplastic, keratolytic, antiseborrheic. Efektif untuk kontrol penyakit kulit yang berhubungan dengan sindrom keratoseborrheic yang berminyak **Dosis dan Cara Pemakaian** Basahi anjing dengan air hangat, gunakan shampo secukupnya secara menyeluruh pada tubuh anjing, pijat, dan bilas. Dapat digunakan 2-3 kali seminggu sampai gejala hilang **Kemasan Botol** 200 ml **Deptan RI** No. I. 04042748 PBC.****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

PELARUT VAKSIN, AQUADEST

05.02

1. **AQUA DESTILATA STERIL** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Pelarut untuk injeksi **Komposisi** Mengandung aquadestilata 100% **Indikasi** Sebagai pelarut untuk sediaan injeksi dan sebagai pelarut untuk vaksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Sesuai cara pakai yang tertera pada sediaan obat atau vaksin yang akan dilarutkan **Kemasan** Botol 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml dan 1 L **Deptan RI** No. D. 06041087 PKC.
2. Obat keras
2. **AQUADESTILLATA** **Wonderindo Pharmatama**
Bentuk Sediaan Pelarut injeksi **Komposisi** Mengandung aquadest steril **Indikasi** Digunakan sebagai pelarut obat, pelarut vaksin dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan aquadest sesuai takarannya, baik untuk pelarut maupun untuk keperluan lainnya **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 10013781 PKC. Obat bebas terbatas
3. **AQUAVET** **Duta Kaiser Pharmacy**
Bentuk Sediaan Air steril untuk injeksi **Komposisi** Mengandung aquabidest steril **Indikasi** Pelarut injeksi **Perhatian** Simpan di tempat sejuk, kering dan terlindung dari cahaya dan panas. Dalam wadah tertutup rapat/kedap udara **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan** **Kemasan** Vial 20 ml, botol 100 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 05032910 PKC. Obat keras
4. **AVIBLUE** **Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/
Lohmann Animal Health Indonesia**
Bentuk Sediaan *Granulate effervescent* **Komposisi** Mengandung sodium thiosulfate, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate, citric acid, polyethileneglycol, patent blue 5 dan serbuk *skim* milk **Indikasi** Sebagai *water stabilizer* yang menetralkan bahan-bahan didalam air minum yang dapat membahayakan vaksin aktif. Sebagai sumber susu *skim* dan bahan-bahan lain yang biasa ditambahkan pada air minum saat vaksinasi. Sebagai *coloring agent* yang dapat memberi gambaran distribusi vaksin aktif yang merata pada ayam (terlihat biru pada lidah/*crop*) **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 125 g kedalam 1.000 L air minum (setara dengan 1 tutup botol AviBlue untuk 200 L air) **Kemasan** Botol 375 g **Kementan RI** No. I. 10123965 PTS. Obat bebas terbatas
5. **AVIMILK** **Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/
Sehat Cerah Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung *sweet whey powder* **Indikasi** Menjaga stabilitas vaksin oral pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan 1 kg dengan 200 ml air minum **Kemasan** Sak 1 kg, 5 kg dan 10 kg **Deptan RI** No. I. 10123951 PTS. Obat bebas terbatas

6. AVIPRO DILUDROP

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung povidone, sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate dehydrate dan disodium hydrogen phosphate dehydrate **Indikasi** Sebagai pelarut vaksin aktif **Dosis dan Cara Pemakaian** 34 ml pelarut untuk 1.000 dosis vaksin aktif. Diberikan secara tetes mata, tetes mulut atau tetes hidung **Kemasan Botol 34 ml Deptan RI No. I. 04103742 VTC.** Obat bebas terbatas

7. AVIPRO DILUJECT

Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/

Lohmann Animal Health Indonesia

Bentuk Sediaan Cairan Komposisi Mengandung saccharum, potassium dihydrogen phosphate, potassium monohydrogen phosphate, sodium glutamate dan lactalbumin hydrolysate **Indikasi** Sebagai pelarut vaksin REO aktif dan vaksin merek **Dosis dan Cara Pemakaian** 200 ml AviPro Diluject untuk 1.000 dosis vaksin. Diberikan secara injeksi IM atau SC **Kemasan Botol 200 ml Kementan RI No. I. 13104642 PTC.** Obat bebas terbatas

8. CEVAMUNE

Ceva Animal Health Indonesia/Sante Animale, Perancis

Bentuk Sediaan Tablet effervescent Komposisi Mengandung sodium thiosulfate 1,5 g dan blue dye (pewarna) 1,2 g **Indikasi** Menetralkan klorin dan pH basa kuat dalam air. Faktor yang membahayakan terhadap kelangsungan hidup virus vaksin aktif **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebelum vaksinasi air disiapkan terlebih dahulu. 1 tablet dilarutkan dalam 100 L air. Tablet dibagi dua jika temperatur air di bawah 15°C. Ditunggu 10 menit untuk proses penetralan klorin, kemudian diaduk dengan pengaduk plastik. Kemudian vaksin yang akan digunakan diencerkan dalam wadah air yang sudah disiapkan. Larutan diaduk dan siap untuk didistribusikan **Kemasan** 100 tablet dalam **Kemasan** 1 ember **Deptan RI No. I. 08053429 PTM.** Obat bebas terbatas

9. DILUENT STERIL

SHS International

Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung natrium klorida dan kalium klorida **Indikasi** Pelarut vaksin **Dosis dan Cara Pemakaian** 30 ml/1.000 dosis **Kemasan** Botol plastik 30 ml, 60 ml dan 75 ml **Deptan RI No. D. 09063642 PKC.** Obat keras

10. LARUTAN DAPAR

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Larutan Komposisi Mengandung sodium chloride 0,8%, potassium chloride 0,02% dan buffer pH 7,2 secukupnya **Indikasi** Pelarut untuk vaksin yang pemakaiannya secara tetes mata, tetes hidung atau tetes mulut (cekok) **Dosis dan Cara Pemakaian** Larutkan vaksin ke dalam pelarut ini (larutan dapar) sampai rata dengan cara mengocok kemudian teteskan ke mata, lubang hidung atau mulut ayam **Kemasan** Botol plastik 100 dosis, 500 dosis dan 1.000 dosis **Deptan RI No. D. 06061264 PKC. 2.** Obat keras

11. MEDIMILK

Medion Farma Jaya

Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Mengandung *pure skim milk* 100% **Indikasi**

Memperbaiki mutu air yang akan dipakai sebagai pelarut vaksin untuk vaksinasi melalui air minum. Menetralkan logam, mineral dan zat-zat lain yang bisa merusak vaksin. Membuat potensi vaksin tetap stabil setelah dilarutkan **Dosis dan Cara Pemakaian** 2 g tiap L air minum, aduk sampai rata. Biarkan dulu selama 15-30 menit, baru campurkan vaksin ke dalam jumlah medimilk yang diperlukan untuk ayam **Kemasan** Sachet aluminium 5 g, 10 g, 25 g dan 50 g. Kantong plastik 100 g, 500 g, 1 kg dan 5 kg **Deptan RI** No. D. 06081065 PTS. 2. Obat bebas terbatas

12. **MONTANIDE ISA 50V2** **Seppic, Perancis/Megasetia Agung Kimia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung mineral oil 89% dan anhydromannitol octadecanoate (montanide 888 VG) 11% **Indikasi** Sebagai adjuvant vaksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Drum 25 kg dan 175 kg **Deptan RI** No. I. 09033580 PTC. Obat bebas terbatas
13. **MONTANIDE ISA 70 VG** **Seppic, Perancis/Megasetia Agung Kimia**
Bentuk Sediaan Cair Komposisi Mengandung mineral oil 89% dan anhydromannitol octadecanoate (montanide 103 VG) 11% **Indikasi** Sebagai adjuvant vaksin **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Drum 25 kg dan 175 kg **Deptan RI** No. I. 09033579 PTC. Obat bebas terbatas
14. **NETRABIL** **Medion Farma Jaya**
Bentuk Sediaan Serbuk Komposisi Setiap g mengandung *skim milk* 460 mg dan dapar fosfat pH 7 **Indikasi** Menetralkan pH air minum yang akan digunakan sebagai pelarut vaksin. Menetralkan logam, mineral dan zat lain seperti klorin dalam air minum yang bisa merusak vaksin. Menjaga kestabilan potensi vaksin setelah dilarutkan **Perhatian** Simpan obat di tempat yang kering dan tertutup rapat serta terhindar dari sinar matahari **Dosis dan Cara Pemakaian** Tiap 5 g dicampur ke dalam 1 L air minum, aduk sampai rata. Biarkan selama 15-30 menit, baru campurkan vaksin ke dalamnya **Kemasan** Sachet 250 g **Kementan RI** No. D. 07093308 PTS. Obat bebas terbatas
15. **NOBILIS DILUENT CA** **Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan pelarut vaksin **Komposisi** Mengandung sukrosa, *pancreatic digest of casein* dan potassium dihydrogen phosphate **Indikasi** Pelarut vaksin unggas live cell-associated **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Botol kaca @ 200 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 800 ml, 1.000 ml dan 1.200 ml **Deptan RI** No. I. 10063842 PKC. Obat keras
16. **NOBILIS DILUENT FD** **Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan pelarut vaksin **Komposisi** Mengandung sukrosa **Indikasi** Pelarut vaksin unggas kering beku **Dosis dan Cara Pemakaian** Lihat pada **Kemasan Kemasan** Botol kaca @ 200 ml, 400 ml, 500 ml dan 1.000 ml **Deptan RI** No. I. 10013765 PKC. Obat keras

- 17. PRO – CELL** **Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/Pfizer Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung disodium EDTA, anhydrous dipotassium phoahate, NZ-amine AS, commercial sukrose, phenol red dan air murni **Indikasi** Sebagai pelarut vaksin merek's **Dosis dan Cara Pemakaian** PRO – CELL 100, 200, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.800. 2.000 dan 2.400 digunakan untuk mensuspensi vaksin dengan dosis 500, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 6.000, 9.000, 10.000 dan 12.000 (0,2 ml) **Kemasan** Vial dan plastik bag 100 ml, 200 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 800 ml, 1.000 ml, 1.200 ml, 1.800 ml, 2.000 ml dan 2.400 ml **Deptan RI** No. I. 09033581 PKC. Obat keras
- 18. STERILE DILUENT** **Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Tiap ml mengandung sodium chloride 4,50 mg, dinatrium hydrogen phosphate 0,78 mg, natrium dihidrogen phosphate 1,80 mg dan methylene blue 0,02 mg **Indikasi** Sebagai diluent/pelarut untuk vaksin ND dan bronchitis **Dosis dan Cara Pemakaian** Diteteskan pada mata atau hidung, untuk dosis vaksin 1.000 dosis **Kemasan** 30 ml **Deptan RI** No. D. 02102487 PKC. Obat keras
- 19. STERILE DILUENT** **Ceva Animal Health Indonesia/ Ceva Sante Animale, Perancis**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung glutaraldehyde dan alkyl dimetylbenzil **Indikasi** Desinfektan bersifat bakterisidal, fungisidal dan virusidal **Dosis dan Cara Pemakaian** Sebagai bakterisidal dosis yang diberikan 0,05%-0,1%. Sebagai fungisidal dosis yang diberikan 0,25%-1,0%. Sebagai virusidal dosis yang diberikan 0,1%-0,5%. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada kemasan. Kemasan Botol 1 L dan jerigen 5 L dan 25 L **Deptan RI** No. I. 09033601 PTC. Obat bebas terbatas. ****

**OBAT INFUS (GLUKOSA, NaCl FISIOLOGIS,
LARUTAN RINGER DAN LAIN-LAIN)**

05.03

1. CALCIDEX

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan infus **Komposisi** Mengandung calcium gluconate, boric acid dan dextrose **Indikasi** Mengatasi hypocalcemia akut dan kronis pada sapi, kuda, kambing, domba dan babi serta *milk fever* pada sapi **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 200-300 ml. Kambing, domba dan babi: 60 ml. Disuntikkan secara IV **Kemasan** 500 ml **Deptan RI** No. D. 02041383 PKC. 2. Obat keras

2. CALCIDEX PLUS

Sanbe Farma

Bentuk Sediaan Cairan infus **Komposisi** Mengandung calcium gluconate, magnesium chloride, sodium hypophosphite dan boric acid **Indikasi** Mengatasi defisiensi kalsium, magnesium dan fosfor pada hewan ternak seperti: milk fever, grass tetany, eclampsia, acidosis, paralisa otot (sebelum dan sesudah melahirkan) **Dosis dan Cara Pemakaian** Sapi dan kuda: 100 ml/200-300 kg BB. Kambing, domba dan babi: 25 ml/50 kg BB. Anjing: 5 ml/10 kg BB. Berikan perlahan-lahan secara IV atau SC **Kemasan** 100 ml **Deptan RI** No. D. 0506137 PKC. I. Obat keras

3. NATRII CHLORIDUM 0,9%

Wonderindo Pharmatama

Bentuk Sediaan Cairan injeksi **Komposisi** Mengandung natrium chloridum **Indikasi** Digunakan sebagai pelarut obat, pelarut vaksin dan lain-lain **Dosis dan Cara Pemakaian** Gunakan aquadest sesuai takarannya, baik untuk pelarut maupun untuk keperluan lainnya **Kemasan** 20 ml, 50 ml, 100 ml dan 500 ml **Deptan RI** No. D. 10043823 Obat bebas terbatas. ****

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

BOH (BAHAN BAKU OBAT HEWAN)

05.04

1. **BIOFOS** **Mosaic, USA/Pakan Serasi**
Bentuk Sediaan Granul **Indikasi** Memenuhi kebutuhan fosfat dan kalsium **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan dan dicampur pakan **Kemasan** 50 kg/bag **Deptan RI** No. I. 0204229 BOH. Obat keras
2. **BIOLYS** **Evonik Industries AG/ PT Evonik Indonesia**
Bentuk Sediaan Free-flow granule berwarna coklat terang **Komposisi** Mengandung L-lysine min 50-70% **Indikasi** Sebagai suplemen L-lysine dalam pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak **Kemasan** Bag 25 kg **Deptan RI** No. I. 0102685 BOH. Obat bebas terbatas
3. **CAPSOQUIN LIQUID** **Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/**
ETHOXYQUIN **Agrinusa Jaya Santosa**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Setiap kg mengandung ethoxyquin 100% **Indikasi** Antioksidan untuk bahan baku dan pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 125–750 g / ton pakan tambahkan ke dalam pakan dan campur secara merata **Kemasan** Drum 25 kg, 200 kg dan kontainer 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 06123148 BOH Obat keras
4. **CAROPHYLL RED** **DSM Nutritional Products France, Perancis/**
DSM Nutritional Product Indonesia
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung canthaxanthine 10% **Indikasi** Untuk meningkatkan kualitas warna telur, ikan, udang dan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dengan target warna yang dikehendaki **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 06041430 BOH. 1.
5. **CAROPHYLL YELLOW** **DSM Nutritional Products France, Perancis/**
DSM Nutritional Product Indonesia
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung apocarotenoid ester 10% **Indikasi** Untuk meningkatkan kualitas warna telur, ikan, udang dan ayam **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dengan target warna yang dikehendaki **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 06041431 BOH. 1.
6. **COYDEN F** **Merial/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 3,5 dikloro-2,6 dimetil-4 pirdinol (clopidol) **Indikasi** Bahan baku obat hewan sebagai antikoksidia pada unggas **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Drum 100 kg **Deptan RI** No. I. 0109902 BOH. Obat keras

7. ETHOXYQUIN 66% POWDER

**Jiangsu Zhongdan Chemical
Goup Corp., China/Behn Meyer Chemicals**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung ethoxyquin min. 66% **Indikasi** Sebagai antioksidan dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam pakan dengan dosis 125-150 g/ton pakan atau bahan baku pakan ternak. Untuk tepung ikan, ditambahkan ke dalam tepung ikan dengan dosis 400-750 g/ton tepung ikan 200 kg/drum **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 08123528 FTS. Obat bebas terbatas

8. ETHOXYQUIN 97% LIQUID

**Jiangsu Zhongdan Chemical
Goup Corp., China/Behn Meyer Chemical**

Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ethoxyquin min. 970 g/kg **Indikasi** Sebagai antioksidan cair dalam pakan atau bahan baku pakan ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Ditambahkan ke dalam tepung ikan sebesar 400-750 g/ton tepung. Ditambahkan ke dalam pakan atau bahan baku pakan hewan sebesar 125 hingga 150 g/ton pakan **Kemasan** 200 kg/drum **Deptan RI** No. I. 100083899 FTC. Obat bebas terbatas

9. L – LYSINE HCL

Cheil Jedang Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk/powder (kuning cerah) **Komposisi** Mengandung L-lysine HCl 99,9% **Indikasi** Menambah kandungan lysine pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak (unggas dan babi) **Kemasan** *Craft paper @ 25 kg dan 1.000 kg woven bag* **Deptan RI** No. D. 1107611 BOH. 1. Obat bebas terbatas

10. L – THREONINE

Cheil Jedang Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk/powder (putih) **Komposisi** Mengandung threonine 97% **Indikasi** Menambah kandungan threonine pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak (unggas dan babi) **Kemasan** *Craft paper @ 25 kg dan 1.000 kg woven bag* **Deptan RI** No. D. 1106560 BOH. 1. Obat bebas terbatas

11. L – TRYPTOPHAN

Cheil Jedang Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk/powder (putih) **Komposisi** Mengandung tryptophan 98,0% **Indikasi** Menambah kandungan tryptophan pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak (unggas dan babi) **Kemasan** *Craft paper @ 25 kg dan 1.000 kg woven bag* **Deptan RI** No. D. 08093491 BOH. Obat bebas terbatas

12. LIQUID LYSINE

Cheil Jedang Indonesia

Bentuk Sediaan Cair (coklat gelap) **Komposisi** Mengandung L-lysine **Indikasi** Menambah kandungan lysine pada pakan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan ternak (unggas dan babi) **Kemasan** Iso tank @ 18 kL-32 kL **Deptan RI** No. D. 10063848 BOH. Obat bebas terbatas

13. LUCANTIN PINK

BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung astaxanthine minimal 10% **Indikasi**

Sebagai sumber astaxanthin guna meningkatkan kualitas warna ikan/udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06093116 **BOH**. Obat keras

- 14. LUCANTIN RED** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung canthaxanthine minimal 10% **Indikasi** Sebagai sumber canthaxanthin guna meningkatkan kualitas warna kuning telur, ayam *broiler* maupun ikan/udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 10 kg **Deptan RI** No. I. 06052427 **BOH**. 1. Obat keras
- 15. LUCANTIN YELLOW** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung beta-apo-asam carotenat ethyl ester minimal 10% **Indikasi** Sebagai sumber karoten guna meningkatkan kualitas warna kuning telur dan ayam *broiler* **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06092428 **BOH**. 1. Obat keras
- 16. LUPROSIL NC** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung ammonium propionate dan propandiol equivalen dengan min. 53,5% asam propionate **Indikasi** Bahan baku obat hewan, sebagai anti jamur dan anti mikroba **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-2.000 g/ton pakan atau biji-bijian **Kemasan** 210 kg dan 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 06092447 **BOH**. 1. Obat keras
- 17. LUPROSIL SALT** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung 98% calcium propionate **Indikasi** Bahan baku obat hewan, sebagai anti jamur dan anti mikroba **Dosis dan Cara Pemakaian** 500-2.000 g/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06052448 **BOH**. 1. Obat keras
- 18. LUTAVIT A 1000 PLUS** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung retinyl acetate equivalen dengan min 500.000 IU vitamin A/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin A **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06073090 **BOH**. Obat keras
- 19. LUTAVIT A 500 PLUS** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung retinyl acetate equivalen dengan min 500.000 IU vitamin A/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin A **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06072429 **BOH**. 1. Obat keras
- 20. LUTAVIT A 500 S** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung retinyl acetate equivalen dengan min 500.000 IU vitamin A/g yang larut dalam air **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin A

Dosis dan Cara Pemakaian Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi
Kemasan 25 kg **Deptan RI** No. I. 06072430 BOH. 1. Obat keras

21. **LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung retinyl acetate dan cholecalciferol equivalen dengan min. 1.000.000 IU vitamin A dan 200.000 IU vitamin D3/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan, sumber vitamin A dan vitamin D3 **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06073089 BOH. Obat keras
22. **LUTAVIT AD3 500/100 PLUS** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung retinyl acetate dan cholecalciferol equivalen dengan min. 500.000 IU vitamin A dan 100.000 IU vitamin D3/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan, sumber vitamin A dan vitamin D3 **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06052433 BOH. 1. Obat keras
23. **LUTAVIT B2 SG 80** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung riboflavin equivalen dengan 80% vitamin B2 **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin B2 **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06052438 BOH. 1. Obat keras
24. **LUTAVIT CALPANT** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung calcium d-panthotenate equivalen dengan 98% calpant **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber asam panthotenate **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06052446 BOH. 1. Obat keras
25. **LUTAVIT E 50 S** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung dl-alpha tocopherol acetate equivalen dengan 50% vitamin E yang larut dalam air **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin E **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06052435 BOH. 1. Obat keras
26. **LUTAVIT E 50** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung dl-alpha tocopherol acetate equivalen dengan 50% vitamin E **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin E **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06052432 BOH. 1. Obat keras
27. **LUTAVIT K3 MSB** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung menadion equivalen dengan 50% vitamin

K3 Indikasi Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin K3 **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06092442 BOH. 1. Obat keras

28. LUTAVIT VITAMIN C MONOPHOSPHATE 35

**BASF Indonesia/
Trouw Nutrition Indonesia**

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin C 35% **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan sumber vitamin C **Dosis dan Cara Pemakaian** Disesuaikan dengan kebutuhan spesies dan tahapan produksi **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 06072444 BOH. 1. Obat keras

29. MICROVIT A PROSOL 500

Adisseo/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 500.000 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin A **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 1202118 BOH. 1. Obat keras

30. MICROVIT A SUPRA 500

Adisseo/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 500.000 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin A **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0110091 BOH. Obat keras.

31. MICROVIT A SUPRA 1000

Adisseo/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 1.000.000 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin A **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 03092633 BOH. Obat keras

32. MICROVIT AD3 SUPRA 1000 – 200

Adisseo/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin A 1.000.000 IU/g dan D3 200.000 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin A **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 04102824 BOH. Obat keras

33. MICROVIT B1 PROMIX

Adisseo/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B1 (thiamin mononitrate) **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B1 (thiamin mononitrate) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0509517 BOH. 1. Obat bebas terbatas

34. MICROVIT B2 SUPRA 80

Adisseo/Romindo Primavetcom

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B2 (riboflavin) **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B2 (riboflavin) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0510514 BOH. 1. Obat bebas terbatas

- 35. MICROVIT B3 PROMIX (NIACIN)** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B3 (niacin) **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B3 (niacin/asam nikotinat) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0509484 BOH. 1. Obat bebas terbatas
- 36. MICROVIT B5 PROMIX** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B5 (Ca – D – pantothenate) **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B5 (Ca – D – pantothenate) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0510524 BOH. 1. Obat bebas terbatas
- 37. MICROVIT B6 PROMIX** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B6 (pyridoxine HCl) **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B6 (pyridoxin HCl) **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0601568 BOH. 1. Obat bebas terbatas
- 38. MICROVIT B12 PROMIX 1000** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B12 0,1% **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B12 **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 1209306 BOH. 1. Obat keras
- 39. MICROVIT D3 PROMIX 500** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin D3 500.000 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin D3 **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 1206060 BOH. 1. Obat keras
- 40. MICROVIT E PROMIX 50** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin E 500 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin E **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 1202375 BOH. 1. Obat keras
- 41. MICROVIT E PROSOL 50** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin E 500 IU/g **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin E **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0110316 BOH. Obat keras
- 42. MICROVIT H PROMIX BIOTIN** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin H (D – Biotin) 2% **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin H (D – Biotin) **Dosis dan Cara Pemakaian**

Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 1209298 BOH. 1. Obat keras

43. **NATUPHOS 5000 G** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung enzim fitase minimal 5.000 unit/g **Indikasi** Sebagai sumber enzim fitase untuk meningkatkan pencernaan bahan baku nabati **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 g/ton pakan untuk *layer* dan 100 g/ton pakan untuk *broiler* dan babi **Kemasan** 10 kg dan 20 kg **Deptan RI** No. I. 06072425 BOH. 1. Obat keras
44. **NATUPHOS 5000 L** **BASF Indonesia/Trouw Nutrition Indonesia**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung enzim fitase minimal 5.000 unit/g **Indikasi** Sebagai sumber enzim fitase untuk meningkatkan pencernaan bahan baku nabati **Dosis dan Cara Pemakaian** 60 g/ton pakan untuk *layer* dan 100 g/ton pakan untuk *broiler* dan babi **Kemasan** 210 kg dan 1.000 kg **Deptan RI** No. I. 06072424 BOH. 1. Obat keras
45. **RHODIMET AT 88** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Cairan **Komposisi** Mengandung DL – 2 – hydroxy – 4 – methylthio – butanoic acid **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung DL – methionine hydroxy analoque acid 88% **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Drum 250 kg **Deptan RI** No. I. 1201355 BOH. 1. Obat keras
46. **RHODIMET NP 99** **Adisseo/Romindo Primavetcom**
Bentuk Sediaan Serbuk kristal **Komposisi** Mengandung DL-methionine minimum 99% **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung DL – methionine minimum 99% **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampur dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 1201391 BOH. 1. Obat keras
47. **RONOZYME NP (CT)** **Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung enzyme phytase **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan yang mengandung enzyme phytase **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Karton box 10 kg dan 20 kg **Kementan RI** No. I. 0107767 BOH.
48. **RONOZYME NP (L)** **Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan Cair **Komposisi** Mengandung enzyme phytase **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan yang mengandung enzyme phytase **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Jerigen 25 kg, drum 200 kg dan 1.000 kg **Kementan RI** No. I. 1207788 BOH. 1. Obat keras

49. RONOZYME P 5000

Novozyme A/S, Denmark/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung enzyme phytase **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung enzyme phytase **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan unggas atau babi **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 04092801 BOH.

50. RONOZYME WX (CT)

Novozyme A/S, Denmark/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung enzyme xylanase **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung enzyme xylanase **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan unggas atau babi **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 0202002 BOH.

51. RONOZYME WX (L)

Novozyme A/S, Denmark/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung enzyme xylanase **Indikasi** Bahan baku obat hewan yang mengandung enzyme xylanase **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan unggas atau babi **Kemasan** Karton box 20 kg **Deptan RI** No. I. 0202001 BOH.

52. ROVIMIX A – 1000

DSM Nutritional Products AG, Swiss/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi Vitamin A sebagai retinyl acetate **Indikasi** Sebagai sumber vitamin A pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022876 BOH.

53. ROVIMIX AD3 1000/200

DSM Nutritional Products AG, Swiss/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung vitamin A dan vitamin D3 **Indikasi** Sebagai sumber vitamin A dan vitamin D3 pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05022877 BOH.

54. ROVIMIX B1

DSM Nutritional Products GmbH, Jerman/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi Vitamin B1 sebagai thiamin mononitrate **Indikasi** Sebagai sumber vitamin B1 pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0508325 BOH. 1.

55. ROVIMIX B2 80 SD

DSM Nutritional Products GmbH, Jerman/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin B2 **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan yang mengandung vitamin B2 **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 1207067 BOH.
1. Obat keras

- 56. ROVIMIX B6** **DSM Vitamins (Shanghai) Ltd, China/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Vitamin B6 sebagai pyridoxine HCl **Indikasi** Sebagai sumber vitamin B6 pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0508797 BOH.
- 57. ROVIMIX BETA – CAROTENE** **DSM Nutritional Products AG, Swiss/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung beta karoten 10% **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan yang mengandung beta karoten **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0002621 BOH.
- 58. ROVIMIX C – EC** **DSM Nutritional Products UK, Inggris/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung coated vitamin C minimal 98% **Indikasi** Sebagai sumber vitamin C pada ternak, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082266 BOH. 1.
- 59. ROVIMIX CALPAN** **DSM Nutritional Products AG, Swiss/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung kalsium d-panthothenate **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan yang mengandung calpan **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0002656 BOH.
- 60. ROVIMIX E – 50 ADSORBATE** **DSM Nutritional Products AG, Swiss/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung vitamin E 50% **Indikasi** Sebagai sumber vitamin E pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0002383 BOH.
- 61. ROVIMIX FOLIC 80 SD** **DSM Nutritional Products France SAS., Perancis/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung folic acid **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan yang mengandung asam folat **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Kantung 20 kg **Kementan RI** No. I. 1205293 BOH. 1. Obat keras
- 62. ROVIMIX NIACIN** **DSM Nutritional Products AG, Swiss/
DSM Nutritional Product Indonesia**
Bentuk Sediaan – Komposisi Mengandung asam nikotinat **Indikasi** Sebagai sumber niasin pada pakan ternak, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 0002292 BOH.

63. ROVIMIX HY – D 1,25%

DSM Nutritional Products, USA/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung vitamin D3 **Indikasi** Sebagai bahan baku obat hewan berupa vitamin D3 **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan sesuai dosis **Kemasan** Drum 25 kg **Kementan RI** No. I. 13022480 BOH. 1. Obat bebas terbatas

64. ROVIMIX STAY C

DSM Nutritional Products France, Perancis/

DSM Nutritional Product Indonesia

Bentuk Sediaan – Komposisi L-ascorbate monophosphate setara dengan 35% vitamin C **Indikasi** Sebagai sumber vitamin C pada ternak, ikan dan udang **Dosis dan Cara Pemakaian** Dicampurkan dalam pakan **Kemasan** Kantung 25 kg **Deptan RI** No. I. 05082423 BOH. 1.

65. TNI BETAIN HC 70

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung betain **Indikasi** Bahan baku obat hewan dan suplemen methyl donor pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Kementan RI** No. D. 11054078 BOH. Obat bebas terbatas

66. TNI BETAIN

The Amalgamated Sugar Company, USA/

Trouw Nutrition Indonesia

Bentuk Sediaan Serbuk **Komposisi** Mengandung betain **Indikasi** Mengurangi stress akibat cekaman panas, suplemen methyl donor pada ternak **Dosis dan Cara Pemakaian** 1-2 kg/ton pakan **Kemasan** 25 kg **Deptan RI** No. I. 09103723 BOH. Obat bebas terbatas.****

Daftar

- Alamat Produsen / Importir / Distributor dan Nama Obat Hewan
- Withdrawal Time
- Instansi Pemerintah Lingkup Departemen Pertanian yang Berkaitan dengan Obat Hewan
- Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia
- Dinas Peternakan di Indonesia

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukkan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

Alamat Produsen/Importir/Distributor dan Nama Obat Hewan

AGRINUSA JAYA

SANTOSA PT.

Kedoya elok plaza blok DE/12
Jl. Raya Panjang Jakarta 11520
Telp: 021-5812819 Fax: 021-5812820

Agrinusa Jaya Santosa

- AGRICARIVIT
- AGRICID
- AGRIMINOVIT
- AGRIMIX BRO
- AGRIMIX
- AGRISELVIT
- AGRISOL
- AGRIVIT POWER
- AGRIVITERAL
- AGRIXINE SOLUTION
- AGRIXINE
- AMIVAKSICOL
- AMPIVAKSICOL
- ASTRESVIT
- BENZALVAKS
- BIODAN PLUS
- BIODAN
- BIOMINOVIT
- BIOSTRESS
- BROVITGRIN
- CARNYVIT
- COCCIPLUS
- CYPROTYLOGRIN
- DESGRIN
- DURACOL D
- DURACOX HC
- ELESAP
- ERYDOVAKS
- ERYTROGRIN HC
- FLOXAMYCINE
- FOSTIGRIN
- HITOPVIT
- KLORIVAKS
- LEVAGRIN
- LEVAMOL
- MANNANASE GRANULAR
- MANNANASE POWDER
- MICROTECH 5000 LIQUID
- MONVIT PREMIX
- MOXYCOLGRIN HC
- NEPTIK

- OXOLINAL
- IPERAVAKS – S
- PROCHICKGRIN
- REN – CLEAR
- STRESSGRIN
- SULTRIVAKS
- TOLTRACOX
- TRIMETOGRIN
- TYLOGRIMIX
- VIRIDAN
- YIDUOZYME P – 8601

Cipla, Ltd

- CIPDEX
- IVOCIP PLUS

Guangdong VTR Bio-Trch Co. Ltd., China

- MICROTECH 5000 GRANUL
- MICROTECH 5000 POWDER
- YIDUOZYME 9180
- YIDUOZYME 9681

Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain

- IVOCIP PLUS
- CAPSANTAL EBS 30 NT
- CAPSANTAL EBS 40 NT
- CAPSOQUIN LIQUID ETHOXYQUIN
- CAPSOQUIN N
- FUNGISAL MIX P
- FUNGISAL MIX
- OXICAP E2

Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals

- FOWL POX
- IBD V877
- MYVAC 202
- NDV4HR

Pasteur Institute, Romania

- ND SINCO BRONVAC
- NEDEVAC
- NEWVAC LASOTA

Preserve International, Amerika Serikat

- ADVANTAGE 256
- DYNE O MIGHT
- SYNERGIZE

Vetoquinol, SA, Perancis

- LONGAMOX
- LONGICINE
- MARBOCYL 10%
- MARBOCYL 2%
- PEN – HISTA STREP
- TOLFEDINE CS INJECTION

AGRI TRADING INVESTMENT PT.

Gedung Bank Panin Pusat Lt. VI
Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 10270
Telp: 021 – 7251162. Fax: 021 – 7251169

Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA

- CALIBRIN A
- CALIBRIN Z
- MD – 09

CTCBIO Inc. Korea Selatan

- CTCZYME

AGRO MAKMUR SENTOSA PT.

Jl. Jurumudi No. 25 Kebon Besar Batu Ceper
Tangerang 14124 Banten
Telp: 021 – 6197528; Fax: 021 – 6197529

Agro Makmur Sentosa

- AGNERAL
- AGRICOX – 10
- AGRI – QUAT
- BIOXAN
- CARNIBROVIT
- CEMOXIN
- COCCIN
- COLA FLOXA
- COLA-FLOXA LIQUID
- COLERAX
- CORISIN
- CORISIN – 24
- ENTROCOLIN
- GANASUPERVIT PLUS
- LARVAZINE
- NEW VERNA
- NUTRI-LACK
- NYCLOSOL
- NYCLOSOL – 50

- OVASTIM SP
- OVASTIM
- RESPIRANT
- RHISOMIX 208
- RHISOMIX
- STRESS BLOCK
- SUPER MIX
- TI – FLOXAN
- XTRA VITAN

AVS, Irlandia Utara

- VIRUCIDAL EXTRA

Bioplagen, Spanyol

- CIPERGEN
- FINIGEN
- SANIVIR
- SANIVIR PLUS

Dupont, Amerika Serikat

- BIO QUAT 20
- BIOPHENE
- IODENE

Farvet Lab., Belanda

- GENTAVET 50
- PENSTREP 20/20
- SPECTOLIN
- TRIDOX LA
- VITAMIN E50 + SE INJ

Industrial Veterinaria SA, - Spanyol

- ACLOMAST
- ALBENDAZOL 10% GANADEXIL
- BETAMINT
- CHICKTONIC
- DOXINYL
- ENERGY
- GANADEXIL ENROFLOXACINA 10%
- HEPAVEX 200

Invesa Int., Spanyol

- PROMECTINE ORAL

Kyoto Biken Lab., Jepang

- CORYZAVAC KBL

LG/CTCBio, Korea

- ^{LG} ACCENT

Woogene B&G, Korea

- COXIXLIN

ALLTECH BIOTECHNOLOGY INDONESIA PT.

Gedung Mugi Griya Lantai 2 Suit 203
Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta 12810
Tlp: 021-83708502; Fax: 021-83708509 / 08

Alltech Inc – USA

- ACID – PAK 4 – WAY 2X WATER SOLUBLE
- ALL – LAC 100 X
- ALLPLEX B
- ALLPLEX LS
- ALLPLEX S
- ALLPLEX W
- ALLZYME FD™
- ALLZYME PT CONCENTRATE WS
- ALLZYME SSF E
- ALLZYME SSF™
- ALLZYME VEGPRO CONCENTRATE
- ALLZYME VEGPRO LIQUID™
- ALLZYME VEGPRO™
- BANOX™E
- BIO – CHROME 5000
- BIO – CHROME
- BIOPLEX C
- BIOPLEX COPPER
- BIOPLEX HIGH FIVE
- BIOPLEX IRON
- BIOPLEX MANGANESE
- BIOPLEX MQP
- BIOPLEX POULTRY PAK
- BIOPLEX ZINC
- DE – ODORASE
- ECONOMASE
- EGGSHELL 49 2X
- LIFEFORCE FORMULA
- MOLD-ZAP
- MOLD-ZAP LIQUID
- NATUSTAT
- NUPRO
- OPTIGEN II
- SEL – PLEX 2000
- SIL – ALL WATER SOLUBLE
- YEA – SACC TS

Alltech Inc – USA; Alltech Biotechnology Corp. Ltd – Thailand

- ACID – PAK 4 – WAY LIQUID HARD WATER FORMULA
- ALLZYME SSF™ LIQUID 500 ML
- ALLZYME SSF™ LIQUID
- YEA – SACC1026

Alltech Ich – USA; Alltech do Brasil – Brazil

- ACTIGEN
- BIO – MOS
- DEMP
- MYCOSORB
- SEL – PLEX 2700
- SEL – PLEX 3000
- SEL – PLEX

Alltech Inc – USA; Alltech China

- ALLZYME PS
- MOLD – ZAP LIQUID

Alltech Inc, USA; Alltech Biotechnology Private Limited – India

- OPTIGEN

AVES PT.

Kel. Dandong RT. 01/RW. III, Kec. Srengat
Kab. Blitar-Jawa Timur Telp: 0342 – 553637

AVES

- AVIT
- B – COM
- DOC – VIT
- RISA – KOL KAPSUL
- RISA – KOL
- SUPER – BRO
- SUPER – EGG
- SUPER – P
- SUPER – VITA
- TELUR VIT

AVINDO PERDANA BAHTERA MULIA PT.

Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi II
Blok A8 N10 Desa Jati Mulia Tangerang
15510 Telp: 021-93553862;
Fax: 021-59910424

Avindo Perdana Bahtera Mulia

- AVICOC
- AVIEGG EXTRA
- AVIFLOX – 10 LIQUID
- AVIFLOX 10
- AVILITE
- AVIMOX 12
- AVIMOX 24

- AVIODINE
- AVIQUIN 25
- AVISOLE
- BENZOGARD
- COLISTAM
- CORITRIME
- ENRODIAZ LIQUID
- ENRODIAZ
- EXTRAGUARD
- NEW OX
- OVULA EXTRA
- RESPIROXAN 10
- RESPIROXAN
- STRESS PROTECTOR

CA Laboratorios Asociados, Venezuela

- BICOVAC
- CALAVAC BRONCHITIS (H 120)
- CALAVAC GUMBORO INTERMEDIATE
- CALAVAC NEWCASTLE BRONCHITIS
- CALAVAC NEWCASTLE LASOTA (LASOTA + H120)
- CALAVAC POWL POX
- WINVAC ND EDS IB
- WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS GUMBORO ND – IB – IBD)
- WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS
- WINVAC NEWCASTLE CONCENTRATED
- WINVAC NEWCASTLE EDS
- WINVAC NEWCASTLE GUMBORO (ND – IBD)

Laboratorio AVIMEX SA DE CV, Mexico

- FX PLUS 20 INJECTABLE SOLUTION
- FX PLUS ORAL SOLUTION
- NEWCASTLE INFLUENZA KILLED VIRUS VACCINE

SYVA Laboratorios, Spain

- BISEPTYL

BASF INDONESIA PT.

DBS Bank Tower 27th floor Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 – Jakarta 12940
Telp: 021-29886000

BASF Indonesia

- LUCANTIN PINK
- LUCANTIN RED
- LUCANTIN YELLOW
- LUCAROTIN 10% FEED

- LUPROSIL ADSORBATE
- LUPROSIL NC
- LUPROSIL SALT
- LUTAVIT A 1000 PLUS
- LUTAVIT A 500 PLUS
- LUTAVIT A 500 S
- LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS
- LUTAVIT AD3 500/100 PLUS
- LUTAVIT B2 SG 80
- LUTAVIT CALPAN
- LUTAVIT E 50
- LUTAVIT E 50 S
- LUTAVIT K3 MSB
- LUTAVIT VITAMIN C MONOPHOSPHATE
- NATUPHOS 10.000 G
- NATUPHOS 5000 G
- NATUPHOS 5000 L

BAYER INDONESIA PT.

Mid Plaza I, Lt. 14-15 Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 10-11 – Jakarta 10220
Telp: 021 – 5703661 ext 745
Fax: 021 – 5703660, 5704150, 5700591

Bayer Korea, Ltd, Korea

- BAYMEC
- BAYTRIL 10 % INJEKSI
- BAYTRIL 5 % INJEKSI
- VIGANTOL E

Bayer Environmental Science SAS, Perancis

- SOLFAC 10 WP
- QUICKBAYT 10 WG

Bayer Indonesia

- RACUMIN 0,0375 BB

Bayer Thai Co. Ltd, Thailand

- NEGUVON

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman

- TOXISORB CLASSIC
- TOXISORB PREMIUM

KVP Pharma + Veteriner Produkte GMBH, Jerman

- ADVANTIX
- ADVOCATE
- BAYTICOL 60 EC

- BAYTRIL FLAVOUR
- BAYTRIL FLAVOUR 150
- DRONTAL CAT
- DRONTAL PLUS FLAVOUR
- KILTIX

OLIC (Thailand) Limited Thailand

- BAYCOX 2,5%
- BAYCOX 5%
- BAYTRIL 10 % ORAL SOLUTION
- CATOSAL INJEKSI
- RINTAL BOLUS
- RINTAL GRANUL 10%

BEHN MEYER CHEMICALS PT.

Taman Tekno Sektor XI Blok B-1, Bumi
Serpong Damai Tangerang 15341
Telp: 021-7565000;
Fax: 021-7560860 / 7560870

AB Enzymes GmbH, Finland

- FINASE EC 40P

Anji Fengmu Veterinary Drugs co. Ltd., China; Zhejiang Share Bio-Pharm co. Ltd., China

- ENDURA F40
- NDURA F80

Behn Meyer Chemicals

- KLINO – MINERAL

Ceracom AG., Switzerland

- GOLDEN GUARD

Elanco Animal Health, USA

- HEMICELL – D
- HEMICELL – HT
- HEMICELL – L
- HEMICELL – MP
- HEMICELL W LIQUID
- WHEAT EASE – M (LIQUID)
- WHEAT EASE – M (POWDER)

Guangzhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd – China

- WISEDEM GOLDEN Y – 20
- WISEDEM RED

Intracare B.V, Belanda

- INTRA HYDRO CARE

Jiangsu Sel Biochem Co, Ltd., China

- BAMBERCIN – 40

Jiangsu Zhongdan Chemical Goup Corp., China

- ETHOXYQUIN 66% POWDER
- ETHOXYQUIN 97% LIQUID

Kemira ChemSolution b.v., The Netherlands

- BIO ADD SOLID
- CALPRONA MD
- CALPRONA P4
- KEMIRA BACTERIA CONTROL LF2 NC
- KEMIRA BACTERIA CONTROL SF1
- KEMIRA MOULD CONTROL LP 1 NC
- KEMIRA MOULD CONTROL LP 3 NC
- KEMIRA MOULD CONTROL SP 1
- KEMIRA PRO GIT SF1
- KEMIRA PRO GIT SF3
- NUTRI – SURE DW1

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

- KOKCISAN 120 G

Miavit GmbH, Jerman

- MIA – OVODUR

Nutrifeed, The Netherlands

- AGROMALAC
- KALVOLAC
- PREMULAC – L
- SEROLAT HL
- SEROLAT PEP

Peak Minerals-Azomite Inc., USA

- AZOMITE

Penergetic International AG., Switzerland

- PENERGETIC – T

Pet Ag Inc., USA

- AVICOC
- BOSPRO
- FERMACTO

**Shandong Jinyang Biological
pharmaceutical Co. Ltd., China;
Hangzhou Invaxe Medical Technology Co.
Ltd., China**

- MONEVAXE – 20

Unipoint AG., Switzerland

- KLINOFEED
- KLINOSAN

Uniscope Inc., USA

- SUPER – LUBE
- ULTRA – PEL

Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. - China

- SUNPHASE G
- SUNPHASE L

**Zhejiang University Sunny Nutrition
Technology Co., Ltd., China**

- BAMBERCIN – 20
- BAMBERCIN – 80
- SUNNY BINDER

Zinpro Corp. – USA

- AVAILA 4
- AVAILA CR 1000
- AVAILA CU 100
- AVAILA FE 100
- AVAILA MN 80
- AVAILA SE 1000
- AVAILA SOW FEET FIRST
- AVAILA STARTER 123
- AVAILA ZN 120
- AVAILA Z/M

BIOADI SASANA PT.

Jl. KS. Tubun 2C/30 Jakarta Barat
Telp: 021-5310299, 5310324;
Fax: 021-5325622
Email: bioadijkt@hotmail.com

Agil, Callevark Park, Inggris

- OXISTAT

BIOMIN INDONESIA PT.

Gd. Mustika Ratu Lt. 5 #505
Jl. Gatoto Subroto Kav. 74-75 -Jakarta 12870
Telp: 021-83709067; Fax: 021-83707143

Biomim Singapore Pte. Ltd

- BIONTRONIC TOP3
- POULTRY STAR ME

Biomim Holding, GmbH. Austria

- BIOMIN CLEANFEED

BIOTEK INDONESIA PT.

Jl. MH. Thamrin Kav. A.10 No. 3
Lippo Cikarang – Bekasi 17550
Telp: 021 – 8972264, 8972270
Fax 021 – 8972268

Biotek Indonesia

- AGRIWORM
- AGRIWORM BOLUS
- AGRIWORM LIQUID
- ALBENTACK – 900
- BIO – OX
- BIOGIN
- BIOGOLD
- BIODINE
- BIOFLOX – 20
- BIOLEUCO
- BIOMOX – 20
- BIOMYTOX PLUS
- BIONEOL
- BIOPROL – 20
- BIOQUIN – 20
- BIOTOLTRA 2.5
- BIOTYFLOX – S
- BIOVITON
- BIOVITON POWDER EFFERVESCENT
- COCCISOL
- CYROTEK – 1
- DOXYCOL
- FORMULA – 1
- FOS – T
- KILLWORM
- MYCOTACK
- MYCOTACK LIQUID
- NEO ULTRADES
- NORITACK LIQUID
- PREMIVIT
- SEPTIDES
- SIERADES

- SIERAMIX – A
- SIERAMIX – B
- SPECLIN
- TOPCEF
- TRIMETHODINE
- TRIMETHODINE BOLUS
- ULTRADES
- ULTRADES PLUS
- ULTRALIN 45 %
- UNIMINERAL
- VIGROO
- VIMMUNE
- VITACHIP
- VITARAL
- VITARAL PLUS
- VITASAM
- VITASAM EFFERVESCENT
- VITASOL – E

Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao

- PROTEK CORYZA KILL VACC
- PROTEK IBD KILL VACC
- PROTEK ND – EDS – IB KILL VACC
- PROTEK ND – IB KILL VACC
- PROTEK ND – IBD KILL VACC
- PROTEK ND KILL VACC
- PROTEK ND LIVE VACC

BIOTEK SARANA INDUSTRI PT.

Jl. Angrek I. No. 14 Larangan Indah
Ciledung Tangerang – Banten 15154
Telp: 021-7315577, 3168639/34, 31909716
Fax: 021-73445777, 31909719

Cevasa SA, Argentina

- DICLACEV PREMIX
- TERMITOX

IQF SA, Argentina

- ANTIGERMEN FORTE
- ORMYCINE LIQUIDO

BLUE SKY BIOTECH PT.

Taman Tekno BSD Blok J3 No. 46 Serpong
Tangerang 15314 Telp: 021-70283685/7
Fax: 021-7565164

Easy Bio System, Inc, Korea

- ENDO – POWER BETA
- GROW MAX

Jefo Nutrition Inc, Kanada

- FORMULA HP
- GALLIACID
- POULTRY GROW
- VITOSELEN

KBNP, Inc, Korea

- AMOXCOL
- AVANTE INJECTION
- COCCOXIN
- COLIMAX 100
- COLIMAX 100 PREMIX
- CYROZINE – 10
- GENOPHOS – 5000G
- HIMMVAC HOG CHOLERA (T/C) VACCINE
- HIMMVAC IB – ND – EDS COMBINED OIL VACCINE
- HIMMVAC IB – ND COMBINED OIL VACCINE
- HIMMVAC IB LIVE VACCINE
- HIMMVAC IBD LIVE VACCINE
- HIMMVAC ILT LIVE VACCINE
- HIMMVAC LASOTA LIVE VACCINE
- HIMMVAC ND – IB COMBINED LIVE VACCINE
- HIMMVAC ND HIGH VACCINE
- HIMMVAC ND OIL VACCINE
- LIFE JACKET
- LIFEGARD – T
- LIFELINE
- MACROTIL 250 SOLUTION
- PEPTIDA – G
- TOLCOXIN
- VITAL CHORUS – FORTE

Cheil Bio Co., Ltd, Korea

- CERESTOP
- CHEIL COLISTIN
- CHEIL COLISTIN 100
- CHEIL TONOCOMP
- CHEIL TYLOSIN 220
- CHEIL TYLOSIN-100
- MULTI SOL – G
- SELETOCO INJECTION

Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea

- BUTAPHOS-B INJECTION
- ENPRO – 50 INJECTION
- ENPRO SOLUTION

- HEMOPIG
- K.O – MEX EC
- O.T.C – LA INJECTION
- PEPEROXIN SOL
- POWERCILLIN INJECTION
- SAMYANG TYLOSIN – 200 INJECTION
- SY IVERMECTIN INJECTION
- VIAMIN – 34 INJECTION
- VITA F – 1P

Dong Bang Co., Ltd, Korea

- LINSMYCIN SOLUBLE POWDER
- NEOCIN SOLUBLE POWDER

ELT Science Corporation, Korea

- PROMOZEN – L

BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA PT.

Sampoerna Strategic Square North Tower
level 6 – 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930. Telp: 021-5732375
Fax: 021-57853808, 5732383

Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico

- VOLVAC® ND CONC. KV
- VOLVAC® ND KV
- VOLVAC® ND + IB KV
- VOLVAC® ND + IB MLV
- VOLVAC® ND LASOTA MLV
- VOLVAC® AC PLUS BACTERIN KV
- VOLVAC® AC PLUS EMUL BACTERIN KV
- VOLVAC® AI KV
- VOLVAC® IBD MLV
- VOLVAC® LT MLV
- VOLVAC® ND + IB + EDS KV

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. USA

- INGELVAC® MYCOFLEX
- INGELVAC® PRRS MLV

BRENNTAG PT.

Graha Pratama Building 17th Floor
Jl. MT. Haryono Kav. 15 – Jakarta Selatan
Telp: 021 – 83790755; Fax: 021 – 83790760

Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China

- SMIZYME PHYTASE 5000 U/G GRANULAR
 - SMIZYME PHYTASE 5000 U/G LIQUID
 - SMIZYME PHYTASE 5000 U/G POWDER
- Nukamel,B.V, Belanda**

- FOKKAMEL EXTRA
- FOKKAMEL PLUS
- FOKKAMIX 9
- MIXOMEL
- NUKAMIX 10

BRIGHT INTERNATIONAL PT.

Plaza Niaga 1 Blok B No.50 Sentul City
Bogor. Telp: 021-87962058
Fax: 021-87961089

Kolin Chemical Co. Ltd., Korea

- CHOLINE CHLORIDE 50%
- CHOLINE CHLORIDE 60%
- CHOLINE CHLORIDE 75%

Kofavet Special Inc., Korea

- TIMING GOLD

Morningbio Co. Ltd., Korea

- PROCID

CAKAR MAS PT.

Taman Tekno BSD Blok E3 No. 6
Bumi Serpong Damai – Tangerang
Telp: 021 – 75880107; Fax: 021 – 75880108

Cakar Mas

- STERILIDES
- SUPER BIOSECURITY
- SUPER IODOCIDE
- X – TRA ALBENDAZ
- X – TRA AMPICOL
- X – TRA AMPROCOC
- X – TRA ANTISTRESS
- X – TRA BETAGAIN
- X – TRA CARNICEL
- X – TRA CARNIVA
- X – TRA DOXYTRO
- X – TRA E – SELEN SUPERMIN
- X – TRA FASTBRO
- X – TRA MOXICOL

- X – TRA TRISULF
- X – TRA VITALIT

Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine Co., Ltd

- DHN AVIAN INFLUENZA VACCINE, INACTIVATED

Ewabo Chemikalien GmbH & Co.KG, German

- MENTOFIN

CAPRIFARMINDO LABORATORIES PT.

Jl. Industri No. 8 Komp. Perindustrian
Cimareme Padalarang – Bandung
Telp: 021 – 6867967; Fax: 021 – 6867969

Caprifarmindo Laboratories

- ADETROVIT®
- CAPRI – ALBEND®
- CAPRI – CHICKS®
- CAPRI – EGG®
- CAPRI B – PLEX® INJ
- CAPRIBRO®
- CAPRICOLI®
- CAPRICOXI®
- CAPRIDES®
- CAPRIGLANDIN® INJ.
- CAPRIMOX®
- CAPRIMUN – E®
- CAPRINIL®
- CAPRINTEL® BOLUS
- CAPRIPROVIT®
- CAPRIRAZIN®
- CAPRITOCIN® INJ.
- CAPRIVAC® AI – K
- CAPRIVAC® IBD – K
- CAPRIVAC® NBG – K
- CAPRIVAC® NB-K
- CAPRIVAC® ND – K
- CAPRIVAC® ND AI – K
- CAPRIVAC® NE – K
- CAPRIVAC® NG – K
- CAPRIVIT B12® INJ.
- CAPRIVIT®
- CAPRIVIT® INJ.
- CAPZURIL®
- CIPROCAP®
- COLISTAMIN®
- DESTACAP®

- DOXYCAP®
- ERITOCAP
- GLUTACAP®
- LEVOCAP
- MIRAVIT®
- PROTEK – STRES®

CATUR NAWA SUMBERARTHA PT.

Graha Catur Nawa, Jl. RC. Veteran No. 11A
Bintaro Pesanggrahan – Jakarta Selatan
Telp: 021 – 7359681, 7359682
Fax: 021 – 7370938

OligoBasics Agroindustrial Ltda., Brazil

- ESSENTIAL
- MADUX 1%
- MONENDOX 200 BMP
- SALINDOX 120 BMP

CEVA ANIMAL HEALTH INDONESIA PT.

Plaza Aminta Lt.4, Suite 401 Jl. TB
Simatupang Kav. 10 – Jakarta Selatan 12310
Telp: 021 – 7653408, 7653610
Fax: 021 – 7512056, 7511924

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals, Hungary

- BROILERMUNE
- CEVAC BROILER ND K
- CEVAC BRON 120 L
- CEVAC CORYMUNE 4 K
- CEVAC CORYMUNE 7 K
- CEVAC FP L
- CEVAC GUMBO L
- CEVAC IBD L
- CEVAC LT L
- CEVAC NB L
- CEVAC ND EDS K
- CEVAC ND IB EDS K
- CEVAC ND IB K
- CEVAC ND IBD K
- CEVAC NEW K
- CEVAC NEW L
- CEVAC TRANSMUNE
- CEVAC TRANSMUNE IBD
- CEVAC VITABRON L
- CEVAC VITAPEST L

- LAYERMUNE 2
- LAYERMUNE ND
- TRANSVAC

Ceva Saude Animale Ltda, Brazil

- CEVAC MG F

Ceva Sante Animale, Perancis

- CEVAMEC 1%
- CEVAMUNE
- COLIVET ORAL SOLUTION
- FLUMISOL
- MYCOTOX
- MYCOTOX NG
- STERILE DILUENT
- VETRIMOXIN 50 WS
- VETRIMOXIN LA
- VETRIMOXIN LA CLAS
- VIGOSINE
- VIRAKIL NG

Ceva Sophavet, Maroko

- CEVAZURIL
- QUINOEX

Biomune Co, USA

- BURSIMUNE
- CEVAC MD HVT & RISPENS
- CEVAC MD RISPENS
- CIRCOMUNE
- CIRCOMUNE W
- LAYERMUNE SE
- MULTIMUNE K
- MULTIMUNE K5
- POXIMUNE
- POXIMUNE AE
- REOMUNE 3
- REPRUMUNE 4
- RESPIMUNE
- TREMORMUNE

Laprovvet Hungarian Veterinary Pharmaceutical Ltd, Hungary

- AVI IB H – 120
- AVI IBD INTER
- AVI ND LASOTA
- AVI ND LASOTA + IB H120
- ITA ND + IB + EDS
- ITA ND + IBD
- ITA NEW (ND)

CHEIL JEDANG INDONESIA PT.

Menara Jamsostek Lt. 21 Jl. Jend. Gatot
Subroto Kav.38 – Jakarta 12710

Telp: 021-52995000;

Fax: 021-52995192, 52995194

Cheil Jedang Indonesia

- BIOTECTOR
- CJ PROSIN
- CJ PROTIDE
- L – LYSINE HCL
- L – THREONINE
- L – TRYPTOPHAN
- LIQUID LYSINE

DEGEPHARM PT.

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 106 – Semarang

Telp: 024 – 3540533, 7475335

Fax: 024 – 7475173

- DHUDHUT
- KUMARUK
- KUMARUK HERBAL
- MARUKI
- MARUKI CAIR

DELTA PRIMA

AGRINDO PT.

Jl. Jenderal Sudirman No. 334 – Bandung

Delta Prima Agrindo

- GLUTACIDE
- PRIMADES

DSM Nutritional Product Indonesia PT.

Perkantoran Hijau Arkadia Tower B 10th FI

Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta – 12520

Telp: 021-78833456; Fax: 021-7804188

Cerbios – Pharma SA., Switzerland

- CYLACTIN LBC ME 10

DSM Nutritional Products AG, Swiss

- ROVIMIX E – 50 ADSORBATE
- ROVIMIX CALPAN
- ROVIMIX BETA – CAROTENE
- ROVIMIX A – 1000
- ROVIMIX AD3 1000/200
- ROVIMIX NIACIN

DSM Nutritional Products France SAS, Perancis

- CAROPHYLL RED
- CAROPHYLL YELLOW
- ROVIMIX STAY C
- ROVIMIX FOLIC 80 SD

DSM Nutritional Products GmbH, Jerman

- ROVIMIX B1
- ROVIMIX B2 80 SD

DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand

- CULINDO PIG WEANER CL – 2
- CULINDO PIG WEANER CL – 3
- CULINDO PIG FINISHER CL – 4
- CULINDO PIG FINISHER CL – 4 M
- CULINDO PIG BREEDER CL – 5
- RONOZYME AX (CT)
- ROVIMIX CP 3 DC
- ROVISOL DM 295
- ROVIMIX 528
- ROVIMIX 8188
- ROVIMIX AQUA VIT PREMIX
- ROVISOL JCI 1000
- ROVISOL JCI 1002 (VITAMIN CONCENTRATE)
- ROVISOL SP – 802
- ROSIGOLD – S
- ROSIGOLD – P
- PROMIX PREMIX
- VITAL PREMIX

DSM Nutritional Products UK, Inggris

- ROVIMIX C – EC

DSM Nutritional Products, USA

- ROVIMIX®HY – D 1.25%

DSM Vitamins (Shanghai) Ltd, Cina

- ROVIMIX B6
- ROSIGOLD WSP

Instituto delle Vitamine SpA., Italia

- ZOOSOL PAN 50
- ZOOSOL LISOVIT
- ZOOSOL AMINOSAL
- ZOOSOL CALORVIT
- NOVOZYME AS, DENMARK
- RONOZYME WX (L)
- RONOZYME WX (CT)
- RONOZYME P 5000
- RONOZYME NP (CT)
- RONOZYME NP (L)

Novozyme Latin America Ltda., Brazil

- RONOZYME PROACT (CT)

DUPONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESIA PT.

Gedung Eltway Office Park Lt. 5 Gedung A
Jl. Ampera Raya Cilandak – Jakarta Selatan
Telp: 021 – 782255
Email: edianandewi.puspita@idn.dupont.com

Antec International Ltd

- DUPONT BIOSOLVE PLUS

DUTA KAISAR PHARMACY PT.

Jl. Adisucipto No. 41 KM.9. Colomadu
Karanganyar Surakarta, Blulukan – Jawa
Tengah Telp: 0271 – 715627, 724336
Fax: 0271 – 724116

Duta Kaisar Pharmacy

- AQUAVET
- AMPIVETBRITIN
- BIOSOLAVET
- FERROVET
- KANIVET
- KRISTAPEN
- PEN – O – VET
- PENZAVET
- STREPTOVET
- TERROXYVET
- TYLOSIVET
- VET – CHOICE
- VET ADE FORTE
- VET B – I
- VET B – 12

- VET B – PLEKS
- VETERDRYL
- VET-PENSTREP 4 : 1
- VET-PENSTREP 4: ½

EKA FARMA PT.

Jl. Imam Bonjol 188 B – Semarang 50132

Telp: 024 – 3541746, 3516636

Fax: 024 – 3541748

Eka Farma

- ANCYLOS
- ANTIWORM
- BIOCILIN
- DATILAN
- GROWVIT
- OSTELIN
- TRIPLE CAPS
- VERNICID

EKASAPTA WIJAYATANGGUH PT.

Kawasan Industri Semanan Megah Blok A/9

Jl. Raya Daan Mogot KM. 18 Kali Deres –
Jakarta Barat 11840

Telp: 021 – 5449928; Fax: 021 – 5449930

Bestar Lab., Singapura

- BAK IB
- BAK IC
- BAK ND
- BAK ND + EDS
- BAK ND + EDS + IB
- BAK ND + IB
- BAK ND + IB
- BAK ND + IBD
- BAL IB H120
- BAL IB H52
- BAL IBD
- BAL ILT
- BAL ND + IB
- BAL ND CLONE
- BAL ND LASOTA
- BAL POX

China Bestar Laboratories, Taiwan

- BESTLYTES

S.P. Veterinaria S.A., Spanyol

- ANTHELMIN ORAL

- AVICILINA PLUS
- CIPROFLOX – 100 SP
- COCCIREX
- COCCIVEX
- COLIMIX
- COLMYC – E
- CRESOVEX – S
- CUATS – 20
- CYPROSIN
- DESIFUNG SOLUBLE
- GUMBEX
- HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS
- LINCO SP
- NEUMOVIRIC
- REX VITAL
- SULFADIM
- YODOR – VEX

Tithebarn Limited, Inggris

- RED ROCKIES
- OPTICIDE
- GENTAMYCIN INJECT
- OXYJECT – 100
- QUINCURE 20 LIQ
- QUINTRIL INJ 5%
- QUINTRIL LIQ 10%
- TRIMAZINE
- COCOSTOP PLUS
- BLOOM & GROW
- GROW MORE
- MULTIVIT EXTRA

EMVI INDONESIA PT.

Jl. Matraman Raya No. 208 – Jakarta Pusat

Telp: 021-8512963, 4700358

Fax: 021-47860609

Impextraco NV., Belgia

- COLIMPEX 8%
- MADIMPEX 10G
- SALIGRAN G120
- ZIBAGRAN G150

Phibro Animal Health, USA

- STAFAC – 500

Virbac Animal Health Inc., Perancis

- PREVENTIC

Virbac Lab, Brazil; Virbac SA., Perancis

- VIRBAMEC LA

Virbac Lab., Perancis

- AMPHOPRIM INJECTION
- SHOTAPEN LA
- SURAMOX 50% OSP
- TRI ALPUCINE
- ZOLETIL – 50

Virbac SA., Perancis

- CALGOPHOS
- CANIGEN DHA 2 P/L
- INJECTAVIT
- NEPHRYL
- NUTRIPLUS GEL
- PARVIGEN
- PROSTAVET-C
- RABIGEN MONO
- SEBOLYTIC

Virbac Vietnam Co. Ltd., Vietnam

- VITAMINO SOL (VIRBAC VITAMINO SOLUTION)
- VITAMINO SP

EVONIK INDONESIA PT.

Menara Duta Building, 6th Floor
Jl. Rasuna Said Kav B – 9, Jakarta 12910
Telp: 021 – 5200393; Fax: 021 – 5200392
Email: mercyawati.subianto@evonik.com

Evonik Indonesia

- BIOLYS
- BIOPLUS®YC
- GALLIPRO®
- METAMINO
- THREAMINO
- TRY-PAMINO

FARMADIKA SEJAHTERA INDONESIA PT.

Jl. Kebun Raya 33, Komplek Duri Kepa
Jakarta Barat 11510
Telp: 021 – 56951511; Fax: 021 – 56944631

Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China

- AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5N2 SUBTYPE)
- INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS LIVE

VACCINE (K137)

- NEWCASTLE DISEASE KILLED VACCINE (LA SOTA)
- NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (CLONE 30)
- NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (LA SOTA)
- NEWCASTLE DISEASE-INFECTIOUS BRONCHITIS LIVE VACCINE (LASOTA+H120)

Kilco International, Scotlandia

- AMINOSOL
- ECOFOAM EXTRA
- KILCOX EXTRA
- LIQAVITE
- PARAFORM PRILLS
- PHENVIRO PLUS
- QUAT 50
- VIREX
- VIROGUARD
- VIROPHOR
- VIROTEC

Pharma Sede, Egypt

- TOLACOX LIQUID

Sinsui Inc, Jepang

- NUZYME
- SELFED CF

Sinsui India Private Limited, India

- K VAC CHICKEN ND
- K VAC CORYZA
- K VAC ND
- K VAC ND-IB
- NAMA VAC LAS-IB
- NAMA VAC NDLAS

Pharma Swede, Mesir

- TOLACOX

Kor – Chin Biotech Co.Limited

- KC – POL

FENANZA PUTERA CV.

Jl. Tebet Timur Dalam IX No 10a, Jakarta Selatan 12820
Phone: 021 – 83787990
Fax: 021 – 8281434

Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd

- CENTRA – ENROX INJECTION 10%
- CENTRA – OXYTE INJECTION 10%
- CENTRA – OXYTE LA INJECTION 20%
- CENTRA – TYLO INJECTION 20%
- CENTRA – TYLO SOLUBLE POWDER 20%
- CENTRE – ALBEN TABLET 500 MG
- CENTRE – IVERMEC INJECTION 1%
- CENTRE – IVERMEC POUR ON SOLUTION 1%
- CENTRE – IVERMEC SOLUTION 1%
- CENTRE – NEOMY SOLUBLE POWDER 5%
- CENTRE – TYLO PREMIX 25%

Beijing Enhakor International Tech. Co., Ltd

- ANER C
- BETAINE HYDROCHLORIDE
- ENHALOR PHYTASE
- HALOR C

Borregaard Norway

- LIGNOBOND DD
- PELLTECH

GEMILANG MULTITRADE PT.

One Pasific Place 9th Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 52-53 SCBD – Jakarta Selatan 12190
Telp: 021 – 42873080; Fax: 021 – 42878252

Biochem GmbH, Jerman

- BETAPRO 1000
- BETAPRO 300
- BIOSOL
- BIOTOX
- BIOZINK WSL
- TECHNOMOS

HALIM SAKTI PRATAMA PT.

Jl. Tomang Raya No. 4 Jati Pulo Palmerah –
Jakarta 11430. Telp: 021 – 5600400, 5667439
Fax: 021 – 5600390

Thai Meiji Pharmaceuticals Co, Ltd, Thailand

- COLISTIN 10% MEIJI

HANNACHEMIE

SUGINDRA PT.

Ciputat Indah Permai Blok D33. Jl. Ir. H.
Juanda No. 50 Ciputat Telp: 021 – 7418825
Fax: 021 – 7418826, 7424353

Delacon Austria

- AROMEX
- FRESTA

HARAPAN MAJU INDAH PT.

Jl. Pangeran Jayakarta No. 30A – Jakarta
10730. Telp: 021 – 6258518, 6258582
Fax: 021 – 6243375

Troy Laboratories Pty, Ltd, Australia

- KETAMIL

Vetafarm, Australia

- STOP WORM (BLUE TABLETS)
- STOP WORM (PINK TABLETS)

HENDY PHARMINDO SATWA PT.

Jl. Raya Hankam No. 42° Kel. Jatiwarna
RT.001/05, Kec. Pondok Gede Bekasi 17415
– Jawa Barat Telp: 021 – 8449427, 8447358,
84593002; Fax: 021 – 8449426

Hendy Pharmindo Satwa

- AMCO CHICKS
- DES HP
- EGG MASTER
- ENRO CHICKS
- ENRO CHICKS
- GLUTACID
- HEMIDOX
- HEMISIN
- HEMISOL
- HENCOX
- NEO–MOXY
- POWER CHICKS
- POWER VIT
- SUPER FIT
- SUPER FIT FORTE
- TOSAPRIM WS
- TYLOCOL

- TYLODOX
- TYLOXACIN
- VIGO VIT

PT. INDOFARMA

Jl. Tambak No. 2A Manggarai – Jakarta
13150. Telp: 021 – 8590349-50, 85008352
Fax: 021 – 8517223, 8574563

Biotek Indonesia

- ALBENDAZOLE 900 MG
- BENZALKONIUM CHLORIDE 10%
- ENROFOXACIN 100 G
- ENROFOXACIN 100 MG
- ERYTROMYCINE 80 G – DOXYCYCLINE 40G
- GLUTARALDEHYDE 30% BENZALKONIUM CHLORIDE 20%
- LEVAMISOLE 2.000 MG
- PVP IODINE 50 G

INDOVETRACO MAKMUR ABADI PT.

Maspion Plaza Lantai 9 Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 20-27 Jakarta 14420
Telp: 021 – 64701200; Fax: 021 – 64700967

Better Pharma Co., Ltd., Thailand

- COMOXY 500 WSP
- DOXCINE WATER SOLUBLE POWDER

Biomix SA, Columbia; Vitusa Corp USA

- TOXIBOND

Choong Ang Biotech, Co. Ld., Korea

- COCCIROL S
- CYC – 100
- SARAKILL
- CYPER KILLER 25 WP
- LEVAMISOLE POWDER
- NEW ERYSULFA
- PERMASOL 500 GRANULE
- PERMASOL 500 LIQUID

Indovetraco Makmur Abadi

- KISA SP
- TOLTRARIL S 5%
- TOLTRARIL S 2,5%

Phibro Animal Health Corp., USA

- AVIAX 5%
- COXISTAC 12%
- V – MAX

Joosten, Belanda

- VETILAC 41% LACTOSA

Kor – Chin Biotech Co., Ltd China

- KC PERMASOL

LFA Lesaffre, Perancis

- ACTISAF SC47

LNB, Belanda

- SPECILAC 41% LACTOSA
- SPECILAC - RED

Miavit GmbH, Jerman untuk XVET GmbH, Jerman

- MAYYA TURBO TOX

Octa Memorial, Thailand

- OCTACIN EN 10% ORAL SOLUTION
- OCTACIN EN 5% INJECTION
- OCTAMIX AC

Oddysey, Amerika Serikat

- MOLD BAND INHIBITOR

Olmix S.A. Perancis

- MISTRAL

Shandong Luxi, China

- NUOQIU PREMIX 5%

Thai PD Chemical Co Ltd, Thailand

- KANA SOLUTION
- D.I.R.P.D
- KOLAMOX LA INJECTION
- MENOROX LIQUID 20%
- PANHELMIN

Intervet Indonesia (MSD Animal Health) PT.

Wisma BNI'46 Lt.27 Jl. Jenderal Sudirman
Kav.1 Jakarta 10220. Telp: 021-57897000;
Fax: 021 – 57897099
Email: <http://www.merck-animal-health.com>

Coventry Chemicals Ltd, Inggris

- OMNICIDE

Intervet Inc. (Merck Animal Health), USA

- AE + POX
- AVABRON HN – 63
- AVAPOX
- BROILERTRAKE – M
- BURSA – VAC
- BURSA – VAC 3
- COCCIVAC – D
- ENRAMYCIN F – 40
- ENTEROVAX
- F VAX MG
- NEWCASTLE DISEASE N – 63
- NEWCASTLE DISEASE N – 79
- POLYBRON N – 63
- TENO – VAXIN

Intervet India Pvt. Ltd., India

- FLOXIDIN 10% INJ.
- FLOXIDIN 10% ORAL SUSP.

Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda

- ALBIPEN LA
- AQUAVAC STREPSA
- AQUAVAC IRIDOV
- BIODEXAMINE
- CHORULON
- DEXADRESON
- FERTAGYL
- FOLLIGON
- INTERTOCIN – S
- METRICURE
- NOBILIS AE + POX
- NOBILIS AE 1143
- NOBILIS CORVAC
- NOBILIS CORYZA
- NOBILIS DILUENT CA
- NOBILIS DILUENT FD
- NOBILIS E COLI INAC
- NOBILIS EDS
- NOBILIS G + ND

- NOBILIS GUMBORO 228E
- NOBILIS GUMBORO D78
- NOBILIS GUMBORO INAC
- NOBILIS IB + G + ND
- NOBILIS IB + ND
- NOBILIS IB + ND + EDS
- NOBILIS IB 4/91
- NOBILIS IB H – 120
- NOBILIS IB MA 5
- NOBILIS IB MULTI + ND + EDS
- NOBILIS IB MULTI + G + ND
- NOBILIS IB MULTI + ND
- NOBILIS ILT
- NOBILIS ILT BIOTRACH
- NOBILIS INFLUENZA H5
- NOBILIS INFLUENZA H5 + ND
- NOBILIS MA5 + CLONE 30
- NOBILIS MAREXINE CA126
- NOBILIS MG 6/85
- NOBILIS MG INAC
- NOBILIS ND + EDS
- NOBILIS ND BROILER
- NOBILIS ND C2
- NOBILIS ND CLONE 30
- NOBILIS ND HITCHNER
- NOBILIS ND LA SOTA
- NOBILIS NEWCAVAC
- NOBILIS REO + IB + G + ND
- NOBILIS REO 1133
- NOBILIS REO 2177
- NOBILIS REO ERS INAC
- NOBILIS REO INAC
- NOBILIS RISMAYAC
- NOBILIS RISMAYAC + CA 126
- NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS
- NOBILIS RT INAC.
- NOBILIS RTV 8544
- NOBILIS SALENVAC
- NOBIVAC DH
- NOBIVAC DHP
- NOBIVAC DHPPI
- NOBIVAC PARVO – C
- NOBIVAC PUPPY DP
- NOBIVAC RABIES
- NOBIVAC RL
- NOBIVAC TRICAT
- NORVAX STREPSI
- OESTRADIOL BENZOAT
- PARACILLIN SP
- PG 600
- PORCILIS ART
- PORCILIS ERY
- TAKTIC
- TONOPHOSPHAN COMPOSITION

Intervet Intl. GmbH, Jerman

- BUTOX 50
- PANACUR 10% SUSP.

**IPB SHIGETA ANIMAL
PHARMACEUTICALS PT.**

Depan Kampus FKH IPB Jl. Agatis Kampus
FKH IPB Darmaga Bogor 16680. Telp: 0251
– 8624928, 8425201; Fax: 0251 – 8123737

IPB SHIGETA Animal Pharmaceuticals

- BIRD CLOSE 5.1

**JAMU AYAM
SERBA GUNA PT.**

Magetan – Jawa Timur

JAMU AYAM SERBA GUNA

- SGT MUAANDHI DEWE

**JAPFA COMFEED
INDONESIA PT.**

Graha Praba Samantha Gdg Japfa Comfeed II
Jl. Daan Mogot KM. 12 No. 9 Jakarta 11730
Telp: 021 – 5448710; Fax: 021 – 5448709
Email: trysetyoh@japfacomfeed.co.id

Centralys, Perancis

- COMFEED BROILER PREMIX 396 R
- COMFEED LAYER PREMIX 2962 R

**JEBSEN & JESSEN
CHEMICALS
INDONESIA PT.**

Graha Inti Fauzi 7th floor Jl. Buncit Raya
No. 22 – Jakarta 12510 Telp: 021 – 27537177
Fax: 021 – 27537188 / 27537189 / 27537190

ECO Animal Health, United Kingdom

- ECOX 200
- VALOSIN FG 50
- VALOSIN WATER SOLUBLE
- HP 300

Kiotechagil, United Kingdom

- MYCOSTAT
- OXIHOLD
- PHORCE
- PREFECT
- SALKIL
- SORBATOX

Lallemand SAS France

- BACTOCELL
- LEVUCCELL SB 20
- LUMIPHYTASE 5 XG

KALBE FARMA PT.

Animal Health Division, Gdg Ziebart Lt. 2
Jl. Letjend Suprpto Kav. 4 Cempaka Putih –
Jakarta Pusat 10510. Telp: 021 – 4203000
Fax: 021 – 4205000

Nutri – Ad International bvba, Belgium

- ADSORBATE DRY
- MOLD NIL DRY
- NUTRILAC IGA LIQUID
- OXY NIL RX DRY
- WATER TREATMENT

Kalbe Farma Tbk

- AMPHIMIX
- DEMYTOX
- DORIS SKIN CARE POWDER
- FEDEX
- FEEDMIX-B
- HI-G
- HI-G PLUS
- KALBAZE – ZG
- KALBAZEN C
- KALBAZEN KAPLET
- KALMIRAL
- KALMOXTIN
- KALOXY-VET
- KALVIDOG
- KALVIMIX-RX
- LABRO
- LAGANTOR BSA
- LAGANTOR BSA BOLUS
- LAGANTOR F 1 CUSTOMIX
- MIXBRO
- MUSCASID 100%
- OXIBENDAZOLE – 100
- PITACID

- STAMIX 20
- STAMIX SP 500
- VITAEGGS

Bioproton Pty. Ltd., Australia

- NATUZYME

Sogeval SA, Perancis

- MEFISTO
- TH4+
- SOGECOLI
- STAFLEX

Jurox Pty Ltd, Australia

- JURAMATE

KATRACO SANTIKA PT.

Jl. Industri VIII/BS No. 18 LIK Kaligawe –
Semarang Telp: 024 – 6580953,
021 – 5480343. Fax: 024 – 6580993

Katraco Santika

- AMPICILLIN-10
- AMPROLIUM 20% WS
- CHLORTETRACYCLINE – 25
- CUSTOM ANTISTRESS
- CUSTOM VITAMIN
- DOXYCYCLINE – 10
- DOXY – PLUS
- ENRO – 10
- ENRO – 21
- ERITROMISIN – 25
- KATRAMIX 325
- KATRAMIX I
- KATRAMIX II
- KATRAMIX III
- MI – LAT
- NICLO – 75
- OXYTETRACYCLINE – 25
- PARAMOL – 50
- PIPERAZINE – 36
- RAMIKAL TRACE MINERAL PREMIX
- SIPRO – 10
- STREPTOMISINA SULFATE
- SULDIVIT
- SULDIVIT
- TYLOSIN – 50
- VIRUS KLIN
- VITAPOULT

PT. KEMIN INDONESIA

Wisma Rmk Suite 301 Jl. Puri Kencana Blok
M4/1 Kembangan Selatan, Jakarta – 11610
Telp : 021 – 5820165; Fax: 021 – 5820147

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore

- ACID LAC DRY
- ACID LAC LIQUID
- CLOSTAT HC DRY
- CLOSTATTM 11 DRY
- ENDOX DRY
- FEED CURB DRY
- KEMTRACE CHROMIUM DRY 0,04%
- KEMZYME V DRY
- LYSOFORTE DRY
- MYCOCURB AW LIQUID
- MYCOCURB EXTEND LIQUID
- TOXFIN TM DRY

KUSUMA MAKMUR UD

Semarang – Jawa Tengah

UD Kusuma Makmur

- PUMA (PUTU MACAN)

LESTARI AGRISATWA HUSADA PT.

Komp. Rukan Harmoni Plaza Blok J3-J4

Jl. Suryapranoto No. 2 Jakarta 10130

Telp: 021-6318949. Fax: 021- 6318948,
63195375 Atau

Jl. Wijaya I No. 51 Keb. Baru, Jakarta Selatan

Telp: 021 – 72792359; Fax: 021 – 72790237

Bernofarm

- AMERIA®
- AVITROL®
- BERCOX®
- BERNOMECS®
- BERNOQUIN®
- BERNOVIT®
- BIOTOCIN®
- BROTIGAN®
- COLISID®
- DIMEDRYL®
- ENDURAN®
- FERODEX 20% WITH VIT B₁₂®
- FERODEX®

- FLOGISTAN®
- HEKSAPLEX®
- KANAMEX®
- KLINORIL®
- LAMOXI®
- LEVOSTA®
- MIKROSID®
- NOVALDON®
- OXYTRAL LA®
- OXYTRAL®
- PRIMAZOL®
- STERILE DILUENT®
- STREPTOMYCIN® SERBUK INJEKSI

LISAN MULIA PT.

Jl. Mangunsarkoro 61 B Mesuan Solo –
Nusukan Solo Telp: 0271 – 717743
Email: lisanmulia@yahoo.com

Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia

- ALBEN 10% ORAL SUSPENSION
- ENROJECT 10% LA INJ. SUSP.
- ENROVA 10% INJECTABLE SOLUTION
- FERROVET 10% INJ SOL
- LINCO-S INJECTABLE SOLUTION
- MICROGEN FARM DESINFECTANT
- NOVAMOX – G INJ
- SULFATRIM 48% ORAL SUSPENSION
- TOLTRAVET 2,5% ORAL SOLUTION
- TYLOVA 200 INJECTABLE SOLUTION

LITO BINA

MEDIKANTARA PT.

Jl. Dr. Sahardjo No. 116 – Jakarta Selatan
12960 Telp: 021 – 8301888; Fax: 021 –
82900347

ANUPCO, Inggris

- ANCOMYCIN 200 LA
- ANCOXIN
- ANFLOX GOLD
- ANIZOLE 100
- COTRIM 240 INJECTION
- LEVIWORM 200

Bayer New Zealand

- BOMECTIN POUR ON
- TERMINATOR
- TETRAVET AEROSOL

IZO S.r.l Italy

- IZOVAC B1 HITCHNER
- IZOVAC CLONE
- IZOVAC CORYZA 3
- IZOVAC FC
- IZOVAC FOWL – POX
- IZOVAC GUMBORO
- IZOVAC GUMBORO 2
- IZOVAC H120 – LA SOTA
- IZOVAC H120 – B1 HITCHNER
- IZOVAC IB H120
- IZOVAC ILT
- IZOVAC LASOTA
- IZOVAC MG
- IZOVAC ND
- IZOVAC ND – BROILER
- IZOVAC ND – EDS
- IZOVAC ND – EDS – IB
- IZOVAC ND – IBD

Vetoquinol S.r.l Italy

- AMINOVITAMIN

LITO PRIMA MANDIRI PT.

Jl. Teluk Betung No. 45-Jakarta Pusat 10230.
Telp:021-3416093; Fax:021-31926987

Cenavisa SA, Spain

- GERM – IOD

Dawes Laboratories, USA

- PROTEK – ALL PLUS

Samu Median, Co., Ltd, Korea

- AMOXICOL
- CEFABEE OINTMENT
- COCCIMASTER
- CYROMAZIN – 10
- EXFO-P INJ.
- PACOM-A
- VIBA ZONE

Qingdao Mingzhu Pharmaceutical Co., Ltd

- E-FLOX 2,5%
- 0.05% VITAMIN PREMIX FOR LIVESTOCK

QYH Biotech Company Limited, China

- AVIAN INFECTIOUS CORYZA VACCINE, INACTIVATED

- ND VIRUS LASOTA AND IB VIRUS 120 LIVE VACCINE
- NEWCASTLE DISEASE AND EGG DROP SYNDROME VACCINE INACTIVATED (LA SOTA STRAIN + 911 STRAIN)
- NEWCASTLE DISEASE VACCINE INACTIVATED (LA SOTA STRAIN)
- NEWCASTLE DISEASE VACCINE LIVE (LASOTA STRAIN)

LOHMANN ANIMAL HEALTH INDONESIA PT.

Gedung Maspion Plaza Lt. 6 Unit C2
Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 8 – Jakarta
Utara 14420 Telp: 021 – 64701203;
Fax: 021 – 64701204

Lohmann Animal Health International, USA

- AVIPRO 101 CORYZA
- AVIPRO 104 MG BACTERIN
- AVIPRO 105 ND
- AVIPRO 105 ND CHICK
- AVIPRO 106 REO
- AVIPRO 108 FC4
- AVIPRO 109 SE4
- AVIPRO 201 ND – IB
- AVIPRO 202 ND – IBD
- AVIPRO 221 ND – IB2
- AVIPRO 331 ND – IB2 – BD3
- AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO
- AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO
- AVIPRO AE TREMBLEX
- AVIPRO IB M 48
- AVIPRO IBD XTREME
- AVIPRO LT
- AVIPRO MG F
- AVIPRO ND – IB POLYBANCO
- AVIPRO ND – IB SOHOL
- AVIPRO ND B1
- AVIPRO ND VISOTA
- AVIPRO POX CEO
- AVIPRO POX TC
- AVIPRO VIBURSA CE

Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, Jerman

- AVIBLUE
- AVIPRO DILUDROP
- AVIPRO DILUJECT
- AVIPRO IB H120
- AVIPRO ILT

- AVIPRO MD RISPENS RL
- AVIPRO ND C131
- AVIPRO ND HB1
- AVIPRO ND LASOTA
- AVIPRO ND – IB LASOTA
- AVIPRO POX
- AVIPRO PRECISE
- AVIPRO REO
- AVIPRO THYMOVAC

MAJU FARMA INDONESIA PT.

Jl. Petamburan IV No. 36. Kel. Petamburan,
Kec. Tanah abang – Jakarta Pusat
Telp: 021-5344777, 91612565
Fax: 0251-5720570

AVICO, Jordan

- ADEMIN LIQUID
- ALBENDAZOLE AVICO
- AVICYCLINE 20% LA INJECTION
- AVIMEC INJECTION
- AVIMEC LIQUID
- AVITRYL ORAL SOLUTION
- AVITRYL – 10 INJECTION
- AVIXIN
- DICLACOX
- ENTEROCILLINE
- FUNGIZAL
- GENTADOX
- IODOPHORE 11,5%
- NEW COLIPRIM
- RAMECTIN INJECTION
- TYLOTRYL
- ULTRAMIN
- ULTRAVIT M
- VITAMIN E SELLENIUM

MEDION FARMA JAYA PT.

Jl. Babakan Ciparay 282 RT. 004 RW.008
Bandung – Jawa Barat 40223
Telp: 022 – 6030612; Fax: 022 – 6010859

Medion

- AMINOVIT
- AMMOTROL
- AMOXITIN
- AMPICOL
- ANTI PICK
- ANTIKOKSI

- ANTISEP
- AQUA DESTILATA STERIL
- BLOATEX
- BROILER VITA
- CACING EXITOR
- CALVITA
- CIL
- COLIQUIN
- COLLIMEZYN
- COXY
- COXY FORTE
- DESINSEP
- DOCTRIL
- DOXYTIN
- DOXYVET
- DUOKO
- EGG STIMULANT
- ERYSUPRIM
- FERDEX 100
- FERDEX PLUS
- FORMADES
- FORTEVIT
- GENTAMIN
- GUMBONAL
- INJEKSI KALSIMUM BOROGLUKONAT
- INJEKSI VITAMIN B KOMPLEKS
- INJEKSI VITAMIN B12
- KANAMIN
- KOKSIDEX
- KOLERIDIN
- KOLERIDIN K
- KUTUTOX
- LARUTAN DAPAR
- LARVATOX
- LEVAMID
- MALADEX
- MEDIBIRD
- MEDIMILK
- MEDISEP
- MEDITRIL K
- MEDIVAC AI
- MEDIVAC AI 0.3
- MEDIVAC CORYZA B
- MEDIVAC CORYZA T SUSPENSION
- MEDIVAC GUMBORO A
- MEDIVAC GUMBORO B
- MEDIVAC GUMBORO EMULSION
- MEDIVAC IB H – 120
- MEDIVAC IB H – 52
- MEDIVAC ILT
- MEDIVAC ND CLONE 45
- MEDIVAC ND EMULSION
- MEDIVAC ND EMULSION 0.3
- MEDIVAC ND GUMBORO EMULSION
- MEDIVAC ND HITCHNER B1
- MEDIVAC ND LA SOTA
- MEDIVAC ND – AI EMULSION
- MEDIVAC ND – EDS EMULSION
- MEDIVAC ND – EDS – IB EMULSION
- MEDIVAC ND – IB
- MEDIVAC ND – IB EMULSION
- MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION
- MEDIVAC POX
- MEDOXY L
- MEDOXY LA
- MELODY
- MINERAL BABI
- MINERAL FEED SUPPLEMENT – A
- MINERAL FEED SUPPLEMENT – S
- NEMASOL – K
- NEO ANTISEP
- NEO ANTISEP NEW FORMULA
- NEO MEDITRIL
- NEO MEDITRIL – I
- NEOBRO
- NETRABIL
- OBAT TEMBOLOK
- PIGMIX
- PIGNOX
- PIGWORM – S
- PROXAN – C
- PROXAN – S
- PUYUH MEDI EGG
- PUYUH VITAKIT
- PUYUH VITANAK
- RESPIRATREK
- SING A SONG
- SOLVIT
- SPORADES
- STRONG EGG
- STRONG N FIT
- SULFAMIX
- SULPIG
- SUPER POWER
- SUPER TOP
- THERAPY
- TOP MIX
- TOP MIX HC
- TRIMEZYN BOLUS
- TRIMEZYN K
- TRIMEZYN S
- TRIWORM
- TURBO
- TYCOTIL
- TYFURAL
- TYSINOL
- VERMIXON SIROP
- VERMIZYN
- VET STREP
- VITA CHICKS

- VITA PLEX
- VITA PLEX B
- VITA PLEX DROPS
- VITA STRESS
- VITA STRESS – B
- VITA STRONG
- VITA TETRA CHLOR
- VITA TETRA CHLOR S
- WORMECTIN INJEKSI
- WORMZOL B
- WORMZOL K
- ZALDES

MEGAN GALUS KINANTAN PT.

Komplek Perkantoran Pulomas Satu Gd. 3,
Lt. I, Ruang No.8 Jl. Jenderal A. Yani No. 2
Pulomas Jakarta 13210. Telp: 021-47867362,
4898118 ext 242; Fax 021-4891784
Email: megan@indosat.net.id

Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol

- CALIMICINA 200 CL
- DESPADAC
- FLUBENZIM 5%
- INDIGEST INJECTABLE
- INMUNAIR 17.5
- OXYTOCINA PITUITARIA
- PLUSET
- PROMOTOR L
- ROBORANTE CALIER
- ROXACIN INJECTABLE
- ROXACIN ORAL
- SEPTO-SKIN CALIER
- SETON 2%
- ZIPYRAN PLUS
- ZODALBEN 12,5%
- ZOOBIOTIC

Bioveta AS, Czech Republic

- BIOCAN DHPPI
- BIOCAN M INJ
- BIOCAN R INJ

MEGASETIA AGUNG KIMIA PT.

Jl. Paradise Timur Raya Blok G1 No. 7 – 10
Sunter Agung – Jakarta Utara 14350
Telp: 021 – 6451037; Fax: 021 – 6452306

Danisco Argentina SA Argentina; Danisco (UK) Ltd, United Kingdom

- PHYZYME XP 1.000 TPT
- PHYZYME XP 10.000 TPT
- Femic SA De CV, Mexico; Danisco (UK)
Ltd, United Kingdom**
- PHYZYME XP 5.000 L

Finnfeeds Oy, Finlandia; Danisco (UK) Ltd, United Kingdom

- AVIZYME 1502
- AVIZYME 1505
- PHYZYME XP 5.000 G

Genencor International BVBA, Belgia untuk Danisco (UK) Ltd., Belgia

- DANISCO ANIMAL NUTRITON LIOUID
ALPHA – AMYLASE

Genencor International Ltd., Finland; Danisco (UK) Ltd., Finland

- DANISCO ANIMAL NUTRITON LIOUID
SUBTILISIN (PROTEASE)
- DANISCO XYLANASE 40.000 G
- DANISCO XYLANASE 40.000 L

Seppic, Perancis

- MONTANIDE ISA 50V2
- MONTANIDE ISA 70 VG

MEIJI INDONESIA PHARMACEUTICAL PT.

Kl. Tanah Abang No. II No. 4 – Jakarta 10036
Telp: 021 – 3845584, 3845571
Fax: 021 – 3457650

Meiji Indonesia Pharmaceutical

- AMCOL
- WIDECILLIN FINE GRANULES 10%
- WIDECILLIN FINE GRANULES 20%

MENSANA ANEKA

SATWA PT.

Jl. Daan Mogot Kav. 100 Komplek Taman
Surya Blok AA 9 – Jakarta 11460. Telp: 021-
5663666, 5681193, 5681194;
Fax: 021 – 5663720

Laboratorios Hipra SA, Spanyol

- ADENIPRAVAC ND/IB
- ADENIPRAVAC TRIPLE
- BRONIPRA – I
- BRONIPRA – ND
- BRONIPRA – ND/IBD
- CORIPRAVAC
- GENTAMOX
- GONASER
- HEXAMAS
- HEXIPRA METRIN
- HIPRAGUMBORO – BPL2
- HIPRAGUMBORO – CH/80
- HIPRAGUMBORO – GM97
- HIPRALONA – NOR S
- HIPRAMIN – B
- HIPRAMOX
- HIPRAPOX
- HIPRAVIAR – B1
- HIPRAVIAR – BPL2
- HIPRAVIAR – CLON
- HIPRAVIAR – CLON/H120
- HIPRAVIAR – ILT
- HIPRAVIAR – ND BROILERS
- HIPRAVIAR – S
- HIPRAVIAR – S/H120
- HIPRAVIAR – TRT4
- HIPRAVIT – AD3E FORTE
- HORMONIPRA
- OXIPRA – 20 LA
- PNEUMOTOS – I
- TYLOPRIM
- VERMIPRAZOL – 10%

Mensana Aneka Satwa

- ALBENMAS
- ALBENMAS – 18%
- BIODS – 100
- BIODS FORTE
- CARMAVIT
- CIPROMAS
- COLIMAS
- COXYMAS
- CYROMAS- 1%
- CYROMAS 10%

- DOXERIN
- DOXERIN +
- DOXYMAS
- EGG PROMOTOR
- ENRO FORTE
- ENROMAS
- EXTRAVIT
- FLOXAMAS
- FLUQUINE
- GLUTAMAS
- LEUCOMAS
- LEVAMAS
- MASABRO
- MASACHICKS
- MASAMIX
- MASAMIX SUPER
- MASAVIT
- MASQUIN
- MITACHICKS
- MOXACOL
- MOXACOL PLUS
- MULTIDES
- NEOXIN
- NICLOMAS
- PIPERAMAS
- PIRETAMAS
- QUINOXAN
- SEPTOCID
- STRONGPLUS
- SUPRALIT
- SUPRALIT +
- TYLOFLOX
- TYLOMAS
- VITAMAS

MITRAVET PT.

Taman Tekno Blok L 1 No.7 BSD City,
Tangerang-Banten Telp: 021 – 75880165,
92608659; Fax: 021 – 75880164

Mitravet

- AMIVIT – E®
- BENZALVET – 10®
- BIO – PLUS®
- CARVITA – 15®
- CATTLEVET®
- CIPRO – 12®
- CIPROSIN EXTRA®
- COCCIVET®
- HEXADIN®
- KURKUMAVIT®
- LARVASID – 10®
- LEVAMIT – 125®

- MITRAFLOX – 12[®]
- MITRAMET – 240[®]
- MITRAMIX – C[®]
- MITRAMOX – 280[®]
- MITRAVIT – 100[®]
- MYCO – BLOCK[®]
- NEO ERYDOVET – 25[®]
- NEOTETRA – 50[®]
- NICLOMIX – L[®]
- PROVITA – 20[®]
- PYRISIN – 525[®]
- SANITAS - 151[®]
- SELEVIT – SB FORTE[®]
- VET – MIX[®]

ChoongAng Vaccine Lab. Korea

- BNE – VAC[®]
- CANISHOT[®] RV – F
- DHPPL – VAC[®]
- IBD – VAC[®]
- IC – VAC[®]
- ILT – VAC[®]
- NB^{4H} – VAC[®]
- NDG – VAC[®]
- NDLS – VAC[®]

MJPF FARMA INDONESIA PT.

Komp BSD Sektor XU Blok HI/18, Taman Tekno
BSD Tangerang – Banten
Telp: 021 – 7562630; Fax: 021 – 7562604

MJPF Farma Indonesia

- COLIMIX – 20
- NEOAMP
- PRIMA ALBENS – 10
- PRIMA AMINOACID PLUS 2002
- PRIMA AMPROFURA – 77
- PRIMA COCCI PLUS
- PRIMA COLIMIX PLUS
- PRIMA COLMY PLUS
- PRIMA CUATS – 30
- PRIMA CYPRO PLUS
- PRIMA DEXTRA – CY PLUS
- PRIMA DOXERY PLUS – 99
- PRIMA GENTA 5% INJECTION
- PRIMA HIT STRESS
- PRIMA IODINE – 33
- PRIMA LINCOSPECT
- PRIMA NEOERY – 25
- PRIMA OXYCOL
- PRIMA OXYMYCINE PLUS

- PRIMA QUINCURE – 25
- PRIMA QUINOL – F
- PRIMA QUINOL – FL
- PRIMA QUINTRIL 10% PLUS
- PRIMA VAM – 200
- PRIMA VITA PLUS
- PRIMA ZINEOS 808 PLUS
- PRIMACIDE – 200
- PRIMAZINE 808 PLUS
- STOVANOL – SF
- VITACART PLUS

MONRAD LUMBAN HOLBUNG PT.

Alamat Produsen: Jl.Rajawali No.45 Sukajadi
Pekanbaru – Riau Kantor perwakilan : Jl. Ir.
Juanda No.99A Margahayu – Kota Bekasi
Telp/Fax: 021 – 8800193

Monrad Lumban Holbung

- SUPLEMEN HERBAL SENIOR

MULTI DAYA PENTAMITRA PT.

Bukit Pamulang Indah C3 No. 12
Telp/fax : 021 – 7423279

Sumber Multivita

- AVIDEGG
- AVITONIC – WSP
- VIANO – 10
- VIRTOX

MULTI MEDITAS PRATAMA PT.

Jl. Perintis Kemerdekaan Kompleks Permata
Bordir Centre Blok A4 Tasikmalaya – Jawa
Barat Telp: 0265 – 327594;
Fax: 0265 – 327594

Multi Meditas Pratama

- FLOXA M2P
- IODINACID

MULTI SARANA FARMA PT.

Jl. Raya Serpong KM.7
Komplek Multiguna Blok A14
Paku Alam, Serpong-Tangerang Selatan
Telp:021-5399521 Fax:021- 53121702

Multi Sarana Farma

- GF – 82

MULTIFARMA SATWA MAJU PT.

Jl. Raya Parung Panjang No. 81
Desa Caringin, Kec. Legok – Tangerang
Telp:021-5979875, 5979876;
Fax:021-5977671

Multifarma Satwa Maju

- CLINIC PLUS
- CONTRA – STRESS
- DOXYMAX
- ERYMAX
- FLOXATRIL
- MULTICHICKS
- MULTIFLOX – 11
- MULTISEPT
- NEOFIL FORTE
- SPIRADEGG
- STRONG – VIT

NOVINDO AGRITECH HUTAMA PT.

Duta mas Fatmawati Blok A1/39
Jl. RS. Fatmawati No. 39 RT. 003/RW. 007
Cipete Utara – Kebayoran Baru
Jakarta Selatan. Telp: 021 – 72790616,
7245986; Fax: 021 – 7220373

ADDCON, Jerman

- KOFA GRAIN -PH 5-

Elanco Animal Health, Belgia

- CLINACOX
- CLINAFARM SMOKE
- CLINAFARM SPRAY
- FLUBENOL 5%
- IMAVEROL
- SOLUBENOL 100 MG/G
- SUROLAN

ICA Laboratories, South Africa

- VIRUKILL

Novartis (Bangladesh) Limited, Bangladesh; Novartis Indonesia

- FASINEX 900

Novartis (Taiwan) Co. Ltd, Taiwan; Novartis Indonesia

- MYCOSTATIN – 20

Novartis (Thailand) Ltd, Thailand; Novartis Indonesia

- AMOXYCYL
- DENAGARD 10% COATED
- DENAGARD 20% INJECTION
- DENAGARD 45% WSG
- QUIXALUD

Novartis Animal Health Inc, Swiss; Novartis Indonesia

- NEPOREX 2 WSG

Novartis Animal Health Inc, Switzerland; Novartis Indonesia

- LARVADEX 10% PREMIX

Novartis Animal Health Ltd, Austria; Novartis Indonesia

- DENAGARD 80% COATED

Shanghai Novartis Animal Health Ltd, China; Novartis Indonesia

- COSUMIX PLUS 750
- ESB – 3 (30%)

Prince Agri Products, Amerika Serikat

- AB 20

Probiotics International, Inggris

- PROTEXIN CONCENTRATE

WooGene B&G, Korea

- WOOGENE COLISTIN 150

NOVUS INDONESIA PT.

Menara Prima Lt. 2 Unit L Jl. Lingkar Mega
Kuningan Blok 6.2 – Jakarta 12950
Telp: 021 – 57947966; Fax: 021 – 57947967

Novus Int. Inc, USA

- ACTIVATE DA
- MINTREX CU
- MINTREX MN
- MINTREX POULTRY
- MINTREX PSE
- MINTREX ZN
- SANTOQUIN LIQUID
- SANTOQUIN MIXTURE 6

Novus Carotenoid S.A

- CANTHACOL
- FORMYCINE GOLD PREMIX
- FORMYCINE LIQUIDO
- TOXIBAN AM
- XAMACOL – 40

OTASINDO

PRIMA SATWA PT.

Apartement & Office Patria Park No. RK-07
Jl. Jend DI Panjaitan Kav. 7-8
Jakarta Timur – 11340. Telp: 021 – 85918477,
85918478; Fax: 021 – 85918498
Email: otasindo@cbn.net.id

Indovax Private Limited, India

- BRONKICHK
- BRONKI-L
- CORYVAX
- ENCIVAX
- GEORGIA STRAIN
- LASOTA STRAIN (NEWCASTLE DISEASE VACCINE)
- POWL POX

Kepro B.V., Holland, Belanda

- KEPCOX 2,5% ORAL
- KEPROMEK INJ.
- KEPROMEK ORAL
- KETAMINE 10 % INJ.
- VIT AD3 E 300 INJ.
- WORMINEX 10% LIQUID

Otasindo Prima Satwa

- BROILER FASGROW
- CARNIFAST
- CIPROXAN
- DOXITRA
- GLUTACID
- KATRIWORM

- KOKSINDO
- LARSIDEX
- MALAKILL
- MICROCID
- MICRODES 100
- MYCOSINDO
- OTAFLOX
- OTAGUMMED
- OTAQUINE SOL
- OTRALECT
- OTRALITE
- OTRAVIT
- PULLOXAL
- RESPIRAC
- SINDOCHICKS
- SINDOFLOK SOL
- SINDOFLOX FORTE
- SINDOMIX 17 EM
- SINDOVIT SUPER
- SINDOXAN
- TRIMESULF

PAECO AGUNG PT.

Jl. Raya Pasar Minggu No. 97A
Jakarta Selatan 12510. Telp: 021 – 7982679,
7975651, 7975652; Fax: 021 – 7982678

CIPLA Ltd, India

- BENVET 10% W/V
- BENVET GR – 2500
- BENVET GR – 300
- CALBRO INJECTION
- CIPLOX 10% W/V
- CLAVET 250 TABLET
- CLAVET 50 TABLET
- DERMAVET CREAM
- IVOCIP PASTE
- MEGACLOX
- NOBLOAT
- OTC SPRAY
- VETQUIN
- WORMNIL

Colorado Serum Company, USA

- ANTHRAX SPORE VACCINE
- BRUCELLA ABORTUS STRAIN RB-51

Merial Saude Animal Ltda, Brasil

- IVOMEK INJECTION

Novartis Animal Health US, Inc , USA

- BOVI SHIELD 3
- VIRA SHIELD 4
- VIRA SHIELD 6

PAKAN SERASI PT.

Jl. KS. Tubun 2C/30 Jakarta – 11410
Telp: 021 – 5480343; Fax: 021 – 5480622

Bedson S.A. Argentina

- BEDGEN 40 PREMIX
- FOSBAC PLUS T

CTCBIO, Korea

- POUSTIN C

Jurox, Australia

- TRIDIAZINE ORAL SUSPENSION

Mosaic, USA

- BIOFOS

Vetanco S.A. Argentina

- AMBIFLUD TRIAZIN
- IVERVET
- OXILEN AD
- VETRIBAC
- VETRIBAC D

PFIZER INDONESIA PT.

Jl. Raya Bogor KM. 28 Pekayon
Jakarta Timur 13710. Telp: 021-30052400
Fax: 021 – 8701866

**Evans Vanodine International PLC,
England**

- BIOCID 30
- GPC 8
- SHIFT
- VANODOX
- VANOQUAT

Fort Dodge Animal Health Lt., USA

- MD – VAC CFL
- NEW BRONZ
- NEW BRONZ MG
- NEWCASTLE K
- VVMD – VAC

Fort Dodge Animal Health, Catania, Italy

- PROMERIS DUO SPOT ON FOR DOGS

Fort Dodge Animal Health, Spain

- DUPHAPEN STREP BP
- Fort Dodge Animal Health, Weesp,
Holland**

- EFFYDRAL

Fort Dodge Australia Pty, Ltd., Australia

- PROHEART SR-12

**Fort Dodge Saude Animal Health Ltd.,
Brazil**

- CORYZA OIL – 3
- EDS – VAC
- PEST-VAC
- POULVAC BURSA F
- POULVAC CORYZA ABC IC3
- POULVAC EDS NEW BRONZ VAC
- POULVAC IB H120
- POULVAC IC ABC OIL
- POULVAC MAREK CVI
- POULVAC MIX 6
- POULVAC NDW
- POULVAC OVOLINE CHI+HVT MAREK'S
DISEASE VACCINE
- PRO – CELL

**France via Frontera San Diego, Synbiotics
Corporation,USA**

- FLU DETECT TYPE A AG TEST STRIP

**Glaxo Smith Kline, USA & Aurubindo,
India**

- CLAVAMOX DROPS

Interphill Laboratories Inc, Philipina

- VALBAZEN 11.25% SUSPENSION

Medreich Limited, India

- AMOXISOL

Milwhite Inc., USA

- MILBON TX

Norbrook Laboratories Ltd., Irlandia,UK

- DUPHAPEN LA

Pfizer Animal Health India Ltd., India

- ENROCIN ORAL SOLUTION
- NEOPROFEN INJECTION

Pfizer Animal Health, USA

- AE VAC
- AE – POXINE
- BRONCHITIS MASS (BRON MASS)
- BURSAPLEX
- BURSINE – 2
- BURSINE – K
- BURSINE N – K
- BURSINE PLUS
- CHICK N – K
- CHICK N POX TC
- DEFENSOR 3
- DURAMUNE DA2L
- DURAMUNE MAX 5/4L
- DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L
- DURAMUNE MAX PV
- EDS NEW VAC
- FELOCELL 3
- FELOCELL 4
- FEL – O – GUARD PLUS 3
- LARYNGO – VAC
- NEWCASTLE B1
- NEWCASTLE DISEASE B1 BRON CONN MASS
- NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS
- NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS II
- POULVAC E COLI
- POULVAC EDS VAC
- POULVAC PABAC IV
- POXINE
- PRO VAC 3
- PRO VAC 4
- RABVAC 3
- RABVAC 3 TF
- RESPISURE
- RIMADYL
- SUVAXYN E
- SUVAXYN RESPIFEND MH
- TRI-REO
- V.A. CHICK VAC
- VA VAC
- VANGUARD PLUS 5 L4 CV
- VANGUARD PLUS 5/CV – L
- VANGUARD PLUS 5/L
- VANGUARD PLUS CPV
- VANGUARD PLUS CPV/CV
- VI – SORBITS

Pfizer Inc. USA

- DECTOMAX
- EXCENEL STERILE POWDER
- EXCENEL STERILE SUSPENSION
- REVOLUTION 12%
- REVOLUTION 6%

Pfizer Inc., Phillipina

- NEO TERRAMYCIN 25
- NEOMIX 325

Pfizer Inc., Venezuela SA., Venezuela

- CANEX MEDIUM

Pfizer Indonesia

- TERRAMYCIN* INJECTABLE SOLUTION
- TERRAMYCIN* LA INJECTABLE SOLUTION

Pfizer Olot S.L.U., Spanyol

- BUTASYL
- DUPHAFRAL AD3E FORTE
- DUPHAFRAL D3 1000
- DUPHAFRAL E-SELENIUM
- DUPHAFRAL MULTI
- DUPHALYTE
- TINKANIUM

Pfizer Suzhou Animal Health, China

- LINCO SPECTIN 100 SOLUBLE POWDER
- LINCO SPECTIN STERILE SOLUTION

Pharmacia & UpJohn Company, USA

- EXCEDE™ FOR SWINE

PIMAIMAS CITRA PT.

Mugi Griya Building Lt. 3, Suite 304
Jl. MT. Haryono Kav. 10 – Jakarta 12810
Telp: 021 – 8308471; Fax: 021 – 8308472

Bimeda Chemicals Ltd, Irlandia

- COOPERTET LA

Bio Science, USA

- GROGEL

Schering-Plough Animal Health, USA

- LT – IVAX

PUSAT VETERINARIA FARMA

Jl. Ketintang II No. 1 Surabaya
Telp: 031 – 813338, 813668, 839683

Pusat Veterinaria Farma

- AG. BRUCELLA RBT
- AG. MYCOPLASMA G.
- AG. ND
- AG. PULLORUM
- ANTHRAXVET
- BRUCIVET
- KOMAVET
- LENTOVET
- ORIVET
- RABIVET SUPRA'92
- SEPTIVET

PYRIDAM VETERINER PT.

Jl. Kemandoran VIII No.16 Grogol Utara
Jakarta Selatan 12210. Telp: 021 – 5485126
Fax: 021 – 5493587, 5329049

Pyridam Veteriner

- AMOXIN
- ANTIBLOAT
- ASCARIN
- B – PLEX INJ.
- BUPHOSOLAMIN
- CIPROXACIN
- COLI – OXY
- COLIVET
- CONTRAWORM
- CONTRAWORM – KAPSUL
- CORYDON
- ENROXIN
- IVOCIP
- MARATON
- MEDILAN
- MONIL BOLUS
- MULTIVIT
- NEW METHIOVIT
- NEW SQ – PLUS
- PIRIMYCIN
- PIRIPEN INJ.
- PIRIVET
- PUYUHVIT
- PYRIKOL – DROPS
- PYRONIL
- PYRONIL SUSPENS
- PYRONIL – 1000 BOLUS

- PYRONIL – 2500 BOLUS
- PYRONIL – 300 KAPLET
- PYROSPLASH
- PYROXY INJ.
- RODALON
- RYOMICIN
- SULFAXALINE
- TETRAFEIN MERAH
- TRIMETH
- TYLAPRIM
- VAKSIN ND LASOTA
- VITABRO
- VITRAMIX – LC

ROMINDO PRIMAVETCOM PT.

Jl. Dr.Sahardjo No.264-Jakarta Selatan 12870
Telp: 021 – 8300300; Fax: 021 – 8280678

Adisseo – Perancis

- MICROVIT A PROSOL 500
- MICROVIT A SUPRA 1000
- MICROVIT A SUPRA 500
- MICROVIT AD3 SUPRA 1000 – 200
- MICROVIT B1 PROMIX
- MICROVIT B12 PROMIX 1000
- MICROVIT B2 SUPRA 80
- MICROVIT B3 PROMIX (NIACIN)
- MICROVIT B5 PROMIX
- MICROVIT B6 PROMIX
- MICROVIT D3 PROMIX 500
- MICROVIT E PROMIX 50
- MICROVIT E PROSOL 50
- MICROVIT H PROMIX BIOTIN
- RHODIMET AT 88
- RHODIMET NP 99
- ROVABIO MAX AP
- ROVABIO™ EXCEL AP
- ROVABIO™ EXCEL LC

Berg & Schmidt

- BERGAFAT
- BERGAPRIME
- BERGAZYM P

Biomim

- BIOMIN C – EX
- BIOMIN IMBO
- BIOMIN PEP 1000
- BIOMIN PEP 125 POULTRY
- BIOTRONIC SE

- BIOTRONIC SE FORTE LIQUID
- LISOVIT
- MYCOFIX PLUS 3.0
- MYCOFIX SECURE
- MYCOFIX SELECT 3.0

Biomin, Austria

- BIOMIN CLEANGRAIN
- ECOSTAT

Biomin, Singapore

- BIOMIN PHYTASE 5000

Bioproperties Pte. Ltd.-Merial Australia

- VAXSAFE MG VACCINE
- VAXSAFE MS VACCINE
- CHOLARAINOL
- COFACALCIUM
- COFALYSOR INJECTION
- COFAVIT 500
- CRD 92
- DIMETOPRIM ORAL POWDER
- FERRO 2000
- HEPARENOL
- OXYTETRA 5 COOPHAVET
- PHOSRETIC
- PROPHYL
- REMACYCLINE LA
- TRISULMIX INJECTABLE/SULRIJECT
- TRISULMIX LIQUIDE
- AMPROL 12%
- AVIFFA RTI
- AVINEW
- AVINEW FROZEN
- BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND+ IB+ IBD)
- BINEWVAX 0.3
- BINEWVAXIDROP
- BIORAL H120
- BIOSOLAMINE
- BUR 706
- BURCELL HVT
- BURSA BLEN M
- CANIFFA
- CERTIFECT L SPOT ON
- CERTIFECT M SPOT ON
- CERTIFECT S SPOT ON
- CERTIFECT XL SPOT ON
- CHICKOPEST
- COYDEN F
- DIFTOSEC CT
- DOVENIX
- EURICAN DHPPi – 2
- EURICAN DHPPi – 2 L
- EURICAN DHPPi – 2 LR

- FELLINIFFA
- FRONTLINE PLUS FOR CATS
- FRONTLINE PLUS FOR DOGS
- FRONTLINE SPOT ON
- FRONTLINE SPRAY
- GALLIMUNE 201 (IBD + REO)
- GALLIMUNE 203 (ND + IB)
- GALLIMUNE 301 (ND + IC2)
- GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS)
- GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO)
- GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2)
- GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD)
- GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2)
- GALLIMUNE FLU H5N9
- GALLIMUNE IBD
- GALLIMUNE MG
- GALLIMUNE ND
- GALLIMUNE ND DAY OLD
- GALLIMUNE REO
- GALLIMUNE SE
- GALLIVAC AE
- GALLIVAC LASOTA
- GALLIVAC REO
- GUMBOPEST
- GUMBORIFFA 0,3
- HAEMOVAX 0,3
- HEMATOPAN B12
- HEXADOG
- HYORESP
- IMEQUYL SOL 20%
- IMOPEST
- IVOMEK FOR SWINE
- LA SOTA MASS BLEN
- LT BLEN
- MAREK RISPEN CVI 988 (MAREK'S DISEASE VACCINE LIVE CHICKEN HERPES VIRUS)
- MAREK RISPEN CVI 988 + HVT
- MAREK'S DISEASE VACCINE, SEROTYPE 3, LIVE VIRUS/MAREK'S HVT
- NEMOVAC
- OVO – 4
- PENTADOG
- PESTIFFA
- PNEUMODOG
- PRIMODOG
- PUREVAX
- RABISIN
- RHINIFFA T
- SOTASEC
- SPECIORLAC
- SUANOVIL SOL. 20
- TRYPAMIDIUM

Merial – Select, USA

- IBD BLEN

MSD – Merial

- HEARTGARD PLUS CHEWABLE
- IVOMEK F INJECTION

Romindo Primavetcom

- AGRITOP
- ALZODIN
- AMPIXIL
- AMPROMIX 25
- AMPROSOL 20
- ARSOMIX
- AVISTRESS
- BIODIN
- BIOMIN CLEANGRAIN FORTE LIQUID
- CARISID
- CHICKOFIT
- DUODIN LA
- DURAVIT
- EMBACOX
- ENOQUYL
- ENOXAN 10%
- ENOXIN
- ENVACLOS
- FERRODIN
- GROFAS
- HEMATODIN
- IMEQUYL
- ISTAM
- ISTAM 20%
- ISTAM 30%
- MIRAL 8
- NOVAQUYL
- PRIMADINE
- PRIMADOXIN
- PRIMATICOL
- PRIMATRIM
- PRIMAVIL
- PRIMEQUYL
- PRISTAM
- R. P. MINERAL
- RHODEGG
- RHODIMIX 22
- RHODIMIX 273
- RHODIMIX 784
- RHODIMIX CF3
- RHODIMIX MB 100
- RHODIVIT
- ROMINDO MICROMIX 2000
- SAQUADIL 100
- SAQUADIL 50
- SPIRADIN – 20

- SUANOVIL
- SULFIDIN
- DUOCYCLINE – LA
- MULTIDOSE – FW
- TERREXINE

Univet – Irlandia

- AQUAPRIME 4/20 INJECTION
- MYCOMAS

SAKA MENARA ALAM PT.

Jl. A. Yani No. 2 – Jakarta 13210
Komp. Pulomas Satu Gd. 4 L.1 R.12
Telp: 021 – 47860352; Fax: 021 – 47860352

Dae Sung Microbiological Labs-Korea

- COCCICHEM WS
- ENROTIL 10% SOL
- ENROTIL 50 INJECTION

Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V.-Belanda

- DUFADEX 10% INJ.
- DUFATRIM/SUL ORAL
- DUFAVIT EXTRA ORAL
- DUFAVIT INJ

Laboratorios Ovejero SA. Spanyol

- INMUGAL IBA GUMBORO
- INMUGAL VP LASOTA
- QUINOVET F

SANBE FARMA PT.

Jl. Tamansari No. 10 Bandung – Jawa Barat
40116. Telp: 021 – 4207725
Fax: 021 – 4238476, 4209231

Choong Ang Vaccine Lab. – Korea

- IB-VAC®

Sanbe Farma

- AMPIBIO®
- BENZADES®
- BIO – CHICKS®
- BIOMIN®
- BIOSAN – TP® INJ
- BIOSAN – TP® ORAL
- BIO – STRONG®
- BIOVIT®

- BRO – GESAT®
- B – SANPLEX®
- CALCIDEX®
- CALCIDEX® ORAL
- CALCIDEX® PLUS
- CIPROMED®
- CLOXALAK®
- CM – PREMIX®
- COLAMOX 200®
- COLIBACT®
- COLIBACT® BOLUS
- COLIBACT® INJEKSI
- COLIBACT® SOLUTION
- C – SAN®
- DESTAN®
- DESTA – SAN®
- DESTASID®
- D – NOX®
- DRYCLOX®
- EGGOSTIM®
- ELECTRO – SAN®
- ELECTROVIT®
- ERIDOKSIN®
- FLUKICIDE® 12,5%
- FLUKICIDE® BOLUS
- FUMISID®
- GLUTADES®
- GLUTANOL®
- HEMADEX®
- INJECTAMIN®
- JECTAVIT B12® INJ
- KLOSAN® 200
- KLOSAN® BOLUS
- KLOSAN® KAPLET
- LARVAKILL® 10%
- LARVAKILL® 2%
- LEVA – PLUS PREMIX®
- LEVA – SAN® BL
- LMS 200®
- MASTILAK®
- MECTISAN®
- MYCOBACT®
- NEO – EGGOSTIM®
- OXY – SAN® 10%
- PIG – PREMIX®
- PINOCID®
- PIPERA – SAN®
- PRO – MIX® LAYER
- RENNIL®
- ROSAN® PREMIX
- ROXINE®
- ROXINE® 10% ORAL SOLUTION
- ROXINE® 25% ORAL SOLUTION
- ROXINE® INJEKSI
- ROXINE® KAPLET

- SAN – ALBEND®
- SANBE – MIX® A
- SANBE – MIX® B
- SANBE – MIX® C
- SANBE – MIX® D
- SANMIX®
- SANMIX – B®
- SANVIMIN®
- SEPTISAN®
- SPIRA – SAN PLUS
- STRESS – STOP®
- SULPIDON® INJEKSI
- TOPVIT®
- TYLO – SAN
- TYMPANOL – SB®
- VERM – O® BOLUS
- VERM – O® KAPLET
- VETADRYL® INJEKSI
- VET – OXY LA®
- VET – OXY SB®
- VIDONE®

SARANA VETERINARIA JAYA ABADI PT.

Jl. Gunung Sahari III No. 9B – Jakarta Pusat
Telp: 021 – 4258246, 5384176
Fax: 021 – 53152579

Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd

- INACTIVATED CORYZA VACCINE
- INFECTIOUS BRONCHITIS H120, LIVE VACCINE
- INFECTIOUS BRONCHITIS H52, LIVE VACCINE
- LARYNGOTRACHEITIS, LIVE VACCINE

Pantex - Holland

- GENTA 100 PANTEX INJECTABLE
- OXYTETRA 200 LA
- PANTRISUL INJECT
- TYLOCARE

Sarana Veterinaria Jaya Abadi

- PANMECTIN – 10
- TOLTRAPAN
- VETA CORYZEV
- VETA CYPROCIN
- VETA DINE
- VETA FLOXA
- VETA GUARD

- VETA MYCOLA
- VETA QUAT
- VETA RESPIREX
- VETA ZURIL
- VITAMIN AD3E PANTEX INJECTABLE

SATWA JAWA JAYA PT.

Komp. Rukan Taman Meruya Ilir Kembangan
Jakarta 11620. Telp: 021 – 5857078,
5857079, 585780; Fax: 021 – 5874649

Alpharma Animal Health (Shenzhou) Co. Ltd., China

- ALBAC
- ALBAC 10% P

Alpharma Inc, Belgium

- ALPHAMUNE G

Alpharma Inc. Henan, RRC

- CYGRO

Alpharma, Inc, USA

- AVATEC
- AVATEC 20%
- BIOCOX
- BMD
- DECCOX 6%

Bremer Pharma GmbH, Jerman

- AMOXINJECT LA
- MULTIVIT B COMP.
- SUPERCOC
- TAPINEX POWDER
- TRIMETHOSULF
- TYLOJECT 20%

Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore

- BAROX
- KEMZYME DRY
- MYCOCURB
- ORO GLO DRY

Laboratorio Avimex SA de Mexico

- BURSA – MEX
- CORI – MEX
- ENC – BI – EDS VACCINE
- ENC – EDS VACCINE
- LASOTA
- NEWCA – MEX

SEHAT CERAH INDONESIA PT.

Komplek Duta Mas Fatmawati, Blok A1
No. 30-32 Jl. RS. Fatmawati No. 39 Jakarta
Selatan Telp:021-7228383; Fax: 021-7237778

AB Vista, UK

- ECONASE XT 25
- QUANTUM 2500 TR

EWABO CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG, Germany

- ALDEKOL DES FF
- MENTOFIN

Genera, Inc., Croatia

- BRONHIKAL SPF
- GUMBOKAL SPF
- PESTIKAL
- PESTIKAL + EDS + IB

Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain

- AVIMILK
- LIPTOBAC – L
- LIPTODRY
- LIPTOSAFE-L

Neofarma, S.R.L, Italy

- NEOVIT E 20% + SE

Norel SA, Spain

- ANILOX P – 10
- ANILOX P – 20
- FUNGINAT FP – 51
- GUSTOR BP 70

Zamira Life Sciences Pty. Ltd., Australia

- ZAMBAC ZN 150

SHS INTERNATIONAL PT.

Maspion Plaza Lantai II Jl. Gunung Sahari
Raya Kav. 18 Jakarta – 14420
Telp: 021 – 64701200; Fax: 021 – 64700968
Email: contact@shs.co.id
AAKO BV, Belanda

- AE
- ANTIPAR 500
- BROMOQUAD 50

- BRONCHIN
- CHOLERIN TRIPLE
- CORYZA
- COXABIC
- EDS + NDV
- EDS + NDV + IB
- GUMBIN MB
- GUMBORO MB
- IB H – 52
- IB H-120
- IBD + NDV + IB
- ILT
- INFECTIOUS BRONCHITIS H – 52
- LASOTA
- LASOTA + H – 120
- MAREK DISEASE VACCINE (STRAIN CVI-988)
- ND VACCINE LASOTA
- NECTIN
- POWL POX
- QUINABIC 14% INJECTABLE SOLUTION
- QUINABIC 7% INJECTABLE SOLUTION
- QUINABIC WSP
- VH
- VH + H – 120

Anitox Corporation, USA

- BLUE ROYALE
- BLUE ROYALE FUNGICIDE
- FUNGEX
- MAXI – MIL HP
- MAXI – MIL S
- MONOPROP
- PUNCH
- PUNCH LIQUID MOLD INHIBITOR
- SORB – IT
- TERMIN 8 LIQUID
- TERMIN 8 POWDER

Antec International – DuPont Company, Inggris

- DSC 1000
- FARM FLUID S
- HYPEROX
- LONGLIFE 250 S
- OO – CIDE
- VIRKON S

Bedson, Argentina

- FOSBAC

Bio – Tek Industries Inc, USA

- TEK – TROL

Cheil Bio Co. Ltd., Korea

- CHEIL BIO MYCOSTATIN 50 WS
- POWERMEC SOLUTION

Chemo Forma AG, Switzerland

- ASCOGEN
- VANNAGEN

Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore

- PX – X4DM
- PX – X5BM
- PX – X6CM
- PX – Y1AM
- PX – Y1ATM
- PX – Y1BM
- PX – Y1CM
- PX – Y20TM
- PX – Y2AM
- PX – Y2DM
- PX – Y3AM
- PX – Y3DM
- PX – Z5AM
- PX – Z88
- PX – Z9AM
- SP – V5
- SP FV – 1
- VB – 1093 T
- VB – 1099 SL
- VB BR – 0899/SL
- VL – 1093 T
- VS – 1093 T
- VSH – 7

China Bestar Laboratories Ltd., Taiwan

- BESTAQUAM
- IRON – G
- PROCHAL – CU
- PROCHAL – MNS
- PROCHAL – ZN

CID Lines NV., Belgia

- BIOGEL
- CID 2000
- DM CID
- KICKSTART
- VIROCID

Crown Pacific Biotechnology, Singapore

- NUTRIMIN PM 518 POULTRY MINERAL PREMIX
- NUTRIMIN SM 318 SWINE MINERAL PREMIX
- PHYLINK 5000
- VITALINK BV 218 BROILER VITAMIN PREMIX

- VITALINK LV118 LAYER VITAMIN PREMIX
- VITALINK LVM 102 LAYER STARTER PREMIX
- VITALINK LVM 202 LAYER PULLET PREMIX
- VITALINK LVM 302 LAYER PHASE I PREMIX
- VITALINK LVM 402 LAYER PHASE II PREMIX
- VITALINK LVM 702 LAYER PREMIX
- VITALINK PV5288 POULTRY VITAMIN PREMIX
- VITALINK SV 318 SWINE VITAMIN PREMIX
- VITALINK SVM 105 SWINE PRE – STARTER PREMIX
- VITALINK SVM 205 SWINE STARTER PREMIX
- VITALINK SVM 305 SWINE GROWER PREMIX
- VITALINK SVM 405 SWINE FINISHER PREMIX
- VITALINK SVM 505 SWINE GESTATION PREMIX
- VITALINK SVM 605 SWINE GESTATION PREMIX
- VITALINK SVM 705 SWINE PREMIX
- VITALINK VP 50180

Daichii Lab – Japan

- DAIMETON SODIUM

Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd., Jepang

- OXALDIN
- OXALDIN LIQUID
- DK SARSAPONIN 30

Diasham Resources Pte, Ltd., Singapore

- AVIPROB
- BREDOL
- DESOGERM – 3A
- DIACOXIN 5%
- DIACOXIN WS
- DIAMIX MINERAL PREMIX
- DIAMIX SUPER LAYER PREMIX
- ESP 8
- GQ PLUS
- NOPCOXYME II
- NOPSTRESS TF
- NOPSTRESS WITH ELECTROLYTES
- PROVYSOL
- TRIMIXIN 480 WS
- TRIMOXAL PIGLET SUSPENSION
- MICRO AID FEED GRADE

- MICRO AID LIQUID 10%
- DOXYCYCLINE 50% WSP
- DOXYSOL – C
- LEVAVERM 10%
- PHENOXYPEN WSP
- PIG – IRONJECT 20% + B12

Dopharma Int – Holland

- GENTAJECT 10%

Dopharma – Netherland

- AMOXYCILLIN WSP 15%
- ELANCOBAN 100 PREMIX
- ELANCOBAN 200 PREMIX
- MAXIBAN 72 PREMIX
- MAXUS 200
- MICOTIL
- MONTEBAN 45
- PULMOTIL AC
- TYLAN SOLUBLE

Elanco Animal Health, USA

- APRALAN SOLUBLE
- ELANCOBAN – 200
- MAXUS 100 PREMIX
- MICOTIL – 300 INJECTION
- OPTAFLEXX 100
- PAYLEAN PREMIX
- PULMOTIL PREMIX
- RUMENSIN 200 PREMIX
- SURMAX 100 PREMIX
- SURMAX – 200 PREMIX
- TYLAN 100 PREMIX
- TYLAN 40 PREMIX

Ewhapharmatek Corporation

- DOXY 10 WSP

Han Poong Industry Co. Ltd., Korea

- ENFLOX ORAL SOLUTION
- ORGANIC GREEN CULTURE
- PRAMISOLE
- SOLUBLE ORGANIC GREEN CULTURE

Huvepharma AD, Bulgaria

- HOSTAZYM C 250 MICROGRANULATE
- HOSTAZYM P 10000
- HOSTAZYM P 5000
- HOSTAZYM X 250 MICROGRANULATE
- PHARMASIN 10 PREMIX
- PHARMASIN 100% WS GRANULES
- PHARMASIN PULVIS

- TILMOVET 25%
- YUMAMYCIN 1%

Impextraco NV, Belgium

- ACIDAL ML
- ACIDAL NC
- ECOCELL
- ELITOX
- FEEDOX DRY
- MOLDSTOP ML
- MOLDSTOP MYCO PLUS
- MOLDSTOP SD PLUS
- NOVASIL PLUS
- SALSTOP SD
- TERMIN 8 LIQUID
- ZYMPEX 006
- ZYMPEX 008

Kela Laboratories NV., Belgium

- ALBENDAZOLE 25
- DRYCLOXA – KEL
- MULTIVIT – CH
- OXY – KEL 10%
- OXY – KEL 20 LA
- RIDAN

Korea Thumb Vet Co. Ltd., Korea

- SUPER VITAMINO
- AMPUCOCCIN - S

Laboratories Biove, USA

- BIOGREEN

Laboratorium Biove, Perancis

- ACTILIVER I
- AMIDURENE
- ANTIGALE
- BIAMINTHIC 5%
- BIAPRIM BUVABLE
- BIAVREM
- BIOGREEN
- BIOLYSE
- BIOPUR
- CORYMYCOL
- INOXYL ORAL SOLUTION

Licensi Kitasato Institute, Jepang

- CORYZA BIVALENT
- LIVE HOG CHOLERA VACCINE

Norbrook Laboratories Limited, Ireland

- PEN & STREP

Norbrook Laboratories Ltd, Belgium

- NOROTRYL

Norbrook Laboratorium, Inggris

- ALAMYCIN AEROSOL
- ALAMYCIN LA
- BOVACLOX DC
- CALCJECT 40 CM
- FLUNIXIN INJECTION
- LACTACLOX
- NOROMECTIN INJECTION

Norbrook Lab – UK

- BETAMOX – LA
- MULTIVIT INJ
- NOROPROST
- NOROTYL LA
- APENTENZYMA 66

Nutrifeed BV, Netherlands

- AVILAC C
- AVILAC E CONCENTRATED
- AVILAC HE

Pucheng Lifehome Biochemistry, China

- BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE 10%
- ZINC BACITRACIN PREMIX 15%

SDS Biotech – Singapore

- CTC SOLUBLE
- TRIMIXIN – 480 WATER SOLUBLE
- FORTICOAT – NL

SHS International

- ALL CIDE
- ALLCIDE
- AMPROL 20%
- BROMOQUAD 10
- COCCIVIT
- DAIMETON B INJEKSI 20%
- DILUENT STERIL
- IODOSEPT
- LEVASOL
- NORFLOX 33
- SURPIZIN

Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd, China

- CONC M 35
- FV 2 A
- MP – 10003A

SINAR HARAPAN UD

Jl. KH Wahid Hasyim No. 6 Lumang – Jawa Timur
Telp/fax: 0334 – 881639

UD Sinar Harapan

- ALBENPAN
- CIPROPAN
- VIT GEMUK (SAPI+KAMBING)
- VIT GEMUK (UNGGAS)

SISTAR INDONESIA PT.

Jl. Sukahaji Raya No. 69 – Bandung 40152
Telp: 022 – 2006674
Email: shenny_ris@yahoo.com

Komipharm International Co. Ltd

- MARBOSTAR 10%
- MULTICIDE
- PANKILL

SONGGOLANGIT

PERSADA PT.

Jl. Raya Kebagusan No. 63 Pasar Minggu – Jakarta Selatan
Telp: 021 – 78834091; Fax 021 – 78833768

Songgolangit Persada

- EM – PETERNAKAN

STARSIA ASIATAMA CV.

Mohamad Thamrin No. 27, Kel. Panunggan Utara, Kec. Cipondoh – Tangerang
Telp: 021-5574034. Fax: 021-9106343

Pantex, BV. Belanda

- PANTISOL
- PANTOMINOVIT

SUMBER HEWAN PT.

Ruko CBD/Bidex Blok C No.17 Jl. Pahlawan Seribu BSD City Kel. Lengkong, Kec. Serpong – Tangerang Selatan 15312
Telp/fax : 021 – 53152608
Jurox Pty Ltd., Australia

- PARAMECTIN RV POUR-ON FOR CATLE

SUMBER MULTIVITA PT.

Jl. Prof.Dr. Latumenten No.7 P-Q Belakang BDNI, Jembatan II – Jakarta 11330
Telp: 021-6307715, 6314868;
Fax: 021-6302293

Sumber Multivita

- ALBEN – 10
- ASCAREX
- BIOMAX – 12
- BROILER FORMULA
- CROMAX – 0,5%
- CROMAX – 10%
- DIACOX
- DIACOX – 0,5% PREMIX
- ENROSOL
- FEROSOL – E INJ
- GENTICOL – INJ
- VITRAVIT

SUNZEN INDONESIA PT.

Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu-PIK Blok E2 No.36 Jl. Pantai Indah Selatan RT.004/RW.03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan-Jakarta Utara 14470
Telp: 021-56982912 ; Fax: 021-56982913

Sunzen Biotech Berhad – Malaysia

- MAMIMUNE

SWADESI

CANDRASSENTOSA PT.

Jl. Ciledug Raya No. 100 AC Jakarta Selatan 12230. Telp: 021 – 7253304, 7253308
Fax: 021 – 7222994, 7233818

Biopharm, Republik Ceko

- LIVACOX – T
- LIVACOX Q

FATRO S.P.A, Italia

- AAGENT
- ADEVIT OS
- AMINOLIFE POULTRY WS
- AQUADEX B SOLUTION
- AQUADEX C FORTE II
- ATIQUE P.18

- BACOLAM
- BENCHLOR
- BICORMICINA LA
- BIOMAREK HVT
- BIOVAC B1
- BIO – VAC LASOTA
- BIOVAC LS – H120
- BIVAC II
- CLOXALENE DRY COW
- CORIVAC
- DENFUS SPRAY
- EDS OLVAC
- EDS VAC
- ENDOFER 20 INJECTABLE SOLUTION
- FATROPRIM LA
- FATROVIT POULTRY WS
- GUMB – VAC
- HG – GEL VAC
- HG – GEL VAC 3
- IB – OLVAC
- IBA VAC
- IBA VAC ST
- LARVAC
- METABOLASE
- MICOSPECTONE
- MULTIVITAMIN B COMPLEX
- NEOPRIDIMET
- OL – VAC
- OLVAC 1000
- OLVAC A + B
- OLVAC B + G
- OXTRA EFFERVESCENT PESSARIES
- OXTRA LA
- PAMIZOLE PS
- PM – OLVAC
- TOLEVIT 10
- TOLEVIT 10 PLUS SE
- TOLOXAN
- TOXIDREN
- VAIOL – VAC
- ZOOBETAMIN

Meriden, England

- BAMBER 20
- MULTICIDE 150
- OREGO – STIM LIQUID
- OREGO – STIM POWDER

TEKAD MANDIRI CITRA PT.

Taman Cibaduyut Indah Blok E No. 193
Bandung 40239 – Jawa Barat
Telp/fax : 022 – 5414881

Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands

- ALBENOL – 100 ORAL
- ALBENOL – 2500 BOLUS
- ALBENOL – 300 BOLUS
- AMPROLIN – 300 WS
- BIOMYCIN – M
- CASTRAN
- DEPOLAC
- DIMOXAN WS
- DOXY – 500 WS
- FLUCONIX – 250
- GENTA – 100
- GLUCORTIN – 20
- INTERFLOX – 100
- INTERFLOX ORAL
- INTERMECTIN
- INTERMECTIN SUPER
- INTERSPECTIN – L
- INTERTRIM – 500 ORAL
- INTERTRIM LA
- INTRAFER – 200 B12
- INTRAMOX – 150
- INTRAMOX – 150 LA
- INTRAMOX – 200 WS
- INTROVIT – B – COMPLEX
- INTROVIT – E – SELEN
- INTROVIT – E – SELEN WS
- INTROVIT 4 + WS
- INTROVIT AD3E WS
- INTROVIT ORAL
- LEVA – 200 ORAL
- LIMOXIN – 200 LA
- LIMOXIN – 25 SPRAY
- LIMOXIN – 50
- NORAN – 150
- NORAN – 200 ORAL
- NORAN – 200 WS
- OXYTOCIN – 10
- PENSTREP – 400
- PHENYLJECT
- TIAMULIN
- TRYPONIL
- VITOL – 140
- XYLA

Tekad Mandiri Citra

- ALBENDAZOLE[®] 16%
- BENZAKLIN[®]
- CIPROLON[®]
- COLISTAN[®]
- COTRIMAZINE[®]
- COTRIMOXAZOLE[®]
- DAVAINOL[®]
- ENROTEN[®]
- ERI – PLUS[®]
- INTERCIDE[®]
- KLORIN – GARD[®]
- LEUCOSTOP
- LEVANUM[®]
- PARAGIN
- PERMETHYL 5%
- SIRNASET[®]
- SPECTARAL – 25[®]
- SPECTARAL[®]
- TM – PERAZINE
- TM – VITA[®]
- VIT – ECO

**TIENYEN
INTERNATIONAL PT.**

Komp. Ruko Golden Boulevard Blok D
No.26 BSD-Tangerang. Telp: 021-51360770
Fax: 021 – 53160071

Mintai Perfume Chemicals Co, Ltd, China

- MINTAI FEED ANTIMOLD PROPIONIC ACID
TYPE (1)

**TIGAKA DISTRINDO
PERKASA PT.**

Jl. Tanah Abang II/37 – Jakarta 10160
Telp: 021-3508980, 3508981;
Fax: 021-3861847

Centralys Div. Protector, Perancis

- PROTECTOR MINERAL PREMIX I
- PROTECTOR MINERAL PREMIX II
- PROTECTOR MINERAL PREMIX III
- PROTECTOR VITAMIN PREMIX I
- PROTECTOR VITAMIN PREMIX II

**TIRTA NIAGA
SEJAHTERA PT.**

Jl. Palmerah Utara no 61B Slipi Jakarta Pusat
Telp: 021 – 5480688; Fax: 021 – 5322146

Linq Technology Corporation, Thailand

- ACIDTEC 401
- AOXTEC 101
- AOXTEC 111
- MOLDTEC 201
- MOLDTEC 202
- MOLTEC 211
- SALTEC 501
- SALTEC 511

TOTWO INDONESIA PT.

Menara Hijau Lt. 4 Jl. MT Haryono Kav.33
Jakarta Telp: 021 – 7985908, 7985909
Fax: 021 – 7985907

Vi-Cor., USA

- A – MAX
- BG – MAX
- KULACTIC

Belgagry SA., Belgia

- TWENTY 1 WP

**TRI DINAMIKA
NUSANTARA PT.**

Kawasan Marunda Center Blok A5 no. 9
Jl. Marunda Makmur, Desa Segara Makmur
Kec. Tarumajaya – Bekasi 17211 Telp. 021-
29088199/70984017; Fax. 021-2908817

Ceetal Laboratoires – Perancis

- ABREUVAL TABLET
- AGRIGERM 1510
- AGRIGERM 2000
- BIOCET DRY
- DERMASEPT IODE GEL

Dex Iberica S.A – Spanyol

- ACIDBAC
- MICOFUNG
- NUTRIAROMA MILKY – VANILLA
- TOXIDEX
- VITAMINOACIDOS

Mobedco-Vet – Jordania

- BETAMOXIN
- DEXAROIDE
- ENTROVET INJ
- FLUNIXVET INJ
- OXYTETRAVET 20% LA INJ
- OXYTETRAVET AEROSOL
- SPECTOVET INJ
- STREPCILLIN
- SULPHAPRIM INJ
- TECTIN INJ
- TYLORATE INJ
- VITAMIN AD3E

Nutrex – Belgia

- NUTRASE XYLA
- NUTRASE XYLA 500
- NUTRASE XYLA LIQUID

Olmix – Perancis

- MFEED
- MT. X+

Veiy Pharma GmbH – Jerman

- GONAVET VEYX
- MAPRELIN
- OXYTOCIN VET
- PGF VEYX
- PGF VEYX FORTE
- VEYXYL LA 20%

Woogene B&G – Korea Selatan

- CLEANUP – F
- FEROPAN 200 INJ
- FEROVITA
- METABOL INJ
- THE ONE

TROUW NUTRITION INDONESIA PT.

Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar Blok
A3-2, Cikarang Barat Bekasi 17845
Telp: 021-89983325; Fax: 021-89983326

Great Plains Processing, USA

- OPTIMIN ZINC 15%
- OPTIMIN COPPER 15%
- OPTIMIN IRON 15%
- OPTIMIN MANGANESE 15%
- OPTIMIN ZINC METHIONINE 20%

- OPTIMIN ZMC

Hendrix NV., Belgium

- PROFISH Ω POULTRY

Lallemand Inc, Canada

- OPTIMIN SEY 3000

Lallemand SAS, Estonia

- FIBOSEL

SELKO BV., The Netherlands

- FYLAX DRY SP
- FYLAX FORTE HC LIQUID
- FYLAX FORTE HC SP
- FYLAX LIQUID
- FYSAL FIT4
- FYSAL LIQUID
- FYSAL SP
- SELACID DRY
- SELACID GREEN GROWTH P LIQUID
- SELACID GREEN GROWTH P MP
- SELDOX HM DRY
- SELKO PH
- TOXO MX
- TOXO XL

The Amalgamated Sugar Company, USA

- TNI BETAIN

Trouw Nutrition Indonesia

- ADE SOLE
- FLS LIQUID
- MAXCARE
- MMAXCARE BEEF ECO
- MAXCARE BROILER
- MIXTROUVIT
- MIXTROUVIT BLEND EGG 552
- MIXTROUVIT MINERAL LAYER
- MIXTROUVIT VITAMIN LAYER
- NUTRI C
- OPTIMIN SE Y
- ORANGE
- PERFEXOL – H
- PERFEXOL – L
- POULTRY VITAMIN PREMIX
- PROGENOS
- SWINE MINERAL PREMIX
- SWINE VITAMIN PREMIX
- TN OX
- TNI BETAIN HC 70
- TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 430
- TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 528
- VITA SOLE
- VITLECT XP

UNIVETAMA DINAMIKAPT.

Jl. Balap Sepeda No. 61 GH Rawamangun –
Jakarta Timur 13220
Telp: 021 – 4754711; Fax: 021 – 4753202

Univetama Dinamika

- DIGESTON ANTHELMINTIC
- DINALON
- DINAPROL
- DINATRIM
- DINAZOL
- ENROVET
- FASTON BOLUS
- FLOXIVET
- KITAMOXIN POWDER
- VETMACOL FORTE

USFA CV.

Jl. Lebak Timur Indah 10 Surabaya
Telp: 031 – 7316908; Fax: 031 – 7324500

CV. USFA

- FORMALIN ACT
- MAMALIA MINERAL
- PIG MINERAL POWDER
- SORBITOL PLUS

VAKSINDO SATWA NUSANTARA PT.

Jl. Pembangunan II Cicadas Gunung Putri –
Bogor 16964 Telp: 021 – 8670414
Fax: 021 – 8672501, 86860791
Email: vaksindo@cbn.net.id

Vaksindo Satwa Nusantara

- CIPROVAKS
- CIPROVAKS
- HERBAGRO 311
- NEO RABIVAK TC
- PULLOGEN
- VAKSIMUNE AI
- VAKSIMUNE ANTHRAX
- VAKSIMUNE CLONE
- VAKSIMUNE CLONE IB
- VAKSIMUNE CORYZA
- VAKSIMUNE CORYZA L
- VAKSIMUNE CORYZA N

- VAKSIMUNE EDS
- VAKSIMUNE IB
- VAKSIMUNE IB INAKTIF
- VAKSIMUNE IBD D
- VAKSIMUNE IBD L
- VAKSIMUNE IBD M
- VAKSIMUNE ILT
- VAKSIMUNE K
- VAKSIMUNE ND AI
- VAKSIMUNE ND AIN2
- VAKSIMUNE ND CLONE
- VAKSIMUNE ND EDS
- VAKSIMUNE ND EDS IB
- VAKSIMUNE ND IB INAKTIF
- VAKSIMUNE ND IB PLUS
- VAKSIMUNE ND IBD INAKTIF
- VAKSIMUNE ND INAKTIF
- VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,1
- VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,3
- VAKSIMUNE ND L INAKTIF
- VAKSIMUNE NDB1
- VAKSIMUNE NDB1 IB
- VAKSIMUNE NDHV
- VAKSIMUNE NDHV IB
- VAKSIMUNE NDLS
- VAKSIMUNE NDLS IB
- VAKSIMUNE POX
- VAKSIMUNE SE
- VITAKUR

VETINDO CITRAPERSADA PT.

Jl. Otto Iskandardinata Rt. 003/011 Ruko
Prima Blok A11 Kel. Ciputat, Kec. Ciputat
Tangerang Selatan 15411 Telp: 021-
74714080, 74714076; Fax: 021 – 74714109

Bimeda Veterinary Pharmaceuticals, Irelandia

- AMINOVITAL SOLUTION
- ECOFLEECE

Guangdong Dahuanong Animal Health Products Co.,Ltd, China

- AVIAN INFLUENZA VACCINE,
INACTIVATED (H5 SUBTYPE, N28 STRAIN)

Malta Vaccines, Malta

- MAVAX FOWL POX
- MAVAX LA SOTA
- MAVAX ND
- MAVAX ND + EDS + IB

Optivite International, Inggris

- GENEX POULTRY
- OPTIMISE
- OPTIZYME
- ZETOX
- TAV VETERINARIA SL, SPANYOL
- TAVET ENROFLOXACINE 10%
- TAVET GST
- TAVET OXITETRACYCLINA
- TAVET SULFA X3

Venkateshwara Hatcheries Pvt. Ltd India

- NEWCASTLE DISEASE VACCINE, LIVING, BP (VET) (B1 STRAIN)
- NEWCASTLE DISEASE VACCINE, LIVING, BP (VET) (LASOTA STRAIN)

Vetindo Citrapersada

- AMPIVET 24
- CIPROVET
- L.E ~ 435
- MEGAVIT POULTRY
- MICROMINERAL POULTRY
- MYCOVET PLUS
- POLYVIT STRESS
- SUPERVETACLEAN
- VETAMIX
- VETCOX
- VETIODINE
- VETMIX AQUAVIT
- VETMIX POULTRY HIGH CONCENTRATES
- VETMIX POULTRY PLUS

VIETINDO JAYA PT.

Kawasan Niaga Sentra Menteng Blok MN
76, Sektor 7 Bintaro – Tangerang 15224
Telp: 021 – 74863906, 71693058
Fax: 021 – 74863910

Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam

- BIO – ATP PLUS
- BIO – CALCIMAX
- BIO – DEWORMER
- BIO – DEXA
- BIO – OXYTOCIN
- BIO – SELEVIT E
- BIO – SELEVIT E FEED ADDITIVE
- BIO – TETRA 200 LA
- BIO – TETRA SPRAY
- BIO – TYLO 200
- BIO – VITAMIN AD3E
- BIOSEPT
- BIVERMECTIN 1%

WARIS PT.

Jl. H. Ten No. 41 Rawamangun – Jakarta Timur
13220 Telp: 021 – 4898301, 4898305
Fax: 021 – 4759661, 4759662

Industrial Kern, Spain

- REDOX T

WONDERINDO PHARMATAMA PT.

Wonder Graha Jl. Tebet Barat IX No. 27
Jakarta Selatan Telp: 021-8302079, 8297666
Fax: 021 – 8302080

Wonderindo Pharmatama

- ANTI COLD
- AQUADESTILLATA
- B – COMPLEX
- CLEANATOR
- COCCILIN CAPSUL
- COCCILIN WATER SOLUBLE POWDER
- CORYVIT WATER SOLUBLE POWDER
- CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G
- DEXATOZON INJEKSI
- EPIDELIN INJEKSI
- IRON – E INJEKSI
- LACTAGEN INJEKSI
- LIDOCAIN
- LIVER EXTRACT INJEKSI
- NATRII CHLORIDUM 0,9%
- NEO BLUE
- OVALUMON INJEKSI
- OXYLIN INJEKSI
- OXYTOCIN INJEKSI
- PANTO VITAMIN
- PENSTREP 4 0,5
- PIPEDON BOLUS
- PIPEDON-X LIQUID
- POTAHORMON INJEKSI
- STREPTOMYCIN INJEKSI
- SULFA STRONG INJEKSI
- SULFANILAMIDE SALEP
- TESTOHORMON INJEKSI
- TETRAMISON INJEKSI
- TETRAMISON TABLET
- TRIPLE WORMER BOLUS
- TYLOON
- VITAMIN B COMPLEX-S INJEKSI
- VITAMIN B12 INJEKSI
- VITAMIN B6 INJEKSI
- VITAMIX INJEKSI
- WONDER AMOXYLIN

- WONDER IODINE SPRAY
- WONDER IVERMEC INJEKSI
- WONDER POULTRY EGG FORMULA
- WONDER QUINOLIN
- WONDER TRIMETHOPRIM
- WONDER VITAMIN B1 INJEKSI
- WONDER VITAMYCIN POWDER
- WONDER ZEOLIT

YUNGSHIN PHARMACEUTICAL INDONESIA PT.

Komplek Tekstil Blok C.6/17, Mangga Dua
Raya Ancol Pademangan – Jakarta Utara
14430. Telp: 021-5676126;
Fax: 021- 5676126;
Email: ysp.id@yspsah.com

Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia

- AMOXICILLIN 50% SOLUBLE POWDER
- ASEPTIC SOLUTION LIQUID
- CONQUER POWDER
- COSCAT – 666 WATER SOLUBLE POWDER
- ENFLOSIN ORAL SOLUTION
- RICAN PREMIX POWDER
- SULTRIM SUSPENSION
- YUCOMY – 20 – POWDER

YUPHARIN PHARMACEUTICALS PT.

Jl. Raya Bogor Km 51,5 Kedung Halang
Bogor – Jawa Barat Telp: 021 – 7228601,
652140. Fax: 021 – 7251165, 652160

Yupharin Pharmaceuticals

- NOFLI LOTION
- NOFLI SHAMPOO

ZAGRO INDONESIA PT.

Jl. Daan Mogot 3 Blok G/6 Kel. Jelambar –
Jakarta Barat Telp: 021 – 5669841
Fax: 021 – 5601738
Email: zindo@zagro.com

Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore

- AMILYTE
- AMOXY – 50
- ANASOL
- ANAVITE POULTRY LAYER VITAMINS
- ANAVITE POULTRY BREEDER MINERALS
- ANAVITE POULTRY BREEDER VITAMINS
- ANAVITE POULTRY CHICK/BROILER MINERALS
- ANAVITE POULTRY CHICK/BROILER VITAMINS
- ANAVITE POULTRY LAYER MINERALS
- BIOTIN 2% FEED GRADE
- COLIZAG 100
- HALTOX
- IOGUARD – 300
- POULTRY MINERAL 2000
- POULTRY VITAMIN 21270
- SUTRIMIX PLUS
- ULTRAXIDE
- ZADOXYL
- ZAGRIBIND
- ZAGRO AD3EK
- ZAGROMIN 369
- ZAGROMIX 368
- ZAGROSOL AD3E
- ZAGROSOL B-COMPLEX
- ZAGROSOL ES
- ZAGROVIT
- ZAGROVIT E – 50
- ZAGROVIT ES

PERHATIAN

Update data-data produk obat hewan teregistrasi berdasarkan
SK Kementerian Pertanian yang dikeluarkan sampai dengan 30 JUNI 2013.
Data-data produk obat hewan yang dikeluarkan setelah tanggal tersebut akan dimasukan pada
buku IOHI edisi selanjutnya.

DAFTAR *WITHDRAWAL TIME*

NO.	NAMA ZAT BERKASAT	JENIS HEWAN	WAKTU HENTI OBAT		
			DAGING	TELUR	SUSU
1.	Albendazol	Sapi	10 Hari	-	-
		Kerbau	10 Hari	-	-
	Kambing	10 Hari	-	-	-
		Domba	10 Hari	-	-
2.	Amoksisilina	Ayam	5 Hari	-	-
		Sapi	10 Hari	-	5 Hari
		Babi	5 Hari	-	-
3.	Ampisilina	Sapi	28 Hari	-	4 Hari
		Babi	28 Hari	-	-
4.	Amprolium	Ayam	10 Hari	-	-
5.	Avilamisina	Semua Hewan	-	-	-
6.	Bambermisina	Ayam	-	-	-
7.	Benzatin Benzil Penisilina	Sapi	30 Hari	-	-
		Kerbau	30 Hari	-	-
		Kuda	30 Hari	-	-
		Babi	30 Hari	-	-
8.	Cantaxanthin	Ayam	-	-	-
9.	Cenamicina (CNV)- 8807	Ayam	12 Hari	-	-
10.	Deksametason	Hewan Produksi	7 Hari	-	-
11.	Diaveridin	Ayam	5 Hari	-	-
12.	Dimertikon	Sapi	-	-	-
		Kerbau	-	-	-
		Domba	-	-	-
		Kambing	-	-	-
13.	Dimetridazol	Sapi	-	-	-
14.	Doksisiklina	Ayam	5 Hari	-	-
15.	Enrofloksasina	Ayam	5 Hari	-	-
		Sapi	5 Hari	-	-
		Babi	5 Hari	-	-
16.	Eritromisina	Ayam	5 Hari	-	-
17.	Fenbendazol	Sapi	5 Hari	-	-
		Kerbau	5 Hari	-	-
18.	Flavomisina	Ayam	-	-	-
		Babi	-	-	-

NO.	NAMA ZAT BERKASIASAT	JENIS HEWAN	WAKTU HENTI OBAT		
			DAGING	TELUR	SUSU
19.	Flumequin	Semua Hewan	5 Hari	5 Hari	5 Hari
20.	Gentamisina	Ayam	7 Hari	-	-
		Sapi	45 Hari	-	3 Hari
		Kambing	45 Hari	-	-
		Babi	45 Hari	-	-
21.	Ivermektin	Sapi	21 Hari	-	-
		Kambing	21 Hari	-	-
		Babi	21 Hari	-	-
22.	Josamisina	Ayam	5 Hari	5 Hari	-
23.	Khlorisulon	Sapi	28 Hari	-	-
24.	Kitasamisina	Ayam	5 Hari	5 Hari	-
25.	Klindamisina	Ayam	4 Hari	-	-
26.	Kloksasilina	Sapi	3 Hari	-	3 Hari
27.	Klortetrasiklina	Ayam	2 Hari	-	-
28.	Kolistin	Sapi	22 Hari	-	72 Hari
		Babi	14 Hari	-	-
		Ayam	5 Hari	-	-
29.	Lincomisina	Ayam	-	-	-
		Babi	6 Hari	-	-
30.	Neomisina	Hewan Produksi	10 Hari	-	-
31.	Neostigmin	Sapi	-	-	-
		Kuda	-	-	-
		Domba	-	-	-
		Kambing	-	-	-
		Babi	-	-	-
		Ayam	-	-	-
		Bebek	-	-	-
		Kalkun	-	-	-
		Angsa	-	-	-
		Anjing	-	-	-
		Kucing	-	-	-
32.	Nistatin	Ayam	5 Hari	5 Hari	-
33.	Oksitetrasiklina	Ayam	28 Hari	28 Hari	-
		Sapi	28 Hari	-	28 Hari
		Kerbau	28 Hari	-	-
		Kuda	28 Hari	-	-
		Babi	28 Hari	-	-
		Domba	28 Hari	-	-

NO.	NAMA ZAT BERKASAT	JENIS HEWAN	WAKTU HENTI OBAT		
			DAGING	TELUR	SUSU
		Anjing	28 Hari	-	-
		Kucing	28 Hari	-	-
34.	Oxyquine	Semua Hewan			
35.	Penicilline G Potasium	Sapi	3 Hari	-	2 Hari
36.	Pilokarpin	Hewan Besar	1 Hari	-	1 Hari
37.	Piperazine	Unggas	5 Hari	-	-
		Sapi	28 Hari	-	-
38.	Pirimetamin	Ayam	7 Hari	14 Hari	-
39.	Prokain Penisilina	Sapi	7 Hari	-	-
		Kuda	7 Hari	-	-
		Babi	7 Hari	-	-
		Anjing	7 Hari	-	-
		Kucing	7 Hari	-	-
40.	Sipermektin	Hewan Piaraan	10 Hari	10 Hari	10 Hari
41.	Spektinomisina	Ayam	7 Hari	-	-
42.	Streptomycine	Ayam	30 Hari	-	-
		Sapi	30 Hari	-	-
		Kuda	30 Hari	-	-
		Domba	30 Hari	-	-
		Babi	30 Hari	-	-
43.	Sulfadiazin	Ayam	5 Hari	-	-
		Hewan Produksi	14 Hari	-	-
		Sapi	10 Hari	-	-
		Domba	10 Hari	-	-
		Kambing	10 Hari	-	-
		Babi	10 Hari	-	-
44.	Sulfadimidine	Ayam	10 Hari	-	-
45.	Sulfadoxine	Sapi	-	-	2 Hari
		Babi	-	-	5 Hari
		Kuda	-	-	5 Hari
		Anjing	-	-	-
46.	Sulfakloropiridazine	Babi	4 Hari	-	-
		Ayam	1 Hari	-	-
47.	Sulfamonometoksin	Sapi	10 Hari	-	-
		Kerbau	10 Hari	-	-
		Kuda	10 Hari	-	-
		Kambing	10 Hari	-	-
		Domba	10 Hari	-	-

NO.	NAMA ZAT BERKASIAAT	JENIS HEWAN	WAKTU HENTI OBAT		
			DAGING	TELUR	SUSU
		Babi	10 Hari	-	-
		Anjing	10 Hari	-	-
		Kucing	10 Hari	-	-
48.	Sulfaquinoxalin	Hewan Produksi	10 Hari	-	-
49.	Sulfasomidin	Hewan Produksi	10 Hari	-	-
50.	Sulfatiazol	Semua Hewan	14 Hari	-	-
51.	Sulpirin	Semua Hewan	14 Hari	-	-
52.	Tetramisole	Sapi	2 Hari	-	-
		Kambing	2 Hari	-	-
		Domba	2 Hari	-	-
		Babi	2 Hari	-	-
53.	Tiamulin	Ayam	5 Hari	-	-
		Babi	5 Hari	-	-
54.	Tilmicosin		3 Hari	3 Hari	3 Hari
55.	Tilosina	Hewan Produksi	14 Hari	-	-
56.	Trichlorophone		7 Hari	7 Hari	7 Hari
57.	Trimetropim	Hewan Produksi	14 Hari	-	-
		Babi	5 Hari	-	-
58.	Virginiamisina	Ayam	-	-	-
59.	Zinc Basitrasina		-	-	-

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP KEMENTRIAN PERTANIAN YANG BERKAITAN DENGAN OBAT HEWAN

1. **Balai Besar Pengujian Mutu dan Setifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)**
Gunung Sindur Bogor 16340
Telp: (021) 7560466, 7560489 Fax: (021) 7560466
2. **Balai Besar Penelitian Veteriner (BBalitvet)**
Jl. RE Martadinata 32 Bogor
Telp: 0251-350083, 331048
3. **Balai Pengujian dan Penyidikan Veteriner Regional I Medan**
Jl.Binjai Km 7, Medan 20127
Telp. (061) 852253
4. **Balai Pengujian dan Penyidikan Veteriner Regional II
Bukittinggi Sumatera Barat**
Komplek Pertanian Jl.Landbow Kotak Pos 35
Bukit Tinggi Sumatera Barat
Telp. (0752) 28300, 21802 Fax. (0752) 28290
5. **Balai Pengujian dan Penyidikan Veteriner Regional III
Tanjung Karang Lampung**
Jl.Untung Suropati No. 2 Kotak Pos 11 Labuhan Ratu, Kedaton
Bandar Lampung 35001
Telp. (0721) 701851
6. **Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta**
Jl.Raya Yogya-Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates
Yogyakarta 55602
Telp. (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
7. **Balai Pengujian dan Penyidikan Veteriner Regional V
Banjar Baru Kalimantan Selatan**
Jl. RO. Ulin Laktabat Kotak Pos 416 Banjarbaru
Telp. (0511) 92249 Fax. (0511) 93249
8. **Balai Pengujian dan Penyidikan Veteriner Regional VI Denpasar**
Jl. Raya Sesetan/Pegok Kotak Pos 416 Denpasar 80223
Telp. (0361) 720862 Fax. (0361) 720415
9. **Balai Besar Veteriner Maros**
Jl. Jend. Sudirman No. 14 Kotak Pos 198, Ujung Pandang
Telp. (0411) 371105, 313015 Fax.(0411) 371105
10. **Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma)**
Jl.Jend. A. Yani No. 68-70 Surabaya 60231
Telp. (031) 8291124-26 Fax. (031) 8291183

11. Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan
Jalan Pemuda No. 29 A Kota Bogor
Telp / Fax : (0251) 8353712
email : admin@bpmpp.org
[http/www : bpmpp.org](http://www.bpmpp.org)
12. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang
Kampung Werasari RT. 33, RW. 11, Kel. Dangdeur, Kec. Subang
Kabupaten Subang – Jawa Barat
Telp: (0260) 7423178

DAFTAR FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN DI INDONESIA

- 1. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala**
Jln Teuku Nya'k Arief Darussalam
Banda Aceh- NAD 23111
Tlp: 0651 - 7552517, 7551538, 7553205
Fax: 0651 - 54208, 7554229
www.unsyiah.ac.id
- 2. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor**
Jl. Agatis, Kampus IPB Darmaga, Bogor.
Telp/fax: 0251 – 8629459
www.fkh.ipb.ac.id
- 3. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada**
Kampus UGM, Jl.Fauna 2 Karangmalang
Yogyakarta Telp: 0274 – 560861, 560862
Fax: 0274 – 560861 www.fkh.ugm.ac.id
- 4. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga**
Kampus C, Unair
Mulyorejo - Surabaya 60155
Tlp: 031-5992785, Fax: 031-5993015
<http://susiakad.fkh.unair.ac.id/>
- 5. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana**
Kampus UNUD, Jl. P. B. Sudirman –
Denpasar, Bali
Telp: 0361 – 223791 Fax: 0361 – 701808
<http://www.fkh.unud.ac.id/>
- 6. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Tenggara Barat**
Kampus FKH-
Universitas Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Nusa Tenggara Barat 83125
Telp:0370-633007; Fax: 0370-636041
www.unram.ac.id
- 7. Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya**
Telp: 0341-551611; Fax: 0341-565420
www.pkh.ub.ac.id
- 8. Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma**
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54,
Surabaya 60225 – Jawa Timur
Telp: 031 – 5677577, 5689738
Fax: 031 – 5679791
<http://fkhuwks.wordpress.com/>
- 9. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana**
Jl. Adi Sucipto, Penfui – Kupang
PO. BOX 104 Kupang 85001,
Nusa Tenggara Timur
Telp: 0380 – 881580
www.undana.ac.id
- 10. Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Makassar – Sulawesi Selatan 90245
Telp : 0411 – 584200, 586200
Fax : 0411 – 585188
www.unhas.ac.id

DAFTAR DINAS PETERNAKAN DI INDONESIA

1. Dinas Peternakan Prov. NAD

Jl. Iskandar Muda No.3
Kotak Pos 87, Banda Aceh
Tlp : 0651-44338, 44340
Fax : 0651-44340, 44354

2. Dinas Peternakan

Prov. Sumatera Utara

Jl. Jend. Gatot Subroto,
Binjai Km.7 No 225
Medan 20127
Tlp : 061-851844, 861436, 8451844
Fax : 061-8461436

3. Dinas Peternakan

Prov. Sumatera Barat

Jl. Rasuna Said No.68
Kotak Pos 105, Padang 25129
Tlp : 0751-28060, 28077,39377
Fax : 0751-28060

4. Dinas Peternakan Prov. Jambi

Jl. Kap A Bakarudin No. 188
Jambi 36126
Tlp : 0741-63417, 64585
Fax : 0741-64585

5. Dinas Peternakan Prov.Riau

Jl. Patimura No. 2
Kode Pos 28131
Tlp : 0761-44341, 44343
Fax : 0761-44342

6. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Bengkulu

Jl. Musium No. 18 Padang Harapan
Bengkulu 38224
Tlp : 0736-21394
Fax : 0736-21431

7. Dinas Pertanian

Prov. Sumatera Selatan

Jl.Kapten P.Tendean No. 1058 PO.BOX.
1138 Palembang 30129
Tlp : 0711-353122, 373667
Fax : 0711-313444

8. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung

Jl. Hj Zainal Abidin Pagar Alam
No. 52
Bandar Lampung 35124
Tlp : 0721-701055, 702189
Fax : 0721-772894

9. Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Banten

Jl. Raya Cilegon Km.4, Drangong
Serang, Banten
Tlp : 0254-211450, 220165
Fax : 0254-220165

10. Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta

Jl.Gunung Sahari Raya 11
Jakarta Pusat
Tlp : 021-6007251,6284935,
Sentral 6007252,6007244
Fax : 021-6241617, 6284935

11. Dinas Peternakan

Prov. Jawa Barat

Jl. Ir. H. Djuanda 358 Dago-Bandung
Tlp : 022-2514740, 2511740, 2513842
Fax : 022-2514740, 2501151

12. Dinas Peternakan

Prov. Jawa Tengah

Jl. Jend. Gatot SubrotoTarubudaya-Ung-
aran Kt.Pos 143 Kode Pos 50581
Tlp : 024-6921023, 6221397
Fax : 024-6921397

13. Dinas Pertanian

Prov. DI Yogyakarta

Jl. Gondosuli No.2 Yogyakarta

Tlp : 0274-511001, 586516

Fax : 0274-563937, 511001

14. Dinas Peternakan

Prov. Jawa Timur

Jl. Jend.A.Yani 202 Surabaya 29131

Tlp : 031-8291853, 8292545

Fax : 031-829153

15. Dinas Peternakan Prov. Bali

Jl. Angsoka No. 12 Denpasar 80233

Tlp : 0361-225368, 224184

Fax : 0361-225368

16. Dinas Peternakan dan Kehewan

Prov. Kalimantan Barat

Jl. Adi Sucipto No.48

Pontianak 78124 Kalbar

Tlp : 0561-732436, 746058

Fax : 0561-736144

17. Dinas Kehewan

Prov. Kalimantan Tengah

Jl. Willem AS No. 2 Palangka Raya

Tlp : 0536-3221293, 21293

Fax : 0536-3227613, 27613

18. Dinas Peternakan

Prov. Kalimantan Selatan

Jl.Jend. Sudirman No.3

Banjar Baru 70711

Tlp : 0511-4772044, 772044

Fax : 0511-4772844, 772844

19. Dinas Peternakan

Prov. Kalimantan Timur

Jl. Bhayangkara No.7

Samarinda 75121 Kt. Pos 53

Tlp.0541-743921,741642,

Fax 0541-736228

20. Dinas Pertanian

Prov. Sulawesi Utara

Komplek Pertanian Kallasey

Kotak Pos 1461 Manado 95114

Tlp : 0431-838643

Fax : 0431-838643

21. Dinas Pertanian Perkebunan & Peternakan Prov. Sulawesi Tengah

Jl.R.A Kartini No. 80 Palu 94125

Tlp : 0451-421460, 452580

Fax : 0451-454562

22. Dinas Pertanian

Prov. Sulawesi Tenggara

Jl. Balai Kota No. 6

Kendari 93111

Tlp : 0401-321365

Fax : 0401-323413, 328198

23. Dinas Peternakan

Prov. Sulawesi Selatan

Jl. Bajiminasa No.12

Makasar 90126

Tlp : 0411-873770, 855954

Fax : 0411-871556, 873770

24. Dinas Pertanian, Peternakan Kelautan dan Perikanan

Prov. Sulawesi Barat

Jl. Martadinata No. 31 Mamuju 91512

Tlp : 0426-22680, 21414

25. Dinas Peternakan Prov. N T B

Jl. Udayana No.5 Po Box 1016,

Mataram 83125

Tlp : 0370-621862, 35213

Fax : 0370-622658

26. Dinas Peternakan Prov. N T T

Jl. Veteran Kupang Kt.Pos 140

Tlp : 0380-825250,831821

Fax : 0380-833060, 825249

27. Dinas Pertanian Prov. Maluku

Jl. WR. Supratman,
Tanah Tinggi Ambon
Tlp : 0911-3412091
Fax : 0911-314178

**28. Dinas Pertanian dan Ketahanan
Panagan Prov. Maluku Utara**

Jl. Tabahawa Baru No.7
Tlp : 0921 - 23984, 326488,24086
Fax : 0921 - 23984

**29. Dinas Pertanian dan Kehutanan
Prov. Bangka Belitung**

Jl.Mentok No.205
Pangkal pinang Bangka 33134
Tlp : 0717-439065, 439492

**30. Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Prov. Gorontalo**

Jl. KH. Agus Salim No. 249
Tlp : 0435-825427
Fax : 0435-830871

31. Dinas Peternakan Prov.Papua

Jl. Raya Abepura,Gd.B Lt. II-III
Kantor Dinas Otonomi Pemda Tk.I Irja
FIM Kotapraja, Jaya pura
Tlp : 0967-585730, 343520
Fax : 0967-583091, 312669

**32. Dinas Pertanian Kehutanan dan
Pertanian Prov. Irian Jaya Barat**

Jl. Drs. Esau Sesa No. 40
Tlp :0986-211719, 213182
Fax : 0986-213124

**33. Dinas Pertanian, Ketahanan dan
Peternakan Prov. Kepulauan Riau**

Jl. DI Panjaitan KM IX Komplek Bintang
Center Blok E No.7-10 Tanjung Pinang
Tlp. 0771-311911;
Fax. 0771-311933

Indeks

- Obat Hewan Berdasarkan Kelompok Hewan
- Produk Biologik
- Nama Generik

INDEX OBAT HEWAN BERDASARKAN KELOMPOK HEWAN

Hewan Kesayangan

1.	ACIDAL ML.....	Impextraco NV, Belgia/SHS International
2.	ACTIGEN.....	Alltech Ich-USA; Alltech do Brasil-Brazil/Alltec Biotechnology Indonesia
3.	ADVANTIX.....	KVP Pharma+Veterinar produkte GmbH, Jerman/Bayer Indonesia
4.	ADVOCATE.....	KVP Pharma+Veterinar produkte GmbH, Jerman dikemas ulang oleh Olic (Thai) Ltd/Bayer Indonesia
5.	AMOXINJECT LA.....	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
6.	AMPHOPRIM INJECTION.....	Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia
7.	AMPIVETBRITIN.....	Duta Kaisar Pharmacy
8.	ANTI COLD.....	Wonderindo Pharmatama
9.	ANTI PICK.....	Medion Farma Jaya
10.	ANTIGALE.....	Laboratories Biove, Perancis/SHS International
11.	AQUA DESTILATA STERIL.....	Medion Farma Jaya
12.	AQUADESTILLATA.....	Wonderindo Pharmatama
13.	AQUAVET.....	Duta Kaisar Pharmacy
14.	AVIBLUE.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/Lohmann Animal Health Indonesia
15.	AVIPRO DILUDROP.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/Lohmann Animal Health Indonesia
16.	AVITONIC – WSP.....	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
17.	AVITRYL – 10 INJECTION.....	AVICO/Maju Farma Indonesia
18.	AVITRYL ORAL SOLUTION.....	AVICO/Maju Farma Indonesia
19.	B – COM.....	Aves
20.	B – COMPLEX.....	Wonderindo Pharmatama
21.	B – PLEX INJ.....	Pyridam Veteriner
22.	B – SANPLEX.....	Sanbe Farma
23.	BAYTICOL 60 EC.....	KVP Pharma+Veteriner GmbH, Jerman dikemas ulang oleh Bayer Thai Co, Ltd Thailand/Bayer Indonesia
24.	BAYTRIL 5 %.....	Bayer Korea. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia
25.	BAYTRIL FLAVOUR.....	KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH, Jerman dikemas ulang oleh OLIC (Thai) Limited, Thailand/Bayer Indonesia
26.	BAYTRIL FLAVOUR 150.....	KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH, Jerman dikemas ulang oleh OLIC (Thai) Limited, Thailand/Bayer Indonesia
27.	BENVET GR – 300.....	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
28.	BENZAKLIN.....	Tekad Mandiri Citra
29.	BERNOMEK.....	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada

30.	BERNOVIT	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
31.	BETAMINT	Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
32.	BETAMOXIN	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
33.	BIAVREM	Laboratories Biove, Perancis/SHS International
34.	BICORMICINA LA	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
35.	BIO – ATP PLUS	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
36.	BIO – CALCIMAX	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya /Dinamika Mandiri Sejati Primatama
37.	BIO – DEXA.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya /Dinamika Mandiri Sejati Primatama
38.	BIO – OXYTOCIN	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
39.	BIO – STRONG	Sanbe Farma
40.	BIO – TETRA SPRAY	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
41.	BIO – TYLO 200	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
42.	BIO – VITAMIN AD3E.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
43.	BIOCAN DHPPI.....	Bioveta, AS-Czech Republic/ Megan Galus Kinantan
44.	BIOCAN M INJ.....	Biovet AS, Czech Republic/Megan Gallus Kinantan
45.	BIOCAN R INJ.....	Bioveta, Czech Republic/Megan Gallus Kinantan
46.	BIODEXAMINE	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
47.	BIODIN.....	Romindo Primavetcom
48.	BIOGREEN	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
49.	BIOGREEN	Laboratories Biove, USA/SHS International
50.	BIOMIN C – Ex.....	Biomin/Romindo Primavetcom
51.	BIOMIN IMBO.....	Biomin/Romindo Primavetcom
52.	BIOMINOVIT	Agrinusa Jaya Santosa
53.	BIOSAN – TP INJ.....	Sanbe Farma
54.	BIOSOLAMINE.....	Merial/Romindo Primavetcom
55.	BIOSOLAVET	Duta Kaisar Pharmacy
56.	BIOSTRESS.....	Vaksindo Satwa Nusantara
57.	BIOTOCIN.....	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
58.	BISEPTYL.....	SYVA Laboratorios, Spain/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
59.	BRO – GESAT	Sanbe Farma
60.	BUPHOSOLAMIN	Pyridam Veteriner
61.	BUTAPHOS – B INJECTION.....	Samyang Anipharm C Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
62.	CALCIDEX PLUS.....	Sanbe Farma
63.	CALGOPHOS.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
64.	CANEX MEDIUM	Pfizer Inc., Venezuela SA., Venezuela/Pfizer
65.	CANIFFA.....	Merial/Romindo Primavetcom
66.	CANIGEN DHA 2 P/L.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
67.	CANISHOT RV – F	ChoongAng Vaccines Labs. Korea/Mitravet

68.	CAPRI – ALBEND	Caprifarmindo Labs.
69.	CAPRI B – PLEX INJ	Caprifarmindo Labs.
70.	CAPRIRAZIN	Caprifarmindo Labs.
71.	CAPRITOCIN Inj.	Caprifarmindo Labs.
72.	CAPRIVIT B12 Inj.	Caprifarmindo Labs.
73.	CAPRIVIT Inj.	Caprifarmindo Labs.
74.	CASTRAN	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
75.	CENTRA – TYLO INJECTION 20%	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
76.	CERTIFECT L SPOT ON	Merial/Romindo Primavetcom
77.	CERTIFECT M SPOT ON	Merial/Romindo Primavetcom
78.	CERTIFECT S SPOT ON	Merial/Romindo Primavetcom
79.	CERTIFECT XL SPOT ON	Merial/Romindo Primavetcom
80.	CEVAMUNE	Ceva Animal Health Indonesia/ Ceva Sante Animale, Perancis
81.	CHEIL TONOCOMP	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
82.	CHORULON	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
83.	CIL	Medion Farma Jaya
84.	CLAVAMOX DROPS	Glaxo Smith Kline, USA & Aurubindo, India/ Pfizer Indonesia
85.	CLAVET 250 TABLET	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
86.	CLAVET 50 TABLET	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
87.	COFAVIT 500	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
88.	CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G	Wonderindo Pharmatama
89.	DEFENSOR 3	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
90.	DERMAVET CREAM	Cipla Ltd, India/Paeco Agung
91.	DEXADRESON	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
92.	DEXAROIDE	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
93.	DHPPL – VAC	ChoongAng Vaccines Labs. Korea/Mitravet
94.	DILUENT STERIL	SHS International
95.	DIMEDRYL	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
96.	DORIS SKIN CARE POWDER	Kalbe Farma Tbk
97.	DOVENIX	Merial/Romindo Primavetcom
98.	DRONTAL CAT	KVP Pharma+Veterinar produkte GmbH, Jerman dikemas ulang oleh OLIC (Thailand) Limited untuk Bayer Thai Co, 0Ltd/Bayer Indonesia
99.	DRONTAL PLUS FLAVOUR	KVP Pharma+Veterinar produkte GmbH, Jerman dikemas ulang oleh OLIC (Thailand) Limited Thailand untuk Bayer Thai., Co., Ltd, Thailand/ Bayer Indonesia
100.	DUPHAFRAL E – SELENIUM	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
101.	DUPHAFRAL MULTI	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
102.	DUPHALYTE	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
103.	DUPHAPEN LA	Norbrook Laboratories Ltd., Irlandia, UK/ Pfizer Indonesia
104.	DUPHAPEN STREP BP	Fort Dodge Animal Health, Spain/Pfizer Indonesia

105. DUPHASPASMIN.....	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/PT. Pfizer Indonesia
106. DURAMUNE DA2L	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
107. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
108. DURAMUNE MAX 5/4L.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
109. DURAMUNE MAX PV	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
110. ENDURAN	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
111. ENTROVET INJ.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
112. EURICAN DHPPi – 2 L.....	Merial/Romindo Primavetcom
113. EURICAN DHPPi – 2 LR	Merial/Romindo Primavetcom
114. EURICAN DHPPi – 2.....	Merial/Romindo Primavetcom
115. EXCENEL STERILE POWDER.....	Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia
116. FEL – O – GUARD PLUS 3.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
117. FELLINIFFA.....	Merial/Romindo Primavetcom
118. FELOCELL 3.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
119. FELOCELL 4.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
120. FEROVITA	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
121. FERROVET	Duta Kaisar Pharmacy
122. FERTAGYL	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
123. FLOGISTAN.....	Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada
124. FOLLIGON.....	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
125. FRONTLINE PLUS FOR CATS	Merial/Romindo Primavetcom
126. FRONTLINE PLUS FOR DOGS	Merial/Romindo Primavetcom
127. FRONTLINE SPOT ON.....	Merial/Romindo Primavetcom
128. FRONTLINE SPRAY	Merial/Romindo Primavetcom
129. GENTADOX.....	AVICO/Maju Farma Indonesia
130. GENTADOX.....	AVICO/Maju Farma Indonesia
131. GENTAMOX.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
132. GENTAVET 50	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
133. GLUCORTIN – 20.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
134. HEARTGARD PLUS CHEWABLE	MSD-Merial/RomindoPrimavetcom
135. HEKSAPLEX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
136. HEMATODIN	Romindo Primavetcom
137. HEMATOPAN B12.....	Merial/Romindo Primavetcom
138. HEPARENOL	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
139. HEXADOG	Merial/Romindo Primavetcom
140. HIPRAMOX	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
141. IMAVEROL	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Hutama
142. INDIGEST INJECTABLE.....	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinanatan
143. INJECTAMIN.....	Sanbe Farma
144. INJEKSI VITAMIN B KOMPLEKS	Medion Farma Jaya
145. INJEKSI VITAMIN B12	Medion Farma Jaya
146. INTERFLOX – 100	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra

147. INTERMECTIN.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
148. INTERSPECTIN – L	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
149. INTRAHER – 200 B12	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
150. INTRAMOX – 150 LA.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
151. INTRAMOX – 150	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
152. INTROVIT – B – COMPLEX	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, Holland/ Tekad Mandiri Citra
153. INTROVIT – E – SELEN.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
154. IVOMEC INJECTION	Merilal Saude Animal, Ltda, Brasil/Paeco Agung
155. JECTAVIT B12 INJ	Sanbe Farma
156. KALOXY – VET	Kalbe Farma Tbk
157. KALVIDOG.....	Kalbe Farma Tbk
158. KANA SOLUTION	Thai PD Chemical Co Ltd, Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
159. KANAMEX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
160. KANIVET.....	Duta Kaisar Pharmacy
161. KETAMIL.....	Troy Laboratories Pty, Ltd, Australia/ Harapan Maju Indah
162. KETAMINE 10 % INJ	Kepro B.V., Holland, Belanda/ Otasindo Prima Satwa
163. KILTIX.....	KVP Pharma+Veterinar produkte GmbH, Jerman dikemas ulang oleh Bayer Thai, Co., Ltd, Thailand/ Bayer Indonesia
164. KITAMOXIN POWDER.....	Univetama Dinamika
165. KLOSAN 200	Sanbe Farma
166. KOLAMOX LA INJECTION.....	Nutec, Inggis/Indovetraco Makmur Abadi
167. LACTAGEN INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
168. LINCO SPECTIN STERILE	Pfizer Suzhou Animal Health, China/ Pfizer Indonesia
169. LIVER EXTRACT INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
170. MARUKI SERBUK.....	Degepharm
171. MECTISAN	Sanbe Farma
172. MEDILAN	Pyridam Veteriner
173. MEDOXY L.....	Medion Farma Jaya
174. METABOL INJ.....	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
175. METABOLASE.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
176. MOLD – ZAP LIQUID.....	Alltech Inc., USA; Alltech China/ Alltech Biotechnology Indonesia
177. MONTANIDE ISA 50V2.....	Seppic, Perancis/Megasetia Agung Kimia
178. MONTANIDE ISA 70 VG.....	Seppic, Perancis/Megasetia Agung Kimia
179. MULTIVIT – CH	Kela Laboratories NV., Belgia/SHS International

180. MULTIVIT B COMP	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
181. MULTIVITAMIN B COMPLEX.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
182. NATRII CHLORIDUM 0,9%	Wonderindo Pharmatama
183. NEO RABIVAK TC.....	Vaksindo Satwa Nusantara
184. NEOPROFEN INJECTION.....	Pfizer Animal Health India Ltd., India/ Pfizer Indonesia
185. NEOVIT E 20% + Se.....	Neofarma, S.R.L, Italy/Sehat Cerah Indonesia
186. NETRABIL	Medion Farma Jaya
187. NOBILIS DILUENT CA	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
188. NOBILIS DILUENT FD	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
189. NOBIVAC DH	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
190. NOBIVAC DHP	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
191. NOBIVAC DHPPI.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
192. NOBIVAC PARVO – C	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
193. NOBIVAC PUPPY DP.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
194. NOBIVAC RABIES	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
195. NOBIVAC RL.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
196. NOBIVAC TRICAT	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
197. NOFLI LOTION.....	Yupharin Pharmaceuticals
198. NOFLI SHAMPOO	Yupharin Pharmaceuticals
199. NOALDON	Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada
200. NUTRIPLUS GEL.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
201. OESTRADIOL BENZOAT.....	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
202. OVALUMON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
203. OXY – SAN 10%.....	Sanbe Farma
204. OXYTOCIN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
205. OXYTOCIN VET	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara
206. OXYTOCINA PITUITARIA	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
207. PANTO VITAMIN.....	Wonderindo Pharmatama
208. PARVIGEN	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
209. PEN – HISTA STREP.....	Vetoquinol SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
210. PENERGETIC – T.....	Penergetic International AG., Switzerland/ Behn Meyer Chemicals
211. PENTADOG	Merial/Romindo Primavetcom
212. PIRIMYCIN.....	Pyridam Veteriner
213. PIRIPEN Inj.....	Pyridam Veteriner
214. PNEUMODOG	Merial/Romindo Primavetcom
215. POTAHORMON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama

216. POWERCILLIN INJECTION	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
217. PREVENTIC.....	Virbac Animal Health Inc., Perancis/ Emvi Indonesia
218. PRIMA AMINOACID PLUS 2002 ..	MJPF Farma Indonesia
219. PRIMA VITA PLUS	MJPF Farma Indonesia
220. PRIMODOG	Merial/Romindo Primavetcom
221. PRO – CELL.....	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
222. PROHEART SR – 12 INJECTION ..	Fort Dodge Australia Pty, Ltd.,Australia/ Pfizer Indonesia
223. PROMERIS DUO SPOT ON	Fort Dodge Animal Health, Catania, Italy/ Pfizer Indonesia
224. PROMOTOR L.....	Laboratorios Calier, S.A.–Spain/ Megan Galus Kinantan
225. PROTEK – ALL PLUS	Dawes Laboratories, USA/Lito Prima Mandiri
226. PUREVAX	Merial/Romindo Primavetcom
227. PYRIKOL – DROPS.....	Pyridam Veteriner
228. PYRONIL – 300 KAPLET	Pyridam Veteriner
229. RABIGEN MONO.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
230. RABISIN.....	Merial/Romindo Primavetcom
231. RABIVET SUPRA'92.....	Pusat Veterinaria Farma
232. RABVAC 3 TF	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
233. RABVAC 3	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
234. REMACYCLINE LA	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
235. REVOLUTION 12%.....	Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia
236. REVOLUTION 6%.....	Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia
237. REX VITAL.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
238. RIMADYL	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
239. ROBORANTE CALIER.....	Laboratorios S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan
240. ROXACIN INJ.....	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
241. ROXINE INJEKSI.....	Sanbe Farma
242. ROXINE KAPLET	Sanbe Farma
243. SAMYANG TYLOSIN – 200	Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
244. SEBOLYTIC	Virba SA., Perancis/Emvi Indonesia
245. SETON 2%	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
246. SING A SONG	Medion Farma Jaya
247. SPECTOVET INJ	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
248. SPIRADIN – 20	Romindo Primavetcom
249. STERILE DILUENT	Ceva Animal Health Indonesia/ Ceva Sante Animale, Perancis
250. STOP WORM (BLUE TABLETS) ..	Vetafarm, Australia/Harapan Maju Indah
251. STOP WORM (PINK TABLETS)....	Vetafarm, Australia/Harapan Maju Indah
252. STREPCILLIN.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

253. STREPTOMISINA SULFATE.....	Katraco Santika
254. STREPTOMYCIN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
255. STREPTOMYCIN Serbuk Injeksi ...	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
256. STREPTOVET	Duta Kaisar Pharmacy
257. SUANOVIL	Romindo Primavetcom
258. SULFA STRONG INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
259. SULFANILAMIDE SALEP	Wonderindo Pharmatama
260. SULPHAPRIM INJ.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
261. SULPIDON INJEKSI	Sanbe Farma
262. SUROLAN.....	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
263. SY IVERMECTIN INJECTION.....	Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
264. TAVET GST	Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada
265. TERROXYVET	Duta Kaisar Pharmacy
266. TESTOHORMON INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
267. TETRAVET AEROSOL	Bayer, New Zealand/Lito Bina Medikantara
268. TONOPHOSPHAN COMPOSITION	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
269. TOPCEF.....	QILU Animal Health/Biotek Indonesia
270. TRIMETHOSULF	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
271. TRIPLE WORMER BOLUS	Wonderindo Pharmatama
272. TRYPMIDIUM.....	Merial/Romindo Primavetcom
273. TRYPONIL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
274. TYLOPRIM	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
275. TYLOSIVET.....	Duta Kaisar Pharmacy
276. VANGUARD PLUS 5 L4 CV.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
277. VANGUARD PLUS 5/CV – L.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
278. VANGUARD PLUS 5/L.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
279. VANGUARD PLUS CPV.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
280. VANGUARD PLUS CPV/CV	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
281. VET – CHOICE	Duta Kaisar Pharmacy
282. VET – OXY SB.....	Sanbe Farma
283. VET – PENSTREP 4: ½	Duta Kaisar Pharmacy
284. VET – PENSTREP 4:1	Duta Kaisar Pharmacy
285. VET B – 1	Duta Kaisar Pharmacy
286. VET B – 12	Duta Kaisar Pharmacy
287. VET B – PLEKS	Duta Kaisar Pharmacy
288. VET STREP.....	Medion Farma Jaya
289. VETADRYL INJEKSI	Sanbe Farma
290. VETERDRYL	Duta Kaisar Pharmacy
291. VETQIUN.....	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
292. VI – SORBITS	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
293. VIAMIN – 34 INJECTION	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
294. VIGANTOL E.....	Bayer Korea, Ltd, Korea/Bayer Indonesia
295. VIGOSINE.....	Ceva Sante Animale/Ceva Animal Health Indonesia

296. VIRBAMEC LA	Virbac Lab, Brazil untuk Virbac SA., Perancis/ Emvi Indonesia
297. VIT – ECO	Tekad Mandiri Citra
298. VITA PLEX B	Medion Farma Jaya
299. VITA PLEX DROPS	Medion Farma Jaya
300. VITA STRESS – B	Medion Farma Jaya
301. VITAMIN AD3E PANTEX	Pantex-Holland/ Sarana Veterinaria Jaya Abadi
302. VITAMIN B COMPLEX-S INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
303. VITAMIN B12 INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
304. VITAMIN B6 INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
305. VITAMINOACIDOS	Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
306. VITAMIX INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
307. VITARAL	Biotek Indonesia
308. VITARAL PLUS	Biotek Indonesia
309. VITOL – 140	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
310. WONDER IODINE SPRAY	Wonderindo Pharmatama
311. WONDER VITAMIN B1 INJEKSI .	Wonderindo Pharmatama
312. WORMECTIN INJEKSI	Medion Farma Jaya
313. XTRA VITAN	Agro Makmur Sentosa
314. XYLA	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
315. ZIPYRAN PLUS	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
316. ZOLETIL – 50	Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia

Hewan Air

1. ANER C	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/ Fenanza Putera
2. AQUAVAC STREPSa	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
3. AQUAVACIRIDOV	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
4. ATIQUEINE P.18	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
5. AZOMITE	Peak Minerals-Azomite Inc., USA/ Behn Meyer Chemicals
6. BAMBERCIN – 20	Zhejiang University Sunny Nutrition Tech Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
7. BAMBERCIN – 40	Jiangsu Sel Biochem Co, Ltd., China/ Behn Meyer Chemicals
8. BAMBERCIN – 80	Zhejiang University Sunny Nutrition Tech Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
9. BANOXTM E	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia

10.	BETAINE HYDROCHLORIDE	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/ Fenanza Putera
11.	BG – MAX.....	Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia
12.	BIO – MOS	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/Alltech Biotechnology Indonesia
13.	CAROPHYLL RED	DSM Nutritional Products France, Perancis/ DSM Nutritional Product Indonesia
14.	CAROPHYLL YELLOW	DSM Nutritional Products France, Perancis/ DSM Nutritional Product Indonesia
15.	CJ PROSIN	Cheil Jedang Indonesia
16.	CJ PROTIDE.....	Cheil Jedang Indonesia
17.	DE – ODORASE	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
18.	ENDO – POWER BETA.....	Easy Bio System, Inc./Blue Sky Biotech
19.	FERMACTO	Pet Ag Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
20.	HALOR C	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/ Fenanza Putera
21.	KILCOX EXTRA	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
22.	MT. X+.....	Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara
23.	NEGUVON.....	Bayer Thai Co. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia
24.	NORVAX STREPSi	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
25.	NUPRO	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
26.	NUTRIMIN FM518 FISH	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
27.	PERMASOL 500 GRANULE	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
28.	QUAT 50	Kilco International, Scotland/ Farmadika Sejahtera Indonesia
29.	QUIXALUD.....	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Hutama
30.	ROVIMIX AQUA VIT PREMIX	Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
31.	ROVIMIX C – EC	DSM Nutritional Products UK, Inggris/ DSM Nutritional Product Indonesia
32.	ROVIMIX NIACIN	DSM Nutritional Products AG, Swiss/ DSM Nutritional Product Indonesia
33.	ROVIMIX STAY C	DSM Nutritional Products France, Perancis/ DSM Nutritional Product Indonesia
34.	SEL – PLEX 2000.....	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
35.	SEL – PLEX 2700.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
36.	SEL – PLEX 3000.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
37.	SEL – PLEX.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
38.	SORBATOX.....	Kiotechagil, United Kingdom/ Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia

39. SUNNY BINDER Zhejiang University Sunny Nutrition Technology Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
40. ULTRA – PEL Uniscope Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
41. VANNAGEN Chemo Forma AG, Switzerland/SHS International
42. VETMIX AQUAVIT Vetindo Citrapersada
43. VITALINK VP 50180 Crown Pacific Biotechnology, Singapore/SHS International

Ternak

1. A – MAX CONCENTRATE Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia
2. AAGENT ATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
3. AB 20 Prince Agri Products, Amerika Serikat/Novindo Agritech Utama
4. ABREUVAL TABLET Ceetal Laboratories – Perancis/Tri Dinamika Nusantara
5. ACID – PAK 4 – WAY LIQUID
HARD WATER FORMULA Alltech Inc-USA; Alltech Biotechnology Corp.
Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia
6. ACID – PAK 4 – WAY 2X WATER
SOLUBLE Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
7. ACID LAC DRY Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Satwa Jawa Jaya
8. ACID LAC DRY Kemin Asia/Indovetraco Makmur Abadi
9. ACID LAC LIQUID Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/
Satwa Jawa Jaya
10. ACID LAC LIQUID Kemin Asia/Indovetraco Makmur Abadi
11. ACIDAL ML Impextraco NV, Belgia/SHS International
12. ACIDAL NC Impextraco, Belgia/SHS International
13. ACIDBAC Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
14. ACIDTEC 401 Linq Technology Corporation, Thailand/
Tirta Niaga Sejahtera
15. ACLOMAST Industrial Veterinaria, SA/Agro Makmur Sentosa
16. ACTICOLI 2 MUI/ML Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
17. ACTIGEN Alltech Ich-USA; Alltech do Brasil-Brazil/
Alltech Biotechnology Indonesia
18. ACTILIVER I Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
19. ACTISAF SC47 LFA Lesaffre, Perancis/Indovetraco Makmur Abadi
20. ACTIVATE DA Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
21. AD3E INJECTION Medion Farma Jaya
22. ADE SOLE Trouw Nutrition Indonesia
23. ADEMIN LIQUID AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
24. ADEVIT OS FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
25. ADVANTAGE 256 Preserve International, Amerika Serikat/
Agrinusa Jaya Santosa
26. AGRI – QUAT Agro Makmur Sentosa
27. AGRICARIVIT Agrinusa Jaya Santosa
28. AGRICID Agrinusa Jaya Santosa

29.	AGRIGERM 1510	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
30.	AGRIGERM 2000	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
31.	AGRIMINOVIT.....	Agrinusa Jaya Santosa
32.	AGRITOP.....	Romindo Primavetcom
33.	AGRIWORM BOLUS.....	Biotek Indonesia
34.	AGRIWORM LIQUID	Biotek Indonesia
35.	AGRIWORM.....	Biotek Indonesia
36.	AGROMALAC.....	Nutrifeed, Netherlands/Behn Meyer Chemicals
37.	ALAMYCIN AEROSOL.....	Norbrook Laboratorium, Inggris/SHS International
38.	ALAMYCIN LA.....	Norbrook Laboratorium, Inggris/SHS International
39.	ALBAC 10% P.....	Alpharma Animal Health (Shenzhou) Co. Ltd., China/Satwa Jawa Jaya
40.	ALBAC	Alpharma Animal Health (Shenzhou) Co.Ltd., China/Satwa Jawa Jaya
41.	ALBEN – 10	Sumber Multivita
42.	ALBEN 10% ORAL SUSPENSION	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
43.	ALBENDAZOL 10% GANADEXIL	Industrial Veterinaria SA, - Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
44.	ALBENDAZOLE 16%.....	Tekad Mandiri Citra
45.	ALBENDAZOLE 25	Kela Laboratories, Belgia/SHS International
46.	ALBENDAZOLE 900 MG.....	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
47.	ALBENDAZOLE AVICO	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
48.	ALBENMAS – 18%	Mensana Aneka Satwa
49.	ALBENMAS.....	Mensana Aneka Satwa
50.	ALBENOL – 100 ORAL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
51.	ALBENOL – 2500 BOLUS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
52.	ALBENOL – 300 BOLUS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
53.	ALBENPAN.....	Sinar Harapan, UD
54.	ALBENTACK – 900.....	Biotek Indonesia
55.	ALBIPEN LA.....	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
56.	ALDEKOL DES FF	EWABO CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG, Germany/Sehat CeraH Indonesia
57.	ALLCIDE.....	SHS International
58.	ALL-LAC 100 X.....	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
59.	ALLPLEX LS	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
60.	ALLPLEX S.....	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
61.	ALLPLEX W	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
62.	ALLZYME PS.....	Alltech China/Alltech Biotechnology Indonesia
63.	ALLZYME PT CONCENTRATE WS	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
64.	ALLZYME SSF E	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
65.	ALLZYME SSFTM LIQUID 500 ML	Alltech Inc-USA; Alltech Biotechnology Corp. Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia

66.	ALLZYME SSFTM LIQUID	Alltech Inc-USA; Alltech Biotechnology Corp. Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia
67.	ALLZYME SSFTM.....	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
68.	ALLZYME VEGPRO	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
	CONCENTRATE	
69.	ALLZYME VEGPRO LIQUIDTM..	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
70.	ALLZYME VEGPROTM.....	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
71.	ALPHAMUNE G.....	Alpharma Inc, Belgia/Satwa Jawa Jaya
72.	ALZODIN.....	Romindo Primavetcom
73.	AMCO CHICKS	Hendy Pharmindo Satwa
74.	AMCOL	Meiji Indonesia Pharmaceutical
75.	AMERIA	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
76.	AMINOVITAL SOLUTION.....	Bimeda Chemicals Export, Irelandia/ Vetindo Citrapersada
77.	AMINOVITAMIN	Vetoquinol S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
78.	AMIVAKSICOL	Agrinusa Jaya Santosa
79.	AMIVIT – E.....	Mitravet
80.	AMMOTROL	Medion Farma Jaya
81.	AMOXCOL.....	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
82.	AMOXCYL.....	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia Novindo Agritech Hutama
83.	AMOXICILLIN 50% SOLUBLE POWDER	Y.S.P.Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
84.	AMOXICOL	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
85.	AMOXINJECT LA.....	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
86.	AMOXY – 50	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
87.	AMOXYCILLIN WSP 15%	Dopharma-Netherland/SHS International
88.	AMPHIMIX	Kalbe Farma Tbk
89.	AMPHOPRIM INJECTION	Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia
90.	AMPIVAKSICOL.....	Agrinusa Jaya Santosa
91.	AMPIVET 24	Vetindo Citrapersada
92.	AMPIVETBRITIN.....	Duta Kaisar Pharmacy
93.	AMPIXIL	Romindo Primavetcom
94.	AMPROLIN – 300 WS.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
95.	AMPROSOL 20.....	Romindo Primavetcom
96.	ANASOL.....	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
97.	ANCOMYCIN 200 LA.....	ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara
98.	ANER C.....	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/ Fenanza Putera
99.	ANILOX P – 10	Norel SA, Spain/Sehat Cera Indonesia
100.	ANILOX P – 20	Norel SA, Spain/Sehat Cera Indonesia
101.	ANILOX P 10	Norel & Nature, Spanyol/Sehat Cera Indonesia
102.	ANIZOLE 100	ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara
103.	ANTHELMIN ORAL.....	S.P.Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh

104. ANTHRASET.....	Pusat Veterinaria Farma
105. ANTHRAX SPORE VACCINE	Colorado Serum Company, USA/Paeco Agung
106. ANTI COLD	Wonderindo Pharmatama
107. ANTI PICK	Medion Farma Jaya
108. ANTIBLOAT	Pyridam Veteriner
109. ANTIGERMEN FORTE.....	IQF SA, Argentina/Biotek Sarana Industri
110. ANTIPAR 500.....	AAKO BV, Belanda/SHS International
111. ANTISEP	Medion Farma Jaya
112. AOXTEC 101	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
113. AOXTEC 111.....	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
114. APENTENZYMA 66.....	Norel SA, Spanyol/SHS International
115. AQUA DESTILATA STERIL.....	Medion Farma Jaya
116. AQUADESTILLATA.....	Wonderindo Pharmatama
117. AQUADEX B SOLUTION	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
118. AQUADEX C FORTE II	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
119. AQUAPRIME 4/20 INJECTION	Univet-Irlandia/Romindo Primavetcom
120. AQUAVET.....	Duta Kaisar Pharmacy
121. AROMEX	Delacon Austria/Hannachemie Sugindra
122. ARSOMIX	Romindo Primavetcom
123. ASABEN.....	Avian Satwa Anugrah
124. ASADINE	Avian Satwa Anugrah
125. ASCAREX.....	Sumber Multivita
126. ASCARIN	Pyridam Veteriner
127. ASEPTIC SOLUTION LIQUID.....	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
128. AVAILA 4.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
129. AVAILA Cr 1000.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
130. AVAILA Cu 100	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
131. AVAILA Fe 100.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
132. AVAILA Mn 80	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
133. AVAILA Se 1000.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
134. AVAILA SOW FEET FIRST	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
135. AVAILA STARTER 123	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
136. AVAILA Z/M	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
137. AVAILA ZN 120	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
138. AVANTE INJECTION.....	KNBP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
139. AVIBLUE.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
140. AVICOC.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
141. AVICYCLINE 20% L.A INJECTION	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
142. AVIDEGG	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
143. AVILAC E CONCENTRATED	Nutrifed BV, Netherlands/SHS International
144. AVILITE	Avindo Perdana Bahtera Mulia
145. AVIMEC INJECTION	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
146. AVIMEC LIQUID.....	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
147. AVIODINE.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia

148. AVIPRO DILUDROP	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
149. AVISOLE	Avindo Perdana Bahtera Mulia
150. AVISTRESS	Romindo Primavetcom
151. AVIT	Aves
152. AVITONIC – WSP	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
153. AVITRYL – 10 INJECTION	AVICO/Maju Farma Indonesia
154. AVITRYL ORAL SOLUTION	AVICO/Maju Farma Indonesia
155. AVIXIN	AVICO/Maju Farma Indonesia
156. AVIZYME 1502	Finnfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
157. AVIZYME 1505	Finfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd., Finlandia/Megasetia Agung Kimia
158. AZOMITE	Peak Minerals-Azomite Inc., USA/ Behn Meyer Chemicals
159. B – COM	Aves
160. B – COMPLEX	Wonderindo Pharmatama
161. B – PLEX INJ	Pyridam Veteriner
162. B – SANPLEX	Sanbe Farma
163. BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE 10%	Pucheng Lifechome Biochemistry, China/ SHS International
164. BACOLAM	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
165. BACTOCELL	Lallemand SAS France/ Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
166. BAMBER 20	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
167. BAMBERCIN – 20	Zhejiang University Sunny Nutrition Tech Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
168. BAMBERCIN – 40	Jiangsu Sel Biochem Co, Ltd., China/ Behn Meyer Chemicals
169. BAMBERCIN – 80	Zhejiang University Sunny Nutrition Tech Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
170. BANOXTM E	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
171. BAROX	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
172. BAYCOX 5%	OLIC (Thailand) Limited Thailand, Untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia
173. BAYMEC	Bayer Korea, Ltd/Bayer Indonesia
174. BAYTRIL 10 %	Bayer Korea Ltd., /Bayer Indonesia
175. BAYTRIL 5 %	Bayer Korea. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia
176. BEDGEN 40 PREMIX	Bedson S.A. Argentina/Pakan Serasi
177. BENCHLOR	Fatro S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
178. BENVET 10% W/V	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
179. BENVET GR – 2500	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
180. BENVET GR – 300	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
181. BENZADES	Sanbe Farma
182. BENZAKLIN	Tekad Mandiri Citra
183. BENZALKONIUM CHLORIDE 10%	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.

184. BENZALVAKS	Agrinusa Jaya Santosa
185. BENZALVET – 10.....	Mitravet
186. BENZOGARD.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
187. BERGAFAT	Berg & Schmidt/Romindo Primavetcom
188. BERGAPRIME.....	Berg & Schmidt/Romindo Primavetcom
189. BERNOMECE	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
190. BERNOVIT	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
191. BESTAQUAM.....	China Bestar Laboratotium Ltd, Taiwan/ SHS International
192. BESTLYTES.....	China Bestar Laboratories, Taiwan/ Ekasapta Wijayatangguh
193. BETAINE HYDROCHLORIDE	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/ Fenanza Putera
194. BETAMINT	Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
195. BETAMOXIN	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
196. BG – MAX.....	Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia
197. BICORMICINA LA	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
198. BIO – ATP PLUS	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
199. BIO – CALCIMAX	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
200. BIO – CHICKS	Sanbe Farma
201. BIO – CHROME 5000.....	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
202. BIO – CHROME.....	Alltech Inc-USA/Alltech Biotechnology Indonesia
203. BIO – DEWORMER	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama
204. BIO – DEXA.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
205. BIO – MOS	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
206. BIO – OX.....	Biotek Indonesia
207. BIO – SELEVIT E.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
208. BIO – STRONG	Sanbe Farma
209. BIO – TETRA 200 LA.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama
210. BIO – TETRA SPRAY.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama
211. BIO – TYLO 200	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama
212. BIO – VITAMIN AD3E.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
213. BIO ADD SOLID.....	Kemira ChemSolution b.v., The Netherlands/ Behn Meyer Chemicals
214. BIO DINE	Biotek Indonesia
215. BIO NEO.....	Biotek Indonesia
216. BIO QUAT 20	Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa

217. BIOCET DRY	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
218. BIOCID 30	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
219. BIOCOLD	Biotek Indonesia
220. BIODAN PLUS	Agrinusa Jaya Santosa
221. BIODAN	Vaksindo Satwa Nusantara
222. BIODES – 100	Mensana Aneka Satwa
223. BIODES FORTE	Mensana Aneka Satwa
224. BIODEXAMINE	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
225. BIODIN	Romindo Primavetcom
226. BIOFOS	Mosaic, USA/Pakan Serasi
227. BIOGEL	CID Lines NV., Belgia/SHS International
228. BIOGREEN	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
229. BIOGREEN	Laboratories Biove, USA/SHS International
230. BIOLYS	Evonik Industries AG, Germany/Evonik Indonesia
231. BIOLYSE	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
232. BIOMAX – 12	Sumber Multivita
233. BIOMIN C – Ex	Biomin/Romindo Primavetcom
234. BIOMIN CLEANFEED	Biomin Holding, GmbH. Austria/Biomin Indonesia
235. BIOMIN CLEANGRAIN FORTE LIQUID	Romindo Primavetcom
236. BIOMIN CLEANGRAIN	Biomin, Austria/Romindo Primavetcom
237. BIOMIN IMBO	Biomin/Romindo Primavetcom
238. BIOMINOVIT	Agrinusa Jaya Santosa
239. BIOMYCIN – M	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
240. BIOMYTOX PLUS	Biotek Indonesia
241. BIOPHENE	Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa
242. BIOPLEX C	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
243. BIOPLEX COPPER	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
244. BIOPLEX HIGH FIVE	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
245. BIOPLEX IRON	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
246. BIOPLEX MANGANESE	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
247. BIOPLEX MQP	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
248. BIOPLEX ZINC	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
249. BIOPLEX®YC	Evonik Indonesia
250. BIOPUR	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
251. BIOSAN – TP INJ	Sanbe Farma
252. BIOSEPT	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
253. BIOSOLAMINE	Merial/Romindo Primavetcom
254. BIOSOLAVET	Duta Kaisar Pharmacy
255. BIOSTRESS	Vaksindo Satwa Nusantara
256. BIOTIN 2% FEED GRADE	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
257. BIOTOCIN	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
258. BIOTOX	Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade

259. BIOTRONIC SE	Biomim/Romindo Primavetcom
260. BIOTRONIC SE FORTE LIQUID...	Biomim/Romindo Primavetcom
261. BIOVIT	Sanbe Farma
262. BISEPTYL.....	SYVA Laboratorios, Spain/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
263. BIVERMECTIN 1%.....	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama
264. BLOATAX	Medion Jaya Farma
265. BLOOM & GROW	Tithearn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
266. BLUE ROYALE FUNGICIDE.....	Anitox Corp-USA/SHS International
267. BLUE ROYALE	Anitox Corp-USA/SHS International
268. BMD SOLUBLE.....	Alpharma, Inc, USA/Satwa Jawa Jaya
269. BOMECTIN POUR ON	Bayer, New Zealand/Lito Bina Medikantara
270. BOSPRO	Pet Ag Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
271. BOVACLOX DC	Norbrook Laboratories, Inggris/SHS International
272. BOVI SHIELD 3.....	Novartis Animal Health US, Inc/Paeco Agung
273. BREDOL.....	Diasham Resources Pte, Ltd, Singapura/ SHS International
274. BRO – GESAT	Sanbe Farma
275. BROMOQUAD 10	SHS International
276. BROMOQUAD 50	AAKO BV, Belanda/SHS International
277. BRUCELLA ABORTUS STRAIN RB – 51	Colorado Serum Company, USA/Paeco Agung
278. BRUCIVET.....	Pusat Veterinaria Farma
279. BUPHOSOLAMIN.....	Pyridam Veteriner
280. BUTAPHOS – B INJECTION.....	Samyang Anipharma C Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
281. BUTASYL.....	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
282. BUTOX 50.....	Intervet Intl. GmbH, Jerman/Intervet Indonesia
283. C – SAN	Sanbe Farma
284. CALBRO INJECTION.....	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
285. CALCIDEX ORAL.....	Sanbe Farma
286. CALCIDEX PLUS.....	Sanbe Farma
287. CALCIDEX	Sanbe Farma
288. CALCIJECT 40 CM	Norbrook Laboratories Ltd., Inggris/ SHS International
289. CALGOPHOS.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
290. CALIBRIN A	Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/ Agri Trading Investment
291. CALIBRIN Z	Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/ Agri Trading Investment
292. CALIMICINA 200 CL.....	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
293. CALPRONA MD.....	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
294. CALPRONA P4.....	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
295. CAPRI – ALBEND.....	Caprifarmindo Labs.
296. CAPRI B – PLEX INJ	Caprifarmindo Labs.

297. CAPRIBRO.....	Caprifarmindo Labs.
298. CAPRIDES	Caprifarmindo Labs.
299. CAPRIGLANDIN Inj.	Caprifarmindo
300. CAPRIMOX.....	Caprifarmindo Labs.
301. CAPRIMUN – E	Caprifarmindo Labs.
302. CAPRINTEL BOLUS	Caprifarmindo Labs.
303. CAPRIPROVIT	Caprifarmindo Labs.
304. CAPRIRAZIN	Caprifarmindo Labs.
305. CAPRITOCIN Inj.	Caprifarmindo Labs.
306. CAPRIVIT B12 Inj.	Caprifarmindo Labs.
307. CAPRIVIT Inj.....	Caprifarmindo Labs.
308. CAPRIVIT	Caprifarmindo Labs.
309. CAPSOQUIN LIQUID	Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/ ETHOXYQUIN Agrinusa Jaya Santosa
310. CAPSOQUIN N.....	Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/ Agrinusa Jaya Santosa
311. CARISID.....	Romindo Primavetcom
312. CARVITA – 15.....	Mitravet
313. CATOSAL INJEKSI	OLIC (Thailand) Limited untuk Bayer Thai, Co., Ltd Thailand/Bayer Indonesia
314. CATTLEVEET	Mitravet
315. CEFABEE OINTMENT	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
316. CENTRA-ENROX INJECTION 10%	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
317. CENTRA-OXYTE INJECTION 10%	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
318. CENTRA – OXYTE LA	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ INJECTION 20% CV. Fenanza Putera
319. CENTRA-TYLO INJECTION 20%.	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
320. CENTRA – TYLO SOLUBLE	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ POWDER 20% CV. Fenanza Putera
321. CENTRE-ALBEN TABLET 500 MG	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
322. CENTRE – IVERMEC	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ INJECTION 1% CV. Fenanza Putera
323. CENTRE – IVERMEC POUR	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ ON SOLUTION 1% CV. Fenanza Putera
324. CENTRE-IVERMEC SOLUTION 1%	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
325. CENTRE – NEOMY SOLUBLE	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ POWDER 5% CV. Fenanza Putera
326. CENTRE – TYLO PREMIX 25%.....	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
327. CERESTOP.....	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
328. CEVAMEC 1%	Ceva Sante Animale/Ceva Animal Health Indonesia
329. CEVAMUNE	Ceva Animal Health Indonesia/ Ceva Sante Animale, Perancis

330. CHEIL BIO MYCOSTATIN 50 WS.	Cheil Bio, Korea/SHS International
331. CHEIL COLISTIN.....	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
332. CHEIL TONOCOMP.....	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
333. CHEIL TYLOSIN 220.....	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
334. CHICKTONIC.....	Industrial Veterinaria., SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
335. CHOLINE CHLORIDE 50%.....	Kolin Chemical, Korea/Bright International
336. CHOLINE CHLORIDE 60%.....	Kolin Chemical, Korea/Bright International
337. CHOLINE CHLORIDE 75%.....	Kolin Chemical, Korea/Bright International
338. CHORULON	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
339. CID 2000.....	CID Lines NV, Belgia/SHS International
340. CIL	Medion Farma Jaya
341. CIPDEX	Cipla, Ltd/Aginusa Jaya Santosa
342. CIPERGEN	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
343. CJ PROSIN	Cheil Jedang Indonesia
344. CJ PROTIDE.....	Cheil Jedang Indonesia
345. CLEANATOR.....	Wonderindo Pharmatama
346. CLEANUP – F	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
347. CLINAFARM SMOKE	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
348. CLINAFARM SPRAY	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
349. CLOXALAK.....	Sanbe Farma
350. CLOXALENE DRY COW	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
351. CM – PREMIX	Sanbe Farma
352. COFACALCIUM.....	Coophavet – Merial, Perancis/ Romindo Primavetcom
353. COFALYSOR INJECTION	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
354. COFAVIT 500.....	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
355. COLA – FLOXA LIQUID	Agro Makmur Sentosa
356. COLAMOX 200	Sanbe Farma
357. COLIBACT BOLUS.....	Sanbe Farma
358. COLIBACT INJEKSI	Sanbe Farma
359. COLIBACT SOLUTION.....	Sanbe Farma
360. COLIBACT.....	Sanbe Farma
361. COLIMIX – 20	MJPF Farma Indonesia
362. COLIMPEX 8%.....	Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia
363. COLISID	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
364. COLISTAN	Tekad Mandiri Citra
365. COLISTIN 10% MEIJI.....	Thai Meiji Pharmaceuticals Co, Ltd, Thailand/ Halim Sakti Pratama
366. COLIVET SOLUTION.....	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
367. COLIZAG 100.....	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
368. COMOXY 500 WSP.....	Better Pharma Co., Ltd., Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi

369. CONQUER POWDER	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
370. COOPERTET LA.....	Bimeda Chemicals Ltd, Irlandia/ Pimaimas Citra
371. CORISIN – 24	Agro Makmur Sentosa
372. CORISIN.....	Agro Makmur Sentosa
373. CORITRIME.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
374. CORYVIT WATER SOLUBLE POWDER.....	Wonderindo Pharmatama
375. COSCAT – 666 WATER SOLUBLE POWDER.....	Y.S.P. Industries (M) Sdn. Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
376. COSUMIX PLUS 750	Shanghai Novartis Animal Health Ld, China/ Novartis Indonesia Novindo Agritech Hutama
377. COTRIM 240 INJECTION.....	ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara
378. COTRIMAZINE	Tekad Mandiri Citra
379. COTRIMOXAZOLE	Tekad Mandiri Citra
380. COXISTAC 12%.....	Phibro AH, Amerika Serikat/ Indovetraco Makmur Abadi
381. CRD 92	Coophavet Merial/Romindo Primavetcom
382. CRESOVEX – S	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
383. CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G.....	Wonderindo Pharmatama
384. CTC SOLUBLE.....	SDS Biotech-Singapore/SHS International
385. CTCZYME.....	CTCBIO Inc. Korea Selatan/ Agri Trading Investment
386. CUATS – 20.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
387. CULINDO PIG BREEDER CL-5....	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia
388. CULINDO PIG FINISHER CL - 4M	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
389. CULINDO PIG FINISHER CL – 4 ..	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
390. CULINDO PIG WEANER CL – 2 ...	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
391. CULINDO PIG WEANER CL – 3 ...	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
392. CYC – 100	Choong Ang Biotech,Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
393. CYDECTIN 1% INJECTION.....	Pfizer Olot S.L.U, Spanyol/Pfizer Indonesia
394. CYLACTIN LBC ME 10.....	Cerbios-Pharma SA., Switzerland/ DSM Nutritional Product Indonesia
395. CYPER KILLER 25 WP.....	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
396. CYPROSIN.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
397. CYROMAS – 1%.....	Mensana Aneka Satwa

398. CYROMAS – 10%.....	Mensana Aneka Satwa
399. CYROMAZIN – 10	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
400. CYROTEK – 1.....	Biotek Indonesia
401. D.I.R.P.D	Thai P.D. Chemica;s, Co. Ltd/ Indovetraco Makmur Abadi
402. DANISCO ANIMAL NUTRITON... LIQUID ALPHA – AMYLASE	Genencor International BVBA, Belgia untuk Danisco (UK) Ltd., Belgia/Megasetia Agung Kimia
403. DANISCO ANIMAL NUTRITON... LIQUID SUBTILISIN (PROTEASE)	Genencor International Ltd., Finland untuk Danisco (UK) Ltd., Finland/Megasetia Agung Kimia
404. DANISCO XYLANASE 40.000 G ..	Genencor International Ltd., Finland untuk Danisco (UK) Ltd., Finland/Megasetia
405. DANISCO XYLANASE 40.000 L ...	Genencor International Ltd., Finland untuk Danisco (UK) Ltd., Finland/Megasetia Agung Kimia
406. DATILAN	Eka Farma
407. DE – ODORASE	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
408. DECCOX 6%	Alpharma Inc., USA/Satwa Jawa Jaya
409. DECTOMAX	Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia
410. DEMP.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
411. DEMYTOX.....	Kalbe Farma Tbk
412. DENAGARD 10% COATED	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
413. DENAGARD 20% INJECTION	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
414. DENAGARD 45% WSG	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
415. DENAGARD 80% COATED	Novartis Animal Health Austria/Novartis Indonesia/ Novindo Agritech Utama
416. DENFUS SPRAY.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
417. DEPOLAC	Interchemie Werkend “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
418. DERMASEPT IODE GEL.....	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
419. DERMAVET CREAM.....	Cipla Ltd, India/Paeco Agung
420. DES HP	Hendy Pharmindo Satwa
421. DESGRIN	Agrinusa Jaya Santosa
422. DESIFUNG SOLUBLE.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
423. DESINSEP	Medion Farma Jaya
424. DESOGERM – 3A.....	Diasham–Singapura/SHS International
425. DESPADAC	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
426. DESTA – SAN	Sanbe Farma
427. DESTACAP	Caprifarmindo Labs.
428. DESTAN	Sanbe Farma
429. DESTASID.....	Sanbe Farma
430. DEXADRESON.....	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
431. DEXAROIDE	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

432.	DEXATOZON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
433.	DHUDHUT	Degepharm
434.	DIACOXIN 5%.....	Diasham Pte. Ltd., Singapore/SHS International
435.	DILUENT STERIL	SHS International
436.	DIMEDRYL.....	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
437.	DIMETOPRIM ORAL POWDER....	Coophavet-Merial/Romindo Primavetcom
438.	DIMOXAN WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
439.	DINALON	Univetama Dinamika
440.	DK SARSAPONIN 30	Desert King, USA/SHS International
441.	DM CID	Cid Lines, Belgia/SHS International
442.	DORIS SKIN CARE POWDER.....	Kalbe Farma Tbk
443.	DOVENIX	Merial/Romindo Primavetcom
444.	DOXINYL	Industrial Veterinaria, SA, Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
445.	DOXY – 500 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
446.	DOXY 10 WSP	Ewhapharmatek Corporation/SHS International
447.	DOXYCOL	Biotek Indonesia
448.	DRYCLOX.....	Sanbe Farma
449.	DRYCLOXA – KEL	Kela Lab NV, Belgia/SHS International
450.	DSC 1000	Antec International DuPont Company/ SHS International
451.	DUFADEX 10% INJ.....	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V/ Saka Menara Alam
452.	DUFATRIM/SUL ORAL	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V- Belanda/Saka Menara Alam
453.	DUFAVIT EXTRA ORAL.....	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V- Belanda/Saka Menara Alam
454.	DUFAVIT INJ	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V- Belanda/Saka Menara Alam
455.	DUOCYCLINE – LA.....	Univet/Romindo Primavetcom
456.	DUODIN LA.....	Romindo Primavetcom
457.	DUPHAFRAL AD3E FORTE	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
458.	DUPHAFRAL D3 1000.....	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
459.	DUPHAFRAL E – SELENIUM	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
460.	DUPHAFRAL MULTI	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
461.	DUPHALYTE.....	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
462.	DUPHAPEN LA	Norbrook Laboratories Ltd., Irlandia, UK/ Pfizer Indonesia
463.	DUPHAPEN STREP BP	Fort Dodge Animal Health, Spain/Pfizer Indonesia
464.	DUPHASPASMIN.....	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/PT. Pfizer Indonesia
465.	DUPONT BIOSOLVE PLUS	Antec International Ltd/
466.	DURACOL D.....	Agrinusa Jaya Santosa
467.	DURAVIT	Romindo Primavetcom
468.	DYNE O MIGHT.....	Preserve International, Amerika Serikat/ Agrinusa Jaya Santosa

469. E – FLOX 2,5%	Qingdao Mingzhu Pharmaceutical Co., Ltd/ Lito Prima mandiri
470. ECOCELL.....	Impextraco, Belgia/SHS International
471. ECOFLEECE	Bimeda Chemicals Export, Irelandia/ Vetindo Citrapersada
472. ECOFOAM EXTRA.....	Kilco Internasional, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
473. ECONASE XT 25	AB Vista, UK/Sehat Cerah Indonesia
474. ECONOMASE.....	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
475. ECOSTAT	Biomin, Australia/Romindo Primavetcom
476. ECOX 200.....	ECO Animal Health, United Kingdom/Jebesen & Jessen Chemicals Indonesia
477. EFFYDRAL	Fort Dodge Animal Health, Weesp, Holland/ Pfizer Indonesia
478. ELESCAP	Agrinusa Jaya Santosa
479. ENDO – POWER BETA.....	Easy Bio System, Inc./Blue Sky Biotech
480. ENDOFER 20 INJECTABLE SOLUTION.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
481. ENDOX DRY.....	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
482. ENDURA F40	Anji Fengmu Veterinary Drugs co. Ltd., China untuk Zhejiang Share Bio-Pharm co. Lid., China/ Behn Meyer Chemicals
483. ENDURA F80.....	Anji Fengmu Veterinary Drugs co. Ltd., China untuk Zhejiang Share Bio-Pharm co. Lid., China/ Behn Meyer Chemicals
484. ENDURAN	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
485. ENERGYN.....	Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
486. ENHALOR PHYTASE.....	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd/ Fenanza Putera
487. ENRO CHICKS	Hendy Pharmindo Satwa
488. ENRO CHICKS	Hendy Pharmindo Satwa
489. ENROJECT 10% LA INJ. SUSP.	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
490. ENROVA 10% INJECTABLE SOLUTION.....	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
491. ENROVET	Univetama Dinamika
492. ENTEROCILLINE	AVICO/Maju Farma Indonesia
493. ENTROCOLIN	Agro Makmur Sentosa
494. ENTROVET INJ.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
495. ENVACLOS.....	Romindo Primavetcom
496. EPIDELIN INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
497. ERITOCAP	Caprifarmindo Labs.
498. ERYMAX.....	Multifarma Satwa Maju
499. ESP 8.....	Diasham Resources, Singapore/SHS International
500. ESSENTIAL	OligoBasics Agroindustrial Ltda., Brazil/ Catur Nawa

501. ETHOXYQUIN 66% POWDER.....	Jiangsu Zhongdan Chemical Goup Corp., China/ Behn Meyer Chemicals
502. ETHOXYQUIN 97% LIQUID	Jiangsu Zhongdan Chemical Goup Corp., China/ Behn Meyer Chemical
503. EXCEDE FOR SWINE	Pharmacia & UpJohn Company, USA/ Pfizer Indonesia
504. EXCENEL STERILE POWDER	Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia
505. EXCENEL STERILE SUSPENSION	Pfizer Inc. USA/Pfizer Indonesia
506. EXFO – P Inj.....	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
507. EXTRAGUARD	Avindo Perdana Bahtera Mulia
508. FARM FLUID S.....	Antec International DuPont Company/ SHS International
509. FASINEX 900.....	Novartis (Bangladesh) Limited, Bangladesh/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
510. FASTON BOLUS	Univetama Dinamika
511. FATROPRIM LA	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
512. FEDEX.....	Kalbe Farma Tbk
513. FEED CURB DRY.....	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
514. FEEDMIX – B	Kalbe Farma Tbk
515. FEEDOX DRY	Impextraco, Belgia/SHS International
516. FERDEX 100	Medion Farma Jaya
517. FERDEX PLUS	Medion Farma Jaya
518. FERMACTO	Pet Ag Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
519. FERODEX 20% WITH VIT B12	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
520. FERODEX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
521. FEROPAN 200 INJ	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
522. FEROSOL – E Inj	Sumber Multivita
523. FEROVITA	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
524. FERRO 2000.....	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
525. FERRODIN.....	Romindo Primavetcom
526. FERROVET 10% INJ SOL.....	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/ Lisan Mulia
527. FERROVET	Duta Kaisar Pharmacy
528. FERTAGYL	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
529. FIBOSEL.....	Lallemand, Estonia/Trouw Nutrition Indonesia
530. FINASE EC 40P	AB Enzymes GmbH, Finland/ Behn Meyer Chemicals
531. FINIGEN.....	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
532. FLOGISTAN.....	Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada
533. FLOXA M2P	Multi Meditas Pratama
534. FLOXIDIN 10% INJ.....	Intervet India Pvt. Ltd., India/Intervet Indonesia
535. FLOXIVET	Univetama Dinamika
536. FLS LIQUID	Trouw Nutrition Indonesia
537. FLUBENOL 5%.....	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama

538. FLUBENZIM 5%	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
539. FLUCONIX – 250	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
540. FLUKICIDE 12,5%	Sanbe Farma
541. FLUKICIDE BOLUS	Sanbe Farma
542. FLUMISOL 10%	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
543. FLUNIXIN INJECTION	Norbrook Laboratories Ltd., Inggris/ SHS International
544. FLUNIXVET INJ	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
545. FLY ZERO GRANULE	Samyang Anipharm Co, Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
546. FOKKAMEL EXTRA	Nukamel B.V., Belanda/Brenntag
547. FOKKAMEL PLUS	Nukamel B.V., Belanda/Brenntag
548. FOKKAMIX 9	Nukamel, B.V, Belanda/Brenntag
549. FOLLIGON	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
550. FORMADES	Medion Farma Jaya
551. FORMALIN ACT	USFA, CV
552. FORMULA HP	Jejo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech
553. FORMYCINE GOLD PREMIX	Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia
554. FORMYCINE LIQUIDO	Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia
555. FORMYCINE LIQUIDO	IQF SA, Argentina/Biotek Sarana Industri
556. FORTICOAT – NL	Selko BV, Belanda/SHS International
557. FORTICOAT – NL	Selko BV, Belanda/SHS International
558. FUMISID	Sanbe Farma
559. FUNGEX	Anitox Corp-USA/SHS International
560. FUNGINAT FP – 51	Norel SA, Spain/Sehat Cera Indonesia
561. FUNGINAT FP 51	Norel & Nature, Spanyol/Sehat Cera Indonesia
562. FUNGISAL MIX P	Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/ Agrinusa Jaya Santosa
563. FUNGISAL MIX	Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/ Agrinusa Jaya Santosa
564. FUNGIZAL	AVICO Jordan/Maju Farma Indonesia
565. FX PLUS 20 INJECTABLE	Laboratorio AVIMEX SA DE CV, Mexico/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
566. FYLAX DRY SP	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
567. FYLAX FORTE HC LIQUID	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
568. FYLAX FORTE HC SP	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
569. FYLAX LIQUID	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
570. FYSAL FIT4	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
571. FYSAL LIQUID	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia

572.	FYSAL SP.....	Selko BV, The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
573.	G – MICROCID.....	Otasindo Prima Satwa
574.	GALLIACID.....	Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech
575.	GANASUPERVIT PLUS	Agro Makmur Sentosa
576.	GENEX POULTRY	Optivite International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada
577.	GENOPHOS – 5000G	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
578.	GENTA – 100.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
579.	GENTA 100 PANTEX INJECTABLE	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
580.	GENTADOX.....	AVICO/Maju Farma Indonesia
581.	GENTADOX.....	AVICO/Maju Farma Indonesia
582.	GENTAMOX.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
583.	GENTAVET 50	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
584.	GERM – IOD	Cenavisa SA, Spain/Lito Prima Mandiri
585.	GF – 82	Multi Sarana Farma
586.	GLUCORTIN – 20.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
587.	GLUTACAP.....	Caprifarmindo Labs.
588.	GLUTACID.....	Hendy Pharmindo Satwa untuk Delta Prima Agrindo
589.	GLUTACID.....	Otasindo Prima Satwa
590.	GLUTACIDE	Delta Prima Agrindo
591.	GLUTADES.....	Sanbe Farma
592.	GLUTAMAS.....	Mensana Aneka Satwa
593.	GLUTANOL	Sanbe Farma
594.	GLUTARALDEHYDE 30%	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
	BENZALKONIUM CHLORIDE 20%	
595.	GOLDEN GUARD	Ceracom AG., Switzerland/Behn Meyer Chemicals
596.	GONASER.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
597.	GONAVET VEYX.....	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara
598.	GPC 8	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
599.	GQ PLUS	Diasham Pte, Ltd, Singapura/SHS International
600.	GROW MAX	Easy Bio System, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
601.	HALOR C	Beijing Enhalar International Tech. Co., Ltd /Fenanza Putera
602.	HALTOX.....	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
603.	HEKSAPLEX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
604.	HEMADEX.....	Sanbe Farma
605.	HEMATODIN.....	Romindo Primavetcom
606.	HEMATOPAN B12.....	Merial/Romindo Primavetcom
607.	HEMICELL – D.....	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals
608.	HEMICELL – HT	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals

609.	HEMICELL – L	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals	
610.	HEMICELL – MP	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals	
611.	HEMICELL W LIQUID	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals	
612.	HEMISIN	Hendy Pharmindo Satwa	
613.	HEMISOL	Hendy Pharmindo Satwa	
614.	HEMOPIG	Samyang Anipharma Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech	
615.	HEPARENOL	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom	
616.	HEPAVEX 200	Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa	
617.	HEXADIN	Mitravet	
618.	HI – G PLUS	Kalbe Farma, Tbk	
619.	HI – G	Kalbe Farma, Tbk	
620.	HIDRO REX VITAL	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ AMINOACIDOS	Ekasapta Wijayatanguh
621.	HIMMVAC HOG CHOLERA (T/C) VACCINE	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech	
622.	HIPRAMIN – B	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa	
623.	HIPRAMOX	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa	
624.	HIPRAVIT – AD3E FORTE	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa	
625.	HORMONIPRA	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa	
626.	HOSTAZYM C 250 MICROGRANULATE	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International	
627.	HOSTAZYM P 10000	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International	
628.	HOSTAZYM P 5000	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International	
629.	HOSTAZYM X 250 MICROGRANULATE	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International	
630.	HYORESP	Merial/Romindo Primavetcom	
631.	HYPEROX	Antec International-A DuPont Company, Inggris/ SHS International	
632.	IMAVEROL	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama	
633.	INDIGEST INJECTABLE	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinanatan	
634.	INGELVAC MYCOFLEX	Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. USA/ Boehringer Ingelheim Indonesia	
635.	INGELVAC PRRS MLV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. USA/ Boehringer Ingelheim Indonesia	
636.	INJECTAMIN	Sanbe Farma	
637.	INJECTAVIT	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia	
638.	INJEKSI KALSIMUM BOROGLUKONAT	Medion Farma Jaya	
639.	INJEKSI VITAMIN B KOMPLEKS	Medion Farma Jaya	
640.	INJEKSI VITAMIN B12	Medion Farma Jaya	
641.	INTERCIDE	Tekad Mandiri Citra	

642. INTERFLOX – 100	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
643. INTERFLOX ORAL.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
644. INTERMECTIN SUPER	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
645. INTERMECTIN.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
646. INTERSPECTIN – L	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
647. INTERTOCIN – S.....	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
648. INTERTRIM – 500 ORAL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
649. INTERTRIM LA.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
650. INTRA HYDROCARE.....	Intracare B.V. Belanda/Behn Meyer Chemicals
651. INTRACOX ORAL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
652. INTRAFER – 200 B12	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
653. INTRAMOX – 150 LA.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
654. INTRAMOX – 150	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
655. INTRAMOX – 200 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
656. INTROVIT – B – COMPLEX	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, Holland/ Tekad Mandiri Citra
657. INTROVIT – E – SELEN WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
658. INTROVIT – E – SELEN.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
659. INTROVIT 4 + WS.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
660. INTROVIT AD3E WS.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
661. INTROVIT ORAL.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
662. IODENE.....	Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa
663. IODINACID.....	Multi Meditas Pratama
664. IODOPHORE 11,5%	AVICO/Maju Farma Indonesia
665. IODOSEPT	SHS International
666. IOGUARD – 300	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
667. IRON – E INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
668. IRON – G	China Bestar Laboratories Ltd, Taiwan/ SHS International

669. IRON – G	China Bestar Laboratories Ltd, Taiwan/ SHS International
670. ISTAM 20%	Romindo Primavetcom
671. ISTAM 30%	Romindo Primavetcom
672. ISTAM.....	Romindo Primavetcom
673. IVERVET	Vetanco S.A. Argentina/Pakan Serasi
674. IVOCIP PASTE.....	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
675. IVOCIP PLUS	Cipla, Ltd/Agrinusa Jaya Santosa
676. IVOMEK F INJECTION	MSD-Merial/Romindo Primavetcom
677. IVOMEK FOR SWINE	Merial/Romindo Primavetcom
678. IVOMEK INJECTION	Merial Saude Animal, Ltda, Brasil/Paeco Agung
679. JECTAVIT B12 INJ	Sanbe Farma
680. JURAMATE.....	Jurox Pty Ltd, Australia/Kalbe Farma Tbk
681. K.O – MEX EC.....	Samyang Anipharma Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
682. KALBAZE – ZG	Kalbe Farma Tbk
683. KALBAZEN C	Kalbe Farma Tbk
684. KALBAZEN KAPLET	Kalbe Farma Tbk
685. KALMOXTIN	Kalbe Farma Tbk
686. KALOXY – VET	Kalbe Farma Tbk
687. KALVIDOG	Kalbe Farma Tbk
688. KALVOLAC.....	Nutrifeed, Netherland/Behn Meyer Chemicals
689. KANA SOLUTION	Thai PD Chemical Co Ltd, Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
690. KANAMEX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
691. KANIVET	Duta Kaisar Pharmacy
692. KATRIWORM.....	Otasindo Prima Satwa
693. KEMIRA BACTERIA CONTROL .. LF2 NC	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
694. KEMIRA BACTERIA CONTROL .. SF1	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
695. KEMIRA MOULD CONTROL	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
696. KEMIRA MOULD CONTROL	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
697. KEMIRA MOULD CONTROL SP 1	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
698. KEMIRA PRO GIT SF1	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
699. KEMTRACE CHROMIUM	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
700. KEMZYME DRY	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
701. KEMZYME V DRY.....	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
702. KEPROMEK INJ.	Kepto B.V., Holland, Belanda/ Otasindo Prima Satwa

703. KEPROMEK ORAL	Kepro B.V., Holland, Belanda/ Otasindo Prima Satwa
704. KETAMIL	Troy Laboratories Pty, Ltd, Australia/ Harapan Maju Indah
705. KICKSTART	CID Lines NV, Belgia/SHS International
706. KILLWORM	Biotek Indonesia
707. KISA SP	Indovetraco Makmur Abadi
708. KITAMOXIN POWDER	Univetama Dinamika
709. KLINOFEEED	Unipoint AG., Switzerland/Behn Meyer hemicals
710. KLINOSAN	Unipoint AG., Switzerland/Behn Meyer Chemicals
711. KLOPIN – GARD	Tekad Mandiri Citra
712. KLOPINAKS	Agrinusa Jaya Santosa
713. KLOSAN 200	Sanbe Farma
714. KLOSAN BOLUS	Sanbe Farma
715. KLOSAN KAPLET	Sanbe Farma
716. KOFA GRAIN -pH 5-	ADDCON, Jerman/Novindo Agritech Hutama
717. KOLAMOX LA INJECTION	Nutec, Inggis/Indovetraco Makmur Abadi
718. KRISTAPEN	Duta Kaisar Pharmacy
719. KULACTIC	Vi-Cor., USA/Totwo Indonesia
720. KUTUTOX	Medion Farma Jaya
721. L – LYSINE HCL	Cheil Jedang Indonesia
722. L – THREONINE	Cheil Jedang Indonesia
723. L – TRYPTOPHAN	Cheil Jedang Indonesia
724. LE-435	Vetindo Citrapersada
725. LABRO	Kalbe Farma Tbk
726. LACTACLOX	Norbrook Laboratories Ltd., Inggis/ SHS International
727. LACTAGEN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
728. LAGANTOR BSA BOLUS	Kalbe Farma Tbk
729. LAGANTOR BSA	Kalbe Farma Tbk
730. LAGANTOR F 1 CUSTOMIX	Kalbe Farma Tbk
731. LAMOXI	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
732. LARVADEX 10% PREMIX	Novartis Animal Health Inc, Switzerland/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Hutama
733. LARVAKILL 10%	Sanbe Farma
734. LARVATOX	Medion Farma Jaya
735. LEVA – 200 ORAL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
736. LEVA – SAN BL	Sanbe Farma
737. LEVAGRIN	Agrinusa Jaya Santosa
738. LEVAMISOLE 2.000 MG	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
739. LEVAMISOLE POWDER	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
740. LEVAMIT – 125	Mitravet
741. LEVAMOL	Agrinusa Jaya Santosa
742. LEVANIUM	Tekad Mandiri Citra
743. LEVASOL	SHS International
744. LEVAVERM 10%	Dopharma BV-Belanda/SHS International

745. LEVIWORM 200.....	ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara
746. LEVUCCELL SB 20	Lallemand SAS France/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
747. LG ACCENT.....	LG/CTCBio , Korea/Agro Makmur Sentosa
748. LIFE JACKET	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
749. LIFEFORCE FORMULA.....	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
750. LIFEGARD – T.....	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
751. LIFELINE.....	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
752. LIGNOBOND DD.....	Borregaard Norway/CV. Fenanza Putera
753. LIMOXIN – 200 LA.....	Interchemie Werken”De Adelaar”BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
754. LIMOXIN – 25 SPRAY	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
755. LIMOXIN – 50	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
756. LINCO-S INJECTABLE SOLUTION	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
757. LINCO SP	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
758. LINCO SPECTIN 100 SOLUBLE .. POWDER	Pfizer Suzhou Animal Health, China/ Pfizer Indonesia
759. LINCO SPECTIN STERILE	Pfizer Suzhou Animal Health, China/ Pfizer Indonesia
760. LINCOMIX 110	Pfizer Suzhou Animal Health, China/ PT. Pfizer Indonesia
761. LIQAVITE	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
762. LIQUID LYSINE	Cheil Jedang Indonesia
763. LIVE HOG CHOLERA VACCINE..	Kitasato Institute, Jepang/SHS International
764. LIVER EXTRACT INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
765. LMS 200	Sanbe Farma
766. LONGAMOX	Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
767. LONGICINE.....	Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
768. LONGLIFE 250 S.....	Antec International-DuPont Company, Inggris/ SHS International
769. LUMIPHYTASE 5 XG.....	Lumis Biotech Pvt Ltd., India/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
770. LUPROSIL ADSORBATE	BASF Indonesia
771. LUPROSIL NC	BASF Indonesia
772. LUPROSIL SALT	BASF Indonesia
773. LUTALYSE.....	Pfizer Inc., Belgium/Pfizer Indonesia
774. LUTAVIT A 1000 PLUS.....	BASF Indonesia
775. LUTAVIT A 500 PLUS	BASF Indonesia
776. LUTAVIT A 500 S	BASF Indonesia
777. LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS.....	BASF Indonesia
778. LUTAVIT AD3 500/100 PLUS.....	BASF Indonesia
779. LUTAVIT B2 SG 80	BASF Indonesia
780. LUTAVIT CALPAN.....	BASF Indonesia
781. LUTAVIT E 50	BASF Indonesia

782.	LUTAVIT E 50 S	BASF Indonesia
783.	LUTAVIT K3 MSB	BASF Indonesia
784.	LUTAVIT VITAMIN C MONOPHOSPHATE 35	BASF Indonesia
785.	LYSOFORTE DRY	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
786.	MACROTIL 250 SOLUTION	KNBP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
787.	MAMALIA MINERAL	USFA, CV
788.	MAMIMUNE	Sunzen Biotech Berhad – Malaysia/ Sunzen Indonesia
789.	MAPRELIN	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara
790.	MARBOCYL 10%	Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
791.	MARBOCYL 2%	Vetoquinol, SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
792.	MARBOSTAR 10%	Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia
793.	MARUKI CAIR	Degepharm
794.	MARUKI SERBUK	Degepharm
795.	MASAMIX	Mensana Aneka Satwa
796.	MASTILAK	Sanbe Farma
797.	MAXCARE BEEF ECO	Trouw Nutrition Indonesia
798.	MAXCARE	Trouw Nutrition Indonesia
799.	MAXCARE	Trouw Nutrition Indonesia
800.	MAXI – MIL HP	Anitox Corporation, USA/SHS International
801.	MAXI – MIL S	Anitox Corporation, USA/SHS International
802.	MAXUS 100 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
803.	MAXUS 200	Elanco Animal Health/SHS International
804.	MAYYA TURBO TOX	Miavit GmbH, Jerman untuk XVET GmbH, Jerman/Indovetraco Makmur Abadi
805.	MD – 09	Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/ Agri Trading Investment
806.	MECTISAN	Sanbe Farma
807.	MEDIBIRD	Medion Farma Jaya
808.	MEDISEP	Medion Farma Jaya
809.	MEDOXY L	Medion Farma Jaya
810.	MEDOXY LA	Medion Farma Jaya
811.	MEFISTO	Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk
812.	MEGACLOX	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
813.	METABOL INJ	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
814.	METABOLASE	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
815.	METAMINO	Evonik Industries AG, Germany/Evonik Indonesia
816.	METRICURE	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
817.	MFEED	Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara
818.	MI – LAT	Katraco Santika
819.	MICOFUNG	Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
820.	MICOSPECTONE	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
821.	MICOTIL – 300 INJECTION	Elanco Animal Health, USA/SHS International
822.	MICOTIL	Elanco Animal Health/SHS International

823. MICRO AID FEED GRADE.....	Distributor Processing Inc., USA/SHS International
824. MICRO AID LIQUID 10%.....	Distributor Processing Inc., USA/SHS International
825. MICROCID.....	Otasindo Prima Satwa
826. MICRODES 100.....	Otasindo Prima Satwa
827. MICROGEN FARM DESINFECTANT	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
828. MICROTECH 5000 GRANUL.....	Guangdong VTR Bio-Trch Co. Ltd., China/ Agrinusa Jaya Santosa
829. MICROTECH 5000 LIQUID	Agrinusa Jaya Santosa
830. MICROTECH 5000 POWDER	Guangdong VTR Bio-Trch Co. Ltd., China/ Agrinusa Jaya Santosa
831. MICROVIT A PROSOL 500	Adisseo/Romindo Primavetcom
832. MICROVIT A SUPRA 1000.....	Adisseo/Romindo Primavetcom
833. MICROVIT A SUPRA 500	Adisseo/Romindo Primavetcom
834. MICROVIT AD3 SUPRA 1000 – 200	Adisseo/Romindo Primavetcom
835. MICROVIT B1 PROMIX.....	Adisseo/Romindo Primavetcom
836. MICROVIT B12 PROMIX 1000.....	Adisseo/Romindo Primavetcom
837. MICROVIT B2 SUPRA 80.....	Adisseo/Romindo Primavetcom
838. MICROVIT B3 PROMIX (NIACIN)	Adisseo/Romindo Primavetcom
839. MICROVIT B5 PROMIX	Adisseo/Romindo Primavetcom
840. MICROVIT B6 PROMIX.....	Adisseo/Romindo Primavetcom
841. MICROVIT D3 PROMIX 500	Adisseo/Romindo Primavetcom
842. MICROVIT E PROMIX 50	Adisseo/Romindo Primavetcom
843. MICROVIT E PROSOL 50	Adisseo/Romindo Primavetcom
844. MICROVIT H PROMIX BIOTIN....	Adisseo/Romindo Primavetcom
845. MICROSID	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
846. MILBOND TX.....	Milwhite. Inc., USA/Pfizer Indonesia
847. MINERAL BABI	Medion Farma Jaya
848. MINERAL FEED SUPPLEMENT-S	Medion Farma Jaya
849. MINTAI FEED ANTIMOLD	Mintai Perfume Chemicals Co, Ltd, China/ PROPRIONIC ACID TYPE (1) .
850. MINTREX Cu.....	Tienyen International
851. MINTREX Mn.....	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
852. MINTREX POULTRY.....	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
853. MINTREX Pse.....	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
854. MINTREX Zn.....	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
855. MIRAL 8	Romindo Primavetcom
856. MIRAVIT	Caprifarmindo Labs.
857. MISTRAL	Olmix S.A. Perancis/Indovetraco Makmur Abadi
858. MITRAFLOX – 12	Mitravet
859. MITRAMET – 240	Mitravet
860. MITRAMOX – 280	Mitravet
861. MITRAVIT – 100®.....	Mitravet
862. MIXBRO	Kalbe Farma Tbk
863. MIXBRO	Kalbe Farma Tbk.
864. MIXOMEL.....	Nukamel,B.V, Belanda/Brenntag
865. MIXTROUVIT	Trouw Nutrition Indonesia

866. MOLD – ZAP LIQUID	Alltech Inc., USA; Alltech China/ Alltech Biotechnology Indonesia
867. MOLD – ZAP	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
868. MOLD BAND INHIBITOR	Oddyssey, Amerika Serikat/ Indovetraco Makmur Abadi
869. MOLD NIL DRY	Nutri-Ad International bvba, Belgia/ Kalbe Farma Tbk
870. MOLDSTOP ML	Impextraco, Belgia/SHS International
871. MOLDSTOP ML	Impextraco, Belgia/SHS International
872. MOLDSTOP MYCO PLUS.....	Impextraco, Belgia/SHS International
873. MOLDSTOP MYCO PLUS.....	Impextraco, Belgia/SHS International
874. MOLDSTOP SD PLUS	Impextraco, Belgia/SHS International
875. MOLDSTOP SD PLUS	Impextraco, Belgia/SHS International
876. MOLDTEC 201	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
877. MOLDTEC 202	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
878. MOLTEC 211	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
879. MONENDOX 200 BMP	DOX-AL Italia SpA. Italy/Catur Nawa
880. MONEVAXE – 20	Shandong Jinyang Biological pharmaceutical Co. Ltd.,China untuk Hangzhou Invaxe Medical Technology Co. Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
881. MONEVAXE – 20	Shandong Jinyang Biological pharmaceutical Co. Ltd.,China untuk Hangzhou Invaxe Medical Technology Co. Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
882. MONIL BOLUS.....	Pyridam Veteriner
883. MONOPROP.....	Anitox Corp-USA/SHS International
884. MONTANIDE ISA 50V2.....	Seppic, Perancis/Megasetia Agung Kimia
885. MONTANIDE ISA 70 VG.....	Seppic, Perancis/Megasetia Agung Kimia
886. MONTEBAN 45	Elanco Animal Health/SHS International
887. MONVIT PREMIX.....	Agrinusa Jaya Santosa
888. MT. X+.....	Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara
889. MULTICIDE 150	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
890. MULTICIDE	Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia
891. MULTIDES.....	Mensana Aneka Satwa
892. MULTIDOSE – FW	Univet/Romindo Primavetcom
893. MULTIFLOX – 11	Multifarma Satwa Maju
894. MULTISEPT	Multifarma Satwa Maju
895. MULTIVIT – CH	Kela Laboratories NV., Belgia/SHS International
896. MULTIVIT B COMP.....	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
897. MULTIVIT EXTRA.....	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
898. MULTIVIT INJ	Norbrook Lab-UK/SHS International
899. MULTIVITAMIN B COMPLEX.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
900. MUSCASID 10%.....	Kalbe Farma Tbk
901. MYCOBACT	Sanbe Farma

902. MYCOCURB AW LIQUID	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
903. MYCOCURB EXTEND LIQUID	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
904. MYCOCURB	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
905. MYCOFIX PLUS 3.0	Biomin/Romindo Primavetcom
906. MYCOFIX SECURE	Biomin/Romindo Primavetcom
907. MYCOFIX SELECT 3.0	Biomin/Romindo Primavetcom
908. MYCOSORB	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
909. MYCOSTAT	Kiotechagil, United Kingdom/Jepsen & Jessen Chemicals Indonesia
910. MYCOSTATIN – 20	Novartis (Taiwan) Co. Ltd, Taiwan/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
911. MYCOTOX NG	Ceva Sante Animale SA, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
912. MYCOTOX	Ceva Sante Animale SA, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
913. NATRII CHLORIDUM 0,9%	Wonderindo Pharmatama
914. NATUPHOS 10.000 G	BASF Indonesia
915. NATUPHOS 5000 G	BASF Indonesia
916. NATUPHOS 5000 L	BASF Indonesia
917. NATUSTAT	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
918. NATUZYME	Bioproton Pty. Ltd., Australia/Kalbe Farma Tbk
919. NEGUVON	Bayer Thai Co. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia
920. NEMASOL – K	Medion Farma Jaya
921. NEO – MOXY	Hendy Pharmindo Satwa
922. NEO ANTISEP NEW FORMULA...	Medion Farma Jaya
923. NEO ANTISEP	Medion Farma Jaya
924. NEO MEDITRIL – I	Medion Farma Jaya
925. NEO TERRAMYCIN 25	Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia
926. NEO ULTRADES	Biotech Indonesia
927. NEOAMP	MJPF Farma Indonesia
928. NEOCIN SOLUBLE POWDER.....	Dong Bang Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
929. NEOMIX 325.....	Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia
930. NEOPRIDIMET.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
931. NEOPROFEN INJECTION	Pfizer Animal Health India Ltd., India/ Pfizer Indonesia
932. NEOVIT E 20% + Se.....	Neofarma, S.R.L., Italy/Sehat Cerah Indonesia
933. NEPOREX 2 WSG	Novartis Animal Health Inc, Swiss/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
934. NETRABIL	Medion Farma Jaya
935. NEUMOVIRIC	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
936. NEW COLIPRIM	AVICO/Maju Farma Indonesia
937. NEW ERY SULFA.....	Choong Ang Biotech, Co. Ld., Korea/ Indovetraco Makmur Abadi

938. NICLO – 75	Katraco Santika
939. NOBILIS DILUENT CA	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
940. NOBILIS DILUENT FD	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
941. NOBLOAT	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
942. NOPCOXYME II.....	Diasham Resources, Singapore/SHS International
943. NORAN – 150	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
944. NORAN – 200 ORAL.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
945. NORAN – 200 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
946. NOROMECTIN INJECTION.....	Norbrook Laboratories, Inggris/SHS International
947. NOROPROST.....	Norbrook Lab-UK/SHS International
948. NOROTRYL	Norbrook Laboratories Ltd, Belgia/ SHS International
949. NOROTYL LA.....	Norbrook lab-UK/SHS International
950. NOVALDON	Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada
951. NOVAMOX – G INJ.....	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
952. NOVASIL PLUS	Impextraco, Belgia/SHS International
953. NUKAMIX 10	Nukamel,N.V, Belgia/Brenntag
954. NUOQIU PREMIX 5%	Shandong Luxi, China/Indovetraco Makmur Abadi
955. NUPRO	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
956. NUTRASE XYLA 500	Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara
957. NUTRASE XYLA LIQUID.....	Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara
958. NUTRASE XYLA	Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara
959. NUTRI – SURE DW1.....	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
960. NUTRIAROMA MILKY-VANILLA	Dex Iberica – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
961. NUTRILAC IGA LIQUID.....	Nutri-Ad International bvba, Belgia/ Kalbe Farma Tbk
962. NUTRIMIN SM 318 SWINE	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
963. NYCLOSOL	Agro Makmur Sentosa
964. O.T.C – LA INJECTION	Samyang Anipharm Co. Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
965. OCTACIN EN 10% ORAL	Octa Memorial, Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
966. OCTACIN EN 5% INJECTION	Octa Memorial,Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
967. OMNICIDE.....	Coventry Chemicals Ltd, Inggris/ Intervet Indonesia/Pimaimas Citra
968. OO – CIDE.....	Antec International-A DuPont Company, Inggris/ SHS International
969. OPTAFLEXX 100.....	Elanco Animal Health, USA/SHS International
970. OPTICIDE	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatangguh
971. OPTIGEN II.....	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
972. OPTIGEN.....	Alltech Inc, USA; Alltech Biotechnology Private Limited-India/Alltech Biotechnology Indonesia

973. OPTIMIN COPPER 15%.....	Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia
974. OPTIMIN IRON 15%.....	Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia
975. OPTIMIN MANGANESE 15%.....	Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia
976. OPTIMIN SE Y.....	Trouw Nutrition Indonesia
977. OPTIMIN SEY 3000.....	Lallemand Inc, Canada/Trouw Nutrition Indonesia
978. OPTIMIN ZINC 15%.....	Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia
979. OPTIMIN ZINC METHIONINE 20%.....	Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia
980. OPTIMIN ZMC.....	Great Plains Processing/Trouw Nutrition Indonesia
981. OPTIZYME.....	Optivite International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada
982. ORANGE.....	Trouw Nutrition Indonesia
983. OREGO – STIM LIQUID.....	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
984. OREGO – STIM POWDER.....	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
985. ORGANIC GREEN CULTURE.....	HanPoong-Korea/SHS International
986. ORIVET.....	Pusat Veterinaria Farma
987. OTC SPRAY.....	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
988. OTRAVIT.....	Otasindo Prima Satwa
989. OVALUMON INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
990. OXALDIN.....	Daichii Pharmaceutical/SHS International
991. OXIBENDAZOLE – 100.....	Kalbe Farma Tbk
992. OXICAP E2.....	Industrial Tecnica Pecuaria, SA, Spain/ Agrinusa Jaya Santosa
993. OXI HOLD.....	Kiotechagil, United Kingdom/Jebesen & Jessen Chemicals Indonesia
994. OXILEN AD.....	Vetanco S.A. Argentina/Pakan Serasi
995. OXIPRA – 20 LA.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
996. OXISTAT.....	Agil, Callevark Park, Inggris/Bioadi Sasana
997. OXOLINAL.....	Agrinusa Jaya Santosa
998. OXTRA EFFERVESCENT PESARIES.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
999. OXTRA LA.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1000. OXY – KEL 10%.....	Kela Laboratories, Belgia/SHS International
1001. OXY – KEL 20 LA.....	Kela Laboratories, Belgia/SHS International
1002. OXY – SAN 10%.....	Sanbe Farma
1003. OXY NIL RX DRY.....	Nutri-Ad International byba, Belgia/ Kalbe Farma Tbk
1004. OXYJECT – 100.....	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
1005. OXYLIN INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1006. OXYTETRA 200 LA.....	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1007. OXYTETRA 5 COOPHAVET.....	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
1008. OXYTETRAVET 20% LA INJ.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1009. OXYTETRAVET AEROSOL.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1010. OXYTOCIN – 10.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1011. OXYTOCIN INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1012. OXYTOCIN VET.....	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara

1013. OXYTOCINA PITUITARIA	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1014. OXYTRAL LA.....	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
1015. OXYTRAL.....	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
1016. PAMIZOLE PS	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentososa
1017. PANACUR 10% SUSP	Intervet Intl. GmbH, Jerman/Intervet Indonesia
1018. PANKILL	Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia
1019. PANMECTIN – 10.....	Pantex-Holland/Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1020. PANTISOL	Pantex, BV. Belanda/Starsia Asiatama
1021. PANTO VITAMIN	Wonderindo Pharmatama
1022. PANTOMINOVIT	Pantex, BV. Belanda/Starsia Asiatama
1023. PANTRISUL INJECT.....	Pantex-Holland/Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1024. PARACILLIN SP.....	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
1025. PARAMECTIN RV POUR – ON FOR CATLE	Jurox Pty Ltd, Australia/Sumber Hewan
1026. PARAMECTIN RV POUR – ON FOR CATLE.....	Jurox Pty Ltd., Australia/Sumber Hewan
1027. PAYLEAN PREMIX.....	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1028. PELLTECH	Borregaard Norway/CV. Fenanza Putera
1029. PEN – HISTA STREP.....	Vetoquinol SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
1030. PEN – O – VET	Duta Kaisar Pharmacy
1031. PEN & STREP	Norbrook Laboratories Limited, Ireland/ SHS International
1032. PENERGETIC – T.....	Penergetic International AG., Switzerland/ Behn Meyer Chemicals
1033. PENSTREP – 400	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1034. PENSTREP 20/20	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
1035. PENSTREP 4 0,5	Wonderindo Pharmatama
1036. PENZAVET.....	Duta Kaisar Pharmacy
1037. PEPEROXIN SOL	Samyang Anipharma Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1038. PERFEXOL – H.....	Trouw Nutrition Indonesia
1039. PERFEXOL – L	Trouw Nutrition Indonesia
1040. PERMASOL 500 GRANULE	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1041. PERMASOL 500 LIQUID.....	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1042. PERMETHYL 5%	Tekad Mandiri Citra
1043. PEST – VAC.....	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd, Brazil/ Pfizer Indonesia
1044. PESTIFFA.....	Merial/Romindo Primavetcom
1045. PG 600.....	Intervet Intl. B.V. Belanda/Intervet Indonesia
1046. PGF VEYX FORTE.....	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara
1047. PGF VEYX	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara

1048. PHARMASIN 100% WS GRANULES	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International
1049. PHARMASIN PULVIS	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International
1050. PHENVIRO PLUS.....	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1051. PHENYLJECT.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1052. PHOSRETIC.....	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
1053. PHYLINK 5000	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1054. PHYZYME XP 1.000 TPT	Danisco Argentina SA Argentina untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/ Megasetia Agung Kimia
1055. PHYZYME XP 10.000 TPT	Danisco Argentina SA Argentina untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/ Megasetia Agung Kimia
1056. PHYZYME XP 5.000 G	Finnfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
1057. PHYZYME XP 5.000 L.....	Femic SA De CV, Mexico untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
1058. PIG – IRONJECT 20% + B12	Dopharma BV, Belanda/SHS International
1059. PIG – PREMIX	Sanbe Farma
1060. PIG MINERAL POWDER	USFA, CV
1061. PIGMIX	Medion Farma Jaya
1062. PIGNOX.....	Medion Farma Jaya
1063. PIGWORM – S	Medion Farma Jaya
1064. PINOCID	Sanbe Farma
1065. PIPEDON – X LIQUID	Wonderindo Pharmatama
1066. PIPEDON BOLUS.....	Wonderindo Pharmatama
1067. PIPERA – SAN	Sanbe Farma
1068. PIPERAVAKS – S.....	Agrinusa Jaya Santosa
1069. PIRIMYCIN.....	Pyridam Veteriner
1070. PIRIPEN Inj.....	Pyridam Veteriner
1071. PITACID	Kalbe Farma Tbk
1072. PLUSET	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1073. PNEUMOTOS – I.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
1074. POLYVIT STRESS.....	Vetindo Citrapersada
1075. PORCILIS ART	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1076. PORCILIS ERY	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1077. POTAHORMON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1078. POWERCILLIN INJECTION	Samyang Anipharma Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1079. POWERMEC SOLUTION	Cheil Bio Co. Ltd., Korea/SHS International
1080. PRAMISOLE.....	Han Poong Indutry Co., Ltd, Korea/ SHS International

1081. PREFECT.....	Kiotechagil, United Kingdom/Jebesen & Jessen Chemicals Indonesia
1082. PREMULAC – L.....	Nutrifeed, Netherland/Behn Meyer Chemicals
1083. PRIMA ALBENS – 10	MJPF Farma Indonesia
1084. PRIMA AMINOACID PLUS 2002 ..	MJPF Farma Indonesia
1085. PRIMA CUATS – 30.....	MJPF Farma Indonesia
1086. PRIMA DEXTRA-CY PLUS	MJPF Farma Indonesia
1087. PRIMA GENTA 5% Injection.....	MJPF Farma Indonesia
1088. PRIMA IODINE – 33	MJPF Farma Indonesia
1089. PRIMA LINCOSPECT	MJPF Farma Indonesia
1090. PRIMA VAM – 200	MJPF Farma Indonesia
1091. PRIMA VITA PLUS	MJPF Farma Indonesia
1092. PRIMACIDE – 200.....	MJPF Farma Indonesia
1093. PRIMADES	Delta Prima Agrindo
1094. PRIMADINE	Romindo Primavetcom
1095. PRIMADOXIN	Romindo Primavetcom
1096. PRIMATICOL.....	Romindo Primavetcom
1097. PRISTAM.....	Romindo Primavetcom
1098. PRO – CELL.....	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1099. PROCHAL – CU.....	China Bestar Laboratories, Taiwan/ SHS International
1100. PROCHAL – MnS	China Bestar Laboratories, Taiwan/ SHS International
1101. PROCHAL – Zn.....	China Bestar Laboratories, Taiwan/ SHS International
1102. PROCHICKGRIN.....	Agrinusa Jaya Santosa
1103. PROCID.....	Morningbio, Korea/Bright International
1104. PROGENOS.....	Trouw Nutrition Indonesia
1105. PROMIX PREMIX	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia
1106. PROMOTOR L	Laboratorios Calier, S.A.–Spain/ Megan Galus Kinantan
1107. PROPHYL.....	Coophavet Merial/Romindo Primavetcom
1108. PROSTAVET – C	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
1109. PROTEK – ALL PLUS	Dawes Laboratories, USA/Lito Prima Mandiri
1110. PROTEXIN CONCENTRATE	Probiotics International, Inggris/ Novindo Agritech Utama
1111. PULMOTIL AC	Elanco Animal Health/SHS International
1112. PULMOTIL PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1113. PUMA (PUTU MACAN)	Kusuma Makmur, UD
1114. PUNCH LIQUID MOLD INHIBITOR	Anitox Corporation, USA/SHS International
1115. PUNCH	Anitox Corp-USA/SHS International
1116. PVP IODINE 50 G.....	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
1117. PYRIKOL – DROPS.....	Pyridam Veteriner
1118. PYRONIL – 1000 BOLUS	Pyridam Veteriner
1119. PYRONIL – 2500 BOLUS	Pyridam Veteriner
1120. PYRONIL – 300 KAPLET	Pyridam Veteriner

1121. PYRONIL SUSPENSİ.....	Pyridam Veteriner
1122. PYRONIL	Pyridam Veteriner
1123. PYROXY Inj.....	Pyridam Veteriner
1124. QUANTUM 2500 TR	AB Vista, UK/Sehat CeraH Indonesia
1125. QUICKBAYT 10 WG.....	Bayer Environmental Science SAS Perancis./ Bayer Indonesia
1126. QUINABIC 14% INJECTABLE SOLUTION.....	AAKO BV, Belanda/SHS International
1127. QUINABIC 7% INJECTABLE SOLUTION.....	AAKO BV, Belanda/SHS International
1128. QUINTRIL INJ 5%.....	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
1129. QUIXALUD.....	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Hutama
1130. R. P. MINERAL	Romindo Primavetcom
1131. RACUMIN 0,0375 BB	Bayer Indonesia
1132. RAMECTIN INJECTION	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
1133. RED ROCKIES.....	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
1134. REDOX T.....	Industrial Kern, Spain/Waris
1135. REMACYCLINE LA	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
1136. RESPISURE.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1137. REX VITAL	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
1138. RHINIFFA T	Merial/Romindo Primavetcom
1139. RHODIMET AT 88	Adisseo/Romindo Primavetcom
1140. RHODIMET NP 99.....	Adisseo/Romindo Primavetcom
1141. RHODIVIT	Romindo Primavetcom
1142. RICAN PREMIX POWDER	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
1143. RIDAN.....	KELA Lab-Belgia/SHS International
1144. RINTAL BOLUS	OLIC (Thailand) Limited, Thailand untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia
1145. RINTAL GRANUL 10%.....	OLIC (Thailand) Limited, Thailand untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia
1146. ROBORANTE CALIER.....	Laboratorios S.A. – Spanyol/Megan Galus Kinantan
1147. RODALON	Pyridam Veteriner
1148. RONOZYME AX (CT).....	Rovithai Limited, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1149. RONOZYME NP (CT)	Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia
1150. RONOZYME NP (L).....	Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia
1151. RONOZYME P 5000.....	Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia
1152. RONOZYME PROACT (CT)	Novozyme Latin America Ltda., Brazil dan Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia
1153. RONOZYME WX (CT).....	Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia

1154. RONOZYME WX (L)	Novozyme A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia
1155. ROSIGOLD – S	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia
1156. ROSIGOLD WSP	DSM Vitamins (Shanghai) Ltd/ DSM Nutritional Product Indonesia
1157. ROVABIOTM EXCEL AP	Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom
1158. ROVABIOTM EXCEL LC	Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom
1159. ROVIMIX 8188	Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1160. ROVIMIX A – 1000	DSM Nutritional Products AG, Swiss/ DSM Nutritional Product Indonesia
1161. ROVIMIX AD3 1000/200	DSM Nutritional Products AG, Swiss/ DSM Nutritional Product Indonesia
1162. ROVIMIX B1	DSM Nutritional Products GmbH, Jerman/ DSM Nutritional Product Indonesia
1163. ROVIMIX B2 80 SD	DSM Nutritional Products GmbH, Jerman/ DSM Nutritional Product Indonesia
1164. ROVIMIX B6	DSM Vitamins (Shanghai) Ltd, China/ DSM Nutritional Product Indonesia
1165. ROVIMIX BETA – CAROTENE.....	DSM Nutritional Products AG, Swiss/ DSM Nutritional Product Indonesia
1166. ROVIMIX C – EC	DSM Nutritional Products UK, Inggris/ DSM Nutritional Product Indonesia
1167. ROVIMIX CALPAN	DSM Nutritional Products AG, Swiss/ DSM Nutritional Product Indonesia
1168. ROVIMIX E – 50 ADSORBATE	DSM Nutritional Products AG, Swiss/ DSM Nutritional Product Indonesia
1169. ROVIMIX FOLIC 80 SD	DSM Nutritional Products France SAS., Perancis/ DSM Nutritional Product Indonesia
1170. ROVIMIX HY – D 1,25%	DSM Nutritional Products, USA/ DSM Nutritional Product Indonesia
1171. ROVIMIX STAY C.....	DSM Nutritional Products France, Perancis/ DSM Nutritional Product Indonesia
1172. ROXINE INJEKSI.....	Sanbe Farma
1173. RUMENSIN 200 PREMIX.....	Elanco Animal Health-USA/SHS International
1174. SALSTOP SD	Impextraco, Beliga/SHS International
1175. SALTEC 501	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
1176. SALTEC 511	Linq Technology Corporation, Thailand/ Tirta Niaga Sejahtera
1177. SAMYANG TYLOSIN – 200 INJECTION	Samyang Anipharma Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1178. SAN – ALBEND	Sanbe Farma
1179. SANITAS – 151	Mitravet
1180. SANIVIR PLUS.....	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
1181. SANIVIR	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
1182. SANTOQUIN LIQUID.....	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia

1183. SANTOQUIN MIXTURE 6	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
1184. SARAKILL.....	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1185. SEL – PLEX 2000.....	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1186. SEL – PLEX 2700.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1187. SEL – PLEX 3000.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1188. SEL – PLEX.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1189. SELACID DRY.....	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1190. SELACID GREEN GROWTH P LIQUID.....	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1191. SELACID GREEN GROWTH P MP	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1192. SELDOX HM DRY	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1193. SELETOCO INJECTION.....	Cheil Bio Co ., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1194. SELEVIT – SB FORTE	Mitravet
1195. SELFEED CF.....	Sinsui Inc, Jepang/Farmadika Sejahtera Indonesia
1196. SELKO PH.....	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1197. SEPTIDES	Biotek Indonesia
1198. SEPTISAN.....	Sanbe Farma
1199. SEPTIVET.....	Pusat Veterinaria Farma
1200. SEPTO – SKIN CALIER.....	Laboratorios Calier, S.A–Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1201. SEPTOCID.....	Mensana Aneka Satwa
1202. SEROLAT HL.....	Nutrifeed, Netherland/Behn Meyer Chemicals
1203. SEROLAT PEP	Nutrifeed, The Netherlands/Behn Meyer Chemicals
1204. SETON 2%	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1205. SHIFT.....	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
1206. SHOTAPEN LA.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
1207. SIERADES.....	Biotek Indonesia
1208. SIERAMIX – A.....	Biotek Indonesia
1209. SIERAMIX – B.....	Biotek Indonesia
1210. SIL – ALL WATER SOLUBLE	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1211. SINDOXAN.....	Otasindo Prima Satwa
1212. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g GRANULAR	Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/ Brenntag
1213. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g LIQUID.....	Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/ Brenntag
1214. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g POWDER.....	Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/ Brenntag
1215. SOGECOLI.....	Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk

1216. SOLFAC 10 WP.....	Bayer Environmental Science SAS Perancis/ Bayer Indonesia
1217. SOLUBENOL 100 MG/G.....	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
1218. SORB – IT	Anitox Corp-USA/SHS International
1219. SORBATOX.....	Kiotechagil, United Kingdom/Jebson & Jessen Chemicals Indonesia
1220. SPECILAC 41% LACTOSA	LNB, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi
1221. SPECILAC RED	LNB, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi
1222. SPECIORLAC	Merial/Romindo Primavetcom
1223. SPECTARAL – 25	Tekad Mandiri Citra
1224. SPECTARAL	Tekad Mandiri Citra
1225. SPECTOVET INJ	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1226. SPIRADIN – 20	Romindo Primavetcom
1227. SPORADES	Medion FarmaJaya
1228. STAFAC – 500	Phibro Animal Health, USA/Emvi Indonesia
1229. STAMIX 20.....	Kalbe Farma Tbk
1230. STAMIX SP 500	Kalbe Farma Tbk
1231. STERILE DILUENT	Sante Animale, Perancis / Ceva Animal Health Indonesia
1232. STERILE DILUENT	Ceva Animal Health Indonesia/ Ceva Sante Animale, Perancis
1233. STERILIDES	Cakar Mas
1234. STREPCILLIN.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1235. STREPTOMISINA SULFATE.....	Katraco Santika
1236. STREPTOMYCIN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1237. STREPTOMYCIN Serbuk Injeksi ...	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
1238. STREPTOVET	Duta Kaisar Pharmacy
1239. STRESS – STOP	Sanbe Farma
1240. STRESS BLOCK	Agro Makmur Sentosa
1241. STRESS PROTECTOR	Avindo Perdana Bahtera Mulia
1242. STRESSGRIN.....	Agrinusa Jaya Santosa
1243. SUANOVIL SOL. 20.....	Merial/Romindo Primavetcom
1244. SUANOVIL	Romindo Primavetcom
1245. SULFA STRONG INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1246. SULFADIM	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
1247. SULFANILAMIDE SALEP	Wonderindo Pharmatama
1248. SULFATRIM 48% ORAL SUSPENSION	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
1249. SULFAXALINE	Pyridam Veteriner
1250. SULFIDIN	Romindo Primavetcom
1251. SULPHAPRIM INJ.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1252. SULPIDON INJEKSI	Sanbe Farma
1253. SULPIG.....	Medion FarmaJaya
1254. SULTRIM SUSPENSION	Y.S.P.Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
1255. SULTRIVAKS.....	Agrinusa Jaya Santosa

1256. SUNNY BINDER	Zhejiang University Sunny Nutrition Technology Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
1257. SUNPHASE G	Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. - China/ Behn Meyer Chemicals
1258. SUNPHASE L	Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. – China/ Behn Meyer Chemicals
1259. SUPER – LUBE	Uniscope Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
1260. SUPER BIOSECURITY	Cakar Mas
1261. SUPER IODOCID	Cakar Mas
1262. SUPERVETACLEAN	Vetindo Citrapersada
1263. SURMAX – 200 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1264. SURMAX 100 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1265. SURPIZIN	SHS International
1266. SUTRIMIX PLUS	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1267. SUVAXYN E	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1268. SUVAXYN RESPIFEND MH	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1269. SV 318 SWINE VITAMIN PREMIX	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1270. SWINE MINERAL PREMIX	Trouw Nutrition Indonesia
1271. SWINE VITAMIN PREMIX	Trouw Nutrition Indonesia
1272. SY IVERMECTIN INJECTION	Samyang Anipharma Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1273. TAKTIC	Intervet International B. V. Belanda/ Intervet Indonesia
1274. TAVET GST	Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada
1275. TAVET OXITETRACYCLINA	Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada
1276. TAVET SULFA X3	Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada
1277. TECTIN INJ	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1278. TEK – TROL	Bio-Tek Industries Inc, USA/SHS International
1279. TERMIN 8 LIQUID	Impextraco, Beliga/SHS International
1280. TERMIN 8 LIQUID	Anitox Corporation, USA/SHS International
1281. TERMIN 8 POWDER	Anitox Corporation, USA/SHS International
1282. TERMINATOR	Bayer New Zealand/Lito Bina Medikantara
1283. TERMITOX	Cevasa SA, Argentina/Biotek Sarana Industri
1284. TERRAMYCIN* INJECTABLE SOLUTION	Pfizer Indonesia
1285. TERRAMYCIN* LA INJECTABLE SOLUTION	Pfizer Indonesia
1286. TERREXINE	Univet/Romindo Primavetcom
1287. TERROXYVET	Duta Kaisar Pharmacy
1288. TESTOHORMON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1289. TETRAMISON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1290. TETRAMISON TABLET	Wonderindo Pharmatama
1291. TETRAVET AEROSOL	Bayer, New Zealand/Lito Bina Medikantara
1292. TH4 + ...	Sovegal SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk
1293. THE ONE	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara

1294. THREAMINO.....	Evonik Industries AG, Germany/Evonik Indonesia
1295. TIAMULIN	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1296. TIMING GOLD	Kofavet Special, Korea/Bright International
1297. TM – PERAZINE	Tekad Mandiri Citra
1298. TN OX.....	Trouw Nutrition Indonesia
1299. TNI BETAINE HC 70	Trouw Nutrition Indonesia
1300. TNI BETAINE.....	The Amalgamated Sugar Company, USA/ Trouw Nutrition Indonesia
1301. TOLEVIT 10 PLUS Se	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1302. TOLFEDINE CS INJECTION	Vetquinol SA, Perancis/Aginusaya Santosa
1303. TOLTRARIL S 2,5%	Indovetraco Makmur Abadi
1304. TOLTRARIL S 5%	Indovetraco Makmur Abadi
1305. TONOPHOSPHAN COMPOSITION	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
1306. TOPCEF.....	QILU Animal Health/Biotek Indonesia
1307. TOPVIT.....	Sanbe Farma
1308. TOSAPRIM WS.....	Hendy Pharmindo Satwa
1309. TOXFIN TM DRY	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
1310. TOXIBAN AM	Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia
1311. TOXIBOND.....	Biomix SA,Columbia untuk Vitusa Corp USA/ Indovetraco Makmur Abadi
1312. TOXIDEX.....	Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
1313. TOXIDREN	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1314. TOXISORB CLASSIC	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman/ Bayer Indonesia
1315. TOXISORB PREMIUM.....	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman/ Bayer Indonesia
1316. TOXO MX	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1317. TOXO XL	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1318. TRIDOX LA	Farvet Lab.,Belanda/Agro Makmur Sentosa
1319. TRIMETHODINE BOLUS	Biotek Indonesia
1320. TRIMETHOSULF	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
1321. TRIMEZYN BOLUS	Medion FarmaJaya
1322. TRIMOXYAL PIGLET SUSPENSION	Diasham Resources, Singapore/SHS International
1323. TRIPLE WORMER BOLUS	Wonderindo Pharmatama
1324. TRISULMIX INJECTABLE/ SULRIJECT.....	Coophavet Merial/Romindo Primavetcom
1325. TRISULMIX LIQUIDE	Coophavet Merial/Romindo Primavetcom
1326. TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 430.....	Trouw Nutrition Indonesia
1327. TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 528.....	Trouw Nutrition Indonesia
1328. TRYAPAMIDIUM.....	Merial/Romindo Primavetcom
1329. TRYAPAMINO	Evonik Industries AG, Germany/Evonik Indonesia

1330. TRYPONIL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1331. TWENTY 1 WP	Belgagry SA., Belgia/Totwo Indonesia
1332. TYLAN 100 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1333. TYLAN 40 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1334. TYLOCARE	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1335. TYLOCOL	Hendy Pharmindo Satwa
1336. TYLODOX	Hendy Pharmindo Satwa
1337. TYLOGRIMIX	Agrinusa Jaya Santosa
1338. TYLOJECT 20%	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
1339. TYLOON	Wonderindo Pharmatama
1340. TYLOPRIM	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
1341. TYLORATE INJ	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1342. TYLOSIN – 50	Katraco Santika
1343. TYLOSIVET	Duta Kaisar Pharmacy
1344. TYLOTRYL	AVICO/Maju Farma Indonesia
1345. TYLOVA 200 INJECTABLE SOLUTION	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
1346. TYLOXACIN	Hendy Pharmindo Satwa
1347. TYMPANOL – SB	Sanbe Farma
1348. TYSINOL	Medion Farma Jaya
1349. ULTRA – PEL	Uniscope Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
1350. ULTRADES PLUS	Biotek Indonesia
1351. ULTRADES	Biotek Indonesia
1352. ULTRALIN 45%	Biotek Indonesia
1353. ULTRAMIN	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
1354. ULTRAVIT M	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
1355. ULTRAXIDE	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1356. UNIMINERAL	Biotek Indonesia
1357. V – MAX	Phibro Animal Health Corp., USA/ Indovetraco Makmur Abadi
1358. VAKSIMUNE ANTHRAX	Vaksindo Satwa Nusantara
1359. VAKSIMUNE SE	Vaksindo Satwa Nusantara
1360. VALBAZEN 11.25% SUSPENSION	Interphill Laboratories Inc, Philipina/ Pfizer Indonesia
1361. VALOSIN FG 50	ECO Animal Health, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
1362. VALOSIN SOLUBLE	ECO Animal Health, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
1363. VANODOX	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
1364. VANOQUAT	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
1365. VERM – O BOLUS	Sanbe Farma
1366. VERM – O KAPLET	Sanbe Farma
1367. VERMIPRAZOL – 10%	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
1368. VET – CHOICE	Duta Kaisar Pharmacy

1369. VET – OXY LA	Sanbe Farma
1370. VET – OXY SB	Sanbe Farma
1371. VET – PENSTREP 4: ½	Duta Kaisar Pharmacy
1372. VET – PENSTREP 4:1	Duta Kaisar Pharmacy
1373. VET ADE FORTE	Duta Kaisar Pharmacy
1374. VET B – 1	Duta Kaisar Pharmacy
1375. VET B – 12	Duta Kaisar Pharmacy
1376. VET B – PLEKS	Duta Kaisar Pharmacy
1377. VET STREP	Medion Farma Jaya
1378. VETA CORYZEV	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1379. VETA CYPROCIN	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1380. VETA DINE	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1381. VETA FLOXA	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1382. VETA GUARD	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1383. VETA QUAT	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1384. VETADRYL INJEKSI	Sanbe Farma
1385. VETAMIX	Vetindo Citrapersada
1386. VETERDRYL	Duta Kaisar Pharmacy
1387. VETILAC 41% LACTOSA	Joosten, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi
1388. VETIODINE	Vetindo Citrapersada
1389. VETQIUN	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
1390. VETRIMOXIN 50 WS	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1391. VETRIMOXIN LA CLAS	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1392. VETRIMOXIN LA	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1393. VEYXYL LA 20%	Veyx Pharma GmbH – Jerman/ Tri Dinamika Nusantara
1394. VIAMIN – 34 INJECTION	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1395. VIBA ZONE	Samu Median, Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
1396. VIDONE	Sanbe Farma
1397. VIGANTOL E	Bayer Korea, Ltd, Korea/Bayer Indonesia
1398. VIGO VIT	Hendy Pharmino Satwa
1399. VIGOSINE	Ceva Sante Animale/Ceva Animal Health Indonesia
1400. VIMMUNE	Jordan Golden Rose for Medical oils Ltd./ Biotek Indonesia
1401. VIRA SHIELD 4	Novartis Animal Health US, Inc/Paeco Agung
1402. VIRA SHIELD 6	Novartis Animal Health US, Inc/Paeco Agung
1403. VIRAKIL NG	Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1404. VIRBAMEC LA	Virbac Lab, Brazil untuk Virbac SA., Perancis/ Emvi Indonesia
1405. VIREX	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1406. VIRIDAN	Vaksindo Satwa Nusantara

1407. VIRKON S.....	Antec International-DuPont Company, Inggris/ SHS International
1408. VIROCID.....	CID Lines, Belgia/SHS International
1409. VIROGUARD.....	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1410. VIROPHOR.....	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1411. VIROTEC.....	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1412. VIRTOX.....	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
1413. VIRUCIDAL EXTRA.....	AVS, Irlandia Utara/Agro Makmur Sentosa
1414. VIRUKILL.....	ICA Laboratories, South Africa/ Novindo Agritech Utama
1415. VIRUS KLIN.....	Katraco Santika
1416. VIT – ECO.....	Tekad Mandiri Citra
1417. VIT AD3 E 300 INJ.....	Kepro bv, Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa
1418. VIT GEMUK (SAPI + KAMBING).....	Sinar Harapan, UD
1419. VITA SOLE.....	Trouw Nutrition Indonesia
1420. VITAKUR.....	Vaksindo Satwa Nusantara
1421. VITAL CHORUS – FORTE.....	KBNP, Inc, korea/Blue Sky Biotech
1422. VITAL PREMIX.....	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia
1423. VITALINK SVM 105 SWINE PRE – STARTER PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1424. VITALINK SVM 205 SWINE STARTER PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1425. VITALINK SVM 305 SWINE GROWER PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1426. VITALINK SVM 405 SWINE FINISHER PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1427. VITALINK SVM 505 SWINE GESTATION PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1428. VITALINK SVM 605 SWINE GESTATION PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1429. VITALINK SVM 705 SWINE PREMIX.....	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1430. VITAMIN AD3E PANTEX INJECTABLE.....	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1431. VITAMIN AD3E.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1432. VITAMIN B COMPLEX-S INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1433. VITAMIN B12 INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1434. VITAMIN B6 INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1435. VITAMIN E SELLENIUM.....	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
1436. VITAMINOACIDOS.....	Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
1437. VITAMIX INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1438. VITARAL.....	Biotek Indonesia
1439. VITARAL PLUS.....	Biotek Indonesia

1440. VITASOL-E	Biotek Indonesia
1441. VITLECT XP	Trouw Nutrition Indonesia
1442. VITOL – 140	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1443. VITOSELEN	Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech
1444. WATER TREATMENT	Nutri-Ad International bvba, Belgia/ Kalbe Farma Tbk
1445. WHEAT EASE – M (LIQUID)	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals
1446. WHEAT EASE – M (POWDER)	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals
1447. WIDECILLIN FINE GRANULES 10%	Meiji Indonesia Pharmaceutical
1448. WIDECILLIN FINE GRANULES 20%	Meiji Indonesia Pharmaceutical
1449. WONDER IODINE SPRAY	Wonderindo Pharmatama
1450. WONDER IVERMEC INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1451. WONDER TRIMETHOPRIM	Wonderindo Pharmatama
1452. WONDER VITAMIN B1 INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1453. WOOGENE COLISTIN 150	WooGene B&G, Korea/Novindo Agritech Utama
1454. WORMECTIN INJEKSI	Medion Farma Jaya
1455. WORMINEX 10% LIQUID	Kepro B.V., Holland, Belanda/ Otasindo Prima Satwa
1456. WORMNIL	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
1457. WORMZOL B	Medion Farma Jaya
1458. WORMZOL K	Medion Farma Jaya
1459. X – TRA ALBENDAZ	Cakar Mas
1460. X – TRA MOXICOL	Cakar Mas
1461. X – TRA TRISULF	Cakar Mas
1462. XYL A	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1463. YEA – SACC 1026	Alltech Inc., USA; Alltech Biotechnology Corp. Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia
1464. YEA – SACC TS	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1465. YIDUOZYME 9180	Guangdong VTR Bio-tech Co. Ltd. China/ Agrinusa Jaya Santosa
1466. YIDUOZYME 9681	Guangdong VTR Bio-tech Co. Ltd.China/ Agrinusa Jaya Santosa
1467. YIDUOZYME P – 8601	Agrinusa Jaya Santosa
1468. YODOR – VEX	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatangguh
1469. YUCOMY – 20 – POWDER	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
1470. ZADOXYL	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1471. ZAGRIBIND	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia

1472. ZAGRO AD3EK	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1473. ZAGROSOL AD3E	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1474. ZAGROSOL B – COMPLEX	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1475. ZAGROSOL ES	Zagro Singapore Pte, Ltd/Zagro Indonesia
1476. ZAGROVIT E – 50	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1477. ZAGROVIT	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1478. ZALDES	Medion Farma Jaya
1479. ZETOX	Optivite International Ltd, UK/ Vetindo Citrapersada
1480. ZIBAGRAN G150	Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia
1481. ZINC BACITRACIN PREMIX 15%	Pucheng Lifechome Biochemistry, China/ SHS International
1482. ZODALBEN 12,5%	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1483. ZOOBETAMIN	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1484. ZOBIOTIC	Laboratorios Calier, S.A–Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1485. ZOOSOL AMINOSAL	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1486. ZOOSOL CALORVIT	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1487. ZOOSOL LISOVIT	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1488. ZYMPEX 006	Impextraco NV, Belgia/SHS International
1489. ZYMPEX 008	Impextraco NV, Belgia/SHS International

Unggas

1. 0.05% VITAMIN PREMIX FOR LIVESTOCK	Qingdao Mingzhu Pharmaceutical Co., Ltd/ Lito Prima Mandiri
2. ABREUVAL TABLET	Ceetal Laboratories – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
3. ACIDAL ML	Impextraco NV, Belgia/SHS International
4. ADE SOLE	Trouw Nutrition Indonesia
5. ADEMIN LIQUID	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
6. ADENIPRAVAC ND/IB	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
7. ADENIPRAVAC TRIPLE	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
8. ADETROVIT	Caprifarmindo Labs.
9. ADEVIT OS	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
10. ADVANTAGE 256	Preserve International, Amerika Serikat/ Agrinusa Jaya Santosa

11.	AE VAC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
12.	AE + POX.....	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
13.	AE	AAKO BV-Belanda/SHS International
14.	AE-POXINE	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
15.	AGNERAL.....	Agro Makmur Sentosa
16.	AGRI – QUAT	Agro Makmur Sentosa
17.	AGRICARIVIT.....	Agrinusa Jaya Santosa
18.	AGRICID	Agrinusa Jaya Santosa
19.	AGRICOX – 10	Agro Makmur Sentosa
20.	AGRIGERM 2000	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
21.	AGRIMINOVIT.....	Agrinusa Jaya Santosa
22.	AGRIMIX BRO.....	Agrinusa Jaya Santosa
23.	AGRIMIX.....	Agrinusa Jaya Santosa
24.	AGRISELVIT.....	Agrinusa Jaya Santosa
25.	AGRISOL	Agrinusa Jaya Santosa
26.	AGRITOP.....	Romindo Primavetcom
27.	AGRIVIT POWER	Agrinusa Jaya Santosa
28.	AGRIVITERAL.....	Agrinusa Jaya Santosa
29.	AGRIWORM LIQUID	Biotek Indonesia
30.	AGRIWORM.....	Biotek Indonesia
31.	AGRIXINE SOLUTION	Agrinusa Jaya Santosa
32.	AGRIXINE	Agrinusa Jaya Santosa
33.	ALBEN – 10	Sumber Multivita
34.	ALBENDAZOL 10% GANADEXIL	Industrial Veterinaria SA, - Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
35.	ALBENDAZOLE 16%.....	Tekad Mandiri Citra
36.	ALBENMAS.....	Mensana Aneka Satwa
37.	ALDEKOL DES FF	EWABO CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG, Germany/Sehat CeraH Indonesia
38.	ALLCIDE.....	SHS International
39.	AMBIFLUD TRIAZIN.....	Vetanco S.A., Argentina/Pakan Serasi
40.	AMCO CHICKS	Hendy Pharmindo Satwa
41.	AMCOL	Meiji Indonesia Pharmaceutical
42.	AMIDURENE.....	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
43.	AMINOLIFE POULTRY WS.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
44.	AMINOSOL.....	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
45.	AMINOVIT	Medion Farma Jaya
46.	AMINOVITAL SOLUTION.....	Bimeda Chemicals Export, Irelandia/ Vetindo Citrapersada
47.	AMINOVITAMIN	Vetoquinol S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
48.	AMIVAKSICOL	Agrinusa Jaya Santosa
49.	AMOXCOL.....	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
50.	AMOXICILLIN 50% SOLUBLE POWDER	Y.S.P.Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
51.	AMOXICOL	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri

52.	AMOXIN	Pyridam Veteriner
53.	AMOXISOL	Medreich Limited, India/Pfizer Indonesia
54.	AMOXITIN	Medion Farma Jaya
55.	AMOXY – 50	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
56.	AMOXYCILLIN WSP 15%	Dopharma-Netherland/SHS International
57.	AMPHIMIX	Kalbe Farma Tbk
58.	AMPIBIO	Sanbe Farma
59.	AMPICILLIN – 10	Katraco Santika
60.	AMPICOL	Medion Farma Jaya
61.	AMPIVAKSICOL	Agrinusa Jaya Santosa
62.	AMPIVET 24	Vetindo Citrapersada
63.	AMPIXIL	Romindo Primavetcom
64.	AMPROL 12%	Merial/Romindo Primavetcom
65.	AMPROL 20%	SHS International
66.	AMPROLIN – 300 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
67.	AMPROLIUM 20% WS	Katraco Santika
68.	AMPROMIX 25	Romindo Primavetcom
69.	AMPROSOL 20	Romindo Primavetcom
70.	AMPUCOCCIN – S	Korea Thumb Vet/SHS International
71.	ANCOMYCIN 200 LA	ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara
72.	ANCOXIN	ANUPCO, Inggris/Lito Bina Medikantara
73.	ANFLOX GOLD	Anupco, Inggris/Lito Bina Medikantara
74.	ANTHELMIN ORAL	S.P.Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
75.	ANTI COLD	Wonderindo Pharmatama
76.	ANTIGERMEN FORTE	IQF SA, Argentina/Biotek Sarana Industri
77.	ANTIKOKSI	Medion Farma Jaya
78.	ANTIPAR 500	AAKO BV, Belanda/SHS International
79.	ANTISEP	Medion Farma Jaya
80.	APRALAN SOLUBLE	Elanco Animal Health, USA/SHS International
81.	AQUADEX B SOLUTION	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
82.	AQUADEX C FORTE II	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
83.	ASABEN	Avian Satwa Anugrah
84.	ASADINE	Avian Satwa Anugrah
85.	ASADOXIN	Avian Satwa Anugrah
86.	ASAGUMED	Avian Satwa Anugrah
87.	ASAPRIM	Avian Satwa Anugrah
88.	ASAPRO	Avian Satwa Anugrah
89.	ASCAREX	Sumber Multivita
90.	ASCARIN	Pyridam Veteriner
91.	ASCOGEN	Chemo Forma AG, Switzerland/SHS International
92.	ASEPTIC SOLUTION LIQUID	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
93.	ASTRESVIT	Agrinusa Jaya Santosa
94.	ATIQUEINE P.18	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa

95. AVABRON HN – 63	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
96. AVAILA Cr 1000.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
97. AVAILA Cu 100.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
98. AVAILA Fe 100.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
99. AVAILA Mn 80	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
100. AVAILA Se 1000.....	Zinpro Corp. – USA/Behn Meyer Chemicals
101. AVANTE INJECTION.....	KNBP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
102. AVAPOX	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
103. AVI IB H120	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
104. AVI IBD Inter.....	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
105. AVI ND LaSota + IB H120.....	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
106. AVI ND LaSota.....	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
107. AVIAN INFECTIOUS CORYZA VACCINE, INACTIVATED	QYH Biotech Company Limited, China/ Lito Prima Mandiri
108. AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5 SUBTYPE, N28 STRAIN)	Zhaoqing Dahuanong Biology Medicine Co., Ltd China/ Vetindo Citrapersada
109. AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5N2 SUBTYPE)	Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia
110. AVICILINA PLUS	S.P. Veterinaria SA, Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
111. AVICOC.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
112. AVIDEGG.....	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
113. AVIEGG EXTRA.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
114. AVIFFA RTI.....	Merial/Romindo Primavetcom
115. AVIFLOX – 10 LIQUID	Avindo Perdana Bahtera Mulia
116. AVIFLOX 10.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
117. AVILAC HE.....	Nutrifeed BV, Netherlands/SHS International
118. AVILITE	Avindo Perdana Bahtera Mulia
119. AVIMOX 12.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
120. AVIMOX 24.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
121. AVINEW FROZEN	Merial/Romindo Primavetcom
122. AVINEW.....	Merial/Romindo Primavetcom
123. AVIODINE.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
124. AVIPRO 101 CORYZA	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
125. AVIPRO 104 MG BACTERIN.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
126. AVIPRO 105 ND CHICK	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
127. AVIPRO 105 ND	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
128. AVIPRO 106 REO	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
129. AVIPRO 108 FC4	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia

130. AVIPRO 109 SE4.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
131. AVIPRO 201 ND-IB.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
132. AVIPRO 202 ND-IBD.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
133. AVIPRO 221 ND-IB2.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
134. AVIPRO 331 ND-IB2-BD3.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
135. AVIPRO 432 ND-IB2-BD3-REO.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
136. AVIPRO AE TREMBLEX.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
137. AVIPRO IB H120.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
138. AVIPRO IB M 48.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
139. AVIPRO IBD XTREME.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
140. AVIPRO ILT.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
141. AVIPRO LT.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
142. AVIPRO MD RISPENS RL.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
143. AVIPRO MG F.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
144. AVIPRO ND B1.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
145. AVIPRO ND B1.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
146. AVIPRO ND C131.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
147. AVIPRO ND HB1.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
148. AVIPRO ND LASOTA.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
149. AVIPRO ND VISOTA.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
150. AVIPRO ND-IB LASOTA.....	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
151. AVIPRO ND-IB POLYBANCO.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
152. AVIPRO ND-IB SOHOL.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
153. AVIPRO POX CEO.....	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia

154. AVIPRO POX TC	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
155. AVIPRO POX	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
156. AVIPRO REO	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
157. AVIPRO THYMOVAC	Lohmann Animal Health GmbH, Jerman/ Lohmann Animal Health Indonesia
158. AVIPRO VIBURSA CE	Lohmann Animal Health International, USA/ Lohmann Animal Health Indonesia
159. AVIQUIN 25	Avindo Perdana Bahtera Mulia
160. AVISTRESS	Romindo Primavetcom
161. AVIT	Aves
162. AVITONIC – WSP	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
163. AVITROL	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
164. AVITRYL – 10 INJECTION	AVICO/Maju Farma Indonesia
165. AVITRYL ORAL SOLUTION	AVICO/Maju Farma Indonesia
166. AVIXIN	AVICO/Maju Farma Indonesia
167. B – COM	Aves
168. B – COMPLEX	Wonderindo Pharmatama
169. B – PLEX INJ	Pyridam Veteriner
170. BAK IB	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
171. BAK IC	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
172. BAK ND + EDS + IB	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
173. BAK ND + EDS	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
174. BAK ND + IB	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
175. BAK ND + IB	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
176. BAK ND + IBD	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
177. BAK ND	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
178. BAL IB H120	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
179. BAL IB H52	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
180. BAL IBD	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
181. BAL ILT	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
182. BAL ND + IB	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
183. BAL ND Clone	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
184. BAL ND Lasota	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
185. BAL POX	Bestar Lab., Singapura/Ekasapta Wijayatanggung
186. BAYCOX 2,5%	OLIC (Thailand) Limited, Thailand untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia
187. BAYTRIL 10 %	OLIC (Thailand) Limited Thailand, untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia
188. BENCHLOR	Fatro S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
189. BENZADES	Sanbe Farma
190. BENZAKLIN	Tekad Mandiri Citra
191. BENZALKONIUM CHLORIDE 10%	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
192. BENZALVAKS	Agrinusa Jaya Santosa
193. BENZALVET – 10	Mitravet
194. BENZOGARD	Avindo Perdana Bahtera Mulia

195. BERCOX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
196. BERNOQUIN	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
197. BERNOVIT	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
198. BESTAQUAM	China Bestar Laboratotium Ltd, Taiwan/ SHS International
199. BESTLYTES	China Bestar Laboratories, Taiwan/ Ekasapta Wijayatanggung
200. BETAMINT	Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
201. BETAMOX – LA	Norbrook Lab-UK/SHS International
202. BIAMINTHC 5%	Laboratories Biove, Perancis/SHS International
203. BIAPRIM BUENABLE	Laboratories Biove, Perancis/SHS International
204. BICOVAC	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
205. BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND+ IB + IBD)	Merial/Romindo Primavetcom
206. BINEWVAX 0,3	Merial/Romindo Primavetcom
207. BINEWVAXIDROP	Merial/Romindo Primavetcom
208. BIO – PLUS	Mitravet
209. BIO – SELEVIT E FEED ADDITIVE	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
210. BIO – SELEVIT E	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
211. BIO – STRONG	Sanbe Farma
212. BIO – TETRA 200 LA	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya Dinamika Mandiri Sejati Primatama
213. BIO – VITAMIN AD3E	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
214. BIO DINE	Biotek Indonesia
215. BIO LEUCO	Biotek Indonesia
216. BIO LEUCO	Biotek Indonesia
217. BIO NEO	Biotek Indonesia
218. BIO QUAT 20	Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa
219. BIO TOLTRA 2.5	Biotek Indonesia
220. BIO TOLTRA 2.5	Biotek Indonesia
221. BIO TYFLOX – S	Biotek Indonesia
222. BIOCET DRY	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
223. BIOCID 30	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
224. BIOCILIN	Eka Farma
225. BIOCIN	Biotek Indonesia
226. BIOCOLD	Biotek Indonesia
227. BIOCIX	Alpharma, Inc, USA/Satwa Jawa Jaya
228. BIODAN PLUS	Agrinusa Jaya Santosa
229. BIODAN	Vaksindo Satwa Nusantara
230. BIODES – 100	Mensana Aneka Satwa
231. BIODES FORTE	Mensana Aneka Satwa

232. BIODIN.....	Romindo Primavetcom
233. BIOFLOX – 20	Biotek Indonesia
234. BIOGEL.....	CID Lines NV., Belgia/SHS International
235. BIOGREEN	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
236. BIOGREEN	Laboratories Biove, USA/SHS International
237. BIOMAREK HVT	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
238. BIOMAX – 12	Sumber Multivita
239. BIOMIN C – Ex.....	iomini/Romindo Primavetcom
240. BIOMIN IMBO.....	Biomini/Romindo Primavetcom
241. BIOMINOVIT	Agrinusa Jaya Santosa
242. BIOMOX – 20	Biotek Indonesia
243. BIOMYTOX PLUS	Biotek Indonesia
244. BIOPHENE.....	Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa
245. BIOPLEX COPPER.....	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
246. BIOPLEX IRON	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
247. BIOPLEX MANGANESE.....	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
248. BIOPLEX ZINC	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
249. BIOPROL – 20.....	Biotek Indonesia
250. BIOPUR.....	Laboratorium Biove, Perancis/SHS International
251. BIOQUIN – 20	Biotek Indonesia
252. BIORAL H120	Merial/Romindo Primavetcom
253. BIOSAN – TP ORAL.....	Sanbe Farma
254. BIOSEPT	Bio-Pharmachemie Co., Ltd., Vietnam/ Vietindo Jaya/Dinamika Mandiri Sejati Primatama
255. BIOSOLAVET	Duta Kaisar Pharmacy
256. BIOSTRESS.....	Vaksindo Satwa Nusantara
257. BIOVAC LS-H120.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
258. BIOVAK B1	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
259. BIOVAK LASOTA	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
260. BIOVIT	Sanbe Farma
261. BIOVITON	Biotek Indonesia
262. BIOVITON POWDER EFFERVESCENT	Biotek Indonesia
263. BIOXAN	Agro Makmur Sentosa
264. BIOZINK WSL.....	Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade
265. BIRD CLOSE 5.1	IPB SHIGETA Animal Pharmaceuticals
266. BISEPTYL	SYVA Laboratorios, Spain/ Avindo Perdana Bahtera Mulia Farma Jaya
267. BIVAC II	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
268. BLOOM & GROW	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
269. BLUE ROYALE	Anitox Corp-USA/SHS International
270. BMD SOLUBLE.....	Alpharma, Inc, USA/Satwa Jawa Jaya
271. BNE-VAC	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet
272. BNE-VAC	Choong Ang Vaccine Lab. – Korea/Sanbe Farma
273. BRO – GESAT	Sanbe Farma
274. BROILER FASGROW	Otasindo Prima Satwa
275. BROILER FORMULA	Sumber Multivita
276. BROILER VITA.....	Medion Farma Jaya

277. BROILERMUNE.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
278. BROILERTRAKE-M.....	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
279. BROMOQUAD 10	SHS International
280. BROMOQUAD 50	AAKO BV, Belanda/SHS International
281. BRONCHIN.....	AAKO BV-Belanda/SHS International
282. BRONCHITIS MASS (BRON MASS).....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
283. BRONHIKAL SPF.....	Genera, Inc., Croatia/Sehat Cerah Indonesia
284. BRONIPRA – 1.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
285. BRONIPRA – ND.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
286. BRONIPRA – ND/IBD.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
287. BRONKICHIK.....	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
288. BRONKI-L.....	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
289. BROTIGAN.....	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
290. BROVITGRIN.....	Agrinusa Jaya Santosa
291. BUR 706	Merial/Romindo Primavetcom
292. BURCELL HVT.....	Merial/Romindo Primavetcom
293. BURSA BLEN M.....	Merial/Romindo Primavetcom
294. BURSA-MEX.....	Laboratorio Avimex SA de Mexico/ Satwa Jawa Jaya
295. BURSAPLEX	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
296. BURSA-VAC.....	Schering-Plough animal Health, USA/ Pimaimas Citra
297. BURSA-VAC 3	Schering-Plough animal Health, USA/ Pimaimas Citra
298. BURSIMUNE.....	Biomune Co., USA/Ceva Animal Health Indonesia
299. BURSINE – 2.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
300. BURSINE – K.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
301. BURSINE N – K.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
302. BURSINE PLUS.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
303. BUTAPHOS – B INJECTION.....	Samyang Anipharma C Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
304. BUTOX 50.....	Intervet Intl. GmbH, Jerman/Intervet Indonesia
305. C – SAN	Sanbe Farma
306. CACING EXITOR.....	Medion Farma Jaya
307. CALAVAC BRONCHITIS (H 120).....	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
308. CALAVAC GUMBORO	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
309. CALAVAC NEWCASTLE	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
310. CALAVAC NEWCASTLE LASOTA (LaSota + H120).....	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
311. CALAVAC POWL POX.....	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
312. CALGOPHOS.....	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia

313.	CALVITA.....	Medion Farma Jaya
314.	CAPRI – ALBEND.....	Caprifarmindo Labs.
315.	CAPRI – CHICKS	Caprifarmindo Labs.
316.	CAPRIBRO.....	Caprifarmindo Labs.
317.	CAPRICOLI.....	Caprifarmindo Labs.
318.	CAPRICOXI.....	Caprifarmindo Labs.
319.	CAPRIDES	Caprifarmindo Labs.
320.	CAPRIMOX.....	Caprifarmindo Labs.
321.	CAPRIMUN – E	Caprifarmindo Labs.
322.	CAPRINIL	Caprifarmindo Labs.
323.	CAPRIPROVIT	Caprifarmindo Labs.
324.	CAPRIRAZIN	Caprifarmindo Labs.
325.	CAPRIVAC AI-K.....	Caprifarmindo Labs.
326.	CAPRIVAC IBD-K.....	Caprifarmindo Labs.
327.	CAPRIVAC NBG-K	Caprifarmindo Labs.
328.	CAPRIVAC NB-K	Caprifarmindo Labs.
329.	CAPRIVAC ND AI-K.....	Caprifarmindo Labs.
330.	CAPRIVAC ND-K.....	Caprifarmindo Labs.
331.	CAPRIVAC NE-K	Caprifarmindo Labs.
332.	CAPRIVAC NG-K.....	Caprifarmindo Labs.
333.	CAPRIVIT B12 Inj.	Caprifarmindo Labs.
334.	CAPRIVIT Inj.....	Caprifarmindo Labs.
335.	CAPRIVIT	Caprifarmindo Labs.
336.	CAPZURIL	Caprifarmindo Labs.
337.	CARISID.....	Romindo Primavetcom
338.	CARMAVIT.....	Mensana Aneka Satwa
339.	CARNIBROVIT	Agro Makmur Sentosa
340.	CARNIFAST.....	Otasindo Prima Satwa
341.	CARNYVIT.....	Agrinusa Jaya Santosa
342.	CARVITA – 15.....	Mitravet
343.	CEMOXIN	Agro Makmur Sentosa
344.	CENTRA – TYLO SOLUBLE	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
345.	CENTRE-IVERMEC	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
346.	CENTRE – NEOMY SOLUBLE	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
347.	CENTRE – TYLO PREMIX 25%.....	Aether Centre (Beijing) Biology Co., Ltd/ CV. Fenanza Putera
348.	CERESTOP.....	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
349.	CEVAC BROILER ND K.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
350.	CEVAC BRON 120 L.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
351.	CEVAC CORYMUNE 4 K.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
352.	CEVAC CORYMUNE 7 K.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia

353. CEVAC FP L.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
354. CEVAC GUMBO L	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
355. CEVAC IBD L	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
356. CEVAC LT L.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
357. CEVAC MD HVT & RISPENS	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
358. CEVAC MD RISPENS	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
359. CEVAC MG F	Ceva Saude Animale Ltda, Brazil/ Ceva Animal Health Indonesia
360. CEVAC NB L.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
361. CEVAC ND EDS K	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
362. CEVAC ND IB EDS K	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
363. CEVAC ND IB K.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
364. CEVAC ND IBD K	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
365. CEVAC NEW K.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
366. CEVAC NEW L	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
367. CEVAC TRANSMUNE IBD.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
368. CEVAC TRANSMUNE.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
369. CEVAC VITABRON L.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
370. CEVAC VITAPEST L.....	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
371. CEVAZURIL.....	Ceva Sophavet, Maroko/ Ceva Animal Health Indonesia
372. CHEIL COLISTIN.....	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
373. CHEIL TYLOSIN – 100	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
374. CHICK N – K	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
375. CHICK N POX TC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
376. CHICKOFIT	Romindo Primavetcom
377. CHICKOPEST	Merial/Romindo Primavetcom
378. CHICKTONIC	Industrial Veterinaria., SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
379. CHLORTETRACYCLINE – 25	Katraco Santika
380. CHOLARAINOL.....	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom

381.	CHOLERIN TRIPLE	AAKO BV-Belanda/SHS International
382.	CHOLINE CHLORIDE 50%.....	Kolin Chemical, Korea/Bright International
383.	CHOLINE CHLORIDE 60%.....	Kolin Chemical, Korea/Bright International
384.	CHOLINE CHLORIDE 75%.....	Kolin Chemical, Korea/Bright International
385.	CID 2000.....	CID Lines NV, Belgia/SHS International
386.	CIPERGEN.....	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
387.	CIPLOX 10% W/V	Cipla, Ltd., India/Paeco Agung
388.	CIPRO – 12	Mitravet
389.	CIPROCAP	Caprifarmindo Labs.
390.	CIPROFLOX – 100 SP	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
391.	CIPROLON.....	Tekad Mandiri Citra
392.	CIPROMAS	Mensana Aneka Satwa
393.	CIPROMED	Sanbe Farma
394.	CIPROPAN	Sinar Harapan, UD
395.	CIPROSIN EXTRA	Mitravet
396.	CIPROVAKS	Vaksindo Satwa Nusantara
397.	CIPROVAKS	Vaksindo Satwa Nusantara
398.	CIPROVET	Vetindo Citrapersada
399.	CIPROXACIN	Pyridam Veteriner
400.	CIPROXAN	Otasindo Prima Satwa
401.	CIRCOMUNE W	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
402.	CIRCOMUNE.....	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
403.	CJ PROSIN	Cheil Jedang Indonesia
404.	CJ PROTIDE.....	Cheil Jedang Indonesia
405.	CLEANATOR.....	Wonderindo Pharmatama
406.	CLEANUP – F	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
407.	CLINAFARM SMOKE	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
408.	CLINAFARM SPRAY	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
409.	CLINIC PLUS.....	PT. Multifarma Satwa Maju
410.	CM – PREMIX	Sanbe Farma
411.	COCCICHEM WS.....	Dae Sung Microbiological Labs-Korea/ Saka Menara Alam
412.	COCCILIN CAPSUL.....	Wonderindo Pharmatama
413.	COCCILIN WATER SOLUBLE POWDER.....	Wonderindo Pharmatama
414.	COCCIMASTER	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
415.	COCCIN.....	Agro Makmur Sentosa
416.	COCCIPLUS.....	Agrinusa Jaya Santosa
417.	COCCIREX	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
418.	COCCIROL S	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi

419. COCCISOL	Biotek Indonesia
420. COCCIVAC – D.....	Intervet Inc., USA/Intervet Indonesia/ Pimaimas Citra
421. COCCIVET	Mitravet
422. COCCIVEX	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
423. COCCIVIT.....	SHS International
424. COCCOXIN.....	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
425. COCOSTOP PLUS	Tithearn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
426. COFALYSOR INJECTION	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
427. COFAVIT 500	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
428. COLA – FLOXA LIQUID	Agro Makmur Sentosa
429. COLA FLOXA.....	Agro Makmur Sentosa
430. COLAMOX 200	Sanbe Farma
431. COLERAX.....	Agro Makmur Sentosa
432. COLI – OXY	Pyridam Veteriner
433. COLIBACT INJEKSI	Sanbe Farma
434. COLIBACT SOLUTION.....	Sanbe Farma
435. COLIBACT.....	Sanbe Farma
436. COLIMAS.....	Mensana Aneka Satwa
437. COLIMAX 100	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
438. COLIMIX – 20	MJPF Farma Indonesia
439. COLIMIX.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
440. COLIQUIN	Medion Farma Jaya
441. COLISID	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
442. COLISTAM.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
443. COLISTAN	Tekad Mandiri Citra
444. COLISTIN 10% MEIJI.....	Thai Meiji Pharmaceuticals Co, Ltd, Thailand/ Halim Sakti Pratama
445. COLIVET SOLUTION.....	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
446. COLIVET.....	Pyridam Veteriner
447. COLLIMEZYN.....	Medion Farma Jaya
448. COLMYC – E	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
449. COMFEED BROILER PREMIX 396 R.....	Centralys, Perancis/Japfa Comfeed Indonesia
450. COMFEED LAYER PREMIX 2962 R.....	Centralys, Perancis/Japfa Comfeed Indonesia
451. COMOXY 500 WSP	Better Pharma Co., Ltd., Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
452. CONC M 35	Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd, China/ SHS International
453. CONQUER POWDER	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
454. CONTRA – STRESS	PT. Multifarma Satwa Maju
455. CONTRAWORM – KAPSUL	Pyridam Veteriner
456. CONTRAWORM.....	Pyridam Veteriner

457. CORI-MEX	Laboratorio Avimex, SA de Mexico/ Satwa Jawa Jaya
458. CORIPRAVAC	Laboratorios Hipra SA, Spanyol/ Mensana Aneka Satwa
459. CORISIN – 24	Agro Makmur Sentosa
460. CORISIN	Agro Makmur Sentosa
461. CORITRIME	Avindo Perdana Bahtera Mulia
462. CORIVAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
463. CORYDON	Pyridam Veteriner
464. CORYMYCOL	Laboratories Biove, Perancis/SHS International
465. CORYVAX	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
466. CORYVIT WATER SOLUBLE POWDER	Wonderindo Pharmatama
467. CORYZA BIVALENT	Licensi Kitasato Institute, Jepang/SHS International
468. CORYZA OIL – 3	Fort Dodge Saude Animal, Brazil/Pfizer Indonesia
469. CORYZA	AAKO BV-Belanda/SHS International
470. CORYZAVAC KBL	Kyoto Biken Lab., Jepang/Agro Makmur Sentosa
471. COSUMIX PLUS 750	Shanghai Novartis Animal Health Ld, China/ Novartis Indonesia Novindo Agritech Utama
472. COTRIMAZINE	Tekad Mandiri Citra
473. COXABIC	AAKO BV, Belanda/SHS International
474. COXIXLIN	WOOGENE B&G, KOREA/Agro Makmur Sentosa
475. COXY FORTE	Medion Farma Jaya
476. COXY	Medion Farma Jaya
477. COXYMAS	Mensana Aneka Satwa
478. CRD 92	Coophavet Merial/Romindo Primavetcom
479. CRESOVEX – S	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
480. CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G	Wonderindo Pharmatama
481. CTC SOLUBLE	SDS Biotech-Singapore/SHS International
482. CUATS – 20	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
483. CUSTOM ANTISTRESS	Katraco Santika
484. CUSTOM VITAMIN	Katraco Santika
485. CYPER KILLER 25 WP	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
486. CYPROSIN	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
487. CYPROTYLOGRIN	Agrinusa Jaya Santosa
488. CYROMAS – 1%	Mensana Aneka Satwa
489. CYROMAS – 10%	Mensana Aneka Satwa
490. CYROMAZIN – 10	Samu Median Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
491. CYROZINE – 10	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
492. D – NOX	Sanbe Farma
493. DAIMETON B INJEKSI 20%	SHS International
494. DAIMETON SODIUM	Daichii Lab-Japan/SHS International

495.	DAVINOL.....	Tekad Mandiri Citra
496.	DENAGARD 20% INJECTION	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
497.	DENAGARD 45% WSG	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
498.	DERMASEPT IODE GEL.....	Ceetal Laboratoires – Perancis/ Tri Dinamika Nusantara
499.	DES HP	Hendy Pharmindo Satwa
500.	DESGRIN	Agrinusa Jaya Santosa
501.	DESIFUNG SOLUBLE	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
502.	DESINSEP	Medion Farma Jaya
503.	DESOGERM – 3A.....	Diasham–Singapura/SHS International
504.	DESPADAC	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
505.	DESTA – SAN	Sanbe Farma
506.	DESTACAP	Caprifarmindo Labs.
507.	DESTAN	Sanbe Farma
508.	DESTASID.....	Sanbe Farma
509.	DHN AVIAN INFLUENZA	Zhaoqing Dahuangong Biology Medicine Co., Ltd/ VACCINE, INACTIVATED Cakar Mas
510.	DIACOX	Sumber Multivita
511.	DIACOXIN WS	Diasham Pte Ltd, Singapore/SHS International
512.	DIAMIX MINERAL PREMIX.....	Diasham, Singapore/SHS International
513.	DIAMIX SUPER LAYER PREMIX	Diasham, Singapore/SHS International
514.	DICLACEV PREMIX	Cevasa SA, Argentina/Biotek Sarana Industri
515.	DICLACOX	AVICO/Maju Farma Indonesia
516.	DIFTOSEC CT.....	Merial/Romindo Primavetcom
517.	DIGESTON ANTHELMINTIC	Univetama Dinamika
518.	DIMETOPRIM ORAL POWDER....	Coophavet-Merial/Romindo Primavetcom
519.	DIMOXAN WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
520.	DINALON	Univetama Dinamika
521.	DINAPROL.....	Univetama Dinamika
522.	DINATRIM	Univetama Dinamika
523.	DINAZOL.....	Univetama Dinamika
524.	DM CID	Cid Lines, Belgia/SHS International
525.	DOC – VIT	Aves
526.	DOCTRIL	Medion Farma Jaya
527.	DOXCINE WATER SOLUBLE P	Better Pharma Co., Ltd., Thailand/ OWDER Indovetraco Makmur Abadi
528.	DOXERIN + ...	Mensana Aneka Satwa
529.	DOXERIN.....	Mensana Aneka Satwa
530.	DOXINYL	Industrial Veterinaria, SA, Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
531.	DOXITRA	Otasindo Prima Satwa
532.	DOXY – 500 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra

533. DOXY – PLUS	Katraco Santika
534. DOXY 10 WSP	Ewhapharmatek Corporation/SHS International
535. DOXYCAP	Caprifarmindo Labs.
536. DOXYCOL	Biotek Indonesia
537. DOXYCYCLINE – 10	Katraco Santika
538. DOXYCYCLINE 50% WSP	Dopharma BV., Belanda/ SHS International
539. DOXYMAS	Mensana Aneka Satwa
540. DOXYMAX	PT. Multifarma Satwa Maju
541. DOXYSOL – C	Dopharma BV., Belanda/SHS International
542. DOXYTIN	Medion Farma Jaya
543. DOXYVET	Medion Farma Jaya
544. DSC 1000	Antec International DuPont Company/ SHS International
545. DUFATRIM/SUL ORAL	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V- Belanda/Saka Menara Alam
546. DUFAVIT EXTRA ORAL	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V- Belanda/Saka Menara Alam
547. DUFAVIT INJ	Dutchfarm Veterinary Pharmaceuticals B.V- Belanda/Saka Menara Alam
548. DUOKO	Medion Farma Jaya
549. DUPONT BIOSOLVE PLUS	Antec International Ltd/ Dupont Agricultural Products Indonesia
550. DURACOL D	Agrinusa Jaya Santosa
551. DURACOX HC	Agrinusa Jaya Santosa
552. DURAVIT	Romindo Primavetcom
553. DYNE O MIGHT	Preserve International, Amerika Serikat/ Agrinusa Jaya Santosa
554. ECOFLEECE	Bimeda Chemicals Export, Irelandia/ Vetindo Citrapersada
555. ECOFOAM EXTRA	Kilco Internasional, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
556. EDS – VAC	Fort Dodge Saude Animal, Brazil/Pfizer Indonesia
557. EDS + NDV + IB	AAKO BV-Belanda/SHS International
558. EDS + NDV	AAKO BV-Belanda/SHS International
559. EDS NEW VAC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
560. EDS OLVAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
561. EDS VAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
562. EGG MASTER	Hendy Pharmindo Satwa
563. EGG PROMOTOR	Mensana Aneka Satwa
564. EGG STIMULANT	Medion Farma Jaya
565. ELECTRO – SAN	Sanbe Farma
566. ELECTROVIT	Sanbe Farma
567. EMBACOX	Romindo Primavetcom
568. ENC-BI-EDS VACCINE	Laboratorio Avimex, SA de Mexico/ Satwa Jawa Jaya
569. ENC-EDS VACCINE	Laboratorio Avimex, SA de Mexico/ Satwa Jawa Jaya

570. ENCIVAX	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
571. ENDURAN	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
572. ENFLOSIN ORAL SOLUTION.....	Y.S.P.Industries(M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
573. ENFLOX ORAL SOLUTION	Han Poong Industry Co. Ltd., Korea/ SHS International
574. ENOQUYL	Romindo Primavetcom
575. ENOXAN 10%	Romindo Primavetcom
576. ENOXIN	Romindo Primavetcom
577. ENPRO – 50 INJECTION	Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
578. ENPRO SOLUTION.....	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
579. ENRO – 10.....	Katraco Santika
580. ENRO – 21.....	Katraco Santika
581. ENRO CHICKS	Hendy Pharmindo Satwa
582. ENRO CHICKS	Hendy Pharmindo Satwa
583. ENRO FORTE	Mensana Aneka Satwa
584. ENROCIN ORAL SOLUTION	Pfizer Animal Health India Ltd., India/ Pfizer Indonesia
585. ENRODIAZ LIQUID	Avindo Perdana Bahtera Mulia
586. ENRODIAZ	Avindo Perdana Bahtera Mulia
587. ENROFOXACIN 100 G.....	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
588. ENROFOXACIN 100 MG.....	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
589. ENROMAS	Mensana Aneka Satwa
590. ENROSOL	Sumber Multivita
591. ENROTEN.....	Tekad Mandiri Citra
592. ENROTIL 10% SOL.....	Dae Sung Microbiological Labs-Korea/ Saka Menara Alam
593. ENROTIL 50 INJECTION	Dae Sung Microbiological Labs-Korea/ Saka Menara Alam
594. ENROVET.....	Univetama Dinamika
595. ENROXIN.....	Pyridam Veteriner
596. ENTEROCILLINE	AVICO/Maju Farma Indonesia
597. ENTEROVAX	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
598. ENTROCOLIN	Agro Makmur Sentosa
599. ENVACLOS.....	Romindo Primavetcom
600. EPIDELIN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
601. ERI – PLUS	Tekad Mandiri Citra
602. ERIDOKSIN	Sanbe Farma
603. ERITROMISIN – 25.....	Katraco Santika
604. ERYDOVAKS.....	Agrinusa Jaya Santosa
605. ERYMAX.....	PT. Multifarma Satwa Maju
606. ERYSUPRIM.....	Medion Farma Jaya
607. ERYTROGRIN HC.....	Agrinusa Jaya Santosa

608.	ERYTROMYCINE 80 G – DOXYCYCLINE 40 G	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
609.	ESB – 3 (30%)	Shanghai Novartis Animal Health Ltd, China/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
610.	ESP 8	Diasham Resources, Singapore/SHS International
611.	EXTRAGUARD	Avindo Perdana Bahtera Mulia
612.	EXTRAVIT	Mensana Aneka Satwa
613.	F VAX MG	Intervet Inc. (Merck Animal Health), USA/ Intervet Indonesia
614.	FARM FLUID S	Antec International DuPont Company/ SHS International
615.	FATROPRIM LA	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
616.	FATROVIT POULTRY WS	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
617.	FEEDMIX – B	Kalbe Farma Tbk
618.	FERROVET	Duta Kaisar Pharmacy
619.	FINIGEN	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
620.	FLOGISTAN	Bernofarm/Lestari Agisatwa Husada
621.	FLOXA M2P	Multi Meditas Pratama
622.	FLOXAMAS	Mensana Aneka Satwa
623.	FLOXAMYCINE	Agrinusa Jaya Santosa
624.	FLOXATRIL	PT. Multifarma Satwa Maju
625.	FLOXIDIN 10% INJ	Intervet India Pvt. Ld., India/Intervet Indonesia
626.	FLOXIDIN 10% INJ	Intervet India Pvt. Ld., India/Intervet Indonesia
627.	FLOXIDIN 10% ORAL SUSP	Intervet India Pvt. Ld., India/Intervet Indonesia
628.	FLOXINE	Avian Satwa Anugrah
629.	FLOXIVET	Univetama Dinamika
630.	FLS LIQUID	Trouw Nutrition Indonesia
631.	FLUBENOL 5%	Elanco Animal Health, Belgia/ Novindo Agritech Utama
632.	FLUBENZIM 5%	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
633.	FLUMISOL 10%	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
634.	FLUQUINE	Mensana Aneka Satwa
635.	FLY ZERO GRANULE	Samyang Anipharm Co, Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
636.	FORMADES	Medion Farma Jaya
637.	FORMALIN ACT	USFA, CV
638.	FORMULA HP	Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech
639.	FORMULA-1	Biotek Indonesia
640.	FORTEVIT	Medion Farma Jaya
641.	FORTICOAT – NL	Selko BV, Belanda/SHS International
642.	FOS – T	Biotek Indonesia
643.	OSBAC PLUS T	Bedson S.A. Argentina/Pakan Serasi
644.	FOSBAC	Bedson, Argentina/SHS International
645.	FOSTIGRIN	Agrinusa Jaya Santosa
646.	FOWL POX	Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/ Agrinusa Jaya Santosa

647. FUMISID	Sanbe Farma
648. FUNGEX	Anitox Corp-USA/SHS International
649. FV 2 A	Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd, China/ SHS International
650. FX PLUS 20 INJECTABLE	Laboratorio AVIMEX SA DE CV, Mexico/ SOLUTION
651. FX PLUS ORAL SOLUTION	Avindo Perdana Bahtera Mulia Laboratorio AVIMEX SA, DE, CV, Mexico/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
652. G – MICROCID	Otasindo Prima Satwa
653. GALLIMUNE 201 (IBD + REO)	Merial/Romindo Primavetcom
654. GALLIMUNE 203 (ND + IB)	Merial/Romindo Primavetcom
655. GALLIMUNE 301 (ND + IC2)	Merial/Romindo Primavetcom
656. GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS)	Merial/Romindo Primavetcom
657. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO)	Merial/Romindo Primavetcom
658. GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2)	Merial/Romindo Primavetcom
659. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD)	Merial/Romindo Primavetcom
660. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2)	Merial/Romindo Primavetcom
661. GALLIMUNE FLU H5N9	Merial/Romindo Primavetcom
662. GALLIMUNE IBD	Merial/Romindo Primavetcom
663. GALLIMUNE MG	Merial/Romindo Primavetcom
664. GALLIMUNE ND	Merial/Romindo Primavetcom
665. GALLIMUNE ND DAY OLD	Merial/Romindo Primavetcom
666. GALLIMUNE REO	Merial/Romindo Primavetcom
667. GALLIMUNE SE	Merial/Romindo Primavetcom
668. GALLIPRO®	Evonik Indonesia
669. GALLIVAC AE	Merial/Romindo Primavetcom
670. GALLIVAC Lasota	Merial/Romindo Primavetcom
671. GALLIVAC REO	Merial/Romindo Primavetcom
672. GANADEXIL	Industrial Veterinaria, SA, Spanyol/ ENROFLOXACINA 10% Agro Makmur Sentosa
673. GANASUPERVIT PLUS	Agro Makmur Sentosa
674. GENTA – 100	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
675. GENTADOX	AVICO/Maju Farma Indonesia
676. GENTAJECT 10%	Dopharma Int-Holland/SHS International
677. GENTAMIN	Medion Farma Jaya
678. GENTAMYCIN INJECT	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanguh
679. GENTAVET 50	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
680. GENTICOL – Inj	Sumber Multivita
681. GEORGIA STRAIN	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
682. GERM – IOD	Cenavisa SA, Spain/Lito Prima Mandiri
683. GLUTACAP	Caprifarmindo Labs.
684. GLUTACID	Hendy Pharmindo Satwa untuk Delta Prima Agrindo

685.	GLUTACID.....	Otasindo Prima Satwa
686.	GLUTACIDE.....	Delta Prima Agrindo
687.	GLUTADES.....	Sanbe Farma
688.	GLUTAMAS.....	Mensana Aneka Satwa
689.	GLUTANOL.....	Sanbe Farma
690.	GLUTARALDEHYDE 30%	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
	BENZALKONIUM CHLORIDE 20%	
691.	GPC 8.....	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
692.	GQ PLUS.....	Diasham Pte, Ltd, Singapura/SHS International
693.	GROFAS.....	Romindo Primavetcom
694.	GROGEL.....	Bio Science, USA/Pimaimas Citra
695.	GROW MORE.....	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
696.	GROWVIT.....	Eka Farma
697.	GUMB – VAC.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
698.	GUMBEX.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
699.	GUMBIN MB.....	AAKO BV-Belanda/SHS International
700.	GUMBOKAL SPF.....	Genera, Inc., Croatia/Sehat CeraH Indonesia
701.	GUMBONAL.....	Medion Farma Jaya
702.	GUMBOPEST.....	Merial/Romindo Primavetcom
703.	GUMBORIFFA 0,3.....	Merial/Romindo Primavetcom
704.	GUMBORO MB.....	AAKO BV-Belanda/SHS International
705.	HAEMOVAX 0,3.....	Merial/Romindo Primavetcom
706.	HEMATODIN.....	Romindo Primavetcom
707.	HEMATOPAN B12.....	Merial/Romindo Primavetcom
708.	HEMIDOX.....	Hendy Pharmindo Satwa
709.	HEMIDOX.....	Hendy Pharmindo Satwa
710.	HEMISOL.....	Hendy Pharmindo Satwa
711.	HENCOX.....	Hendy Pharmindo Satwa
712.	HEPARENOL.....	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
713.	HEPAVEX 200.....	Industrial Veterinaria, SA-Spanyol/ Agro Makmur Sentosa
714.	HEXADIN.....	Mitravet
715.	HEXAMAS.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
716.	HG – GEL VAC 3.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
717.	HG – GEL VAC.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
718.	HI – G PLUS.....	Kalbe Farma, Tbk
719.	HI – G.....	Kalbe Farma, Tbk
720.	HIDRO REX VITAL.....	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanggung
	AMINOACIDOS	
721.	HIMMVAC IB LIVE VACCINE.....	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
722.	HIMMVAC IBD LIVE VACCINE ...	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
723.	HIMMVAC IB-ND COMBINED OIL VACCINE.....	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
724.	HIMMVAC IB-ND-EDS COMBINED OIL VACCINE.....	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
725.	HIMMVAC ILT LIVE VACCINE	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech

726. HIMMVAC LASOTA LIVE VACCINE	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
727. HIMMVAC ND HIGH VACCINE ...	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
728. HIMMVAC ND OIL VACCINE.....	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
729. HIMMVAC ND-IB COMBINED LIVE VACCINE	KBNP Inc, Korea/Blue Sky Biotech
730. HIPRAGUMBORO – BPL2.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
731. HIPRAGUMBORO – CH/80.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
732. HIPRAGUMBORO – GM97.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
733. HIPRALONA – NOR S	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
734. HIPRAMIN – B	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
735. HIPRAMOX	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
736. HIPRAPOX	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
737. HIPRAVIAR – B1	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
738. HIPRAVIAR – BPL2	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
739. HIPRAVIAR – CLON	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
740. HIPRAVIAR – CLON/H120	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
741. HIPRAVIAR – ILT.....	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
742. HIPRAVIAR – ND BROILERS	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
743. HIPRAVIAR – S	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
744. HIPRAVIAR – S/H120	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
745. HIPRAVIAR – TRT4	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
746. HYPEROX.....	Antec International-A DuPont Company, Inggris/ SHS International
747. IB – OLVAC.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
748. IB H – 52.....	AAKO BV, Belanda/SHS International
749. IB H-120	AAKO BV-Belanda/SHS International
750. IBA VAC ST.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
751. IBA VAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
752. IBD + NDV + IB.....	AAKO BV-Belanda/SHS International
753. IBD BLEN	Merial-Select, USA/Romindo Primavetcom
754. IBD V877	Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/ Agrinusa Jaya Santosa
755. IBD-VAC	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet
756. IBD-VAC	Choong Ang Vaccine Lab. – Korea/Sanbe Farma
757. IB-VAC	Choong Ang Vaccine Lab. – Korea/Sanbe Farma
758. IC-VAC	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet
759. IC-VAC	Choong Ang Vaccine Lab. – Korea/Sanbe Farma
760. ILT	AAKO BV-Belanda/SHS International
761. ILT-VAC.....	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet
762. ILT-VAC.....	Choong Ang Vaccine Lab. – Korea/Sanbe Farma
763. IMEQUYL SOL 20%.....	Merial/Romindo Primavetcom
764. IMEQUYL	Romindo Primavetcom
765. IMOPEST.....	Merial/Romindo Primavetcom
766. INACTIVATED CORYZA VACCINE	Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd/ Sarana Veterinaria Jaya Abadi
767. INFECTIOUS BRONCHITIS H120, LIVE VACCINE	Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd/ Sarana Veterinaria Jaya Abadi

768. INFECTIOUS BRONCHITIS H-52	AAKO BV-Belanda/SHS International
769. INFECTIOUS BRONCHITIS H52, LIVE VACCINE	Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd/ Sarana Veterinaria Jaya Abadi
770. INFECTIOUS LARYNGO TRACHEITIS LIVE VACCINE (K137)	Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China/ Farmadika Sejahtera Indonesia
771. INJECTAMIN.....	Sanbe Farma
772. INMUGAL IBA GUMBORO.....	Laboratorios Ovejero SA. Spanyol/ Saka Menara Alam
773. INMUGAL VP LASOTA.....	Laboratorios Ovejero SA. Spanyol/ Saka Menara Alam
774. INOXYL ORAL SOLUTION.....	Laboratories Biove, Perancis/SHS International
775. INTERCIDE.....	Tekad Mandiri Citra
776. INTERFLOX – 100	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
777. INTERFLOX ORAL.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
778. INTERSPECTIN – L	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
779. INTERTRIM – 500 ORAL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
780. INTERTRIM LA.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
781. INTRA HYDROCARE.....	Intracare B.V, Belanda/Behn Meyer Chemicals
782. INTRACOX ORAL.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
783. INTRAMOX – 150 LA.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
784. INTRAMOX – 150	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
785. INTRAMOX – 200 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
786. INTROVIT – E – SELEN WS.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
787. INTROVIT – E – SELEN.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
788. INTROVIT 4 + WS.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
789. INTROVIT AD3E WS.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
790. INTROVIT ORAL.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
791. IODENE.....	Dupont, Amerika Serikat/Agro Makmur Sentosa
792. IODINACID.....	Multi Meditas Pratama
793. IODOPHORE 11,5%	AVICO/Maju Farma Indonesia
794. IODOSEPT	SHS International
795. IOGUARD – 300	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia

796. ISTAM 20%	Romindo Primavetcom
797. ISTAM 30%	Romindo Primavetcom
798. ISTAM.....	Romindo Primavetcom
799. ITA ND + IBD.....	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
800. ITA (NEW) ND	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
801. ITA ND + IB + EDS	Laprovect, Hungary/Ceva Animal Health Indonesia
802. IZOVAC B1 HITCHNER	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
803. IZOVAC CLONE.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
804. IZOVAC CORYZA 3	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
805. IZOVAC FC	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
806. IZOVAC FOWL – POX.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
807. IZOVAC GUMBORO 2	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
808. IZOVAC GUMBORO.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
809. IZOVAC H120 - LA SOTA.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
810. IZOVAC H120-B1 HITCHNER	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
811. IZOVAC IB H120	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
812. IZOVAC ILT	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
813. IZOVAC LASOTA.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
814. IZOVAC MG.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
815. IZOVAC ND	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
816. IZOVAC ND–BROILER	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
817. IZOVAC ND–EDS.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
818. IZOVAC ND–EDS–IB.....	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
819. IZOVAC ND–IBD	IZO S.r.l Italy/Lito Bina Medikantara
820. K VAC CHICKEN ND	Sinsui India Private Limited, India/ Farmadika Sejahtera Indonesia
821. K VAC CORYZA.....	Sinsui India Private Limited, India/ Farmadika Sejahtera Indonesia
822. K VAC ND	Sinsui India Private Limited, India/ Farmadika Sejahtera Indonesia
823. K VAC ND-IB.....	Sinsui India Private Limited, China/ Farmadika Sejahtera Indonesia
824. KALMIRAL.....	Kalbe Farma Tbk
825. KALMOXTIN	Kalbe Farma Tbk
826. KALOXY – VET	Kalbe Farma Tbk
827. KALVIMIX – RX	Kalbe Farma Tbk
828. KANAMEX	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
829. KANAMIN	Medion Farma Jaya
830. KANIVET.....	Duta Kaisar Pharmacy
831. KATRAMIX 325.....	Katraco Santika
832. KATRAMIX I	Katraco Santika
833. KATRAMIX II.....	Katraco Santika
834. KATRAMIX III.....	Katraco Santika
835. KATRIWORM.....	Otasindo Prima Satwa
836. KC – POL	Korchin, China/Farmadika Sejahtera Indonesia
837. KC PERMASOL.....	Kor-Chin Biotech Co., Ltd China/ Indovetraco Makmur Abadi
838. KEPCOX 2,5% ORAL.....	Kepro bv, Holland, Belanda/Otasindo Prima Satwa

839.	KEPROMEC ORAL	Kepro B.V., Holland, Belanda/ Otasindo Prima Satwa
840.	KICKSTART	CID Lines NV, Belgia/SHS International
841.	KILLWORM	Biotek Indonesia
842.	KISA SP	Indovetraco Makmur Abadi
843.	KITAMOXIN POWDER	Univetama Dinamika
844.	KLINO – MINERAL	Behn Meyer Chemicals
845.	KLINORIL	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
846.	KLORIN – GARD	Tekad Mandiri Citra
847.	KLORIVAKS	Agrinusa Jaya Santosa
848.	KLORIVAKS	Vaksindo Satwa Nusantara
849.	KOKCISAN 120 G	KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia/ Behn Meyer Chemicals
850.	KOKSIDEX	Medion Farma Jaya
851.	KOKSINDO	Otasindo Prima Satwa
852.	KOLAMOX LA INJECTION	Nutec, Inggis/Indovetraco Makmur Abadi
853.	KOLERIDIN K	Medion Farma Jaya
854.	KOLERIDIN	Medion Farma Jaya
855.	KOMAVET	Pusat Veterinaria Farma
856.	KUMARUK	Degepharm
857.	KURKUMAVIT	Mitravet
858.	KUTUTOX	Medion Farma Jaya
859.	LE-435	Vetindo Citrapersada
860.	LA SOTA MASS BLEN	Merial/Romindo Primavetcom
861.	LABRO	Kalbe Farma Tbk
862.	LAMOXI	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
863.	LARVAC	Neuva Eurobio Vaccini s.r.l., Italia/ Swadesi Candrasentosa
864.	LARVADEX 10% PREMIX	Novartis Animal Health Inc, Switzerland/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Hutama
865.	LARVAKILL 2%	Sanbe Farma
866.	LARVAKILL 10%	Sanbe Farma
867.	LARVASID – 10	Mitravet
868.	LARVATOX	Medion Farma Jaya
869.	LARYNGOTRACHEITIS, LIVE VACCINE	Harbin Pharmaceutical Group Bio Vaccine Co., Ltd/ Sarana Veterinaria Jaya Abadi
870.	LARYNGO-VAC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
871.	LASOTA + H-120	AAKO BV-Belanda/SHS International
872.	LASOTA STRAIN (NEWCASTLE DISEASE VACCINE)	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
873.	LASOTA	Laboratorio Avimex, SA de Mexico/ Satwa Jawa Jaya
874.	LASOTA	AAKO BV-Belanda/SHS International
875.	LAYERMUNE 2	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
876.	LAYERMUNE ND	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia

877. LAYERMUNE SE	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
878. LENTOVET	Pusat Veterinaria Farma
879. LEUCOMAS	Mensana Aneka Satwa
880. LEUCOSTOP	Tekad Mandiri Citra
881. LEVA – PLUS PREMIX	Sanbe Farma
882. LEVAGRIN	Agrinusa Jaya Santosa
883. LEVAMAS	Mensana Aneka Satwa
884. LEVAMID	Medion Farma Jaya
885. LEVAMISOLE POWDER	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
886. LEVAMIT – 125	Mitravet
887. LEVAMOL	Agrinusa Jaya Santosa
888. LEVANIAM	Tekad Mandiri Citra
889. LEVOCAP	Caprifarmindo Labs.
890. LEVOSTA	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
891. LG ACCENT	LG/CTCBio , Korea/Agro Makmur Sentosa
892. LIFE JACKET	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
893. LIFEGARD – T	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
894. LIFELINE	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
895. LIMOXIN – 200 LA	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
896. LIMOXIN – 25 SPRAY	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
897. LIMOXIN – 50	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
898. LINCO SP	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatangguh
899. LINCO SPECTIN 100 SOLUBLE .. POWDER	Pfizer Suzhou Animal Health, China/ Pfizer Indonesia
900. LINCO SPECTIN STERILE	Pfizer Suzhou Animal Health, China/ Pfizer Indonesia
901. LINSMYCIN SOLUBLE POWDER	Dong Bang Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
902. LIPTOBAC – L	Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/ Sehat Cera Indonesia
903. LIPTODRY	Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/ Sehat Cera Indonesia
904. LIPTOSAFE – L	Lipidos Toledo (LIPTOSA), SA, Spain/ Sehat Cera Indonesia
905. LIQAVITE	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
906. LISOVIT	Biomim/Romindo Primavetcom
907. LIVACOX Q	Biopharm, Republik Ceko/Swadesi Candrasentosa
908. LIVACOX T	Biopharm, Republik Ceko/Swadesi Candrasentosa
909. LIVE VACCINE (LASOTA+H120)	Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia
910. LONGLIFE 250 S	Antec International-DuPont Company, Inggris/ SHS International

911. LT – IVAX	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
912. LT BLEN.....	Merial/Romindo Primavetcom
913. LUCAROTIN 10% FEED	BASF Indonesia
914. MADIMPEX 10G.....	Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia
915. MALADEX.....	Medion Farma Jaya
916. MALAKILL.....	Otasindo Prima Satwa
917. MARATON.....	Pyridam Veteriner
918. MAREK DISEASE VACCINE (STRAIN CVI – 988).....	AAKO BV-Belanda/SHS International
919. MAREK RISPEN CVI 988 (MAREK’S DISEASE VACCINE LIVE CHICKEN HERPES VIRUS).....	Merial/Romindo Primavetcom
920. MAREK RISPEN CVI 988 + HVT ..	Merial/Romindo Primavetcom
921. MAREK’S DISEASE VACCINE, SEROTYPE 3, LIVE VIRUS/ MAREK’s HVT	Merial/Romindo Primavetcom
922. MARUKI CAIR	Degepharm
923. MARUKI SERBUK.....	Degepharm
924. MASABRO.....	Mensana Aneka Satwa
925. MASACHICKS	Mensana Aneka Satwa
926. MASAMIX SUPER.....	Mensana Aneka Satwa
927. MASAMIX	Mensana Aneka Satwa
928. MASAVIT.....	Mensana Aneka Satwa
929. MASQUIN.....	Mensana Aneka Satwa
930. MAVAX FOWL POX	Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada
931. MAVAX LA SOTA.....	Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada
932. MAVAX ND + EDS + IB.....	Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada
933. MAVAX ND.....	Malta Vaccines, Malta/Vetindo Citrapersada
934. MAXCARE BROILER.....	Trouw Nutrition Indonesia
935. MAXCARE.....	Trouw Nutrition Indonesia
936. MAXUS 200	Animal Health/SHS International
937. MAYYA TURBO TOX.....	Miavit GmbH, Jerman untuk XVET GmbH, Jerman/Indovetraco Makmur Abadi
938. MD – 09	Amlan International, Oil-Dri Corporation. USA/ Agri Trading Investment
939. MD – VAC CFL.....	Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/ Pfizer Indonesia
940. MEDIBIRD.....	Medion Farma Jaya
941. MEDISEP.....	Medion Farma Jaya
942. MEDITRIL K.....	Medion Farma Jaya
943. MEDIVAC ND – EDS – IB EMULSION	Medion Farma Jaya
944. MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION.....	Medion Farma Jaya
945. MEDIVAC ND – IB	Medion Farma Jaya
946. MEDIVAC ND – IB EMULSION	Medion Farma Jaya
947. MEDIVAC ND EMULSION 0.3	Medion Farma Jaya

948. MEDIVAC ND EMULSION	Medion Farma Jaya
949. MEDIVAC ND GUMBORO EMULSION	Medion Farma Jaya
950. MEDIVAC ND HITCHNER B1	Medion Farma Jaya
951. MEDIVAC ND LA SOTA	Medion Farma Jaya
952. MEDIVAC POX	Medion Farma Jaya
953. MEFISTO	Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk
954. MEGAVIT POULTRY	Vetindo Citrapersada
955. MELODY	Medion Farma Jaya
956. MENOROX LIQUID 20%	Nutec, Inggis/Indovetraco Makmur Abadi
957. METABOL INJ	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
958. METABOLASE	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
959. MFEED	Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara
960. MI – LAT	Katraco Santika
961. MIA – OVODUR	Miavit GmbH, Jerman/Behn Meyer Chemicals
962. MICROCID	Otasindo Prima Satwa
963. MICRODES 100	Otasindo Prima Satwa
964. MICROGEN FARM DESINFECTANT	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
965. MICROMINERAL POULTRY	Vetindo Citrapersada
966. MIKROSID	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
967. MINERAL FEED SUPPLEMENT-A	Medion Farma Jaya
968. MIRAL 8	Romindo Primavetcom
969. MIRAVIT	Caprifarmindo Labs.
970. MITACHICKS	Mensana Aneka Satwa
971. MITRAFLOX – 12	Mitravet
972. MITRAMET – 240	Mitravet
973. MITRAMIX – C®	Mitravet
974. MITRAMOX – 280	Mitravet
975. MITRAVIT – 100®	Mitravet
976. MIXOMEL	Nukamel, B.V, Belanda/Brenntag
977. MIXTROUVIT BLEND EGG 552	Trouw Nutrition Indonesia
978. MIXTROUVIT MIN EGG 552	Trouw Nutrition Indonesia
979. MIXTROUVIT MINERAL LAYER	Trouw Nutrition Indonesia
980. MIXTROUVIT VITAMIN LAYER	Trouw Nutrition Indonesia
981. MIXTROUVIT	Trouw Nutrition Indonesia
982. MONEVAXE – 20	Shandong Jinyang Biological pharmaceutical Co. Ltd., China untuk Hangzhou Invaxe Medical Technology Co. Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
983. MONEVAXE – 20	Shandong Jinyang Biological pharmaceutical Co. Ltd., China untuk Hangzhou Invaxe Medical Technology Co. Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
984. MOXACOL PLUS	Mensana Aneka Satwa
985. MOXACOL	Mensana Aneka Satwa
986. MOXYCOLGRIN HC	Agrinusa Jaya Santosa
987. MP – 10003A	Tianjin Chia Tai Feed Tech Co. Ltd., China/ SHS International

988. MT. X+	Olmix – Perancis/Tri Dinamika Nusantara
989. MULTI SOL – G	Cheil Bio Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
990. MULTICHICKS	Multifarma Satwa Maju
991. MULTICIDE 150	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
992. MULTICIDE	Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia
993. MULTIDES	Mensana Aneka Satwa
994. MULTIFLOX – 11	Multifarma Satwa Maju
995. MULTIMUNE K	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
996. MULTIMUNE K5	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
997. MULTISEPT	Multifarma Satwa Maju
998. MULTIVIT – CH	Kela Laboratories NV, Belgia/SHS International
999. MULTIVIT B COMP	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
1000. MULTIVIT	Pyridam Veteriner
1001. MULTIVITAMIN B COMPLEX	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1002. MUSCASID 10%	Kalbe Farma Tbk
1003. MYCO – BLOCK	Mitravet
1004. MYCOBACT	Sanbe Farma
1005. MYCOFIX PLUS 3.0	Biomim/Romindo Primavetcom
1006. MYCOFIX SECURE	Biomim/Romindo Primavetcom
1007. MYCOFIX SELECT 3.0	Biomim/Romindo Primavetcom
1008. MYCOMAS	Univet-Irlandia/Romindo Primavetcom
1009. MYCOSINDO	Otasindo Prima Satwa
1010. MYCOSORB	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1011. MYCOSTAT	Kiotechagil, United Kingdom/ Jebesen & Jessen Chemicals Indonesia
1012. MYCOSTATIN – 20	Novartis (Taiwan) Co. Ltd, Taiwan/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Hutama
1013. MYCOTACK LIQUID	Biotek Indonesia
1014. MYCOTACK	Biotek Indonesia
1015. MYCOTOX NG	Ceva Sante Animale SA, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1016. MYCOTOX	Ceva Sante Animale SA, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1017. MYCOVET PLUS	Vetindo Citrapersada
1018. MYVAC 202	Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/ Agrinusa Jaya Santosa
1019. NAMA VAC LAS-IB	Sinsui India Private Limited, India/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1020. NAMA VAC NDLAS	Sinsui India Private Limited, India/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1021. NATUPHOS 10.000 G	BASF Indonesia
1022. NATUSTAT	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1023. NATUZYME	Bioproton Pty. Ltd., Australia/Kalbe Farma Tbk
1024. NBLH - VAC	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet

1025. ND SINCO BRONVAC	Pasteur Institute, Romania/Agrinusa Jaya Santosa
1026. ND VACCINE LASOTA	AAKO BV, Belanda/SHS International
1027. ND VIRUS LASOTA AND IB	QYH Biotech Company Limited, China/
VIRUS 120 LIVE VACCINE	Lito Prima Mandiri
1028. NDG – VAC	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet
1029. NDLS – VAC	Choong Ang Vaccine Lab.-Korea/Mitravet
1030. NDV4HR	Malaysian Vaccine and Pharmaceuticals/
	Agrinusa Jaya Santosa
1031. NECTIN	AAKO BV-Belanda/SHS International
1032. NEDEVAC	Pasteur Institute, Romania/Agrinusa Jaya Santosa
1033. NEGUVON	Bayer Thai Co. Ltd, Thailand/Bayer Indonesia
1034. NEMOVAC	Merial/Romindo Primavetcom
1035. NEO – EGGOSTIM	Sanbe Farma
1036. NEO – MOXY	Hendy Pharmindo Satwa
1037. NEO – MOXY	Hendy Pharmindo Satwa
1038. NEO ANTISEP NEW FORMULA	Medion Farma Jaya
1039. NEO ANTISEP	Medion Farma Jaya
1040. NEO BLUE	Wonderindo Pharmatama
1041. NEO ERYDOVET – 25	Mitravet
1042. NEO MEDITRIL – I	Medion Farma Jaya
1043. NEO MEDITRIL – I	Medion Farma Jaya
1044. NEO MEDITRIL	Medion Farma Jaya
1045. NEO TERRAMYCIN 25	Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia
1046. NEO TERRAMYCIN 25	Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia
1047. NEO ULTRADES	Biotek Indonesia
1048. NEOAMP	MJPF Farma Indonesia
1049. NEOBRO	Medion Farma Jaya
1050. NEOCIN SOLUBLE POWDER	Dong Bang Co., Ltd, Korea/Blue Sky Biotech
1051. NEOFIL FORTE	Multifarma Satwa Maju
1052. NEOMIX 325	Pfizer Inc., Phillipina/Pfizer Indonesia
1053. NEOPRIDIMET	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1054. NEOTETRA – 50	Mitravet
1055. NEOVIT E 20% + Se	Neofarma, S.R.L, Italy/Sehat Cera Indonesia
1056. NEOXIN	Mensana Aneka Satwa
1057. NEPHRYL	Virbac SA., Perancis/Emvi Indonesia
1058. NEPOREX 2 WSG	Novartis Animal Health Inc, Swiss/
	Novartis Indonesia/Novindo Agritech Utama
1059. NEPTIK	Vaksindo Satwa Nusantara
1060. NEUMOVIRIC	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/
	Ekasapta Wijayatanguh
1061. NEUMOVIRIC	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/
	Ekasapta Wijayatanguh
1062. NEW BRONZ MG	Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/
	Pfizer Indonesia
1063. NEW BRONZ	Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/
	Pfizer Indonesia
1064. NEW COLIPRIM	AVICO/Maju Farma Indonesia
1065. NEW COLIPRIM	AVICO/Maju Farma Indonesia

1066. NEW ERYSULFA.....	Choong Ang Biotech, Co. Ld., Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1067. NEW ERYSULFA.....	Choong Ang Biotech, Co. Ld., Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1068. NEW OX.....	Avindo Perdana Bahtera Mulia
1069. NEW SQ – PLUS.....	Pyridam Veteriner
1070. NEW VERN.....	Agro Makmur Sentosa
1071. NEW METHIOVIT	Pyridam Veteriner
1072. NEWCA-MEX.....	Laboratorio Avimex, SA de Mexico/ Satwa Jawa Jaya
1073. NEWCASTLE B1.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1074. NEWCASTLE DISEASE AND EGG DROP SYNDROME VACCINE INACTIVATED (La Sota Strain + 911 Strain)	QYH Biotech Company Limited, China/ Lito Prima Mandiri
1075. NEWCASTLE DISEASE B1 BRON CONN MASS	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1076. NEWCASTLE DISEASE KILLED.. VACCINE (LA SOTA)	Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia
1077. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS II	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1078. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1079. NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (CLONE 30)	Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia
1080. NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (LA SOTA)	Harbin Weike Bio-Technology Development Company, China/Farmadika Sejahtera Indonesia
1081. NEWCASTLE DISEASE N – 63	Schering-Plough animal Health, USA/ Pimaimas Citra
1082. NEWCASTLE DISEASE N – 79	Schering-Plough animal Health, USA/ Pimaimas Citra
1083. NEWCASTLE DISEASE	QYH Biotech Company Limited, China/ Lito Prima Mandiri
1084. NEWCASTLE DISEASE VACCINE LIVE (LASOTA STRAIN)	QYH Biotech Company Limited, China/ Lito Prima Mandiri
1085. NEWCASTLE DISEASE	Venkateshwara Hatcheries Pvt, Ltd India/ Vetindo Citrapersada
1086. NEWCASTLE DISEASE	Venkateshwara Hatcheries Pvt, Ltd India/ Vetindo Citrapersada
1087. NEWCASTLE INFLUENZA	Laboratorio AVIMEX SA DE CV, Mexico/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
1088. NEWCASTLE K.....	Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/ Pfizer Indonesia
1089. NEWCASTLE LASOTA.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1090. NEWVAC LASOTA	Pasteur Institute, Romania/Agrinusa Jaya Santosa

1091. NICLOMAS.....	Mensana Aneka Satwa
1092. NICLOMIX – L	Mitravet
1093. NOBILIS AE + POX	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1094. NOBILIS AE 1143.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1095. NOBILIS CORVAC	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1096. NOBILIS CORYZA.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1097. NOBILIS E COLI INAC	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1098. NOBILIS EDS	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1099. NOBILIS G + ND	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1100. NOBILIS GUMBORO 228E.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1101. NOBILIS GUMBORO D78.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1102. NOBILIS GUMBORO INAC.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1103. NOBILIS IB + G + ND.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1104. NOBILIS IB + ND + EDS.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1105. NOBILIS IB + ND.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1106. NOBILIS IB 4/91.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1107. NOBILIS IB H – 120.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1108. NOBILIS IB MA 5.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1109. NOBILIS IB MULTI + ND + EDS..	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1110. NOBILIS IB MULTI + G + ND	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1111. NOBILIS IB MULTI + ND.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1112. NOBILIS ILT BIOTRACH.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1113. NOBILIS ILT	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1114. NOBILIS INFLUENZA H5 + ND....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1115. NOBILIS INFLUENZA H5.....	Intervet Intl. B. V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia

1116. NOBILIS MA5 + CLONE 30.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1117. NOBILIS MAREXINE CA126	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1118. NOBILIS MG 6/85	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1119. NOBILIS MG INAC.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1120. NOBILIS ND + EDS	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1121. NOBILIS ND BROILER.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1122. NOBILIS ND C2	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1123. NOBILIS ND CLONE 30.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1124. NOBILIS ND HITCHNER.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1125. NOBILIS ND LA SOTA	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1126. NOBILIS NEWCAVAC.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1127. NOBILIS REO + IB + G + ND	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1128. NOBILIS REO 1133	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1129. NOBILIS REO 2177.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1130. NOBILIS REO ERS INAC.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1131. NOBILIS REO INAC	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1132. NOBILIS RISMAVAC + CA 126	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1133. NOBILIS RISMAVAC.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/ Intervet Indonesia
1134. NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia
1135. NOBILIS RT INAC.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia
1136. NOBILIS RTV 8544	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia
1137. NOBILIS SALENVAC.....	Intervet Intl. B.V. (MSD Animal Health), Belanda/Intervet Indonesia
1138. NOPCOXYME II.....	Diasham Resources, Singapore/SHS International
1139. NOPSTRESS TF.....	Diasham Resource, Singapore/SHS International
1140. NOPSTRESS WITH ELECTROLYTES.....	Diasham Resources, Singapore/SHS International

1141. NORAN – 150	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1142. NORAN – 200 ORAL	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1143. NORAN – 200 WS	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1144. NORFLOX 33	SHS International
1145. NORITACK LIQUID	Biotek Indonesia
1146. NOVAQUYL	Romindo Primavetcom
1147. NOVASIL PLUS	Impextraco, Beliga/SHS International
1148. NUOQIU PREMIX 5%	Shandong Luxi, China/Indovetraco Makmur Abadi
1149. NUPRO	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1150. NUTRASE XYLA 500	Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara
1151. NUTRASE XYLA LIQUID	Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara
1152. NUTRASE XYLA	Nutrex – Belgia/Tri Dinamika Nusantara
1153. NUTRI – C	Trouw Nutrition Indonesia
1154. NUTRI – LACK	Agro Makmur Sentosa
1155. NUTRI – SURE DW1	Kemira ChemSolutions b.v., Netherland/ Behn Meyer Chemicals
1156. NUTRIAROMA MILKY-VANILLA	Dex Iberica – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
1157. NUTRILAC IGA LIQUID	Nutri-Ad International bvba, Belgia/Kalbe Farma Tbk
1158. NUTRIMIN PM 518 POULTRY MINERAL PREMIX	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1159. NUZYME	Sinsui Inc, Jepang/Farmadika Sejahtera Indonesia
1160. NUCLOSOL – 50	Agro Makmur Sentosa
1161. OBAT TEMBOLOK	Medion Farma Jaya
1162. OCTACIN EN 10% ORAL	Octa Memorial, Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
1163. OCTACIN EN 5% INJECTION	Octa Memorial, Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
1164. OCTAMIX AC	Octa Memorial, Thailand/ Indovetraco Makmur Abadi
1165. OL – VAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1166. OLVAC 1000	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1167. OLVAC A+B	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1168. OLVAC B+G	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1169. OMNICIDE	Coventry Chemicals Ltd, Inggris/ Intervet Indonesia/Pimaimas Citra
1170. OO – CIDE	Antec International-A DuPont Company, Inggris/ SHS International
1171. OPTICIDE	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
1172. OPTIMISE	Optivite International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada
1173. ORANGE	Trouw Nutrition Indonesia
1174. OREGO – STIM LIQUID	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
1175. OREGO – STIM POWDER	Meriden Animal Health Ltd, Inggris/ Swadesi Candrasentosa
1176. ORGANIC GREEN CULTURE	HanPoong-Korea/SHS International

1177. ORO GLO DRY	Kemin Industries (Asia) Pte, Ltd, Singapore/ Satwa Jawa Jaya
1178. OSTELIN	Eka Farma
1179. OTAFLOX	Otasindo Prima Satwa
1180. OTAGUMMED	Otasindo Prima Satwa
1181. OTAQUINE SOL	Otasindo Prima Satwa
1182. OTRALECT	Otasindo Prima Satwa
1183. OTRALITE	Otasindo Prima Satwa
1184. OTRAVIT	Otasindo Prima Satwa
1185. OVASTIM SP	Agro Makmur Sentosa
1186. OVASTIM	Agro Makmur Sentosa
1187. OVO – 4	Merial/Romindo Primavetcom
1188. OVULA EXTRA	Avindo Perdana Bahtera Mulia
1189. OXALDIN LIQUID	Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd., Jepang/ SHS International
1190. OXIBENDAZOLE – 100	Kalbe Farma Tbk
1191. OXILEN AD	Vetanco S.A. Argentina/Pakan Serasi
1192. OXIPRA – 20 LA	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
1193. OXOLINAL	Agrinusa Jaya Santosa
1194. OXTRA LA	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1195. OXY – SAN 10%	Sanbe Farma
1196. OXYLIN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1197. OXYTETRA 200 LA	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1198. OXYTETRA 5 COOPHAVET	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
1199. OXYTETRACYCLINE – 25	Katraco Santika
1200. OXYTRAL LA	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
1201. PACOM – A	Samu Median, Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
1202. PAMIZOLE PS	S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1203. PANHELMIN	Inggris/Indovetraco Makmur Abadi
1204. PANKILL	Komipharm International Co. Ltd/Sistar Indonesia
1205. PANTISOL	Pantex, BV. Belanda/Starsia Asiatama
1206. PANTOMINOVIT	Pantex, BV. Belanda/Starsia Asiatama
1207. PARACILLIN SP	Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
1208. PARAGIN	Tekad Mandiri Citra
1209. PARAMOL – 50	Katraco Santika
1210. PEN – HISTA STREP	Vetoquinol SA, Perancis/Agrinusa Jaya Santosa
1211. PEN & STREP	Norbrook Laboratories Limited, Ireland/ SHS International
1212. PENERGETIC – T	Penergetic International AG., Switzerland/ Behn Meyer Chemicals
1213. PENSTREP – 400	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1214. PENSTREP 20/20	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
1215. PENSTREP 4 0,5	Wonderindo Pharmatama
1216. PEPEROXIN SOL	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1217. PEPTIDA – G	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
1218. PERFEXOL – H	Trouw Nutrition Indonesia

1219. PERFEXOL – L	Trouw Nutrition Indonesia
1220. PERMASOL 500 GRANULE	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1221. PERMASOL 500 LIQUID	Indovetraco Makmur Abadi
1222. PESTIKAL + EDS + IB	Genera, Inc., Croatia/Sehat CeraH Indonesia
1223. PESTIKAL	Genera, Inc., Croatia/Sehat CeraH Indonesia
1224. PHARMASIN 10 PREMIX	AD, Bulgaria/SHS International
1225. PHARMASIN 100% WS GRANULES	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International
1226. PHARMASIN PULVIS	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International
1227. PHENOXYPEN WSP	Dopharma BV, Belanda/SHS International
1228. PHENVIRO PLUS	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1229. PHOSRETIC	Coophavet – Merial/Romindo Primavetcom
1230. PHYLINK 5000	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ SHS International
1231. PHYZYME XP 1.000 TPT	Danisco Argentina SA Argentina untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
1232. PHYZYME XP 10.000 TPT	Danisco Argentina SA Argentina untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
1233. PHYZYME XP 5.000 G	Finnfeeds Oy, Finlandia untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
1234. PHYZYME XP 5.000 L	Femic SA De CV, Mexico untuk Danisco (UK) Ltd, United Kingdom/Megasetia Agung Kimia
1235. PINOCID	Sanbe Farma
1236. PIPEDON – X LIQUID	Wonderindo Pharmatama
1237. PIPERA – SAN	Sanbe Farma
1238. PIPERAMAS	Mensana Aneka Satwa
1239. PIPERAVAKS – S	Agrinusa Jaya Santosa
1240. PIPERAZINE – 36	Katraco Santika
1241. PIRETAMAS	Mensana Aneka Satwa
1242. PIRIPEN Inj	Pyridam Veteriner
1243. PIRIVET	Pyridam Veteriner
1244. PITACID	Kalbe Farma Tbk
1245. PM – OLVAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1246. PNEUMOTOS – I	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
1247. POLYBRON N-63	Schering-Plough animal Health, USA/ Pimaimas Citra
1248. POLYVIT STRESS	Vetindo Citrapersada
1249. POULTRY GROW	Jefo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech
1250. POULTRY MINERAL 2000	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1251. POULTRY VITAMIN 21270	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1252. POULTRY VITAMIN PREMIX	Trouw Nutrition Indonesia
1253. POULTRY SAR ME	Biomin Singapore Pte. Ltd/Biomin Indonesia
1254. POULVAC BURSA F	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia

1255. POULVAC CORYZA ABC IC3.....	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1256. POULVAC E COLI.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1257. POULVAC EDS NEW BRONZ VAC	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1258. POULVAC EDS VAC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1259. POULVAC IB H120.....	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1260. POULVAC IC ABC OIL.....	Fort Dodge Saude Animal Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1261. POULVAC MAREK CVI	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1262. POULVAC MIX 6.....	Fort Dodge Saude Animal Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1263. POULVAC NDW	Fort Dodge Saude Animal Health Ltd., Brazil/ Pfizer Indonesia
1264. POULVAC OVOLINE CHI+HVT ... MAREK'S DISEASE VACCINE	Fort Dodge Saude Animal Health Ltda., Brazil/ Pfizer Indonesia
1265. POULVAC PABAC IV.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1266. POUSTIN C.....	CTCBIO, Korea/Pakan Serasi
1267. POWER CHICKS.....	Hendy Pharmindo Satwa
1268. POWER VIT	Hendy Pharmindo Satwa
1269. POWERCILLIN INJECTION.....	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
1270. POWERMEC SOLUTION.....	Cheil Bio Co. Ltd., Korea/SHS International
1271. POWL POX	Indovax Private Limited, India/ Otasindo Primasatwa
1272. POWL POX	AAKO BV-Belanda/SHS International
1273. POXIMUNE AE	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
1274. POXIMUNE.....	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
1275. POXINE.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1276. PREFECT.....	Kiotechagil, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
1277. PREMUIT	Biotek Indonesia
1278. PRIMA AMINOACID PLUS 2002 ..	MJPF Farma Indonesia
1279. PRIMA AMPROFURA – 77.....	MJPF Farma Indonesia
1280. PRIMA COCCI PLUS	MJPF Farma Indonesia
1281. PRIMA COLIMIX PLUS	MJPF Farma Indonesia
1282. PRIMA COLMY PLUS	MJPF Farma Indonesia
1283. PRIMA CUATS – 30.....	MJPF Farma Indonesia
1284. PRIMA CYPRO PLUS	MJPF Farma Indonesia
1285. PRIMA DOXERY PLUS – 99	MJPF Farma Indonesia
1286. PRIMA GENTA 5% Injection.....	MJPF Farma Indonesia
1287. PRIMA HIT STRESS	MJPF Farma Indonesia
1288. PRIMA IODINE – 33	MJPF Farma Indonesia
1289. PRIMA LINCOSPECT	MJPF Farma Indonesia

1290. PRIMA NEOERY – 25	MJPF Farma Indonesia
1291. PRIMA OXYCOL.....	MJPF Farma Indonesia
1292. PRIMA OXYMYCINE PLUS.....	MJPF Farma Indonesia
1293. PRIMA QUINCURE – 25	MJPF Farma Indonesia
1294. PRIMA QUINOL – F	MJPF Farma Indonesia
1295. PRIMA QUINOL – FL	MJPF Farma Indonesia
1296. PRIMA QUINTRIL 10% PLUS	MJPF Farma Indonesia
1297. PRIMA VITA PLUS	MJPF Farma Indonesia
1298. PRIMA ZINEOS 808 PLUS	MJPF Farma Indonesia
1299. PRIMACIDE – 200.....	MJPF Farma Indonesia
1300. PRIMADES	Delta Prima Agrindo
1301. PRIMADINE	Romindo Primavetcom
1302. PRIMADOXIN	Romindo Primavetcom
1303. PRIMATICOL.....	Romindo Primavetcom
1304. PRIMATRIM	Romindo Primavetcom
1305. PRIMAVIL.....	Romindo Primavetcom
1306. PRIMAZINE 808 PLUS	MJPF Farma Indonesia
1307. PRIMAZOL	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
1308. PRIMEQUYL	Romindo Primavetcom
1309. PRISTAM.....	Romindo Primavetcom
1310. PRO – MIX LAYER	Sanbe Farma
1311. PRO VAC 3	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1312. PRO VAC 4.....	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1313. PROCHAL – CU.....	China Bestar Laboratories, Taiwan/ SHS International
1314. PROCHAL – MnS	China Bestar Laboratories, Taiwan/ SHS International
1315. PROCHAL – Zn.....	China Bestar Laboratories, Taiwan/ SHS International
1316. PROCHICKGRIN.....	Agrinusa Jaya Santosa
1317. PROCID	Morningbio, Korea/Bright International
1318. PROFISH Ω POULTRY	Hendrix NV/Trouw Nutrition Indonesia
1319. PROMECTINE ORAL	Invesa Int., Spanyol/Agro Makmur Sentosa
1320. PROMOTOR L	Laboratorios Calier, S.A.–Spain/ Megan Galus Kinantan
1321. PROPHYL.....	Coophavet Merial/Romindo Primavetcom
1322. PROTECTOR MINERAL	Centralys Div. Protector, Perancis/ Tigaka Distrindo Perkasa
PREMIX I	
1323. PROTECTOR MINERAL	Centralys Div Protector, Perancis/ Tigaka Distrindo Perkasa
PREMIX II	
1324. PROTECTOR MINERAL	Centralys Division Protector, Perancis/ Tigaka Distrindo Perkasa
PREMIX III	
1325. PROTECTOR VITAMIN PREMIX I	Centralys Division Protector, Perancis/ Tigaka Distrindo Perkasa
1326. PROTECTOR VITAMIN PREMIX II	Centralys Division Protector, Perancis/ Tigaka Distrindo Perkasa
1327. PROTEK – ALL PLUS.....	Dawes Laboratories, USA/Lito Prima Mandiri

1328. PROTEK CORYZA KILL VACC.....	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1329. PROTEK IBD KILL VACC.....	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1330. PROTEK ND KILL VACC.....	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1331. PROTEK ND LIVE VACC.....	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1332. PROTEK ND-EDS-IB KILL VACC.	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1333. PROTEK ND – IB KILL VACC.....	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1334. PROTEK ND – IBD KILL VACC....	Yebio Bioengineering Co., Ltd Of Qingdao/ Biotek Indonesia
1335. PROTEK-STRES.....	Caprifarmindo Labs.
1336. PROTEXIN CONCENTRATE.....	Probiotics International, Inggris/ Novindo Agritech Utama
1337. PROVITA – 20.....	Mitravet
1338. PROVYSOL.....	Diasham Resources, Singapore/SHS International
1339. PROXAN – C.....	Medion Farma Jaya
1340. PROXAN – S.....	Medion Farma Jaya
1341. PULLOGEN.....	Vaksindo Satwa Nusantara
1342. PULLOXAL.....	Otasindo Prima Satwa
1343. PULMOTIL AC.....	Elanco Animal Health/SHS International
1344. PUYUH MEDI EGG.....	Medion Farma Jaya
1345. PUYUH VITAKIT.....	Medion Farma Jaya
1346. PUYUH VITANAK.....	Medion Farma Jaya
1347. PUYUHVIT.....	Pyridam Veteriner
1348. PVP IODINE 50 G.....	Biotek Indonesia untuk Indofarma Tbk.
1349. PX – X4DM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1350. PX – X5BM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1351. PX – X6CM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1352. PX – Y1AM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1353. PX – Y1ATM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1354. PX – Y1BM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1355. PX – Y1CM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1356. PX – Y20TM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1357. PX – Y2AM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1358. PX – Y2DM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1359. PX – Y3AM.....	Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/SHS International
1360. PX – Y3DM.....	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1361. PX – Z5AM.....	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1362. PX – Z88.....	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1363. PX – Z9AM.....	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International

1364. PYRISIN – 525	Mitravet
1365. PYRONIL SUSPENSII	Pyridam Veteriner
1366. PYROSPLASH	Pyridam Veteriner
1367. PYROXY Inj.	Pyridam Veteriner
1368. QUANTUM 2500 TR	AB Vista, UK/Sehat CeraH Indonesia
1369. QUICKBAYT 10 WG	Bayer Environmental Science SAS Perancis./ Bayer Indonesia
1370. QUINABIC WSP	AAKO BV, Belanda/SHS International
1371. QUINCURE 20 LIQ	Tithebarn Limited, Inggris/EkasaptaWijayatanggung
1372. QUINOEX	Ceva Sophavet SA, Maroko & Ceva Sante Animale, Perancis/Ceva Animal Health Indonesia
1373. QUINOVET F	Laboratorios Ovejero SA. Spanyol/ Saka Menara Alam
1374. QUINOXAN	Mensana Aneka Satwa
1375. QUINTRIL INJ 5%	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
1376. QUINTRIL LIQ 10%	Tithebarn Limited, Inggris/EkasaptaWijayatanggung
1377. QUIXALUD	Novartis (Thailand) Ltd, Thailand/ Novartis Indonesia/Novindo Agritech Hutama
1378. R. P. MINERAL	Romindo Primavetcom
1379. RACUMIN 0,0375 BB	Bayer Indonesia
1380. RAMIKAL TRACE MINERAL PREMIX	Katraco Santika
1381. REN – CLEAR	Agrinusa Jaya Santosa
1382. RENNIL	Sanbe Farma
1383. REOMUNE 3	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
1384. REPROMUNE 4	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
1385. RESPIMUNE	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
1386. RESPIRAC	Otasindo Prima Satwa
1387. RESPIRANT	Agro Makmur Sentosa
1388. RESPIRATREK	Medion Farma Jaya
1389. RESPIROXAN 10	Avindo Perdana Bahtera Mulia
1390. RESPIROXAN	Avindo Perdana Bahtera Mulia
1391. REX VITAL	S.P. Veterinaria S.A., / Spanyol Ekasapta Wijayatanggung
1392. RHISOMIX 208	Agro Makmur Sentosa
1393. RHISOMIX	Agro Makmur Sentosa
1394. RHODEGG	Romindo Primavetcom
1395. RHODIMIX 22	Romindo Primavetcom
1396. RHODIMIX 273	Romindo Primavetcom
1397. RHODIMIX 784	Romindo Primavetcom
1398. RHODIMIX CF3	Romindo Primavetcom
1399. RHODIMIX MB 100	Romindo Primavetcom
1400. RHODIVIT	Romindo Primavetcom
1401. RINTAL GRANUL 10%	OLIC (Thailand) Limited, Thailand untuk Bayer Thai Co., Ltd., Thailand/Bayer Indonesia

1402. RISA – KOL KAPSUL	Aves
1403. RISA – KOL.....	Aves
1404. RODALON	Pyridam Veteriner
1405. ROMINDO MICROMIX 2000.....	Romindo Primavetcom
1406. RONOZYME PROACT (CT)	Novozyne Latin America Ltda., Brazil dan Novozyne A/S, Denmark/ DSM Nutritional Product Indonesia
1407. ROSAN PREMIX.....	Sanbe Farma
1408. ROSIGOLD – P	DSM Nutritional Products Rovithai Limited, Thailand/DSM Nutritional Product Indonesia
1409. ROSIGOLD WSP	DSM Vitamins (Shanghai) Ltd/ DSM Nutritional Product Indonesia
1410. ROVABIO MAX AP.....	Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom
1411. ROVABIOTM EXCEL AP	Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom
1412. ROVABIOTM EXCEL LC	Adisseo-Perancis/Romindo Primavetcom
1413. ROVIMIX 528	Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1414. ROVIMIX CP 3 DC.....	Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1415. ROVISOL DM 295	DSM Nutritional Products Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1416. ROVISOL DM 295	Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1417. ROVISOL JCI 1000.....	DSM Nutritional Products Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1418. ROVISOL JCI 1002	DSM Nutritional Products Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
(Vitamin Concentrate)	
1419. ROVISOL SP – 802	Rovithai Ltd, Thailand/ DSM Nutritional Product Indonesia
1420. ROXACIN ORAL.....	Laboratorios Calier, S.A. – Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1421. ROXINE 10% ORAL SOLUTION ..	Sanbe Farma
1422. ROXINE 25% ORAL SOLUTION ..	Sanbe Farma
1423. ROXINE INJEKSI.....	Sanbe Farma
1424. ROXINE KAPLET	Sanbe Farma
1425. ROXINE.....	Sanbe Farma
1426. RYOMICIN.....	Pyridam Veteriner
1427. SALIGRAN G120.....	Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia
1428. SALINDOX 120 BMP.....	DOX-AL Italia SpA. Italy/Catur
1429. SALKIL.....	Kiotechagil, United Kingdom/Jebesen & Jessen Chemicals Indonesia
1430. SAMYANG TYLOSIN – 200	Samyang Anipharm Co.,Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech
INJECTION	
1431. SANBE – MIX A	Sanbe Farma
1432. SANBE – MIX B	Sanbe Farma
1433. SANBE – MIX C	Sanbe Farma
1434. SANBE – MIX D	Sanbe Farma
1435. SANITAS – 151	Mitravet

1436. SANIVIR PLUS.....	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
1437. SANIVIR	Bioplagen, Spanyol/Agro Makmur Sentosa
1438. SANMIX – B	Sanbe Farma
1439. SANMIX.....	Sanbe Farma
1440. SANTOQUIN LIQUID.....	Novus Int. Inc, USA/Novus Indonesia
1441. SANTOQUIN MIXTURE 6	Int. Inc, USA/Novus Indonesia
1442. SANVIMIN.....	Sanbe Farma
1443. SAQUADIL 100	Romindo Primavetcom
1444. SAQUADIL 50	Romindo Primavetcom
1445. SARAKILL	Choong Ang Biotech, Korea/ Indovetraco Makmur Abadi
1446. SEL – PLEX 2000.....	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1447. SEL – PLEX 2700.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1448. SEL – PLEX 3000.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1449. SEL – PLEX.....	Alltech Inc., USA; Alltech do Brasil-Brazil/ Alltech Biotechnology Indonesia
1450. SELACID DRY.....	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1451. SELEVIT – SB FORTE	Mitravet
1452. SELKO PH.....	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1453. SEPTIDES	Biotek Indonesia
1454. SEPTISAN.....	Sanbe Farma
1455. SEPTO – SKIN CALIER.....	Laboratorios Calier, S.A–Spanyol/ Megan Galus Kinantan
1456. SEPTOCID.....	Mensana Aneka Satwa
1457. SHIFT.....	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
1458. SIERADES.....	Biotek Indonesia
1459. SIL – ALL WATER SOLUBLE	Alltech Inc, USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1460. SINDOCHICKS.....	Otasindo Prima Satwa
1461. SINDOFLOK SOL.....	Otasindo Prima Satwa
1462. SINDOFLOX FORTE.....	Otasindo Primasatwa
1463. SINDOMIX 17 EM.....	Otasindo Prima Satwa
1464. SINDOVIT SUPER	Otasindo Prima Satwa
1465. SIPRO – 10	Katraco Santika
1466. SIRNASET.....	Tekad Mandiri Citra
1467. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g..... GRANULAR	Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/ Brenntag
1468. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g	Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/ LIQUID Brenntag
1469. SMIZYME PHYTASE 5000 U/g	Beijing Smile Feed SCI & Tech. Co., Ltd, China/ POWDER Brenntag
1470. SOGECOLI.....	Sogeval SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk
1471. SOLFAC 10 WP.....	Bayer Environmental Science SAS Perancis/ Bayer Indonesia

1472. SOLUBLE ORGANIC GREEN CULTURE.....	HanPoong-Korea/SHS International
1473. SOLVIT.....	Medion Farma Jaya
1474. SORB – IT	Anitox Corp-USA/SHS International
1475. SOTASEC.....	Merial/Romindo Primavetcom
1476. SP – V5.....	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1477. SP FV – 1	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1478. SPECLIN	Biotek Indonesia
1479. SPECTARAL – 25	Tekad Mandiri Citra
1480. SPECTARAL	Tekad Mandiri Citra
1481. SPECTOLIN	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
1482. SPECTOVET INJ	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara
1483. SPIRA – SAN PLUS.....	Sanbe Farma
1484. SPIRADEGG	Multifarma Satwa Maju
1485. SPIRADIN – 20	Romindo Primavetcom
1486. SPORADES	Medion Farma Jaya
1487. STAFAC – 500	Phibro Animal Health, USA/Emvi Indonesia
1488. STAMIX 20.....	Kalbe Farma Tbk
1489. STAMIX SP 500	Kalbe Farma Tbk
1490. STERILE DILUENT	Sante Animale, Perancis / Ceva Animal Health Indonesia
1491. STERILIDES	Cakar Mas
1492. STOVANOL – SF	MJPF Farma Indonesia
1493. STREPTOMISINA SULFATE.....	Katraco Santika
1494. STREPTOMYCIN INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1495. STREPTOMYCIN Serbuk Injeksi ...	Bernofarm/Lestari Agrisatwa Husada
1496. STREPTOVET	Duta Kaisar Pharmacy
1497. STRESS – STOP	Sanbe Farma
1498. STRESS BLOCK.....	Agro Makmur Sentosa
1499. STRESS PROTECTOR	Avindo Perdana Bahtera Mulia
1500. STRESSGRIN.....	Agrinusa Jaya Santosa
1501. STRONG – VIT	Multifarma Satwa Maju
1502. STRONG EGG	Medion Farma Jaya
1503. STRONG N FIT.....	Medion Farma Jaya
1504. STRONGPLUS.....	Mensana Aneka Satwa
1505. SUANOVIL	Romindo Primavetcom
1506. SULDIVIT	Katraco Santika
1507. SULDIVIT	Katraco Santika
1508. SULFA STRONG INJEKSI.....	Wonderindo Pharmatama
1509. SULFADIM	S.P. Veterinaria S.A., Spanyol/ Ekasapta Wijayatanguh
1510. SULFAMIX	Medion Farma Jaya
1511. SULFATRIM 48% ORAL SUSPENSION	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
1512. SULFAXALINE	Pyridam Veteriner
1513. SULPHAPRIM INJ.....	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara

1514. SUNNY BINDER	Zhejiang University Sunny Nutrition Technology Co., Ltd., China/Behn Meyer Chemicals
1515. SUNPHASE G	Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. - China/Behn Meyer Chemicals
1516. SUNPHASE L	Wuhan Sunhy Biology Co Ltd. – China/Behn Meyer Chemicals
1517. SUPER – BRO	Aves
1518. SUPER – EGG	Aves
1519. SUPER – LUBE	Uniscope Inc., USA/Behn Meyer Chemicals
1520. SUPER – P	Aves
1521. SUPER – VITA	Aves
1522. SUPER BIOSECURITY	Cakar Mas
1523. SUPER FIT FORTE	Hendy Pharmindo Satwa
1524. SUPER FIT	Hendy Pharmindo Satwa
1525. SUPER IODOCID	Cakar Mas
1526. SUPER MIX	Agro Makmur Sentosa
1527. SUPER POWER	Medion Farma Jaya
1528. SUPER TOP	Medion Farma Jaya
1529. SUPER VITAMINO	Co. Ltd., Korea/SHS International
1530. SUPERVETACLEAN	Vetindo Citrapersada
1531. SUPRALIT + ...	Mensana Aneka Satwa
1532. SUPRALIT	Mensana Aneka Satwa
1533. SURMAX – 200 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1534. SURMAX 100 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1535. SURPIZIN	SHS International
1536. SUTRIMIX PLUS	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1537. SYNERGIZE	Preserve International, Amerika Serikat/ Agrinusa Jaya Santosa
1538. TAVET ENROFLOXACINE 10% ...	Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada
1539. TAVET GST	Tav Veterinarian SL, Spanyol/Vetindo Citrapersada
1540. TECHNOMOS	Biochem GmbH, Jerman/Gemilang Multitrade
1541. TEK – TROL	Bio-Tek Industries Inc, USA/SHS International
1542. TELUR VIT	Aves
1543. TENO-VAXIN	Schering-Plough Animal Health, USA/ Pimaimas Citra
1544. TERMINATOR	Bayer New Zealand/Lito Bina Medikantara
1545. TERMITOX	Cevasa SA, Argentina/Biotek Sarana Industri
1546. TERRAMYCIN* LA INJECTABLE SOLUTION	Pfizer Indonesia
1547. TERROXYVET	Duta Kaisar Pharmacy
1548. TETRAFEIN MERAH	Pyridam Veteriner
1549. TETRAMISON INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1550. TETRAVET AEROSOL	Bayer, New Zealand/Lito Bina Medikantara
1551. TH4 + ...	Sovegal SA, Perancis/Kalbe Farma Tbk
1552. THE ONE	Woogene B&G – Korea Selatan/ Tri Dinamika Nusantara
1553. THERAPY	Medion Farma Jaya

1554. TI – FLOXAN	Agro Makmur Sentosa
1555. TIAMULIN	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1556. TILMOVET 25%	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International
1557. TIMING GOLD	Kofavet Special, Korea/Bright International
1558. TINKANIUM	Pfizer Olot S.L.U., Spanyol/Pfizer Indonesia
1559. TM – PERAZINE	Tekad Mandiri Citra
1560. TM – VITA	Tekad Mandiri Citra
1561. TOLACOX	Pharma Swede, Mesir/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1562. TOLCOXIN	KBNP, Inc, Korea/Blue Sky Biotech
1563. TOLEVIT 10 PLUS Se	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1564. TOLEVIT 10	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1565. TOLTRACOX	Agrinusa Jaya Santosa
1566. TOLTRAPAN	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1567. TOLTRARIL S 2,5%	Indovetraco Makmur Abadi
1568. TOLTRAVET 2,5% ORAL SOLUTION	Nova Laboratories Sdn, Bhd, Malaysia/Lisan Mulia
1569. TONOPHOSPHAN COMPOSITION	Intervet Intl. B. V. Belanda/Intervet Indonesia
1570. TOP MIX HC	Medion Farma Jaya
1571. TOP MIX	Medion Farma Jaya
1572. TOPVIT	Sanbe Farma
1573. TOSAPRIM WS	Hendy Pharmindo Satwa
1574. TOXIBAN AM	Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia
1575. TOXIBOND	Biomix SA,Columbia untuk Vitusa Corp USA/ Indovetraco Makmur Abadi
1576. TOXIDEX	Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
1577. TOXIDREN	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1578. TOXISORB CLASSIC	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman/ Bayer Indonesia
1579. TOXISORB PREMIUM	Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Jerman/ Bayer Indonesia
1580. TOXO MX	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1581. TOXO XL	Selko BV., The Netherlands/ Trouw Nutrition Indonesia
1582. TRANSVAC	Ceva Phylaxia Vet. Biologicals, Hungary/ Ceva Animal Health Indonesia
1583. TREMORMUNE	Ceva Biomune Co., USA/ Ceva Animal Health Indonesia
1584. TRI ALPUCINE	Virbac Lab., Perancis/Emvi Indonesia
1585. TRIDIAZINE ORAL SUSPENSION	Jurox, Australia/Pakan Serasi
1586. TRIMAZINE	Tithebarn Limited, Inggris/Ekasapta Wijayatanggung
1587. TRIMESULF	Otasindo Prima Satwa
1588. TRIMETH	Pyridam Veteriner
1589. TRIMETHODINE	Biotek Indonesia
1590. TRIMETHOSULF	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
1591. TRIMETOGRIN	Agrinusa Jaya Santosa

1592. TRIMEZYN K	Medion Farma Jaya
1593. TRIMEZYN S	Medion Farma Jaya
1594. TRIMIXIN – 480 WATER SOLUBLE	SDS Biotech/SHS International
1595. TRIMIXIN 480 WS	Resources, Singapore/SHS International
1596. TRI-REO	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1597. TRIWORM	Medion Farma Jaya
1598. TURBO	Medion Farma Jaya
1599. TWENTY 1 WP	Belgagry SA., Belgia/Totwo Indonesia
1600. TYCOTIL	Medion Farma Jaya
1601. TYFURAL	Medion Farma Jaya
1602. TYLAN 100 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1603. TYLAN 40 PREMIX	Elanco Animal Health, USA/SHS International
1604. TYLAN SOLUBLE	Elanco Animal Health/SHS International
1605. TYLAPRIM	Pyridam Veteriner
1606. TYLOCARE	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1607. TYLOCOL	Hendy Pharmindo Satwa
1608. TYLODOX	Hendy Pharmindo Satwa
1609. TYLOFLOX	Mensana Aneka Satwa
1610. TYLOGRIMIX	Agrinusa Jaya Santosa
1611. TYLOJECT 20%	Bremer Pharma GmbH, Jerman/Satwa Jawa Jaya
1612. TYLOMAS	Mensana Aneka Satwa
1613. TYLOON	Wonderindo Pharmatama
1614. TYLOPRIM	HIPRA, S.A Spanyol/Mensana Aneka Satwa
1615. TYLO-SAN	Sanbe Farma
1616. TYLOSIN – 50	Katraco Santika
1617. TYLOTRYL	VICO/Maju Farma Indonesia
1618. TYLOXACIN	Hendy Pharmindo Satwa
1619. TYSINOL	Medion Farma Jaya
1620. ULTRADES PLUS	Biotek Indonesia
1621. ULTRADES	Biotek Indonesia
1622. ULTRALIN 45%	Biotek Indonesia
1623. ULTRAMIN	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
1624. ULTRAVIT M	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
1625. ULTRAXIDE	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1626. V – MAX	Phibro Animal Health Corp., USA/ Indovetraco Makmur Abadi
1627. V.A. CHICK VAC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1628. VA VAC	Pfizer Animal Health, USA/Pfizer Indonesia
1629. VAIOL – VAC	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1630. VAKSIMUNE AI	Vaksindo Satwa Nusantara
1631. VAKSIMUNE CLONE IB	Vaksindo Satwa Nusantara
1632. VAKSIMUNE CLONE	Vaksindo Satwa Nusantara
1633. VAKSIMUNE CORYZA L	Vaksindo Satwa Nusantara
1634. VAKSIMUNE CORYZA N	Vaksindo Satwa Nusantara
1635. VAKSIMUNE CORYZA	Vaksindo Satwa Nusantara
1636. VAKSIMUNE EDS	Vaksindo Satwa Nusantara

1637. VAKSIMUNE IB INAKTIF	Vaksindo Satwa Nusantara
1638. VAKSIMUNE IB	Vaksindo Satwa Nusantara
1639. VAKSIMUNE IBD D	Vaksindo Satwa Nusantara
1640. VAKSIMUNE IBD L	Vaksindo Satwa Nusantara
1641. VAKSIMUNE IBD M	Vaksindo Satwa Nusantara
1642. VAKSIMUNE ILT	Vaksindo Satwa Nusantara
1643. VAKSIMUNE K	Vaksindo Satwa Nusantara
1644. VAKSIMUNE ND AI	Vaksindo Satwa Nusantara
1645. VAKSIMUNE ND AIN2	Vaksindo Satwa Nusantara
1646. VAKSIMUNE ND CLONE	Vaksindo Satwa Nusantara
1647. VAKSIMUNE ND EDS IB	Vaksindo Satwa Nusantara
1648. VAKSIMUNE ND EDS	Vaksindo Satwa Nusantara
1649. VAKSIMUNE ND IB INAKTIF	Vaksindo Satwa Nusantara
1650. VAKSIMUNE ND IB PLUS	Vaksindo Satwa Nusantara
1651. VAKSIMUNE ND IBD INAKTIF ...	Vaksindo Satwa Nusantara
1652. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,1	Vaksindo Satwa Nusantara
1653. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,3	Vaksindo Satwa Nusantara
1654. VAKSIMUNE ND INAKTIF	Vaksindo Satwa Nusantara
1655. VAKSIMUNE ND L INAKTIF	Vaksindo Satwa Nusantara
1656. VAKSIMUNE NDB1 IB	Vaksindo Satwa Nusantara
1657. VAKSIMUNE NDB1	Vaksindo Satwa Nusantara
1658. VAKSIMUNE NDHV	Vaksindo Satwa Nusantara
1659. VAKSIMUNE NDHV IB	Vaksindo Satwa Nusantara
1660. VAKSIMUNE NDLS IB	Vaksindo Satwa Nusantara
1661. VAKSIMUNE NDLS	Vaksindo Satwa Nusantara
1662. VAKSIMUNE POX	Vaksindo Satwa Nusantara
1663. VAKSIN ND LASOTA	Pyridam Veteriner
1664. VALOSIN FG 50	ECO Animal Health, United Kingdom/ Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
1665. VALOSIN SOLUBLE	ECO Animal Health, United Kingdom/Jebsen & Jessen Chemicals Indonesia
1666. VANODOX	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
1667. VANOQUAT	Evans Vanodine International PLC, England/ Pfizer Indonesia
1668. VAXSAFE MG VACCINE	Bioproperties Pte. Ltd.-Merial Australia/ Romindo Primavetcom
1669. VAXSAFE MS VACCINE	Merial Australi/Romindo Primavetcom
1670. VB – 1093 T	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1671. VB – 1099 SL	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1672. VBBR – 0899/SL	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1673. VERMIXON SIROP	Medion Farma Jaya
1674. VERMIZYN	Medion Farma Jaya
1675. VET – MIX	Mitravet
1676. VET – OXY LA	Sanbe Farma

1677. VET – PENSTREP 4: ½	Duta Kaisar Pharmacy
1678. VET – PENSTREP 4:1	Duta Kaisar Pharmacy
1679. VET B – 1	Duta Kaisar Pharmacy
1680. VET STREP	Medion Farma Jaya
1681. VETA CORYZEV	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1682. VETA CYPROCIN	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1683. VETA DINE	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1684. VETA FLOXA	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1685. VETA GUARD	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1686. VETA MYCOLA	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1687. VETA QUAT	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1688. VETA RESPIREX	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1689. VETA ZURIL	Sarana Veterinaria Jaya Abadi
1690. VETAMIX	Vetindo Citrapersada
1691. VETCOX	Vetindo Citrapersada
1692. VETILAC 41% LACTOSA	Joosten, Belanda/Indovetraco Makmur Abadi
1693. VETIODINE	Vetindo Citrapersada
1694. VETMACOL FORTE	Univetama Dinamika
1695. VETMIX POULTRY HIGH CONCENTRATES	Vetindo Citrapersada
1696. VETMIX POULTRY PLUS	Vetindo Citrapersada
1697. VETRIBAC D	Vetanco S.A., Argentina/Pakan Serasi
1698. VETRIBAC	Vetanco S.A., Argentina/Pakan Serasi
1699. VETRIMOXIN 50 WS	Ceva Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1700. VH + H – 120	AAKO BV-Belanda/SHS International
1701. VH	AAKO BV-Belanda/SHS International
1702. VIANO – 10	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra
1703. VIBA ZONE	Samu Median, Co., Ltd, Korea/Lito Prima Mandiri
1704. VIDONE	Sanbe Farma
1705. VIGO VIT	Hendy Pharmindo Satwa
1706. VIGOSINE	Ceva Sante Animale/Ceva Animal Health Indonesia
1707. VIGROO	Biotek Indonesia
1708. VIMMUNE	Jordan Golden Rose for Medical oils Ltd./ Biotek Indonesia
1709. VIRAKIL NG	Sante Animale, Perancis/ Ceva Animal Health Indonesia
1710. VIREX	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1711. VIRIDAN	Vaksindo Satwa Nusantara
1712. VIRKON S	Antec International-DuPont Company, Inggris/ SHS International
1713. VIROCID	CID Lines, Belgia/SHS International
1714. VIROGUARD	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia
1715. VIOPHOR	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia

1716. VIROTEC	Kilco International, Scotlandia/ Farmadika Sejahtera Indonesia	
1717. VIRTOX	Sumber Multivita/Multi Daya Pentamitra	
1718. VIRUCIDAL EXTRA	AVS, Irlandia Utara/Agro Makmur Sentosa	
1719. VIRUKILL	ICA Laboratories, South Africa/ Novindo Agritech Utama	
1720. VIRUS KLIN	Katraco Santika	
1721. VIT – ECO	Tekad Mandiri Citra	
1722. VIT GEMUK (UNGGAS)	Sinar Harapan, UD	
1723. VITA CHICKS	Medion Farma Jaya	
1724. VITA F – 1P	Samyang Anipharm Co., Ltd, Korea/ Blue Sky Biotech	
1725. VITA PLEX B	Medion Farma Jaya	
1726. VITA PLEX DROPS	Medion Farma Jaya	
1727. VITA PLEX	Medion Farma Jaya	
1728. VITA SOLE	Trouw Nutrition Indonesia	
1729. VITA STRESS – B	Medion Farma Jaya	
1730. VITA STRESS	Medion Farma Jaya	
1731. VITA STRONG	Medion Farma Jaya	
1732. VITA TETRA CHLOR S	Medion Farma Jaya	
1733. VITA TETRA CHLOR	Medion Farma Jaya	
1734. VITABRO	Pyridam Veteriner	
1735. VITACART PLUS	MJPF Farma Indonesia	
1736. VITACHIP	Biotek Indonesia	
1737. VITAEGGS	Kalbe Farma Tbk	
1738. VITAKUR	Vaksindo Satwa Nusantara	
1739. VITAL CHORUS – FORTE	KBNP, Inc, korea/Blue Sky Biotech	
1740. VITALINK BV 218 BROILER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ VITAMIN PREMIX	SHS International
1741. VITALINK LV118 LAYER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ VITAMIN PREMIX	SHS International
1742. VITALINK LVM 102 LAYER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ STARTER PREMIX	SHS International
1743. VITALINK LVM 202 LAYER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ PULLET PREMIX	SHS International
1744. VITALINK LVM 302 LAYER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ PHASE I PREMIX	SHS International
1745. VITALINK LVM 402 LAYER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ PHASE II PREMIX	SHS International
1746. VITALINK LVM 702 LAYER	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ PREMIX	SHS International
1747. VITALINK PV5288 POULTRY	Crown Pacific Biotechnology, Singapore/ VITAMIN PREMIX	SHS International
1748. VITAMAS	Mensana Aneka Satwa	
1749. VITAMILD PLUS	Avian Satwa Anugrah	
1750. VITAMIN AD3E PANTEX INJECTABLE	Pantex-Holland/PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi	
1751. VITAMIN AD3E	Mobedco-Vet – Jordania/Tri Dinamika Nusantara	

1752. VITAMIN B6 INJEKSI	Wonderindo Pharmatama
1753. VITAMIN E SELLENIUM.....	AVICO, Jordan/Maju Farma Indonesia
1754. VITAMIN E50 + Se INJ	Farvet Lab., Belanda/Agro Makmur Sentosa
1755. VITAMINO SOL (VIRBAC VITAMINO SOLUTION)	Virbac Vietnam Co. Ltd., Vietnam/Emvi Indonesia
1756. VITAMINO SP	Virbac Vietnam Co. Ltd., Vietnam/Emvi Indonesia
1757. VITAMINOACIDOS	Dex Iberica S.A – Spanyol/Tri Dinamika Nusantara
1758. VITAPOULT	Katraco Santika
1759. VITARAL	Biotek Indonesia
1760. VITARAL PLUS	Biotek Indonesia
1761. VITASAM	Biotek Indonesia
1762. VITASAM EFFERVESCENT	Biotek Indonesia
1763. VITASOL-E	Biotek Indonesia
1764. VITLECT XP	Trouw Nutrition Indonesia
1765. VITOL – 140.....	Interchemie Werken “De Adelaar” BV, The Netherlands/Tekad Mandiri Citra
1766. VITOSELEN.....	Jejo Nutrition Inc, Kanada/Blue Sky Biotech
1767. VITRAMIX – LC.....	Pyridam Veteriner
1768. VITRAVIT	Sumber Multivita
1769. VL – 1093 T	Chai Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1770. VOLVAC AC PLUS BACTERIN KV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1771. VOLVAC AC PLUS EMUL	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1772. VOLVAC AI KV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1773. VOLVAC IBD MLV.....	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1774. VOLVAC LT MLV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1775. VOLVAC ND CONC. KV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1776. VOLVAC ND KV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1777. VOLVAC ND LASOTA MLV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, SA. DE CV. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1778. VOLVAC ND+IB KV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1779. VOLVAC ND+IB MLV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1780. VOLVAC ND+IB+EDS KV	Boehringer Ingelheim Vetmedica, S.A. DE C.V. Mexico/Boehringer Ingelheim Indonesia
1781. VS – 1093 T	Chai Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International
1782. VSH – 7.....	Chia Tai Feedmill Pte. Ltd., Singapore/ SHS International

1783. VVMD – VAC.....	Fort Dodge Animal Health Ltd., USA/ Pfizer Indonesia
1784. WATER TREATMENT.....	Nutri-Ad International bvba, Belgia/ Kalbe Farma Tbk
1785. WHEAT EASE – M (LIQUID).....	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals
1786. WHEAT EASE – M (POWDER).....	Elanco Animal Health, USA/ Behn Meyer Chemicals
1787. WINVAC ND EDS IB	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
1788. WINVAC NEWCASTLE	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
BRONCHITIS GUMBORO	ND-IB-IBD)
1789. WINVAC NEWCASTLE	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
BRONCHITIS.....	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
1790. WINVAC NEWCASTLE	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
CONCENTRATED.....	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
1791. WINVAC NEWCASTLE EDS.....	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
1792. WINVAC NEWCASTLE	CA Laboratorios Asociados, Venezuela/ Avindo Perdana Bahtera Mulia
GUMBORO (ND-IBD)	Guangzhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd – China/Behn Meyer Chemicals
1793. WISDEM GOLDEN Y – 20	Guangzhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd – China/Behn Meyer Chemicals
1794. WISDEM RED	Guangzhou Wisdom Bio-Technology Co., Ltd – China/Behn Meyer Chemicals
1795. WONDER AMOXYLIN.....	Wonderindo Pharmatama
1796. WONDER POULTRY EGG FORMULA	Wonderindo Pharmatama
1797. WONDER QUINOLIN.....	Wonderindo Pharmatama
1798. WONDER TRIMETHOPRIM.....	Wonderindo Pharmatama
1799. WONDER VITAMIN B1 INJEKSI..	Wonderindo Pharmatama
1800. WONDER VITAMYCIN POWDER	Wonderindo Pharmatama
1801. WONDER ZEOLIT	Wonderindo Pharmatama
1802. WOOGENE COLISTIN 150	WooGene B&G, Korea/Novindo Agritech Hutama
1803. X – TRA AMPICOL	Cakar Mas
1804. X – TRA AMPROCOC	Cakar Mas
1805. X – TRA ANTISTRESS	Cakar Mas
1806. X – TRA BETAGAIN.....	Cakar Mas
1807. X – TRA CARNICEL.....	Cakar Mas
1808. X – TRA CARNIVA.....	Cakar Mas
1809. X – TRA DOXYTRO	Cakar Mas
1810. X – TRA E – SELEN SUPERMIN...	Cakar Mas
1811. X – TRA FASTBRO	Cakar Mas
1812. X – TRA TRISULF	Cakar Mas
1813. X – TRA VITALIT	Cakar Mas
1814. XAMACOL – 40.....	Novus Carotenoid S.A/Novus Indonesia
1815. YEA – SACC 1026	Alltech Inc., USA; Alltech Biotechnology Corp. Ltd-Thailand/Alltech Biotechnology Indonesia

1816. YEA – SACC TS.....	Alltech Inc., USA/Alltech Biotechnology Indonesia
1817. YIDUOZYME 9180	Guangdong VTR Bio-tech Co. Ltd. China/ Agrinusa Jaya Santosa
1818. YIDUOZYME 9681	Guangdong VTR Bio-tech Co. Ltd.China/ Agrinusa Jaya Santosa
1819. YIDUOZYME P – 8601	Agrinusa Jaya Santosa
1820. YODOR – VEX	S.A., Spanyol/Ekasapta Wijayatanguh
1821. YUCOMY – 20 – POWDER	Y.S.P. Industries (M) Sdn.Bhd., Malaysia/ Yung Shin Pharmaceutical Indonesia
1822. YUMAMYCIN 1%.....	Huvepharma AD, Bulgaria/SHS International
1823. ZADOXYL	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1824. ZAGRO AD3EK.....	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1825. ZAGROMIN 369	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1826. ZAGROMIX 368	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1827. ZAGROSOL AD3E	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1828. ZAGROSOL B – COMPLEX.....	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1829. ZAGROSOL ES.....	Zagro Singapore Pte, Ltd/Zagro Indonesia
1830. ZAGROVIT ES.....	Zagro Singapore Pte, Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1831. ZAGROVIT	Zagro Singapore Pte. Ltd, Singapore/ Zagro Indonesia
1832. ZALDES	Medion Farma Jaya
1833. ZAMBAC ZN 150	Zamira Life Sciences Pty. Ltd., Australia/ Sehat CeraH Indonesia
1834. ZETOX.....	Optivite International Ltd, UK/Vetindo Citrapersada
1835. ZIBAGRAN G150.....	Impextraco NV., Belgia/Emvi Indonesia
1836. ZOOBETAMIN.....	FATRO S.P.A, Italia/Swadesi Candrasentosa
1837. ZOOSOL AMINOSAL	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1838. ZOOSOL CALORVIT	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1839. ZOOSOL LISOVIT.....	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1840. ZOOSOL PAN 50	Instituto delle Vitamine SpA., Italia/ DSM Nutritional Product Indonesia
1841. ZYMPEX 006	Impextraco NV, Belgia/SHS International
1842. ZYMPEX 008	Impextraco NV, Belgia/SHS International.****

INDEKS PRODUK BIOLOGIK

VAKSIN UNGGAS

Avian Encephalomyelitis (AE)

1. AE – POXINE (PFIZER)
2. AE + POXB (INTERVET)
3. AE (AAKO BV)
4. AVIPRO AE TREMBLEX (LOHMANN)
5. GALLIVAC AE (MERIAL)
6. NOBILIS AE + POX (INTERVET)
7. NOBILIS AE 1143 (INTERVET)
8. POXIMUNE AE (CEVA BIOMUNE CO)
9. TREMORMUNE (CEVA BIOMUNE CO)

Avian Influenza (AI)

1. AE VAC (PFIZER)
2. AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5 SUBTYPE, N28 STRAIN) (ZHAOQING DAHUANONG)
3. AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5N2 SUBTYPE) (HARBIN WEIKE BIO)
4. BIRD CLOSE 5.1 (IPB SHIGETA)
5. CAPRIVAC AI – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
6. CAPRIVAC ND AI – K CAPRIFARMINDO LABS.)
7. DHN AVIAN INFLUENZA VACCINE, INACTIVATED (ZHAOQING DAHUANONG)
8. GALLIMUNE FLU H5N9 (MERIAL)
9. MEDIVAC AI 0.3 (MEDION)
10. MEDIVAC AI (MEDION)
11. MEDIVAC ND – AI EMULSION (MEDION)
12. NEWCASTLE INFLUENZA KILLED VIRUS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX SA)
13. NOBILIS INFLUENZA H5 + ND (INTERVET)
14. NOBILIS INFLUENZA H5 (INTERVET)
15. VAKSIMUNE AI (VAKSINDO)
16. VAKSIMUNE ND AI (VAKSINDO)
17. VAKSIMUNE ND AIN2 (VAKSINDO)
18. VOLVAC AI KV (BOEHRINGER)

Cholera

1. AVIPRO 108 FC4 (LOHMANN)
2. CHOLERIN TRIPLE (AAKO BV)
3. IZOVAC FC (IZO)
4. MULTIMUNE K (CEVA BIOMUNE CO)
5. MULTIMUNE K5 (CEVA BIOMUNE CO)
6. PM – OLVAC (FATRO)
7. POULVAC PABAC IV (PFIZER)

Chicken Infection Anemia

1. AVIPRO THYMOVAC (LOHMANN)
2. CIRCOMUNE W (CEVA BIOMUNE CO)
3. CIRCOMUNE (CEVA BIOMUNE CO)

Coccidiosis

1. LIVACOX Q (BIOPHARM)
2. LIVACOX T (BIOPHARM)

Coryza/Snot

1. AVIAN INFECTIOUS CORYZA VACCINE, INACTIVATED (QYH BIOTECH CO.)
2. AVIPRO 101 CORYZA (LOHMANN)
3. BAK IC (BESTAR LAB.)
4. BICOVAC (CA LABORATORIOS ASOCIADOS)
5. CEVAC CORYMUNE 4 K (CEVA PHYLAXIA VET.)
6. CEVAC CORYMUNE 7 K (CEVA PHYLAXIA VET.)
7. CORI – MEX (LABORATORIO AVIMEX, SA)
8. CORIPRAVAC (LABORATORIOS HIPRA SA.)
9. CORIVAC (FATRO)
10. GALLIMUNE 301 (ND + IC2) (MERIAL)
11. GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2) (MERIAL)
12. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2) (MERIAL)
13. HAEMOVAX 0,3 (MERIAL)

14. HG – GEL VAC 3 (FATRO)
15. HG – GEL VAC (FATRO)
16. IC – VAC (CHOONGANG)
17. INACTIVATED CORYZA VACCINE (HARBIN PHARMACEUTICAL)
18. IZOVAC CORYZA 3 (IZO)
19. K VAC CORYZA (SINSUI INDIA)
20. MEDIVAC CORYZA B (MEDION)
21. MEDIVAC CORYZA T SUSPENSION (MEDION)
22. NOBILIS CORVAC (INTERVET)
23. NOBILIS CORYZA (INTERVET)
24. POULVAC CORYZA ABC IC3 (FORT DODGE)
25. POULVAC IC ABC OIL (FORT DODGE)
26. POULVAC MIX 6 (FORT DODGE)
27. PROTEK CORYZA KILL VACC (YEBIO)
28. VAKSIMUNE CORYZA L (VAKSINDO)
29. VAKSIMUNE CORYZA N (VAKSINDO)
30. VAKSIMUNE CORYZA (VAKSINDO)

E. Coli

1. NOBILIS E COLI INAC (INTERVET)
2. POULVAC E COLI (PFIZER)

Egg Drop Syndrome (EDS)

1. ADENIPRAVAC ND/IB (HIPRA, S.A)
2. ADENIPRAVAC TRIPLE (HIPRA, S.A)
3. BAK ND + EDS + IB (BESTAR LAB)
4. BAK ND + EDS (BESTAR LAB)
5. BINEWVAXIDROP (MERIAL)
6. BNE – VAC (CHOONGANG)
7. CAPRIVAC NE – K (CAPRIFARMINDO LABS).
8. CEVAC CORYMUNE 7 K (CEVA PHYLAXIA)
9. CEVAC ND EDS K (CEVA PHYLAXIA)
10. CEVAC ND IB EDS K (CEVA PHYLAXIA)
11. EDS – VAC (FORT DODGE)
12. EDS + NDV + IB (AAKO BV)
13. EDS + NDV (AAKO BV)
14. EDS NEW VAC (PFIZER)
15. EDS OLVAC (FATRO)
16. EDS VAC (FATRO)
17. ENC – BI – EDS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX, SA)
18. ENC – EDS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX, SA)
19. GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS) (MERIAL)
20. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD) (MERIAL)

21. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2) (MERIAL)
22. HIMMVAC IB – ND – EDS COMBINED OIL VACCINE (KBNP)
23. ITA ND + IB + EDS (LAPROVET)
24. IZOVAC ND – EDS – IB (IZO)
25. IZOVAC ND – EDS (IZO)
26. MAVAX ND + EDS + IB (MALTA VACCINES)
27. MEDIVAC ND – EDS EMULSION (MEDION)
28. MEDIVAC ND-EDS-IB EMULSION (MEDION)
29. ND SINCO BRONVAC (PASTEUR INSTITUTE)
30. NEWCASTLE DISEASE AND EGG DROP SYNDROME VACCINE INACTIVATED (LA SOTA STRAIN + 911 STRAIN) (QYH BIOTECH CO)
31. NOBILIS EDS (INTERVET)
32. NOBILIS IB + ND + EDS (INTERVET)
33. NOBILIS IB MULTI + ND + EDS (INTERVET)
34. NOBILIS ND + EDS (INTERVET)
35. NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS (INTERVET)
36. OLVAC A + B (FATRO)
37. OVO – 4 (MERIAL)
38. PESTIKAL + EDS + IB (GENERA, INC.)
39. POULVAC EDS NEW BRONZ VAC (FORT DODGE)
40. POULVAC EDS VAC (PFIZER)
41. POULVAC MIX 6 (FORT DODGE)
42. PROTEK ND – EDS – IB KILL VACC (YEBIO)
43. VAKSIMUNE EDS (VAKSINDO)
44. VAKSIMUNE ND EDS IB (VAKSINDO)
45. VAKSIMUNE ND EDS (VAKSINDO)
46. VOLVAC ND + IB + EDS KV (BOEHRINGER)
47. WINVAC ND EDS IB (CA LABORATORIOS)
48. WINVAC NEWCASTLE EDS (CA LABORATORIOS)

Fowl Pox

1. AE – POXINE (PFIZER)
2. AE + POX (INTERVET)
3. AVAPOX (INTERVET)
4. AVIPRO POX CEO (LOHMANN)
5. AVIPRO POX TC (LOHMANN)

6. AVIPRO POX (LOHMANN)
7. BAL POX (BESTAR LAB)
8. BRONKI – L (INDOVAX)
9. CALAVAC POWL POX (CA LABORATORIOS)
10. CEVAC FP L (CEVA PHYLAXIA)
11. CHICK N POX TC (PFIZER)
12. CORYVAX(INDOVAX)
13. CORYZA BIVALENT (LICENSI KITASATO INSTITUTE)
14. CORYZA OIL – 3 (FORT DODGE)
15. CORYZA (AAKO BV)
16. CORYZAVAC KBL (KYOTO BIKEN LAB)
17. DIFTOSEC CT (MERIAL)
18. FOWL POX (MALAYSIAN VACCINE AND PHARM)
19. HIPRAPOX (HIPRA, S.A)
20. IB H – 52 (AAKO BV)
21. INFECTIOUS BRONCHITIS H-52 (AAKO BV)
22. IZOVAC FOWL – POX (IZO)
23. MAVAX FOWL POX (MALTA VACCINES)
24. MEDIVAC POX (MEDION)
25. NOBILIS AE + POX (INTERVET)
26. POWL POX (INDOVAX)
27. POWL POX (AAKO BV)
28. POXIMUNE AE (CEVA BIOMUNE CO)
29. POXIMUNE (CEVA BIOMUNE CO)
30. POXINE (PFIZER)
31. VAIOL – VAC (FATRO)
32. VAKSIMUNE POX (VAKSINDO)
12. AVIPRO ND – IB POLYBANCO (LOHMANN)
13. AVIPRO ND – IB SOHOL (LOHMANN)
14. BAK ND + EDS + IB (BESTAR LAB.)
15. BAK ND + IB (BESTAR LAB.)
16. BAL IB H120 (BESTAR LAB.)
17. BAL IB H52 (BESTAR LAB.)
18. BAL ND + IB (BESTAR LAB.)
19. BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND + IB + IBD) (MERIAL)
20. BINEWVAX 0,3 (MERIAL)
21. BINEWVAXIDROP (MERIAL)
22. BIORAL H120 (MERIAL)
23. BIOVAC LS – H120 (FATRO)
24. BIVAC II (FATRO)
25. BNE – VAC (CHOONGANG)
26. BRONCHIN (AAKO BV)
27. BRONCHITIS MASS (BRON MASS) (PFIZER)
28. BRONHIKAL SPF (GENERA, INC.)
29. BRONIPRA – I (HIPRA, S.A)
30. BRONIPRA – ND (HIPRA, S.A)
31. BRONIPRA – ND/IBD (HIPRA, S.A)
32. BRONKICHIK (INDOVAX)
33. CALAVAC BRONCHITIS (H 120) (CA LABORATORIOS)
34. CALAVAC NEWCASTLE BRONCHITIS (CA LABORATORIOS)
35. CAPRIVAC NB – K (CAPRIFARMINDO LABS).
36. CAPRIVAC NBG – K (CAPRIFARMINDO LABS).
37. CEVAC BRON 120 L (CEVA PHYLAXIA)
38. CEVAC NB L (CEVA PHYLAXIA)
39. CEVAC ND IB EDS K (CEVA PHYLAXIA)
40. CEVAC ND IB K (CEVA PHYLAXIA)
41. CEVAC VITABRON L (CEVA PHYLAXIA)
42. EDS + NDV + IB (AAKO BV)
43. ENC – BI – EDS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX.)
44. GALLIMUNE 203 (ND + IB) (MERIAL)
45. GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS) (MERIAL)
46. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO) (MERIAL)
47. GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2) (MERIAL)
48. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD) (MERIAL)
49. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2) (MERIAL)
50. HIMMVAC IB – ND – EDS COMBINED OIL VACCINE (KBNP INC)
51. HIMMVAC IB – ND COMBINED OIL VACCINE (KBNP INC)

Haemophilus paragallinarum

1. VOLVAC AC PLUS BACTERIN KV (BOEHRINGER)
2. VOLVAC AC PLUS EMUL BACTERIN KV (BOEHRINGER)

Infectious Bronchitis (IB)

1. ADENIPRAVAC ND/IB (HIPRA, S.A)
2. AVABRON HN – 63 (INTERVET)
3. AVI IB H120 (LAPROVET)
4. AVI ND LASOTA + IB H120 (LAPROVET)
5. AVIPRO 201 ND – IB (LOHMANN)
6. AVIPRO 221 ND – IB2 (LOHMANN)
7. AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO (LOHMANN)
8. AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO (LOHMANN)
9. AVIPRO IB H120 (LOHMANN)
10. AVIPRO IB M 48 (LOHMANN)
11. AVIPRO ND – IB LASOTA (LOHMANN)

52. HIMMVAC IB LIVE VACCINE (KBNP INC)
53. HIMMVAC ND – IB COMBINED LIVE (KBNP INC)
54. HIPRAVIAR – CLON/H120 (HIPRA, S.A)
55. HIPRAVIAR – S/H120 (HIPRA, S.A)
56. HIPRAVIAR – TRT4 (HIPRA, S.A)
57. IB – OLVAC (FATRO)
58. IB H – 120 (AAKO BV)
59. IB (BESTAR LAB.)
60. IBD + NDV + IB (AAKO BV)
61. INFECTIOUS BRONCHITIS H120, LIVE VACCINE (HARBIN PHAR)
62. INFECTIOUS BRONCHITIS H52, LIVE VACCINE (HARBIN PHAR)
63. ITA ND + IB + EDS (LAPROVET)
64. IZOVAC H120 – B1 HITCHNER (IZO)
65. IZOVAC H120 – LA SOTA (IZO)
66. IZOVAC IB H120 (IZO)
67. IZOVAC ND – EDS – IB (IZO)
68. IZOVAC ND – IBD (IZO)
69. K VAC ND – IB (SINSUI INDIA)
70. LA SOTA MASS BLEN (MERIAL)
71. LASOTA + H – 120 (AAKO BV)
72. LAYERMUNE 2 (CEVA PHYLAXIA)
73. MAVAX ND + EDS + IB (MALTA VACCINES)
74. MEDIVAC IB H – 120 (MEDION)
75. MEDIVAC IB H – 52 (MEDION)
76. MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION (MEDION)
77. MEDIVAC ND – IB (MEDION)
78. MEDIVAC ND-EDS-IB EMULSION (MEDION)
79. MEDIVAC ND-IB EMULSION (MEDION)
80. MYVAC 202 (MALAYSIAN VACCINE)
81. NAMA VAC LAS-IB (SINSUI INDIA)
82. NBLH – VAC (CHOONGANG VACCINE)
83. ND SINCO BRONVAC (PASTEUR INSTITUTE)
84. ND VIRUS LASOTA AND IB VIRUS 120 LIVE VACCINE (QYH BIOTECH CO)
85. NEW BRONZ MG (FORT DODGE)
86. NEW BRONZ (FORT DODGE)
87. NEWCASTLE DISEASE – INFECTIOUS BRONCHITIS LIVE VACCINE (LASOTA+H120) (HARBIN WEIKE BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT CO)
88. NEWCASTLE DISEASE B1 BRON CONN MASS (PFIZER)
89. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS II (PFIZER)
90. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS (PFIZER)
91. NOBILIS IB + G + ND (INTERVET)
92. NOBILIS IB + ND + EDS (INTERVET)
93. NOBILIS IB + ND (INTERVET)
94. NOBILIS IB 4/91 (INTERVET)
95. NOBILIS IB H – 120 (INTERVET)
96. NOBILIS IB MA 5 (INTERVET)
97. NOBILIS IB MULTI + ND + EDS (INTERVET)
98. NOBILIS IB MULTI + G + ND (INTERVET)
99. NOBILIS IB MULTI + ND (INTERVET)
100. NOBILIS MA5 + CLONE 30 (INTERVET)
101. NOBILIS REO + IB + G + ND (INTERVET)
102. NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS (INTERVET)
103. OLVAC A + B (FATRO)
104. OLVAC B + G (FATRO)
105. OVO – 4 (MERIAL)
106. PESTIKAL + EDS + IB GENERA, INC.)
107. POLYBRON N – 63 (INTERVET)
108. POULVAC EDS NEW BRONZ VAC (FORT DODGE)
109. POULVAC IB H120 (FORT DODGE)
110. POULVAC MIX 6 (FORT DODGE)
111. PRO VAC 3 (PFIZER)
112. PRO VAC 4 (PFIZER)
113. PROTEK ND – EDS – IB KILL VACC (YEBIO)
114. PROTEK ND – IB KILL VACC (YEBIO)
115. REPROMUNE 4 AVIPRO 331 ND – IB2 – BD3 (LOHMANN)
116. VAKSIMUNE CLONE IB (VAKSINDO)
117. VAKSIMUNE IB INAKTIF (VAKSINDO)
118. VAKSIMUNE IB (VAKSINDO)
119. VAKSIMUNE ND EDS IB (VAKSINDO)
120. VAKSIMUNE ND IB INAKTIF (VAKSINDO)
121. VAKSIMUNE ND IB PLUS (VAKSINDO)
122. VAKSIMUNE NDB1 IB (VAKSINDO)
123. VAKSIMUNE NDB1 (VAKSINDO)
124. VAKSIMUNE NDHV IB (VAKSINDO)
125. VAKSIMUNE NDLS IB (VAKSINDO)
126. VH + H – 120 (AAKO BV)
127. VOLVAC ND + IB + EDS KV (BOEHRINGER)
128. VOLVAC ND + IB KV (BOEHRINGER)
129. VOLVAC ND + IB MLV (BOEHRINGER)
130. VOLVAC ND CONC. KV (BOEHRINGER)
131. WINVAC ND EDS IB (CA LABORATORIOS)
132. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS GUMBORO (ND – IB – IBD) (CA LABORATORIOS)
133. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS (CA LABORATORIOS)

Infectious Bursal Disease (IBD)

1. ADENIPRAVAC TRIPLE (HIPRA, S.A)
2. AVI IBD INTER (LAPROVET)
3. AVIPRO 202 ND – IBD (LOHMANN)
4. AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO (LOHMANN)
5. AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO (LOHMANN)
6. AVIPRO IBD XTREME (LOHMANN)
7. AVIPRO PRECISE (LOHMANN)
8. AVIPRO VIBURSA CE (LOHMANN)
9. BAK ND + IBD (BESTAR LAB)
10. BAL IBD (BESTAR LAB)
11. BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND + IB + IBD) (MERIAL)
12. BRONIPRA – ND/IBD (HIPRA, S.A)
13. BUR 706 (MERIAL)
14. BURCELL HVT (MERIAL)
15. BURSA – MEX (LABORATORIO AVIMEX)
16. BURSA – VAC (INTERVET)
17. BURSA – VAC 3 (INTERVET)
18. BURSA BLEN M (MERIAL)
19. BURSAPLEX (PFIZER)
20. BURSIMUNE (BIOMUNE CO)
21. BURSINE – 2 (PFIZER)
22. BURSINE – K (PFIZER)
23. BURSINE N – K (PFIZER)
24. BURSINE PLUS (PFIZER)
25. CALAVAC GUMBORO INTERMEDIATE (CA LABORATORIOS)
26. CAPRIVAC IBD – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
27. CAPRIVAC NBG – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
28. CAPRIVAC NG – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
29. CEVAC GUMBO L (CEVA PHYLAXIA)
30. CEVAC IBD L (CEVA PHYLAXIA)
31. CEVAC ND IBD K (CEVA PHYLAXIA)
32. CEVAC TRANSMUNE IBD (CEVA PHYLAXIA)
33. CEVAC TRANSMUNE (CEVA PHYLAXIA)
34. GALLIMUNE 201 (IBD + REO) (MERIAL)
35. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO) (MERIAL)
36. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD) (MERIAL)
37. GALLIMUNE IBD (MERIAL)
38. GEORGIA STRAIN (INDOVAX PRIVATE)
39. GUMB – VAC (FATRO)
40. GUMBIN MB (AAKO BV)
41. GUMBOKAL SPF (GENERA, INC)
42. GUMBOPEST (MERIAL)
43. GUMBORIFFA 0,3 (MERIAL)
44. GUMBORO MB (AAKO BV)
45. HIMMVAC IBD LIVE VACCINE (KBNP INC)
46. HIPRAGUMBORO – BPL2 (HIPRA, S.A)
47. HIPRAGUMBORO – CH/80 (HIPRA, S.A)
48. HIPRAGUMBORO – GM97 (HIPRA, S.A)
49. HIPRAVIAR – TRT4 (HIPRA, S.A)
50. IBA VAC ST (FATRO)
51. IBA VAC (FATRO)
52. IBD – VAC (CHOONGANG)
53. IBD + NDV + IB (AAKO BV)
54. IBD BLEN (MERIAL)
55. IBD V877 (MALAYSIAN VACCINE)
56. INMUGAL IBA GUMBORO (LABORATORIOS OVEJERO SA)
57. ITA ND + IBD (LAPROVET)
58. IZOVAC GUMBORO 2 (IZO)
59. IZOVAC GUMBORO (IZO)
60. MEDIVAC GUMBORO A (MEDION)
61. MEDIVAC GUMBORO B (MEDION)
62. MEDIVAC GUMBORO EMULSION (MEDION)
63. MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION (MEDION)
64. NOBILIS G + ND (INTERVET)
65. NOBILIS GUMBORO 228E (INTERVET)
66. NOBILIS GUMBORO D78 (INTERVET)
67. NOBILIS GUMBORO INAC (INTERVET)
68. NOBILIS IB + G + ND (INTERVET)
69. NOBILIS IB MULTI + G + ND (INTERVET)
70. NOBILIS REO + IB + G + ND (INTERVET)
71. OLVAC B + G (FATRO)
72. POULVAC BURSA F (FORT DODGE)
73. PRO VAC 3 (PFIZER)
74. PRO VAC 4 (PFIZER)
75. PROTEK IBD KILL VACC (YEBIO)
76. PROTEK ND-IBD KILL VACC (YEBIO)
77. REPROMUNE 4 AVIPRO 331 ND – IB2 – BD3 (LOHMANN)
78. TRANSVAC (CEVA PHYLAXIA)
79. VAKSIMUNE IBD D (VAKSINDO)
80. VAKSIMUNE IBD L (VAKSINDO)
81. VAKSIMUNE IBD M (VAKSINDO)
82. VAKSIMUNE ND IBD INAKTIF (VAKSINDO)
83. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS GUMBORO (ND – IB – IBD) (CA LABORATORIOS)
84. WINVAC NEWCASTLE GUMBORO (ND-IBD) (CA LABORATORIOS)
85. VOLVAC IBD MLV (BOEHRINGER)

Infectious Laryngo Tracheitis (ILT)

1. AVIPRO ILT (LOHMANN)
2. AVIPRO LT (LOHMANN)
3. BAL ILT (BESTAR LAB)
4. BROILERTRAKE – M (INTERVET)
5. CEVAC LT L (CEVA PHYLAXIA)
6. HIMMVAC ILT LIVE VACCINE (KBNP INC)
7. HIPRAVIAR – ILT (HIPRA, S.A)
8. ILT – VAC (CHOONGANG)
9. ILT (AAKO BV)
10. INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS LIVE VACCINE (K137) (HARBIN WEIKE)
11. IZOVAC ILT (IZO)
12. LARVAC (NEUVA EUROBIO)
13. LARYNGO – VAC (PFIZER)
14. LARYNGOTRACHEITIS, LIVE VACCINE (HARBIN PHARMACEUTICAL)
15. LT – IVAX (SCHERING-PLOUGH)
16. LT BLEN (MERIAL)
17. MEDIVAC ILT(MEDION)
18. NOBILIS ILT BIOTRACH (INTERVET)
19. NOBILIS ILT (INTERVET)
20. VAKSIMUNE ILT (VAKSINDO)
21. VOLVAC LT MLV (BOEHRINGER)

Marek

1. AVIPRO MD RISPENS RL (LOHMANN)
2. BIOMAREK HVT (FATRO)
3. BURCELL HVT (MERIAL)
4. CEVAC MD HVT & RISPENS (CEVA BIOMUNE CO)
5. CEVAC MD RISPENS (CEVA BIOMUNE CO)
6. MAREK DISEASE VACCINE (STRAIN CVI – 988) (AAKO BV)
7. MAREK RISPEN CVI 988 (MAREK'S DISEASE VACCINE LIVE CHICKEN HERPES VIRUS) (MERIAL)
8. MAREK RISPEN CVI 988 + HVT (MERIAL)
9. MAREK'S DISEASE VACCINE, SEROTYPE3, LIVE VIRUS/MAREK'S HVT (MERIAL)
10. MD – VAC CFL (FORT DODGE)
11. NOBILIS MAREXINE CA126 (INTERVET)
12. NOBILIS RISMAYAC + CA 126 (INTERVET)
13. NOBILIS RISMAYAC (INTERVET)
14. POULVAC MAREK CVI (FORT DODGE)

15. POULVAC OVOLINE CHI + HVT MAREK'S DISEASE VACCINE (FORT DODGE)
16. VVMD – VAC (FORT DODGE)

Mycoplasma gallisepticum

1. AVIPRO 104 MG BACTERIN (LOHMANN)
2. AVIPRO MG F (LOHMANN)
3. CEVAC MG F (CEVA SAUDE)
4. F VAX MG (INTERVET)
5. GALLIMUNE MG (MERIAL)
6. IZOVAC MG (IZO)
7. NEW BRONZ MG (FORT DODGE)
8. NOBILIS ND + EDS (INTERVET)
9. VAXSAFE MG VACCINE (BIOPROPERTIES PTE. LTD.-MERIAL AUSTRALIA)

Mycoplasma sinovia

1. VAXSAFE MS VACCINE (MERIAL)

Newcastle Disease (ND)

2. ADENIPRAVAC ND/IB (HIPRA, S.A)
3. ADENIPRAVAC TRIPLE (HIPRA, S.A)
4. AVABRON HN – 63 (INTERVET)
5. AVI ND LASOTA + IB H120 (LAPROVET)
6. AVI ND LASOTA (LAPROVET)
7. AVINEW FROZEN (MERIAL)
8. AVINEW (MERIAL)
9. AVIPRO 105 ND CHICK (LOHMANN)
10. AVIPRO 105 ND (LOHMANN)
11. AVIPRO 201 ND – IB (LOHMANN)
12. AVIPRO 202 ND – IBD (LOHMANN)
13. AVIPRO 221 ND – IB2 (LOHMANN)
14. AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO (LOHMANN)
15. AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO (LOHMANN)
16. AVIPRO ND – IB LASOTA (LOHMANN)
17. AVIPRO ND – IB POLYBANCO (LOHMANN)
18. AVIPRO ND – IB SOHOL (LOHMANN)
19. AVIPRO ND B1 (LOHMANN)
20. AVIPRO ND C131 (LOHMANN)
21. AVIPRO ND HB1 (LOHMANN)
22. AVIPRO ND LASOTA (LOHMANN)
23. AVIPRO ND VISOTA (LOHMANN)
24. BAK ND + EDS + IB (BESTAR LAB.)
25. BAK ND + EDS (BESTAR LAB.)
26. BAK ND + IB (BESTAR LAB.)
27. BAK ND + IBD (BESTAR LAB.)
28. BAK ND (BESTAR LAB.)

29. BAL ND + IB (BESTAR LAB.)
30. BAL ND CLONE (BESTAR LAB.)
31. BAL ND LASOTA (BESTAR LAB.)
32. BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND + IB + IBD) (MERIAL)
33. BINEWVAX 0,3 (MERIAL)
34. BINEWVAXIDROP (MERIAL)
35. BIOVAC LS – H120 (FATRO)
36. BIOVAK B1 (FATRO)
37. BIOVAK LASOTA (FATRO)
38. BNE – VAC (CHOONGANG)
39. BROILERMUNE (CEVA PHYLAXIA VET.)
40. BRONCHIN (AAKO BV)
41. BRONIPRA – ND (HIPRA, S.A)
42. BRONIPRA – ND/IBD (HIPRA, S.A)
43. BURSINE N – K (PFIZER)
44. CALAVAC NEWCASTLE BRONCHITIS (CA LABORATORIOS)
45. CALAVAC NEWCASTLE LASOTA (LASOTA+H120) (CA LABORATORIOS)
46. CAPRIVAC NB – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
47. CAPRIVAC NBG – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
48. CAPRIVAC ND – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
49. CAPRIVAC ND AI – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
50. CAPRIVAC NE – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
51. CAPRIVAC NG – K (CAPRIFARMINDO LABS.)
52. CEVAC BROILER ND K (CEVA PHYLAXIA VET.)
53. CEVAC CORYMUNE 7 K (CEVA PHYLAXIA VET.)
54. CEVAC NB L (CEVA PHYLAXIA VET.)
55. CEVAC ND EDS K (CEVA PHYLAXIA VET.)
56. CEVAC ND IB EDS K (CEVA PHYLAXIA VET.)
57. CEVAC ND IB K (CEVA PHYLAXIA VET.)
58. CEVAC ND IBD K (CEVA PHYLAXIA VET.)
59. CEVAC NEW K (CEVA PHYLAXIA VET.)
60. CEVAC NEW L (CEVA PHYLAXIA VET.)
61. CEVAC VITABRON L (CEVA PHYLAXIA VET.)
62. CEVAC VITAPEST L (CEVA PHYLAXIA VET.)
63. CHICK N – K (PFIZER)
64. CHICKOPEST (MERIAL)
65. EDS + NDV + IB (AAKO BV)
66. EDS + NDV (AAKO BV)
67. EDS NEW VAC (PFIZER)
68. EDS OLVAC (FATRO)
69. ENC – BI – EDS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX, SA)
70. ENC – EDS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX, SA)
71. ENCIVAX (INDOVAX PRIVATE)
72. GALLIMUNE 203 (ND + IB) (MERIAL)
73. GALLIMUNE 301 (ND + IC2) (MERIAL)
74. GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS) (MERIAL)
75. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO) (MERIAL)
76. GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2) (MERIAL)
77. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD) (MERIAL)
78. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2) (MERIAL)
79. GALLIMUNE ND DAY OLD (MERIAL)
80. GALLIMUNE ND (MERIAL)
81. GALLIVAC LASOTA (MERIAL)
82. GUMBIN MB (AAKO BV)
83. GUMBOPEST (MERIAL)
84. HIMMVAC IB – ND – EDS COMBINED OIL VACCINE (KBNP INC)
85. HIMMVAC IB – ND COMBINED OIL VACCINE (KBNP INC)
86. HIMMVAC LASOTA LIVE VACCINE (KBNP INC)
87. HIMMVAC ND – IB COMBINED LIVE VACCINE (KBNP INC)
88. HIMMVAC ND HIGH VACCINE (KBNP INC)
89. HIMMVAC ND OIL VACCINE (KBNP INC)
90. HIPRAGUMBORO – BPL2 (HIPRA, S.A)
91. HIPRAVIAR – B1 (HIPRA, S.A)
92. HIPRAVIAR – BPL2 (HIPRA, S.A)
93. HIPRAVIAR – CLON (HIPRA, S.A)
94. HIPRAVIAR – CLON/H120 (HIPRA, S.A)
95. HIPRAVIAR – ND BROILERS (HIPRA, S.A)
96. HIPRAVIAR – S (HIPRA, S.A)
97. HIPRAVIAR – S/H120 (HIPRA, S.A)
98. HIPRAVIAR – TRT4 (HIPRA, S.A)
99. IB – OLVAC (FATRO)
100. IBD + NDV + IB (AAKO BV)
101. IMOPEST (MERIAL)
102. INMUGAL VP LASOTA (LABORATORIOS OVEJERO SA)
103. ITA ND + IBD (LAPROVET)
104. ITA (NEW) ND (LAPROVET)
105. ITA ND + IB + EDS (LAPROVET)
106. IZOVAC B1 HITCHNER (IZO)
107. IZOVAC CLONE (IZO)
108. IZOVAC H120 – B1 HITCHNER (IZO)
109. IZOVAC H120 – LA SOTA (IZO)

110. IZOVAC LASOTA (IZO)
111. IZOVAC ND – BROILER (IZO)
112. IZOVAC ND – EDS – IB (IZO)
113. IZOVAC ND – EDS (IZO)
114. IZOVAC ND – IBD (IZO)
115. IZOVAC ND (IZO)
116. K VAC CHICKEN ND (SINSUI INDIA)
117. K VAC ND – IB (SINSUI INDIA)
118. K VAC ND (SINSUI INDIA)
119. KOMAVET (PUSVETMA)
120. LA SOTA MASS BLEN (MERIAL)
121. LASOTA + H – 120 (AAKO BV)
122. LASOTA STRAIN (NEWCASTLE DISEASE VACCINE) (INDOVAX PRIVATE)
123. LASOTA STRAIN (NEWCASTLE DISEASE VACCINE) (INDOVAX PRIVATE)
124. LASOTA (LABORATORIO AVIMEX, SA)
125. LASOTA (LABORATORIO AVIMEX, SA)
126. LASOTA (AAKO BV)
127. LASOTA (AAKO BV)
128. LAYERMUNE 2 (CEVA PHYLAXIA)
129. LAYERMUNE ND(CEVA PHYLAXIA)
130. LENTOVET (PUSVETMA)
131. MAVAX LA SOTA (MALTA VACCINES)
132. MAVAX ND + EDS + IB (MALTA VACCINES)
133. MAVAX ND (MALTA VACCINES)
134. MEDIVAC ND – AI EMULSION (MEDION)
135. MEDIVAC ND – EDS EMULSION (MEDION)
136. MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION (MEDION)
137. MEDIVAC ND – IB (MEDION)
138. MEDIVAC ND CLONE 45 (MEDION)
139. MEDIVAC ND EMULSION 0.3 (MEDION)
140. MEDIVAC ND EMULSION (MEDION)
141. MEDIVAC ND GUMBORO EMULSION (MEDION)
142. MEDIVAC ND HITCHNER B1 (MEDION)
143. MEDIVAC ND LA SOTA (MEDION)
144. MEDIVAC ND-EDS-IB EMULSION (MEDION)
145. MEDIVAC ND-IB EMULSION (MEDION)
146. MYVAC 202 (MALAYSIAN VACCINE AND PHARM)
147. NAMA VAC LAS-IB (SINSUI INDIA)
148. NAMA VAC NDLAS (SINSUI INDIA)
149. NBLH – VAC (CHOONGANG)
150. ND SINCO BRONVAC (PASTEUR INSTITUTE)
151. ND VACCINE LASOTA (AAKO BV)
152. ND VIRUS LASOTA AND IB VIRUS 120 LIVE VACCINE (QYH BIOTECH CO)
153. NDG – VAC (CHOONGANG)
154. NDLS – VAC (CHOONGANG)
155. NDV4HR (MALAYSIAN VACCINE AND PHARM)
156. NECTIN (AAKO BV)
157. NEDEVAC(PASTEUR INSTITUTE)
158. NEW BRONZ MG (FORT DODGE)
159. NEW BRONZ (FORT DODGE)
160. NEWCA – MEX (LABORATORIO AVIMEX)
161. NEWCASTLE B1 (PFIZER)
162. NEWCASTLE DISEASE – INFECTIOUS BRONCHITIS LIVE VACCINE (LASOTA+H120) (HARBIN WEIKE)
163. NEWCASTLE DISEASE AND EGG DROP SYNDROME VACCINE INACTIVATED (LA SOTA STRAIN + 911 STRAIN) (QYH BIOTECH CO)
164. NEWCASTLE DISEASE B1 BRON CONN MASS (PFIZER)
165. NEWCASTLE DISEASE KILLED VACCINE (LA SOTA) (HARBIN WEIKE)
166. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS II (PFIZER)
167. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS (PFIZER)
168. NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (CLONE 30) (HARBIN WEIKE)
169. NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (LA SOTA) (HARBIN WEIKE)
170. NEWCASTLE DISEASE N – 63 (NTERVET)
171. NEWCASTLE DISEASE N – 79 (NTERVET)
172. NEWCASTLE DISEASE VACCINE INACTIVATED (LA SOTA STRAIN) (QYH BIOTECH CO)
173. NEWCASTLE DISEASE VACCINE LIVE (LASOTA STRAIN) (QYH BIOTECH CO)
174. NEWCASTLE DISEASE VACCINE, LIVING, BP (VET) (B1 STRAIN) (VENKATESHWARA HATCH)
175. NEWCASTLE DISEASE VACCINE, LIVING, BP (VET) (LASOTA STRAIN) (VENKATESHWARA HATCH)
176. NEWCASTLE INFLUENZA KILLED VIRUS VACCINE (LABORATORIO AVIMEX SA)
177. NEWCASTLE K (FORT DODGE)
178. NEWCASTLE LASOTA (PFIZER)
179. NEWVAC LASOTA (PASTEUR INSTITUTE)
180. NOBILIS G + ND (INTERVET)
181. NOBILIS IB + G + ND (INTERVET)
182. NOBILIS IB + ND + EDS (INTERVET)
183. NOBILIS IB + ND (INTERVET)
184. NOBILIS IB MULTI + ND + EDS (INTERVET)
185. NOBILIS IB MULTI + G + ND (INTERVET)
186. NOBILIS MA5 + CLONE 30 (INTERVET)
187. NOBILIS ND + EDS (INTERVET)
188. NOBILIS ND BROILER (INTERVET)

189. NOBILIS ND C2 (INTERVET)
190. NOBILIS ND CLONE 30 (INTERVET)
191. NOBILIS ND HITCHNER (INTERVET)
192. NOBILIS ND LA SOTA (INTERVET)
193. NOBILIS NEWCAVAC (INTERVET)
194. NOBILIS REO + IB + G + ND (INTERVET)
195. NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS (INTERVET)
196. OL – VAC (FATRO)
197. OLVAC 1000 (FATRO)
198. OLVAC A + B (FATRO)
199. OLVAC B + G (FATRO)
200. OVO – 4 (MERIAL)
201. PESTIKAL + EDS + IB (GENERA, INC)
202. PESTIKAL (GENERA, INC)
203. PM – OLVAC (FATRO)
204. POLYBRON N – 63 (INTERVET)
205. POULVAC EDS NEW BRONZ VAC (FORT DODGE)
206. POULVAC MIX 6 (FORT DODGE)
207. POULVAC NDW (FORT DODGE)
208. PRO VAC 3 (PFIZER)
209. PRO VAC 4 (PFIZER)
210. PROTEK ND – EDS – IB KILL VACC (YEBIO)
211. PROTEK ND – IB KILL VACC (YEBIO)
212. PROTEK ND KILL VACC (YEBIO)
213. PROTEK ND LIVE VACC (YEBIO)
214. PROTEK ND-IBD KILL VACC (YEBIO)
215. REPMUNE 4 AVIPRO 331 ND – IB2 – BD3 (LOHMANN)
216. RESPIMUNE (CEVA BIOMUNE CO.)
217. SOTASEC (MERIAL)
218. VAKSIMUNE CLONE IB (VAKSINDO)
219. VAKSIMUNE CLONE (VAKSINDO)
220. VAKSIMUNE K (VAKSINDO)
221. VAKSIMUNE ND AI (VAKSINDO)
222. VAKSIMUNE ND AIN2 (VAKSINDO)
223. VAKSIMUNE ND CLONE (VAKSINDO)
224. VAKSIMUNE ND EDS IB (VAKSINDO)
225. VAKSIMUNE ND EDS (VAKSINDO)
226. VAKSIMUNE ND IB INAKTIF (VAKSINDO)
227. VAKSIMUNE ND IB PLUS (VAKSINDO)
228. VAKSIMUNE ND IBD INAKTIF (VAKSINDO)
229. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,1 (VAKSINDO)
230. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,3 (VAKSINDO)
231. VAKSIMUNE ND INAKTIF (VAKSINDO)
232. VAKSIMUNE ND L INAKTIF (VAKSINDO)
233. VAKSIMUNE NDB1 IB (VAKSINDO)
234. VAKSIMUNE NDB1 (VAKSINDO)
235. VAKSIMUNE NDHV (VAKSINDO)
236. VAKSIMUNE NDHV IB (VAKSINDO)
237. VAKSIMUNE NDLS IB (VAKSINDO)
238. VAKSIMUNE NDLS (VAKSINDO)
239. VAKSIN ND LASOTA (VAKSINDO)
240. VH + H – 120 (AAKO BV)
241. VH (AAKO BV)
242. VOLVAC ND + IB + EDS KV (BOEHRINGER)
243. VOLVAC ND + IB KV (BOEHRINGER)
244. VOLVAC ND + IB MLV (BOEHRINGER)
245. VOLVAC ND CONC. KV (BOEHRINGER)
246. VOLVAC ND KV (BOEHRINGER)
247. VOLVAC ND LASOTA MLV (BOEHRINGER)
248. WINVAC ND EDS IB (CA LABORATORIOS)
249. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS GUMBORO (ND – IB – IBD) (CA LABORATORIOS)
250. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS (CA LABORATORIOS)
251. WINVAC NEWCASTLE CONCENTRATED (CA LABORATORIOS)
252. WINVAC NEWCASTLE EDS (CA LABORATORIOS)
253. WINVAC NEWCASTLE GUMBORO (ND-IBD) (CA LABORATORIOS)

Reo Virus

1. AVIPRO 106 REO (LOHMANN)
2. AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO (LOHMANN)
3. AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO (LOHMANN)
4. AVIPRO REO (LOHMANN)
5. ENTEROVAX (INTERVET)
6. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO) (MERIAL)
7. GALLIMUNE REO (MERIAL)
8. NOBILIS REO + IB + G + ND (INTERVET)
9. NOBILIS REO 1133 (INTERVET)
10. NOBILIS REO 2177 (INTERVET)
11. NOBILIS REO ERS INAC (INTERVET)
12. NOBILIS REO INAC (INTERVET)
13. PRO VAC 4 (PFIZER)
14. REOMUNE 3 (CEVA BIOMUNE CO)
15. REPMUNE 4 GALLIMUNE 201 (IBD + REO) (MERIAL)
16. TRI – REO (PFIZER)

Salmonella Enteritidis (SE)

1. AVIPRO 109 SE4 (LOHMANN)
2. CEVAC CORYMUNE 7 K (CEVA PHYLAXIA)
3. GALLIMUNE SE (MERIAL)
4. LAYERMUNE SE (CEVA BIOMUNE CO)
5. NOBILIS SALENVAC (INTERVET)

Swollen Head Syndrome (SHS)

1. AVIFFA RTI (MERIAL)
2. HIPRAVIAR – TRT4 (HIPRA, S.A)
3. NEMOVAC (MERIAL)
4. NOBILIS RT INAC (INTERVET)
5. NOBILIS RTV 8544 (INTERVET)
6. OVO – 4 (MERIAL)

S. Pullorum

1. PULLOGEN (VAKSINDO)

Tenosynovitis

1. GALLIVAC REO (MERIAL)
2. TENO – VAXIN (INTERVET)
3. V.A. CHICK VAC (PFIZER)
4. VA VAC (PFIZER)

Turkey Rhinotracheitis (TRT)

1. NOBILIS RT + IB MULTI + ND + EDS (INTERVET).****

VAKSIN TERNAK

Anthrax

1. ANTHRAXVET (PUSVETMA)
2. ANTHRAX SPORE VACCINE (COLORADO SERUM CO.)
3. VAKSIMUNE ANTHRAX (VAKSINDO)

Atrophic rhinitis

1. RHINIFFA T (MERIAL)

Bordetella bronchiseptica

1. PORCILIS ART (INTERVET)

Bovine diarea

1. BOVI SHIELD 3 (NOVARTIS)

Bovine respiratory syncytial virus (BRSV)

1. VIRA SHIELD 6 (NOVARTIS)

Brucella abortus

1. BRUCELLA ABORTUS STRAIN RB – 51 (COLORADO SERUM CO.)
2. BRUCIVET (PUSVETMA)

Cytopathic Bovine Viral Diarrhea (BVD)

1. VIRA SHIELD 4 (NOVARTIS)
2. VIRA SHIELD 6 (NOVARTIS)

Hog cholera

1. HIMMVAC HOG CHOLERA (T/C) VACCINE (KBNP INC.)
2. LIVE HOG CHOLERA VACCINE (KITASATO)
3. PEST – VAC (FORT DODGE SAUDE)
4. PESTIFFA (MERIAL)

Infectious bovine rhinotracheitis (IBR)

1. VIRA SHIELD 4 (NOVARTIS)
2. VIRA SHIELD 6 (NOVARTIS)

Mycoplasma hyopneumoniae

1. HYORESP (MERIAL)
2. INGELVAC MYCOFLEX (BOEHRINGER)
3. RESPISURE (PFIZER)
4. SUVAXYN RESPIFEND MH (PFIZER)

Noncytopathic

1. VIRA SHIELD 4 (NOVARTIS)

Orf (Contagious ectyema, Contagious dermatitis)

1. ORIVET(PUSVETMA)

Parainfluenza (PI3)

1. VIRA SHIELD 4 (NOVARTIS)
2. VIRA SHIELD 6 (NOVARTIS)

Pasteurella multocida

1. PORCILIS ART(INTERVET)

Porcine reproductive and Respiratory syndrome (PRRS)

1. INGELVAC PRRS MLV (BOEHRINGER)

Septicemia epizootica (SE)

1. SEPTIVET (PUSVETMA)
2. VAKSIMUNE SE (VAKSINDO)

Swine erysipelas

1. PORCILIS ERY (INTERVET)
2. SUVAXYN E (PFIZER).****

VAKSIN HEWAN AIR

1. AQUAVAC STREPSA (INTERVET)
2. AQUAVACIRIDOV (INTERVET)
3. NORVAX STREPSI (INTERVET).****

WAKSIN HEWAN KESAYANGAN

Bordetella brochiseptica

1. PNEUMODOG (MERIAL)

Canine Adenovirus

1. BIOCAN DHPPI (BIOVETA)
2. DURAMUNE DA2L (PFIZER)
3. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
4. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
5. NOBIVAC DH (INTERVET)
6. NOBIVAC DHP (INTERVET)
7. NOBIVAC DHPPI (INTERVET)
8. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
9. VANGUARD PLUS 5/CV – L (PFIZER)
10. VANGUARD PLUS 5/L (PFIZER)

Canine Corona virus (CCV)

1. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
2. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
3. VANGUARD PLUS 5/CV – L (PFIZER)
4. VANGUARD PLUS CPV/CV (PFIZER)

Canine Distemper Virus (CDV)

1. BIOCAN DHPPI (BIOVETA)
2. CANIFFA (MERIAL)
3. CANIGEN DHA 2 P/L (VIRBAC SA)
4. DHPPL – VAC (CHOONGANG)
5. DURAMUNE DA2L (PFIZER)
6. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
7. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
8. EURICAN DHPPI – 2 (MERIAL)
9. EURICAN DHPPI – 2 LR (MERIAL)
10. EURICAN DHPPI – 2 (MERIAL)
11. HEXADOG (MERIAL)
12. NOBIVAC DH (INTERVET)
13. NOBIVAC DHP (INTERVET)
14. NOBIVAC DHPPI (INTERVET)
15. NOBIVAC PUPPY DP (INTERVET)
16. PENTADOG (MERIAL)
17. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
18. VANGUARD PLUS 5/CV – L (PFIZER)
19. VANGUARD PLUS 5/L (PFIZER)

Canine Para Influenza (CPiV)

1. BIOCAN DHPPI (BIOVETA,)
2. DHPPL – VAC (CHOONGANG)
3. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
4. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
5. EURICAN DHPPI – 2 L (MERIAL)
6. EURICAN DHPPI – 2 LR (MERIAL)
7. EURICAN DHPPI – 2 (MERIAL)
8. NOBIVAC DHPPI (INTERVET)
9. PNEUMODOG (MERIAL)
10. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
11. VANGUARD PLUS 5/CV – L (PFIZER)
12. VANGUARD PLUS 5/L (PFIZER)

Canine Parvo Virus (CPV)

1. BIOCAN DHPPI (BIOVETA)
2. CANIGEN DHA 2 P/L (VIRBAC SA)
3. DHPPL – VAC (CHOONGANG)
4. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
5. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
6. DURAMUNE MAX PV (PFIZER)
7. EURICAN DHPPI – 2 L (MERIAL)
8. EURICAN DHPPI – 2 LR (MERIAL)
9. EURICAN DHPPI – 2 (MERIAL)
10. HEXADOG (MERIAL)
11. NOBIVAC DHP (INTERVET)
12. NOBIVAC DHPPI (INTERVET)
13. NOBIVAC PARVO – C (INTERVET)
14. NOBIVAC PUPPY DP (INTERVET)
15. PARVIGEN (VIRBAC SA)
16. PRIMODOG (MERIAL)
17. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
18. VANGUARD PLUS 5/CV – L (PFIZER)
19. VANGUARD PLUS 5/L (PFIZER)
20. VANGUARD PLUS CPV (PFIZER)
21. VANGUARD PLUS CPV/CV (PFIZER)

Feline Calici virus (FCV)

1. FEL – O – GUARD PLUS 3 (PFIZER)
2. NOBIVAC TRICAT (INTERVET)
3. PUREVAX (MERIAL)

Feline Chlamydiosis

1. FELOCELL 4 (PFIZER)

Feline Herpes virus (FHV)

1. NOBIVAC TRICAT (INTERVET)
2. PUREVAX (MERIAL)

Feline Panleukopenia (FPL)

1. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
2. FEL – O – GUARD PLUS 3 (PFIZER)3.
FELLINIFFA (MERIAL)
4. FELOCELL 4 (PFIZER)
5. NOBIVAC TRICAT (INTERVET)
6. PUREVAX (MERIAL)

Feline Respiratory disease

1. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
2. FELOCELL 4 (PFIZER)

Feline Rhinotracheitis (FVR)

1. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
2. FEL – O – GUARD PLUS 3 (PFIZER)
3. FELOCELL 3 (PFIZER)
4. FELOCELL 4 (PFIZER)

HCC

1. HEXADOG (MERIAL)

Infectious Canine Hepatitis (ICH)

1. CANIFFA (MERIAL)
2. CANIGEN DHA 2 P/L (VIRBAC SA)
3. DHPPL – VAC (CHOONGANG)
4. DURAMUNE DA2L (PFIZER)
5. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
6. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
7. EURICAN DHPPI – 2 L (MERIAL)
8. EURICAN DHPPI – 2 LR (MERIAL)
9. EURICAN DHPPI – 2 (MERIAL)
10. PENTADOG (MERIAL)
11. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
12. VANGUARD PLUS 5/CV – L (PFIZER)

Leptospirosis

1. CANIFFA (MERIAL)
2. CANIGEN DHA 2 P/L (VIRBAC SA)
3. DHPPL – VAC (CHOONGANG)
4. DURAMUNE DA2L (PFIZER)
5. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L (PFIZER)
6. DURAMUNE MAX 5/4L (PFIZER)
7. EURICAN DHPPI – 2 L (MERIAL)
8. EURICAN DHPPI – 2 LR (MERIAL)
9. HEXADOG (MERIAL)
10. NOBIVAC RL (INTERVET)
11. PENTADOG (MERIAL)
12. VANGUARD PLUS 5 L4 CV (PFIZER)
13. VANGUARD PLUS 5/L (PFIZER)

Microsporum canis

1. BIOCAN M INJ (BIOVETA,)

Rabies

1. BIOCAN R INJ (BIOVETA,)
2. CANISHOT RV – F (CHOONGANG)
3. DEFENSOR 3 (PFIZER)
4. EURICAN DHPPI – 2 LR (MERIAL)
5. HEXADOG (MERIAL)
6. NEO RABIVAK TC (VAKSINDO)
7. NOBIVAC RABIES (INTERVET)
8. NOBIVAC RL (INTERVET)
9. PENTADOG (MERIAL)
10. RABIGEN MONO (VIRBAC SA)
11. RABISIN (MERIAL)
12. RABIVET SUPRA'92 (PUSVETMA)
13. RABVAC 3 TF (PFIZER)
14. RABVAC 3 (PFIZER).****

INDEX OBAT HEWAN BERDASARKAN NAMA GENERIK

Sediaan Obat Hewan Golongan Sediaan Farmasetik (01) dan Imbuhan Pakan (03-01) disusun secara alfabetis menurut nama generik zat aktif kandungannya. Dalam indeks ini hanya dimuat zat aktif utama dan tidak dicantumkan vitamin, asam amino, mineral dan zat aktif penunjang dan sediaan majemuk.

Benzalkonium klorida dan amonium kuarterner dan dicantumkan sebagai AMONIUM KUARTENER, senyawa. Surfaktan lain yang digunakan sebagai antiseptika/desinfeksi dicantumkan di bawah judul SURFAKTAN. Senyawa fenolitik dan senyawa desinfektansia di cantumkan di bawah judul FENOL, senyawa.

DAFTAR KHUSUS

Butadion = Fenil Butazon (Phenylbutazone), Antiinflamasi, analgesik
Dipyrrone= Metampiron (Methampyrone) = Antalgin =Metamizol =Sulpirin
Centiofur (sodium), antibakteri golongan Sefalosporin (Chepalosporin)
Cephalexin, antibakteri golongan Sefalosporin (Chepalosporin)
Chepapiirin, anti bakteri golongan Sefalosporin (Chepalosporin)
Propionic compound=senyawa propionat, faran atau derivat asam propionat.

α - AMYLASE

1. DANISCO ANIMAL NUTRITON LIQUID
2. ALPHA – AMYLASE

ABAMECTINE

1. PARAMECTIN RV POUR – ON FOR CATLE
2. PARAMECTIN RV POUR – ON FOR CATLE

ACEPROMAZINE

1. CASTRAN

ALBENDAZOLE

1. ALBEN 10% ORAL SUSPENSION
2. ALBENDAZOL 10% GANADEXIL
3. ALBENDAZOLE 16%
4. ALBENDAZOLE 25
5. ALBENDAZOLE 900 MG
6. ALBENDAZOLE AVICO
7. ALBENMAS
8. ALBENMAS – 18%
9. ALBENOL – 100 ORAL
10. ALBENOL – 2500 BOLUS
11. ALBENOL – 300 BOLUS
12. ALBENPAN
13. ALBENTACK – 900
14. ALZODIN

15. ANIZOLE 100
16. BENVET 10% W/V
17. BENVET GR – 2500
18. BENVET GR – 300
19. BIO – DEWORMER
20. CAPRI – ALBEND
21. CENTRE – ALBEN TABLET 500 MG
22. FASTON BOLUS
23. FLUKICIDE 12,5%
24. FLUKICIDE BOLUS
25. KALBAZE – ZG
26. KALBAZEN C
27. KALBAZEN KAPLET
28. LAGANTOR BSA
29. LAGANTOR BSA BOLUS
30. MONIL BOLUS
31. PYRONIL
32. PYRONIL – 1000 BOLUS
33. PYRONIL – 2500 BOLUS
34. PYRONIL – 300 KAPLET
35. PYRONIL SUSPENSI
36. SAN – ALBEND
37. VALBAZEN 11.25% SUSPENSION
38. VERMIPRAZOL – 10%
39. WORMINEX 10% LIQUID
40. WORMZOL B
41. WORMZOL K
42. X – TRA ALBENDAZ
43. ZODALBEN 12,5%

AMBROSIT (ALUMUNOSILIKAT)

1. TERMITOX

AMITRAZ

1. PREVENTIC
2. TAKTIC

AMMONIUM KUARTENER

DAN BKC

1. AGRI – QUAT
2. ASABEN
3. BENCHLOR
4. BENZADES
5. BENZAKLIN
6. BENZALKONIUM CHLORIDE 10%
7. BENZALVAKS
8. BENZALVET – 10
9. BIODES – 100
10. BIODES FORTE
11. BROMOQUAD 10
12. BROMOQUAD 50
13. CAPRIDES
14. CUATS – 20
15. DES HP
16. DESTACAP
17. DESTAN
18. DESTASID
19. DSC 1000
20. ISTAM 30%
21. ISTAM
22. MICRODES 100
23. PRIMADES
24. QUAT 50
25. SEPTIDES
26. SEPTISAN
27. VANOQUAT
28. VIROCID
29. VIRUKILL
30. ZALDES

AMOKSISILIN

1. AMOXICILLIN 50% SOLUBLE POWDER
2. AMOXINJECT LA
3. AMOXISOL
4. AMOXY – 50
5. AMOXYCILLIN WSP 15%
6. BETAMOX – LA
7. BETAMOXIN
8. HIPRAMOX
9. INTRAMOX – 200 WS
10. KOLAMOX LA INJECTION
11. LAMOXI

12. LONGAMOX
13. PARACILLIN SP
14. VETRIMOXIN 50 WS
15. VETRIMOXIN LA
16. VETRIMOXIN LA CLAS
17. VEYXYL LA 20%
18. WIDECILLIN FINE GRANULES
19. WIDECILLIN FINE GRANULES
20. WONDER AMOXYLIN
21. ZOOBIOITIC

AMPISILIN

1. ALBIPEN LA
2. AMPICILLIN – 10
3. AMPIVET 24
4. AMPIXIL
5. BIOCILIN
6. INTRAMOX – 150 LA

AMPROLIUM

1. AMPROL 12%
2. AMPROL 20%
3. AMPROLIN – 300 WS
4. AMPROLIUM 20% WS
5. AMPROMIX 25
6. AMPROSOL 20
7. AMPUCOCCIN – S
8. BIOPROL – 20
9. PRIMA AMPROFURA – 77
10. X – TRA AMPROCO

APOCAROTENOID ESTER

1. CAROPHYLL YELLOW

APRAMYCINE SULPHATE

1. APRALAN SOLUBLE

ASAM FOLAT

1. ROVIMIX FOLIC 80 SD

ASAM FORMAT

1. SALSTOP SD

ASAM LAKTAT

1. ACIDAL NC

ASAM PROPIONAT

1. BLUE ROYALE FUNGICIDE
2. DESIFUNG SOLUBLE
3. KEMIRA MOULD CONTROL SP 1
4. LUPROSIL ADSORBATE
5. MOLD BAND INHIBITOR

6. MOLDSTOP MYCO PLUS
7. MOLDSTOP MYCO PLUS
8. MOLDSTOP SD PLUS
9. MOLDSTOP SD PLUS
10. MOLDTEC 202
11. PUNCH LIQUID MOLD INHIBITOR
12. PUNCH
13. SALTEC 511

ASAM NIKOTINAT

1. ROVIMIX NIACIN

ASAM ORGANIK

1. FYLAX DRY SP
2. FYLAX FORTE HC LIQUID
3. FYLAX FORTE HC SP
4. FYLAX LIQUID
5. FYSAL FIT4
6. FYSAL LIQUID
7. FYSAL SP
8. PROCID
9. SELACID DRY
10. SELACID GREEN GROWTH P LIQUID
11. SELACID GREEN GROWTH P MP

ASPERGILLUS NIGER

1. ALLZYME SSFTM

ASTAXANTHINE

1. LUCANTIN PINK

AVILAMYCINE

1. MAXUS 100 PREMIX
2. MAXUS 200
3. SURMAX – 200 PREMIX
4. SURMAX 100 PREMIX

AZAMETHIPOS

1. MI – LAT
2. TWENTY 1 WP

AZOMITE (HYDRATED SODIUM CALCIUM ALUMINA SILICATE)

1. AB 20
2. AZOMITE
3. MILBOND TX
4. SORBATOX
5. TOXIBOND
6. ZAGRIBIND

BAMBERMYCIN

1. BAMBER 20
2. BAMBERCIN – 20
3. BAMBERCIN – 40
4. BAMBERCIN – 80

BACITRACINE

1. ALBAC
2. ALBAC 10% P
3. BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE 10%
4. BMD SOLUBLE
5. BMD
6. ZAMBAC ZN 150
7. ZIBAGRAN G150
8. ZINC BACITRACIN PREMIX 15%

BACILLUS SUBTILIS

1. GALLIPRO®

BETA CAROTEN

1. LUCAROTIN 10% FEED
2. ROVIMIX BETA – CAROTENE

BETA MANNANASE

1. CTCZYME
2. HEMICELL – D
3. HEMICELL – HT
4. HEMICELL – L
5. HEMICELL – MP
6. MANNANASE GRANULAR
7. MANNANASE POWDER

BETAIN

1. TNI BETAIN
2. TNI BETAIN HC 70

BENTONITE

1. MD – 09
2. TOXISORB CLASSIC
3. TOXO MX
4. TOXO XL

BUTYLHYDROXYANISOL

1. FEEDOX DRY

CARBARYL

1. ANTIGALE

CALCIUM BOROGLUCONATE

1. CALBRO INJECTION

CALCIUM CARBONATE

1. PENERGETIC – T

CALCIUM FOSFOMYCINE

1. FOSBAC
2. FX PLUS 20 INJECTABLE SOLUTION
3. FX PLUS ORAL SOLUTION

CALCIUM D – PANTHOTHENATE

1. ROVIMIX CALPAN

CALCIUM LIGNOSULPHONATE

1. LIGNOBOND DD

CALCIUM MONTMORILLONITE CLAY

1. CALIBRIN A
2. CALIBRIN Z

CALCIUM PROPIONATE

1. LUPROSIL SALT
2. LUTAVIT CALPAN

CANTHAXANTHINE

1. CAROPHYLL RED
2. LUCANTIN RED

CEFTIOFUR

1. EXCEDE FOR SWINE
2. LG ACCENT
3. EXCENEL STERILE POWDER
4. EXCENEL STERILE SUSPENSION
5. EXFO – P INJ.
6. CERESTOP
7. AVANTE INJECTION

CEPHAPIRIN

1. METRICURE

CEFUROXIME SODIUM

1. CEFABEE OINTMENT

CHOLINE CHLORIDE

1. CHOLINE CHLORIDE 50%
2. CHOLINE CHLORIDE 60%
3. CHOLINE CHLORIDE 75%

CHLORAMPHENICOL

1. PYRIKOL – DROPS

CHLORHYDROXYQUINOLINE (HALQUINOL)

1. QUIXALUD

CHLORTETRACYCLINE

1. CHLORTETRACYCLINE – 25
2. CTC SOLUBLE

CHROMIUM PICOLINATE

1. GROW MAX

CIPROFLOXACINE

1. BERNOQUIN
2. BIOFLOX – 20
3. CIPLOX 10% W/V
4. CIPRO – 12
5. CIPROCAP
6. CIPROFLOX – 100 SP
7. CIPROLON
8. CIPROMAS
9. CIPROMED
10. CIPROPAN
11. CIPROSIN EXTRA
12. CIPROVAKS
13. CIPROVAKS
14. CIPROVET
15. CIPROXACIN
16. CIPROXAN
17. PRIMA CYPRO PLUS
18. PRIMA QUINOL – FL
19. PROXAN – C
20. PROXAN – S
21. SIPRO – 10
22. VETA CYPROCIN

CLOPIDOL

1. COYDEN F

CLOPOSTRENOL SODIUM

1. JURAMATE
2. PGF VEYX FORTE
3. PGF VEYX

CLORAMINES – T

1. DESINSEP

CLOXACILLIN BENZATHINE

1. CLOXALENE DRY COW
2. DRYCLOXA – KEL

COLISTINE

1. ACTICOLI 2 MUI/ML
2. AMIVAKSICOL
3. CHEIL COLISTIN
4. CHEIL COLISTIN 100
5. CHEIL TYLOSIN 220
6. COLIMAX 100
7. COLIMAX 100 PREMIX
8. COLIMPEX 8%
9. COLISTIN 10% MEIJI
10. COLIVET SOLUTION
11. COLIZAG 100
12. COSCAT – 666 WATER SOLUBLE POWDER
13. RICAN PREMIX POWDER
14. SOGECOLI
15. WOOGENE COLISTIN 150

COPPER PROTEINATE

1. BIOPLEX COPPER

CRECYLIC ACID

1. ANTI PICK

CYPERMETHRINE

1. CIPERGEN
2. CYPER KILLER 25 WP
3. ECOFLEECE

CYROMAZINE

1. AMBIFLUD TRIAZIN
2. CYROMAS – 1%
3. CYROMAS – 10%
4. CYROMAZIN – 10
5. CYROTEK – 1
6. CYROZINE – 10
7. LARSIDEX
8. LARVADEX 10% PREMIX
9. LARVAKILL 2%
10. LARVAKILL 10%
11. LARVASID – 10
12. LARVATOX
13. LARVAZINE
14. MUSCASID 10%
15. NEPOREX 2 WSG
16. SIRNASET

DL - METHIONINE

1. METAMINO
2. RHODIMET NP 99

DL – 2 – HYDROXY – 4 – METHYLTHIO – BUTANOIC ACID

1. RHODIMET AT 88

DECOQUINATE

1. DECCOX 6%

DEKSAMETHASONE

1. BIO – DEXA
2. DEXADRESON
3. DEXAROIDE
4. DEXATOZON INJEKSI
5. GLUCORTIN – 20

DELTAMETHRIN

1. BUTOX 50

DICLAZURIL

1. AGRICOX – 10
2. CLINACOX
3. COXYMAS
4. DICLACEV PREMIX
5. DICLACOX
6. NUOQIU PREMIX 5%
7. VETTRIBAC D
8. VETTRIBAC

DICHLOROISOCYANURATE (NADCC)

1. LIFEGARD – T

DIFENHIDRAMIN

1. DIMEDRYL
2. VETADRYL INJEKSI
3. VETERDRYL

DIMETIKON

1. ANTIBLOAT
2. PERMETHYL 5%
3. TYMPANOL – SB

DINOPROST TROMETHAMINE

1. CAPRIGLANDIN INJ.

DOKSISIKLIN

1. DOXCINE WATER SOLUBLE POWDER
2. DOXINYL
3. DOXY – 500 WS
4. DOXY 10 WSP

5. DOXYCAP
6. DOXYCYCLINE – 10
7. DOXYCYCLINE 50% WSP
8. DOXYMAS
9. DOXYVET
10. ENOXAN 10%
11. PRIMA DOXERY PLUS – 99
12. ZADOXYL

DORAMECTINE

1. DECTOMAX

ENILKONAZOL

1. CLINAFARM SMOKE
2. CLINAFARM SPRAY
3. DERMASEPT IODE GEL

ENRAMYCINE

1. ENDURA F40
2. ENDURA F80
3. ENRAMYCIN F – 40

ENROFLOKSASIN

1. AGRISOL
2. AGRIXINE SOLUTION
3. AGRIXINE
4. AVIFLOX – 10 LIQUID
5. AVIFLOX 10
6. AVITRYL – 10 INJECTION
7. AVITRYL ORAL SOLUTION
8. BAYTRIL 10 %
9. BAYTRIL 10 %
10. BAYTRIL 5 %
11. BAYTRIL FLAVOUR 150
12. BAYTRIL FLAVOUR
13. CENTRA – ENROX INJECTION 10%
14. COLA – FLOXA LIQUID
15. COLA FLOXA
16. COLMYC – E
17. DOCTRIL
18. ENFLOSIN ORAL SOLUTION
19. ENFLOX ORAL SOLUTION
20. ENOQUYL
21. ENPRO – 50 INJECTION
22. ENPRO SOLUTION
23. ENRO – 10
24. ENRO – 21
25. ENRO CHICKS
26. ENRO FORTE
27. ENROCIN ORAL SOLUTION
28. ENROFOXACIN 100 G
29. ENROFOXACIN 100 MG
30. ENROJECT 10% LA INJ. SUSP.

31. ENROMAS
32. ENROSOL
33. ENROTEN
34. ENROTIL 10% SOL
35. ENROTIL 50 INJECTION
36. ENROVA 10% INJECTABLE SOLUTION
37. ENROVET
38. ENROXIN
39. ENTROVET INJ
40. FLOXA M2P
41. FLOXAMYCINE
42. FLOXATRIL
43. FLOXIDIN 10% INJ.
44. FLOXIDIN 10% ORAL SUSP.
45. FLOXINE
46. FLOXIVET
47. GANADEXIL ENROFLOXACINA 10%
48. INTERFLOX – 100
49. INTERFLOX ORAL
50. INTRAMOX – 150
51. MASQUIN
52. MITRAFLOX – 12
53. MULTIFLOX – 11
54. MYCOTACK LIQUID
55. MYCOTACK
56. NEO MEDITRIL – I
57. NEO MEDITRIL
58. OCTACIN EN 10% ORAL SOLUTION
59. OCTACIN EN 5% INJECTION
60. PRIMA COLMY PLUS
61. QUINOEX
62. QUINOVET F
63. RISA – KOL KAPSUL
64. RISA – KOL
65. ROXACIN INJ.
66. ROXACIN ORAL
67. ROXINE 10% ORAL SOLUTION
68. ROXINE 25% ORAL SOLUTION
69. ROXINE INJEKSI
70. ROXINE KAPLET
71. ROXINE
72. SINDOFLOK SOL
73. SINDOFLOX FORTE
74. TAVET ENROFLOXACINE 10%
75. VETA FLOXA
76. VIANO – 10
77. WONDER QUINOLIN

ENILCONAZOLE

1. IMAVEROL

ENTEROCOCCUS FAECIUM

1. BIOSOL
2. CYLACTIN LBC ME 10

ERITROMISIN

1. EREDITROMISIN

ETHYNIL ESTRADIOL

1. OVALUMON INJEKSI

ETHOXYQUIN

1. CAPSOQUIN LIQUID ETHOXYQUIN
2. ETHOXYQUIN 66% POWDER
3. ETHOXYQUIN 97% LIQUID
4. SANTOQUIN LIQUID
5. SANTOQUIN MIXTURE 6

ETIPROSTON (PGF 2 A) PROSTAVET – C

FEBANTEL

1. RINTAL BOLUS
2. RINTAL GRANUL 10%

FENBENDAZOLE

1. PANACUR 10% SUSP
2. PIGWORM – S

FENILBUTASONE

1. PHENYLJECT

FERROSUS SULPHATE

1. IRON – G

FIPRONIL

1. FRONTLINE SPOT ON
2. FRONTLINE SPRAY

FLUBENDAZOL

1. FLUBENOL 5%
2. FLUBENZIM 5%

FLUMETHRINE

1. BAYTICOL 60 EC

FLUMEQUINE

- ATIQUINE P.18
BIOQUIN – 20
FLUMISOL 10%

FLUQUINE

1. IMEQUYL SOL 20%

2. OTAQUINE SOL
3. PRIMA QUINCURE – 25
4. PRIMEQUYL
5. QUINCURE 20 LIQ

FLUNIXIN MEGLUMINE

1. FLUNIXIN INJECTION
2. FLUNIXVET INJ

FORMALDEHID

1. CIL
2. FORMALIN ACT

GENABILIC ACID

1. INDIGEST INJECTABLE

GENTAMISIN

1. GENTA – 100
2. GENTAJECT 10%
3. GENTAMIN
4. GENTAMYCIN INJECT
5. GENTAVET 50

GLUCOMAMANNAN OLIGO-SAKARIDA

1. MYCOSORB

GLYCERYL POLYETHYLENEGLYCOL RICINOLEATE

1. AVILAC C
2. AVILAC E CONCENTRATED

GONADRODELLIN

1. FERTAGYL
2. GONAVET VEYX
3. MAPRELIN

HEXAMIN

1. CAPRINIL
2. HEXADIN
3. HEXAMAS

HIDROGEN PEROKSIDA

1. BIOPUR
2. INTRA HYDROCARE

HORMON HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN)

1. CHORULON

HORMON PMSG (PREGNANT MARE SERUM GONADOTROPHIN)

1. FOLLIGON
2. GONASER

IMADACLOPRID

1. FINIGEN
2. QUICKBAYT 10 WG

IODINE

1. BIO DINE
2. VIDONE
3. VIROPHOR

IODIUM

1. NEO ANTISEP
2. PRIMADINE
3. VETIODINE
4. YODOR – VEX

IRON DEKSTRAN

1. DUFADEX 10% INJ.
2. ENDOFER 20 INJECTABLE SOLUTION
3. FEDEX
4. FERODEX
5. FEROPAN 200 INJ
6. FERRO 2000
7. FERRODIN
8. HEMADEX
9. IRON – E INJEKSI
10. RIDAN

IRON PROTEINATE

1. BIOPLEX IRON

ISOMETAMIDUM KLORIDA

1. TRYPMIDIUM

IVERMEKTIN

1. AVIMEC INJECTION
2. AVIMEC LIQUID
3. BAYMEC
4. BERNOMEK
5. BIVERMECTIN 1%
6. BOMECTIN POUR ON

7. CENTRE – IVERMEC INJECTION 1%
8. CENTRE – IVERMEC POUR ON SOLUTION 1%
9. CENTRE – IVERMEC SOLUTION 1%
10. CEVAMEC 1%
11. INTERMECTIN
12. IVERVET
13. IVOCIP PASTE
14. IVOMEK FOR SWINE
15. IVOMEK INJECTION
16. KEPROMEK INJ.
17. KEPROMEK ORAL
18. MECTISAN
19. NOROMECTIN INJECTION
20. POWERMEK SOLUTION
21. PROMECTINE ORAL
22. SY IVERMECTIN INJECTION
23. TECTIN INJ
24. VIRBAMEK LA
25. WONDER IVERMEC INJEKSI

KANAMYCIN SULPHATE

1. KANA SOLUTION
2. KANAMEX
3. KANAMIN
4. KANIVET

KETAMINE

1. KETAMINE 10% INJ.

KITASAMYCINE TARTRATE

1. KISA SP

KLOSANTEL

1. CAPRINTEL BOLUS
2. KLOSAN 200
3. KLOSAN BOLUS
4. KLOSAN KAPLET

KOTRIMOXAZOL

1. PRIMAZOL

KUMATETRALIL

1. RACUMIN 0,0375 BB

LASOLICID SODIUM

1. AVATEC 20%

LEVAMISOL

1. AGRIWORM BOLUS
2. AGRIWORM LIQUID
3. AGRIWORM

4. ANTHELMIN ORAL
5. AVISOLE
6. BIAMINTHIC 5%
7. HEMISOL
8. L.E-435
9. LEVA – 200 ORAL
10. LEVA – SAN BL
11. LEVAMAS
12. LEVAMISOLE 2.000 MG
13. LEVAMISOLE POWDER
14. LEVAMIT – 125
15. LEVAMOL
16. LEVASOL
17. LEVAVERM 10%
18. LEVIWORM 200
19. LMS 200
20. NEMASOL – K
21. PRAMISOLE
22. PRIMA VAM – 200

LEVOFLOXACINE

1. LEVOCAP
2. LEVOSTA

LIDOCAIN

LIDOCAIN

L – LYSINE HCL

1. BIOLYS
2. L – LYSINE HCL
3. LIQUID LYSINE
4. PEPTIDA – G

LYNCOMYCINE HYDRO-CHLORIDE

1. LINCOMIX 110

MADURAMYCIN

1. CYGRO
2. MADUX 1%
3. MADIMPEX 10G

MANGANESE PROTEINATE

1. BIOPLEX MANGANESE

MARBOFLOXACINE

1. MARBOCYL 10%
2. MARBOCYL 2%
3. MARBOSTAR 10%

MEBENDAZOLE

1. CONQUER POWDER

METAMPIRON

1. ANTI COLD

MONENSIN

1. ECOX 200
2. ELANCOBAN – 200
3. ELANCOBAN 100 PREMIX
4. ELANCOBAN 200 PREMIX
5. MONENDOX 200 BMP
6. MONEVAXE – 20
7. MONEVAXE – 20
8. RUMENSIN 200 PREMIX

MOXIDECTINE

1. CYDECTIN 1% INJECTION
2. PROHEART SR – 12 INJECTION

NATRIUM CHLORIDUM

1. NATRII CHLORIDUM 0,9%

NARASIN

1. MONTEBAN 45

NEOMYCINE

1. BIO NEO
2. NEOMIX 325

NIKLOSAMID

1. DAVAINOL
2. NICLO – 75
3. NICLOMAS
4. NYCLOSOL – 50
5. PITACID

NISTATIN

1. CHEIL BIO MYCOSTATIN 50 WS
2. MYCOSTATIN – 20
3. YUCOMY – 20 – POWDER

NITROXINIL

1. DOVENIX
2. FLUCONIX – 250

NORFLOXACINE

1. ANFLOX GOLD
2. FLOXAMAS
3. HIPRALONA – NOR S
4. MEDITRIL K
5. MENOROX LIQUID 20%
6. MYCOMAS
7. NORAN – 150

8. NORAN – 200 ORAL
9. NORAN – 200 WS
10. NORFLOX 33
11. NORITACK LIQUID
12. NOVAQUYL
13. OTAFLOX
14. PRIMA QUINTRIL 10% PLUS
15. QUINABIC 14% INJECTABLE SOLUTION
16. QUINABIC 7% INJECTABLE SOLUTION
17. QUINABIC WSP
18. QUINTRIL INJ 5%
19. QUINTRIL LIQ 10%

OESTRADIOL BENZOAT

1. OESTRADIOL BENZOAT

OFLOXACINE

1. OXALDIN
2. OXALDIN LIQUID

OXSITETRASIKLIN

1. ALAMYCIN AEROSOL
2. ALAMYCIN LA
3. ANCOMYCIN 200 LA
4. AVICYCLINE 20% L.A INJECTION
5. BIO – TETRA 200 LA
6. BIO – TETRA SPRAY
7. CALIMICINA 200 CL
8. CENTRA – OXYTE INJECTION 10%
9. COOPERTET LA
10. DUOCYCLINE – LA
11. DUODIN LA
12. EPIDELIN INJEKSI
13. LIMOXIN – 200 LA
14. LIMOXIN – 50
15. LONGICINE
16. MEDOXY LA
17. O.T.C – LA INJECTION
18. OTC SPRAY
19. OXILEN AD
20. OXIPRA – 20 LA
21. OXTRA EFFERVESCENT PESSARIES
22. OXTRA LA
23. OXY – KEL 10%
24. OXY – KEL 20 LA
25. OXYJECT – 100
26. OXYLIN INJEKSI
27. OXYTETRA 5 COOPHAVET
28. OXYTETRACYCLINE – 25
29. OXYTETRAVET 20% LA INJ
30. OXYTETRAVET AEROSOL
31. OXYTRAL LA
32. REMACYCLINE LA
33. TAVET OXITETRACYCLINA

34. TERRAMYCIN* INJECTABLE SOLUTION
35. TERRAMYCIN* LA INJECTABLE SOLUTION
36. TETRAVET AEROSOL
37. TRIDOX LA
38. VET – OXY LA

OXOLINIC

1. OXOLINAL
2. INOXYL ORAL SOLUTION
3. OXFENDAZOLE
4. VERM – O BOLUS
5. VERM – O KAPLET

OXYBENDAZOLE

1. OXIBENDAZOLE – 100
2. TRIPLE WORMER BOLUS

OXYQUINOL

1. MYCOTOX

OXYTOCIN

1. BIO – OXYTOCIN
2. BIOTOCIN
3. CAPRITOCIN INJ.
4. HORMONIPRA
5. INTERTOCIN – S
6. OXYTOCIN – 10
7. OXYTOCIN INJEKSI
8. OXYTOCIN VET
9. OXYTOCINA PITUITARIA

PARASETAMOL

1. PARAMOL – 50
2. PIRETAMAS

PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI

1. BACTOCELL

PEFLOXACINE

METHANESULFONAT

1. PEPEROXIN SOL

PERMETRIN

1. NOFLI LOTION
2. NOFLI SHAMPOO

PHENOXYMETHYL

PENICILLIN

1. PHENOXYPEN WSP

PHYTASE

1. BIOMIN PHYTASE 5000
2. FINASE EC 40P
3. GENOPHOS – 5000G
4. HOSTAZYM P 10000
5. HOSTAZYM P 5000
6. MICROTECH 5000 LIQUID
7. NATUPHOS 10.000 G
8. NATUPHOS 5000 G
9. NATUPHOS 5000 L
10. PHYLINK 5000
11. PHYZYME XP 1.000 TPT
12. PHYZYME XP 10.000 TPT
13. PHYZYME XP 5.000 G
14. PHYZYME XP 5.000 L
15. QUANTUM 2500 TR
16. RONOZYME NP (CT)
17. RONOZYME NP (L)
18. RONOZYME P 5000
19. SMIZYME PHYTASE 5000 U/G LIQUID
20. SUNPHASE G
21. SUNPHASE L

PROKAIN PENISILIN G

1. CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G
2. PEN – O – VET
3. PENZAVET

PROGESTERON

1. POTAHORMON INJEKSI

PROSTAGLANDING F2 ALPHA

1. NOROPROST

PIPERAZIN

1. ASCAREX
2. ASCARIN
3. CACING EXITOR
4. CAPIRAZIN
5. CARISID
6. CONTRAWORM
7. CONTRAWORM – KAPSUL
8. DATILAN
9. DIGESTON ANTHELMINTIC
10. HEMISIN
11. KATRIWORM
12. KILLWORM
13. MARUKI CAIR

14. MARUKI SERBUK
15. PIPEDON – X LIQUID
16. PIPEDON BOLUS
17. PIPERA – SAN
18. PIPERAMAS
19. PIPERAVAKS – S
20. PIPERAZINE – 36
21. SURPIZIN
22. TM – PERAZINE
23. TRIWORM
24. VERMIXON SIROP
25. VERMIZYN

PROTEASE

1. ALLZYME FDTM
2. DANISCO ANIMAL NUTRITON LIQUID
SUBTILISIN (PROTEASE)
3. RONOZYME PROACT (CT)

POLYMETHYLOLCARBAMIDE (PMC)

1. SUNNY BINDER

POVIDON

1. AGRICID
2. ASADINE
3. ASEPTIC SOLUTION LIQUID
4. INTERCIDE
5. IODOPHORE 11,5%
6. IODOSEPT
7. NEO ANTISEP NEW FORMULA
8. PVP IODINE 50 G
9. SEPTOCID
10. SIERADES

RACTOPAMIN HCL

1. OPTAFLEXX 100
2. PAYLEAN PREMIX

SACCHAROMYCES

CEREVISIAE

1. ACTISAF SC47
2. ALPHAMUNE G
3. CYC – 100
4. ECOCELL
5. FIBOSEL
6. LEVUCCELL SB 20
7. NUPRO
8. TECHNOMOS
9. VANNAGEN
10. YEA – SACC TS

SEMDURAMYCINE

AVIAX 5%

SEVIN

1. ANTIPAR 500

SELAMECTINE

1. REVOLUTION 12%
2. REVOLUTION 6%

SELENIUM

OPTIMIN SEY 3000

1. SEL – PLEX

SIFLUTRIN

1. SOLFAC 10 WP

SILICUM OXIDE

1. BIOLYSE

SIMETHICONE

1. NOBLOAT
2. BLOATEX
3. DHUDHUT

SPIRAMYCINE

1. MYCOSINDO
2. PRIMAVIL
3. SPIRADIN – 20
4. SUANOVIL
5. SUANOVIL SOL. 20

SODIUM BUTYRATE

1. GUSTOR BP 70

SODIUM BICARBONATE

1. OBAT TEMBOLOK

SODIUM HIDROKSIDA

1. BIOGEL
2. DUPONT BIOSOLVE PLUS
3. SHIFT

SODIUM SACCHARIN

1. APENTENZYMA 66

SODIUM SALINOMISIN

1. BIOCOX
2. COXISTAC 12%
3. KOKCISAN 120 G

4. KOKCISAN 120 G
5. SALIGRAN G120
6. SALINDOX 120 BMP

STREPTOMISIN

1. STREPTOMISINA SULFATE
2. STREPTOMYCIN INJEKSI
3. STREPTOMYCIN SERBUK INJEKSI
4. STREPTOVET

SULFACHLORPYRIDAZINE

1. ESB – 3 (30%)
2. KLORIVAKS

SULFADIMETHYLPYRIMIDINE

1. SULFAMIX

SULFADIMETOKSIN

1. PYRISIN – 525
2. SULFADIM

SULFAKLOROPIRAZIN

1. ESB – 3 (30%)

SULFAMETHOXAZOLE

1. TRIMIXIN 480 WS

SULFAMONOMETHOXINE

1. DAIMETON B INJEKSI 20%
2. DAIMETON SODIUM
3. LEUCOSTOP

SULFANILAMIDE

1. SULFANILAMIDE SALEP

SULFAQUINOXALINE

SODIUM

1. KOKSINDO

SUPER ADSORBENT

POLYMER

1. GROGEL

TESTOSTERON PROPIONAT

1. TESTOHORMON INJEKSI

TETRAMISOL HCL

1. PAMIZOLE PS

2. TETRAMISON INJEKSI
3. TETRAMISON TABLET

THIAMPHENICOL

1. DENFUS SPRAY

THREONINE

1. L – THREONINE
2. THREAMINO

THYMOL

1. MYCOTOX NG

TIAMULIN

1. DENAGARD 10% COATED
2. DENAGARD 20% INJECTION
3. DENAGARD 45% WSG
4. DENAGARD 80% COATED
5. TIAMULIN
6. ULTRALIN 45%

TILMIKOSIN

1. MACROTIL 250 SOLUTION
2. MICOTIL
3. MICOTIL – 300 INJECTION
4. PULMOTIL AC
5. PULMOTIL PREMIX
6. TILMOVET 25%

TOLFENAMIC ACID

1. TOLFEDINE CS INJECTION

TOLTRAZURIL

1. BAYCOX 2,5%
2. BAYCOX 5%
3. BERCOX
4. BIO TOLTRA 2.5
5. BIO TOLTRA 2.5
6. CAPZURIL
7. CEVAZURIL
8. COXIXLIN
9. DIACOXIN 5%
10. DIACOXIN WS
11. INTRACOX ORAL
12. KEPCOX 2,5% ORAL
13. TOLACOX
14. TOLCOXIN
15. TOLTRACOX
16. TOLTRAPAN
17. TOLTRARIL S 2,5%
18. TOLTRARIL S 5%
19. TOLTRAVET 2,5% ORAL SOLUTION

TRICHLORFON

1. NEGUVON

TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM

1. ALLZYME PT CONCENTRATE WS

TRICLABENDAZOLE

1. FASINEX 900

TRYPTOPHAN

1. L – TRYPTOPHAN
2. TRYPAMINO

TYLOSIN

1. BIO – TYLO 200
2. CENTRA – TYLO INJECTION 20%
3. CENTRA – TYLO SOLUBLE POWDER 20%
4. CENTRE – NEOMY SOLUBLE POWDER 5%
5. CENTRE – TYLO PREMIX 25%
6. CHEIL TYLOSIN – 100
7. NOROTRYL
8. NOROTYL LA
9. PHARMASIN 10 PREMIX
10. PHARMASIN 100% WS GRANULES
11. PHARMASIN PULVIS
12. SAMYANG TYLOSIN – 200 INJECTION
13. TIMING GOLD
14. TYLAN 100 PREMIX
15. TYLAN 40 PREMIX
16. TYLAN SOLUBLE
17. TYLOGRIMIX
18. TYLOJECT 20%
19. TYLOON
20. TYLOPRIM
21. TYLORATE INJ
22. TYLOSIN – 50
23. TYLOSIVET
24. TYLOVA 200 INJECTABLE SOLU
25. TYSINOL

TYLVALOSIN TARTRATE

1. VALOSIN FG 50
2. VALOSIN SOLUBLE

VIRGINIAMISIN

1. STAFAC – 500
2. STAMIX 20
3. STAMIX SP 500

VITAMIN A

1. LUTAVIT A 1000 PLUS
2. LUTAVIT A 500 PLUS
3. LUTAVIT A 500 S
4. LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS
5. MICROVIT A PROSOL 500
6. MICROVIT A SUPRA 1000
7. MICROVIT A SUPRA 500
8. MICROVIT AD3 SUPRA 1000 – 200
9. ROVIMIX A – 1000

VITAMIN B1

1. MICROVIT B1 PROMIX
2. ROVIMIX B1
3. VET B – I
4. WONDER VITAMIN B1 INJEKSI

VITAMIN B2

1. LUTAVIT B2 SG 80
2. MICROVIT B2 SUPRA 80
3. ROVIMIX B2 80 SD

VITAMIN B3

1. MICROVIT B3 PROMIX (NIACIN)

VITAMIN B5

1. MICROVIT B5 PROMIX
2. VITAMIN B6
3. MICROVIT B6 PROMIX

ROVIMIX B6

1. VITAMIN B6 INJEKSI

VITAMIN B12

1. CAPRIVIT B12 INJ.
2. INJEKSI VITAMIN B12
3. JECTAVIT B12 INJ
4. LIVER EXTRACT INJEKSI
5. MICROVIT B12 PROMIX 1000
VET B – 12

VITAMIN C

1. C – SAN
2. LUTAVIT VITAMIN C MONOPHOSPHATE
35
3. NUTRI – C
4. POUSTIN C

5. ROVIMIX C – EC
6. ROVIMIX STAY C

VITAMIN D3

1. DUPHAFRAL D3 1000
2. MICROVIT D3 PROMIX 500
3. ROVIMIX HY – D 1,25%

VITAMIN E

1. LUTAVIT E 50
2. LUTAVIT E 50 S
3. MICROVIT E PROMIX 50
4. MICROVIT E PROSOL 50
5. PX – Z88
6. ROVIMIX E-50 ADSORBATE TOLEVIT 10
7. ZAGROVIT E – 50

VITAMIN H2

1. BIOTIN 2% FEED GRADE
2. MICROVIT H PROMIX BIOTIN

VITAMIN K3

1. LUTAVIT K3 MSB

XYLAZINE

1. SETON 2%
2. XYLA

XYLANASE

1. BERGAZYM P
2. DANISCO XYLANASE 40.000 G
3. DANISCO XYLANASE 40.000 L
4. ECONASE XT 25
5. HOSTAZYM C 250 MICROGRANULATE
6. NUTRASE XYLA 500
7. NUTRASE XYLA LIQUID
8. NUTRASE XYLA
9. RONOZYME WX (CT)
10. RONOZYME WX (L)
11. ZYMPEX 006

YUCCA SCHIDEGERA

- DK SARSAPONIN 30
MICRO AID LIQUID 10%

ZINC PROTEINATE

1. BIOPLEX ZINC.****

Indeks Umum



INDEX UMUM

A	Hal			
1.	0.05% VITAMIN PREMIX FOR LIVESTOCK	557	43. AGRICOX – 10	177
2.	A – MAX CONCENTRATE	483	44. AGRIGERM 1510	177
3.	AAGENT	55	45. AGRIGERM 2000	18
4.	AB 20	483	46. AGRIMINOVIT	266
5.	ABREUVAL TABLET	17	47. AGRIMIX	557
6.	ACID-PAK 4-WAY 2X WATER SOLUBLE	484	48. AGRIMIX BRO	557
7.	ACID -PAK 4-WAY LIQUID HARD WATER FORMULA	484	49. AGRISELVIT	266
8.	ACID LAC DRY	483	50. AGRISOL	55
9.	ACID LAC LIQUID	483	51. AGRITOP	266
10.	ACIDAL ML	255	52. AGRIVIT POWER	266
11.	ACIDAL NC	483	53. AGRIVITERAL	267
12.	ACIDBAC	484	54. AGRIWORM	199
13.	ACIDTEC 401	484	55. AGRIWORM BOLUS	199
14.	ACLOMAST	55	56. AGRIWORM LIQUID	199
15.	ACTICOLI 2 MUI/ML	255	57. AGRIXINE	55
16.	ACTIGEN	484	58. AGRIXINE SOLUTION	55
17.	ACTILIVER 1	255	59. AGROMALAC	558
18.	ACTISAF SC47	485	60. ALAMYCIN AEROSOL	56
19.	ACTIVATE DA	485	61. ALAMYCIN LA	56
20.	AD3E INJECTION	265	62. ALBAC	485
21.	ADE SOLE	557	63. ALBAC 10% P	485
22.	ADEMIN LIQUID	265	64. ALBEN – 10	199
23.	ADENIPRAVAC ND/IB	351	65. ALBEN 10% ORAL SUSPENSION	199
24.	ADENIPRAVAC TRIPLE	351	66. ALBENDAZOL 10% GANADEXIL	200
25.	ADETROVIT®	265	67. ALBENDAZOLE 25	200
26.	ADEVIT OS	265	68. ALBENDAZOLE 900 MG	200
27.	ADSORBATE DRY	485	69. ALBENDAZOLE AVICO	201
28.	ADVANTAGE 256	17	70. ALBENDAZOLE 10%	200
29.	ADVANTIX	237	71. ALBENDAZOLE® 16%	200
30.	ADVOCATE	237	72. ALBENMAS	201
31.	AE	352	73. ALBENMAS – 18%	201
32.	AE – POXINE	352	74. ALBENOL – 100 ORAL	201
33.	AE + POX	351	75. ALBENOL – 2500 BOLUS	202
34.	AE VAC	351	76. ALBENOL – 300 BOLUS	202
35.	AG. BRUCELLA RBT	479	77. ALBENPAN	202
36.	AG. MYCOPLASMA G.	479	78. ALBENTACK – 900	202
37.	AG. ND	479	79. ALBIPEN LA	56
38.	AG. PULLORUM	479	80. ALDEKOL DES FF	18
39.	AGNERAL	557	81. ALL – LAC 100 X	485
40.	AGRI – QUAT	18	82. ALL CIDE	19
41.	AGRICARIVIT	265	83. ALLPLEX B	486
42.	AGRICID	17	84. ALLPLEX LS	486
			85. ALLPLEX S	486
			86. ALLPLEX W	486
			87. ALLZYME FD™	486
			88. ALLZYME PS	486
			89. ALLZYME PT CONCENTRATE WS	487
			90. ALLZYME SSF E	487

91. ALLZYME SSF™.....	487	140. ANAVITE POULTRY LAYER VITAMINS.....	489
92. ALLZYME SSF™ LIQUID.....	487	141. ANAVITE POULTRY BREEDER MINERALS	489
93. ALLZYME SSF™ LIQUID 500 ML.....	487	142. ANAVITE POULTRY BREEDER VITAMINS.....	489
94. ALLZYME VEGPRO CONCENTRATE.....	488	143. ANAVITE POULTRY CHICK/ BROILER MINERALS	489
95. ALLZYME VEGPRO LIQUID™.....	488	144. ANAVITE POULTRY CHICK/ BROILER VITAMINS.....	489
96. ALLZYME VEGPRO™.....	488	145. ANAVITE POULTRY LAYER MINERALS	489
97. ALPHAMUNE G.....	488	146. ANCOMYCIN 200 LA.....	61
98. ALZODIN	56	147. ANCOXIN.....	178
99. AMBIFLUD TRIAZIN	237	148. ANCYLOS.....	203
100. AMCO CHICKS	56	149. ANER C.....	490
101. AMCOL.....	56	150. ANFLOX GOLD.....	61
102. AMERIA®.....	177	151. ANILOX P – 10	490
103. AMIDURENE.....	177	152. ANILOX P – 20	490
104. AMILYTE.....	488	153. ANIZOLE 100.....	203
105. AMINOLIFE POULTRY WS.....	267	154. ANTHELMIN ORAL	203
106. AMINOSOL.....	267	155. ANTHRASET.....	457
107. AMINOVIT.....	267	156. ANTHRAX SPORE VACCINE.....	457
108. AMINOVITAL SOLUTION.....	268	157. ANTI COLD	333
109. AMINOVITAMIN	268	158. ANTI PICK.....	345
110. AMIVAKSICOL.....	57	159. ANTIBLOAT	255
111. AMIVIT – E®.....	558	160. ANTIGALE.....	237
112. AMMOTROL.....	559	161. ANTIGERMEN FORTE.....	19
113. AMOXCOL.....	57	162. ANTIKOKSI.....	178
114. AMOXCYL.....	57	163. ANTIPAR 500.....	203
115. AMOXICILLIN 50% SOLUBLE POWDER.....	58	164. ANTISEP.....	19
116. AMOXICOL.....	57	165. ANTIWORM	203
117. AMOXIN.....	58	166. AOXTec 101.....	490
118. AMOXINJECT LA	58	167. AOXTec 111.....	490
119. AMOXISOL.....	58	168. APENTENZYMA 66.....	491
120. AMOXITIN.....	58	169. APRALAN SOLUBLE.....	61
121. AMOXY – 50	59	170. AQUA DESTILATA STERIL.....	607
122. AMOXYCILLIN WSP 15%.....	59	171. AQUADESTILLATA.....	607
123. AMPHIMIX.....	59	172. AQUADEX B SOLUTION	268
124. AMPHOPRIM INJECTION	59	173. AQUADEX C FORTE II	268
125. AMPIBIO®.....	59	174. AQUAPRIME 4/20 INJECTION.....	62
126. AMPICILLIN-10.....	60	175. AQUAVAC IRIDOV.....	477
127. AMPICOL.....	60	176. AQUAVAC STREPSA.....	477
128. AMPIVAKSICOL.....	60	177. AQUAVET.....	607
129. AMPIVET 24.....	60	178. AROMEX.....	599
130. AMPIVETBRITIN.....	60	179. ARSOMIX.....	491
131. AMPIXIL.....	61	180. ASABEN.....	19
132. AMPROL 12%.....	177	181. ASADINE.....	19
133. AMPROL 20%.....	177	182. ASADOXIN.....	61
134. AMPROLIN – 300 WS.....	177	183. ASAGUMED.....	333
135. AMPROLIUM 20% WS.....	178		
136. AMPROMIX 25.....	178		
137. AMPROSOL 20.....	178		
138. AMPUCOCCIN-S.....	178		
139. ANASOL.....	488		

184. ASAPRIM	61	231. AVIMOX 12	63
185. ASAPRO	62	232. AVIMOX 24	63
186. ASCAREX	203	233. AVINEW	354
187. ASCARIN	203	234. AVINEW FROZEN	354
188. ASCOGEN	558	235. AVIODINE	20
189. ASEPTIC SOLUTION LIQUID	20	236. AVIPRO 101 CORYZA	354
190. ASTRESVIT	268	237. AVIPRO 104 MG BACTERIN	355
191. ATIQUEINE P.18	62	238. AVIPRO 105 ND	355
192. AVABRON HN – 63	352	239. AVIPRO 105 ND CHICK	355
193. AVAILA 4	558	240. AVIPRO 106 REO	355
194. AVAILA CR 1000	558	241. AVIPRO 108 FC4	356
195. AVAILA CU 100	559	242. AVIPRO 109 SE4	356
196. AVAILA FE 100	559	243. AVIPRO 201 ND – IB	356
197. AVAILA MN 80	559	244. AVIPRO 202 ND – IBD	356
198. AVAILA SE 1000	559	245. AVIPRO 221 ND – IB2	357
199. AVAILA SOW FEET FIRST	560	246. AVIPRO 331 ND – IB2 – BD3	357
200. AVAILA STARTER 123	560	247. AVIPRO 401 ND – IB – IBD – REO	357
201. AVAILA Z/M	560	248. AVIPRO 432 ND – IB2 – BD3 – REO	358
202. AVAILA ZN 120	560	249. AVIPRO AE TREMBLEX	358
203. AVANTE INJECTION	62	250. AVIPRO DILUDROP	608
204. AVAPOX	352	251. AVIPRO DILUJECT	358
205. AVATEC	179	252. AVIPRO IB H120	358
206. AVATEC 20%	491	253. AVIPRO IB M 48	359
207. AVI IB H – 120	352	254. AVIPRO IBD XTREME	359
208. AVI IBD INTER	353	255. AVIPRO ILT	359
209. AVI ND LASOTA	353	256. AVIPRO LT	359
210. AVI ND LASOTA + IB H120	353	257. AVIPRO MD RISPENS RL	359
211. AVIAN INFECTIOUS CORYZA VACCINE, INACTIVATED	353	258. AVIPRO MG F	359
212. AVIAN INFLUENZA VACCINE INACTIVATED (H5N2 SUBTYPE)	353	259. AVIPRO ND – IB LASOTA	361
213. AVIAN INFLUENZA VACCINE, INACTIVATED (H5 SUBTYPE, N28 STRAIN)	353	260. AVIPRO ND – IB POLYBANCO	361
214. AVIAX 5%	491	261. AVIPRO ND – IB SOHOL	361
215. AVIBLUE	607	262. AVIPRO ND B1	360
216. AVICILINA PLUS	62	263. AVIPRO ND C131	360
217. AVICOC	179	264. AVIPRO ND HB1	360
218. AVICYCLINE 20% L.A INJECTION	63	265. AVIPRO ND LASOTA	360
219. AVIDEGG	269	266. AVIPRO ND VISOTA	360
220. AVIEGG EXTRA	560	267. AVIPRO POX	362
221. AVIFFA RTI	354	268. AVIPRO POX CEO	361
222. AVIFLOX – 10 LIQUID	63	269. AVIPRO POX TC	362
223. AVIFLOX 10	63	270. AVIPRO PRECISE	362
224. AVILAC C	491	271. AVIPRO REO	362
225. AVILAC E CONCENTRATED	491	272. AVIPRO THYMOVAC	362
226. AVILAC HE	561	273. AVIPRO VIBURSA CE	363
227. AVILITE	269	274. AVIPROB	491
228. AVIMEC INJECTION	204	275. AVIQUIN 25	64
229. AVIMEC LIQUID	204	276. AVISOLE	204
230. AVIMILK	607	277. AVISTRESS	269
		278. AVIT	269
		279. AVITONIC – WSP	270
		280. AVITROL®	270

281. AVITRYL – 10 INJECTION.....	64
282. AVITRYL ORAL SOLUTION	64
283. AVIXIN	64
284. AVIZYME 1502.....	492
285. AVIZYME 1505.....	492
286. AZOMITE.....	492

B

Hal

287. B – COM.....	270
288. B – COMPLEX	270
289. B – PLEX INJ.	275
290. B – SANPLEX®.....	276

291. BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE 10%.....	492
292. BACOLAM.....	64
293. BACTOCELL.....	492
294. BAK IB	363
295. BAK IC	363
296. BAK ND.....	364
297. BAK ND + EDS.....	363
298. BAK ND + EDS + IB.....	363
299. BAK ND + IB	364
300. BAK ND + IBD	364

301. BAL IB H120.....	364
302. BAL IB H52.....	365
303. BAL IBD.....	365
304. BAL ILT	365
305. BAL ND + IB.....	365
306. BAL ND Clone.....	365
307. BAL ND Lasota.....	365
308. BAL POX.....	366
309. BAMBER 20.....	492
310. BAMBERCIN – 20	492

311. BAMBERCIN – 40	492
312. BAMBERCIN – 80	492
313. BANOX™ E.....	493
314. BAROX.....	493
315. BAYCOX 2,5%.....	179
316. BAYCOX 5%.....	179
317. BAYMEC.....	238
318. BAYTICOL 60 EC.....	238
319. BAYTRIL 10 % injeksi.....	65
320. BAYTRIL 10 % Oral solution.....	65

321. BAYTRIL 5 % injeksi.....	65
322. BAYTRIL FLAVOUR.....	65
323. BAYTRIL FLAVOUR 150.....	66
324. BEDGEN 40 PREMIX.....	494
325. BENCHLOR	20

326. BENVET 10% W/V.....	205
327. BENVET GR – 2500	205
328. BENVET GR – 300	204
329. BENZADES®.....	20
330. BENZAKLIN®.....	21

331. BENZALKONIUM CHLORIDE 10%.....	21
332. BENZALVAKS.....	21
333. BENZALVET – 10®.....	21
334. BENZOGARD	21
335. BERCOX®.....	179
336. BERGAFAT.....	493
337. BERGAPRIME	493
338. BERGAZYM P.....	494
339. BERNOMECS®.....	205
340. BERNOQUIN®.....	66

341. BERNOVIT®.....	270
342. BESTAQUAM.....	22
343. BESTLYTES.....	271
344. BETAINE HYDROCHLORIDE.....	494
345. BETAMINT.....	271
346. BETAMOX – LA	66
347. BETAMOXIN.....	66
348. BETAPRO 1000.....	494
349. BETAPRO 300.....	494
350. BG – MAX.....	494

351. BIAMINTHIC 5%.....	180
352. BIAPRIM BUVABLE.....	180
353. BIAVREM.....	180
354. BICORMICINA LA.....	67
355. BICOVAC	366
356. BIGOPEST (GALLIMUNE 304 ND + IB + IBD).....	366
357. BINEWVAX 0,3.....	366
358. BINEWVAXIDROP.....	366
359. BIO – ATP PLUS	271
360. BIO – CALCIMAX.....	271

361. BIO – CHICKS®.....	495
362. BIO – CHROME	495
363. BIO – CHROME 5000.....	495
364. BIO – DEWORMER.....	205
365. BIO – DEXA	333
366. BIO – MOS	496
367. BIO – OX	497
368. BIO – OXYTOCIN	337
369. BIO – PLUS®.....	561
370. BIO – SELEVIT E	272

371. BIO – SELEVIT E FEED ADDITIVE	561
372. BIO – STRONG®.....	274
373. BIO – TETRA 200 LA	68
374. BIO – TETRA SPRAY	68

375. BIO – TYLO 200.....	69	424. BIOPLEX COPPER.....	561
376. BIO – VITAMIN AD3E.....	272	425. BIOPLEX HIGH FIVE.....	497
377. BIO ADD SOLID.....	495	426. BIOPLEX IRON.....	561
378. BIO DINE.....	22	427. BIOPLEX MANGANESE.....	561
379. BIO LEUCO.....	180	428. BIOPLEX MQP.....	497
380. BIO QUAT 20.....	22	429. BIOPLEX POULTRY PAK.....	497
		430. BIOPLEX ZINC.....	561
381. BIO TOLTRA 2.5.....	180	431. BIOPUS®YC.....	561
382. BIOCAN DHPII.....	465	432. BIOPROL – 20.....	181
383. BIOCAN M INJ.....	465	433. BIOPUR.....	24
384. BIOCAN R INJ.....	465	434. BIOQUIN – 20.....	58
385. BIOCET DRY.....	22	435. BIORAL H120.....	367
386. BIOCID 30.....	23	436. BIOSAN – TP® INJ.....	273
387. BIOCILIN.....	67	437. BIOSAN – TP® ORAL.....	273
388. BIOCIN.....	67	438. BIOSEPT.....	24
389. BIOCOLD.....	333	439. BIOSOL.....	498
390. BIOCOCX.....	180	440. BIOSOLAMINE.....	259
		441. BIOSOLAVET.....	273
391. BIODAN.....	23	442. BIOSTRESS.....	273
392. BIODAN PLUS.....	23	443. BIOTECTOR.....	498
393. BIODES – 100.....	23	444. BIOTIN 2% FEED GRADE.....	498
394. BIODES FORTE.....	23	445. BIOTOCIN®.....	337
395. BIODEXAMINE.....	67	446. BIOTOLTRA 2.5.....	
396. BIODIN.....	272	447. BIOTOX.....	498
397. BIOFLOX – 20.....	67	448. BIOTRONIC SE.....	498
398. BIOFOS.....	613	449. BIOTRONIC SE FORTE LIQUID.....	499
399. BIOGEL.....	24	450. BIOTRONIC TOP3.....	496
400. BIOGREEN.....	256		
		451. BIOTYFLOX – S.....	69
401. BIOGREEN.....	561	452. BIOVAC B1.....	367
402. BIOLEUCO.....		453. BIOVAC LS – H120.....	367
403. BIOLYS.....	613	454. BIOVAK LASOTA.....	367
404. BIOLYSE.....	495	455. BIOVIT®.....	274
405. BIOMAREK HVT.....	367	456. BIOVITON.....	274
406. BIOMAX – 12.....	272	457. BIOVITON POWDER	
407. BIOMIN C – Ex.....	256	EFFERVESCENT.....	274
408. BIOMIN CLEANFEED.....	495	458. BIOXAN.....	69
409. BIOMIN CLEANGRAIN.....	496	459. BIOZINK WSL.....	561
410. BIOMIN CLEANGRAIN FORTE		460. BIRD CLOSE 5.1.....	368
LIQUID.....	495		
411. BIOMIN IMBO.....	561	461. BISEPTYL.....	69
412. BIOMIN PEP 1000.....	496	462. BIVAC II.....	368
413. BIOMIN PEP 125 POULTRY.....	496	463. BIVERMECTIN 1%.....	206
414. BIOMIN PHYTASE 5000.....	496	464. BLOATAX.....	256
415. BIOMIN®.....	496	465. BLOOM & GROW.....	275
416. BIOMINOVIT.....	273	466. BLUE ROYALE.....	24
417. BIOMOX – 20.....	68	467. BLUE ROYALE FUNGICIDE.....	173
418. BIOMYCIN – M.....	68	468. BMD.....	499
419. BIOMYTOX PLUS.....	173	469. BMD SOLUBLE.....	70
420. BIONE0.....	69	470. BNE – VAC®.....	368
421. BIONTRONIC TOP3.....		471. BOMECTIN POUR ON.....	206
422. BIOPHENE.....	24	472. BOSPRO.....	499
423. BIOPLEX C.....	497		

473. BOVACLOX DC.....	70	518. CALAVAC NEWCASTLE LASOTA (LaSota + H120).....	373
474. BOVI SHIELD 3.....	457	519. CALAVAC POWL POX.....	373
475. BREDOL.....	499	520. CALBRO INJECTION.....	277
476. BRO – GESAT®.....	275	521. CALCIDEX®.....	611
477. BROILER FASGROW.....	276	522. CALCIDEX® ORAL.....	277
478. BROILER FORMULA.....	563	523. CALCIDEX® PLUS.....	611
479. BROILER VITA.....	276	524. CALCIJECT 40 CM.....	277
480. BROILERMUNE.....	368	525. CALGOPHOS.....	277
481. BROILERTRAKE – M.....	368	526. CALIBRIN A.....	499
482. BROMOQUAD 10.....	25	527. CALIBRIN Z.....	499
483. BROMOQUAD 50.....	25	528. CALIMICINA 200 CL.....	70
484. BRONCHIN.....	368	529. CALPRONA MD.....	500
485. BRONCHITIS MASS (BRON MASS).....	369	530. CALPRONA P4.....	500
486. BRONHIKAL SPF.....	369	531. CALVITA.....	277
487. BRONIPRA – 1.....	369	532. CANEX MEDIUM.....	206
488. BRONIPRA – ND.....	369	533. CANIFFA.....	465
489. BRONIPRA – ND/IBD.....	370	534. CANIGEN DHA 2 P/L.....	465
490. BRONKICHIK.....	370	535. CANISHOT® RV – F.....	466
491. BRONKI-L.....	370	536. CANTHACOL.....	500
492. BROTIGAN®.....	276	537. CAPRI – ALBEND®.....	206
493. BROVITGRIN.....	275	538. CAPRI – CHICKS®.....	278
494. BRUCELLA ABORTUS STRAIN RB-51.....	458	539. CAPRI – EGG®.....	500
495. BRUCIVET.....	458	540. CAPRI B – PLEX® INJ.....	278
496. BUPHOSOLAMIN.....	259	541. CAPRIBRO®.....	278
497. BUR 706.....	370	542. CAPRICOLI®.....	70
498. BURCELL HVT.....	370	543. CAPRICOXI®.....	181
499. BURSA – MEX.....	371	544. CAPRIDES®.....	25
500. BURSA – VAC.....	371	545. CAPRIGLANDIN® Inj.....	337
501. BURSA – VAC 3.....	371	546. CAPRIMOX®.....	71
502. BURSA BLEN M.....	370	547. CAPRIMUN – E®.....	278
503. BURSAPLEX.....	371	548. CAPRINIL®.....	253
504. BURSIMUNE.....	371	549. CAPRINTEL® BOLUS.....	207
505. BURSINE – 2.....	371	550. CAPRIPROVIT®.....	278
506. BURSINE – K.....	371	551. CAPRIRAZIN®.....	207
507. BURSINE N – K.....	371	552. CAPRITOCIN® Inj.....	337
508. BURSINE PLUS.....	371	553. CAPRIVAC® AI – K.....	373
509. BUTAPHOS-B INJECTION.....	259	554. CAPRIVAC® IBD – K.....	374
510. BUTASYL.....	70	555. CAPRIVAC® NBG – K.....	374
511. BUTOX 50.....	238	556. CAPRIVAC® NB-K.....	374
		557. CAPRIVAC® ND – K.....	375
		558. CAPRIVAC® ND AI – K.....	374
		559. CAPRIVAC® NE – K.....	375
		560. CAPRIVAC® NG – K.....	375
		561. CAPRIVIT B12® Inj.....	278
		562. CAPRIVIT®.....	279
		563. CAPRIVIT® Inj.....	279
		564. CAPSANTAL EBS 30 NT.....	500
		565. CAPSANTAL EBS 40 NT.....	501
		566. CAPSOQUIN LIQUID ETHOXYQUIN.....	613
512. C – FRESH.....	280		
513. C – SAN®.....	281		
514. CACING EXITOR.....	206		
515. CALAVAC BRONCHITIS (H 120).....	373		
516. CALAVAC GUMBORO INTERMEDIATE.....	373		
517. CALAVAC NEWCASTLE BRONCHITIS.....	373		



Hal

567. CAPSOQUIN N.....	501	613. CEVAC ND IBD K.....	379
568. CAPZURIL®.....	181	614. CEVAC NEW K.....	379
569. CARISID.....	207	615. CEVAC NEW L.....	379
570. CARMAVIT.....	279	616. CEVAC TRANSMUNE.....	380
571. CARNIBROVIT.....	279	617. CEVAC TRANSMUNE IBD.....	379
572. CARNIFAST.....	279	618. CEVAC VITABRON L.....	380
573. CARNYVIT.....	280	619. CEVAC VITAPEST L.....	380
574. CAROPHYLL RED.....	613	620. CEVAMEC 1%.....	239
575. CAROPHYLL YELLOW.....	613	621. CEVAMUNE.....	608
576. CARVITA – 15®.....	563	622. CEVAZURIL.....	239
577. CASTRAN.....	13	623. CHEIL BIO MYCOSTATIN 50 WS.....	501
578. CATOSAL INJEKSI.....	280	624. CHEIL COLISTIN.....	74
579. CATTLEVET®.....	563	625. CHEIL COLISTIN 100.....	501
580. CEFABEE OINTMENT.....	71	626. CHEIL TONOCOMP.....	259
581. CEMOXIN.....	71	627. CHEIL TYLOSIN 220.....	501
582. CENTRA – ENROX INJECTION 10%.....	71	628. CHEIL TYLOSIN-100.....	74
583. CENTRA – OXYTE INJECTION 10%.....	72	629. CHICK N – K.....	380
584. CENTRA – OXYTE LA INJECTION 20%.....	72	630. CHICK N POX TC.....	380
585. CENTRA – TYLO INJECTION 20%.....	72	631. CHICKOFIT.....	260
586. CENTRA – TYLO SOLUBLE POWDER 20%.....	73	632. CHICKOPEST.....	381
587. CENTRE – ALBEN TABLET 500 MG.....	207	633. CHICKTONIC.....	280
588. CENTRE – IVERMEC INJECTION 1%.....	208	634. CHLORTETRACYCLINE – 25.....	74
589. CENTRE – IVERMEC POUR ON SOLUTION 1%.....	208	635. CHOLARAINOL.....	260
590. CENTRE – IVERMEC SOLUTION 1%.....	208	636. CHOLERIN TRIPLE.....	381
591. CENTRE – NEOMY SOLUBLE POWDER 5%.....	73	637. CHOLINE CHLORIDE 50%.....	564
592. CENTRE – TYLO PREMIX 25%.....	73	638. CHOLINE CHLORIDE 60%.....	564
593. CERESTOP.....	73	639. CHOLINE CHLORIDE 75%.....	564
594. CERTIFECT L SPOT ON.....	238	640. CHORULON.....	337
595. CERTIFECT M SPOT ON.....	239	641. CID 2000.....	25
596. CERTIFECT S SPOT ON.....	239	642. CIL.....	345
597. CERTIFECT XL SPOT ON.....	239	643. CIPDEX.....	333
598. CEVAC BROILER ND K.....	375	644. CIPERGEN.....	239
599. CEVAC BRON 120 L.....	375	645. CIPLOX 10% W/V.....	181
600. CEVAC CORYMUNE 4 K.....	376	646. CIPRO – 12®.....	76
601. CEVAC CORYMUNE 7 K.....	376	647. CIPROCAP®.....	74
602. CEVAC FP L.....	376	648. CIPROFLOX – 100 SP.....	74
603. CEVAC GUMBO L.....	376	649. CIPROLON®.....	74
604. CEVAC IBD L.....	376	650. CIPROMAS.....	75
605. CEVAC LT L.....	377	651. CIPROMED®.....	75
606. CEVAC MD HVT & RISPENS.....	377	652. CIPROPAN.....	75
607. CEVAC MD RISPENS.....	377	653. CIPROSIN EXTRA®.....	75
608. CEVAC MG F.....	377	654. CIPROVAKS.....	75
609. CEVAC NB L.....	378	655. CIPROVET.....	76
610. CEVAC ND EDS K.....	378	656. CIPROXACIN.....	76
611. CEVAC ND IB EDS K.....	378	657. CIPROXAN.....	76
612. CEVAC ND IB K.....	379	658. CIRCOMUNE.....	381
		659. CIRCOMUNE W.....	381
		660. CJ PROSIN.....	564
		661. CJ PROTIDE.....	564
		662. CLAVAMOX DROPS.....	76

663. CLAVET 250 TABLET.....	77	712. COLISTAMIN®.....	502
664. CLAVET 50 TABLET.....	77	713. COLISTAN®.....	81
665. CLEANATOR.....	25	714. COLISTIN 10% MEIJI.....	564
666. CLEANUP – F.....	25	715. COLIVET.....	81
667. CLINACOX.....	501	716. COLIVET SOLUTION.....	81
668. CLINAFARM SMOKE.....	26	717. COLLIZAG 100.....	502
669. CLINAFARM SPRAY.....	26	718. COLLIMEZYN.....	81
670. CLINIC PLUS.....	77	719. COLMYC – E.....	82
671. CLOSTAT HC DRY.....	501	720. COMFEED BROILER PREMIX 396 R.....	565
672. CLOSTAT™ 11 DRY.....	502	721. COMFEED LAYER PREMIX 2962 R.....	565
673. CLOXALAK®.....	345	722. COMOXY 500 WSP.....	82
674. CLOXALENE DRY COW.....	345	723. CONC M 35.....	565
675. CM – PREMIX®.....	564	724. CONQUER POWDER.....	209
676. COCCICHEM WS.....	182	725. CONTRA – STRESS.....	281
677. COCCILIN CAPSUL.....	77	726. CONTRAWORM.....	209
678. COCCILIN WATER SOLUBLE POWDER.....	77	727. CONTRAWORM – KAPSUL.....	209
679. COCCIMASTER.....	182	728. COOPERTET LA.....	82
680. COCCIN.....	182	729. CORI – MEX.....	381
681. COCCIPLUS.....	182	730. CORIPRAVAC.....	382
682. COCCIREX.....	182	731. CORISIN.....	82
683. COCCIROL S.....	182	732. CORISIN – 24.....	82
684. COCCISOL.....	183	733. CORITRIME.....	184
685. COCCIVAC – D.....	183	734. CORIVAC.....	382
686. COCCIVET®.....	183	735. CORYDON.....	82
687. COCCIVEX.....	183	736. CORYMYCOL.....	83
688. COCCIVIT.....	183	737. CORYVAX.....	382
689. COCCOXIN.....	183	738. CORYVIT WATER SOLUBLE POWDER.....	83
690. COCOSTOP PLUS.....	184	739. CORYZA.....	383
691. COFACALCIUM.....	281	740. CORYZA BIVALENT.....	382
692. COFALYSOR INJECTION.....	281	741. CORYZA OIL – 3.....	382
693. COFAVIT 500.....	281	742. CORYZAVAC KBL.....	383
694. COLA FLOXA.....	78	743. COSCAT – 666 WATER SOLUBLE POWDER.....	503
695. COLA-FLOXA LIQUID.....	78	744. COSUMIX PLUS 750.....	83
696. COLAMOX 200®.....	78	745. COTRIM 240 INJECTION.....	83
697. COLERAX.....	78	746. COTRIMAZINE®.....	83
698. COLI – OXY.....	81	747. COTRIMOXAZOLE®.....	83
699. COLIBACT®.....	78	748. COXABIC.....	184
700. COLIBACT® BOLUS.....	79	749. COXISTAC 12%.....	184
701. COLIBACT® INJEKSI.....	79	750. COXIXLIN.....	185
702. COLIBACT® SOLUTION.....	79	751. COXY.....	185
703. COLIMAS.....	79	752. COXY FORTE.....	185
704. COLIMAX 100.....	80	753. COXYMAS.....	185
705. COLIMAX 100 PREMIX.....	502	754. COYDEN F.....	613
706. COLIMIX.....	80	755. CRD 92.....	84
707. COLIMIX – 20.....	80	756. CRESOVEX – S.....	26
708. COLIMPEX 8%.....	502	757. CROMAX – 0,5%.....	503
709. COLIQUIN.....	80	758. CROMAX – 10%.....	503
710. COLISID®.....	80	759. CRYSTALLINE PROCAIN PENICILLIN G.....	84
711. COLISTAM.....	80		

760. CTC SOLUBLE	84
761. CTCZYME.....	503
762. CUATS – 20	26
763. CULINDO PIG BREEDER CL – 5	565
764. CULINDO PIG FINISHER CL – 4	565
765. CULINDO PIG FINISHER CL – 4 M	565
766. CULINDO PIG WEANER CL – 2	566
767. CULINDO PIG WEANER CL – 3	566
768. CUSTOM ANTISTRESS	282
769. CUSTOM VITAMIN	282
770. CYC – 100	503
771. CYDECTIN 1%	240
772. CYGRO	504
773. CYLACTIN LBC ME 10	504
774. CYPER KILLER 25 WP	240
775. CYPROSIN	84
776. CYPROTYLOGRIN	84
777. CYROMAS- 1%	240
778. CYROMAS 10%	240
779. CYROMAZIN – 10	240
780. CYROTEK – 1	504
781. CYROZINE – 10	240

D

Hal

782. D – NOX®	185
783. D.I.R.P.D	282
784. DAIMETON B INJEKSI 20%	185
785. DAIMETON SODIUM	85
786. DANISCO ANIMAL NUTRITION LIOUID ALPHA – AMYLASE	504
787. DANISCO ANIMAL NUTRITON LIOUID SUBTILISIN (PROTEASE)	504
788. DANISCO XYLANASE 40.000 G	505
789. DANISCO XYLANASE 40.000 L	505
790. DATILAN	209
791. DAVAINOL®	209
792. DE – ODORASE	506
793. DECCOX 6%	505
794. DECTOMAX	209
795. DEFENSOR 3	466
796. DEMP	505
797. DEMYTOX	505
798. DENAGARD 10% COATED	505
799. DENAGARD 20% INJECTION	85
800. DENAGARD 45% WSG	85
801. DENAGARD 80% COATED	506
802. DENFUS SPRAY	345
803. DEPOLAC	85

804. DERMASEPT IODE GEL	26
805. DERMAVET CREAM	599
806. DES HP	27
807. DESGRIN	27
808. DESIFUNG SOLUBLE	173
809. DESINSEP	27
810. DESOGERM – 3A	27
811. DESPADAC	27
812. DESTA – SAN®	28
813. DESTACAP®	27
814. DESTAN®	28
815. DESTASID®	28
816. DEXADRESON	334
817. DEXAROIDE	334
818. DEXATOZOON INJEKSI	334
819. DHN AVIAN INFLUENZA VACCINE, INACTIVATED	383
820. DHPPL – VAC®	466
821. DHUDHUT	256
822. DIACOX	185
823. DIACOX – 0,5% premix	506
824. DIACOXIN 5%	185
825. DIACOXIN WS	186
826. DIAMIX MINERAL PREMIX	566
827. DIAMIX SUPER LAYER PREMIX	566
828. DICLACEV PREMIX	186
829. DICLACOX	186
830. DIFTOSEC CT	383
831. DIGESTON ANTHELMINTIC	210
832. DILUENT STERIL	608
833. DIMEDRYL®	210
834. DIMETOPRIM ORAL POWDER	85
835. DIMOXAN WS	86
836. DINALON	28
837. DINAPROL	186
838. DINATRIM	86
839. DINAZOL	86
840. DK SARSAPONIN 30	506
841. DM CID	28
842. DOC – VIT	282
843. DOCTRIL	86
844. DORIS SKIN CARE POWDER	345
845. DOVENIX	210
846. DOXCINE WATER SOLUBLE POWDER	86
847. DOXERIN	87
848. DOXERIN + ...	87
849. DOXINYL	87
850. DOXITRA	87
851. DOXY – 500 WS	89

852. DOXY – PLUS.....	89	899. ECOX 200.....	507
853. DOXY 10 WSP.....	89	900. EDS – VAC.....	383
854. DOXYCAP®.....	87	901. EDS + NDV.....	384
855. DOXYCOL.....	88	902. EDS + NDV + IB.....	383
856. DOXYCYCLINE – 10.....	88	903. EDS NEW VAC.....	384
857. DOXYCYCLINE 50% WSP.....	88	904. EDS OLVAC.....	384
858. DOXYMAS.....	88	905. EDS VAC.....	384
859. DOXYMAX.....	282	906. EFFYDRAL.....	285
860. DOXYSOL – C.....	88	907. E-FLOX 2,5%.....	97
861. DOXYTIN.....	88	908. EGG MASTER.....	285
862. DOXYVET.....	88	909. EGG PROMOTOR.....	285
863. DRONTAL CAT.....	210	910. EGG STIMULANT.....	285
864. DRONTAL PLUS FLAVOUR.....	211	911. EGGSTIM®.....	507
865. DRYCLOX®.....	346	912. EGGSHELL 49 2X.....	507
866. DRYCLOXA – KEL.....	334	913. ELANCOBAN – 200.....	508
867. DSC 1000.....	29	914. ELANCOBAN 100 PREMIX.....	508
868. DUFADEx 10% INJ.....	260	915. ELANCOBAN 200 PREMIX.....	508
869. DUFATRIM/SUL ORAL.....	89	916. ELECTRO – SAN®.....	286
870. DUFAVIT EXTRA ORAL.....	282	917. ELECTROVIT®.....	286
871. DUFAVIT INJ.....	283	918. ELESCAP.....	286
872. DUOCYCLINE – LA.....	89	919. ELITOX.....	508
873. DUODIN LA.....	90	920. EM – PETERNAKAN.....	508
874. DUOKO.....	90	921. EMBACOX.....	186
875. DUPHAFRAL AD3E FORTE.....	283	922. ENC – BI – EDS VACCINE.....	384
876. DUPHAFRAL D3 1000.....	283	923. ENC – EDS VACCINE.....	385
877. DUPHAFRAL E-SELENIUM.....	284	924. ENCIVAX.....	385
878. DUPHAFRAL MULTI.....	284	925. ENDO – POWER BETA.....	508
879. DUPHALYTE.....	284	926. ENDOFER 20 INJECTABLE SOLUTION.....	260
880. DUPHAPEN LA.....	90	927. ENDOX DRY.....	509
881. DUPHAPEN STREP BP.....	90	928. ENDURA F40.....	509
882. DUPHASPASMIN.....	13	929. ENDURA F80.....	509
883. DUPONT BIOSOLVE PLUS.....	29	940. ENDURAN®.....	287
884. DURACOL D.....	90	941. ENERGYN.....	287
885. DURACOX HC.....	186	942. ENFLOSIN ORAL SOLUTION.....	91
886. DURAMUNE DA2L.....	466	943. ENFLOX ORAL SOLUTION.....	91
887. DURAMUNE MAX 5 – CVK/4L.....	467	944. ENHALOR PHYTASE.....	509
888. DURAMUNE MAX 5/4L.....	467	945. ENOQUYL.....	91
889. DURAMUNE MAX PV.....	468	946. ENOXAN 10%.....	91
890. DURAVIT.....	285	947. ENOXIN.....	91
891. DYNE O MIGHT.....	29	948. ENPRO – 50 INJECTION.....	91
892. ECOCCELL.....	506	949. ENPRO SOLUTION.....	91
893. ECOFLEECE.....	241	950. ENRAMYCIN F – 40.....	509
894. ECOFOAM EXTRA.....	29	951. ENRO – 10.....	95
895. ECOMETIN 1% INJECTION.....	211	952. ENRO – 21.....	95
896. ECONASE XT 25.....	507	953. ENRO CHICKS.....	94
897. ECONOMASE.....	507	954. ENRO CHICKS.....	94
898. ECOSTAT.....	507	955. ENRO FORTE.....	94
		956. ENROCIN ORAL SOLUTION.....	92
		957. ENRODIAZ.....	92

958. ENRODIAZ LIQUID.....	92
959. ENROFOXACIN 100 G	92
960. ENROFOXACIN 100 MG.....	93
961. ENROJECT 10% LA INJ. SUSP.....	92
962. ENROMAS	93
963. ENROSOL.....	93
964. ENROTEN®	93
965. ENROTIL 10% SOL	94
966. ENROTIL 50 INJECTION	95
967. ENROVA 10% INJECTABLE SOLUTION	93
968. ENROVET	96
969. ENROXIN.....	93
970. ENTEROCILLINE.....	96
971. ENTEROVAX.....	385
972. ENTEROCOX ORAL.....	187
973. ENTROCOLIN.....	96
974. ENTROVET INJ.....	97
975. ENVACLOS	211
976. EPIDELIN INJEKSI	96
977. ERI – PLUS®	97
978. ERIDOKSIN®.....	97
979. ERITOCAP.....	97
980. ERITROMISIN – 25	97
981. ERYDOVAKS.....	98
982. ERYMAX	287
983. ERYSUPRIM	98
984. ERYTROGRIN HC.....	98
985. ERYTROMYCINE 80 G – DOXYCYCLINE 40 G	98
986. ESB – 3 (30%).....	173
987. ESP 8	287
989. ESSENTIAL.....	509
990. ETHOXYQUIN 66% POWDER	614
991. ETHOXYQUIN 97% LIQUID	614
992. EURICAN DHPPi – 2	469
993. EURICAN DHPPi – 2 L	468
994. EURICAN DHPPi – 2 LR.....	468
995. EXCEDE FOR SWINE.....	98
996. EXCENEL STERILE POWDER.....	99
997. EXCENEL STERILE SUSPENSION.....	99
998. EXFO-P Inj.....	99
999. EXTRAGUARD	29
1000. EXTRAVIT	287
1001. F VAX MG.....	385
1002. FARM FLUID S.....	29
1003. FASINEX 900	211

F

Hal

1004. FASTOB BOLUS.....	211
1005. FATROPRIM LA.....	100
1005. FATROVIT POULTRY WS	287
1006. FEDEX	288
1007. FEED CURB DRY	173
1008. FEEDMIX-B.....	566
1009. FEEDOX DRY.....	510
1010. FEL – O – GUARD PLUS 3	470
1011. FELLINIFFA.....	469
1012. FELOCELL 3	469
1013. FELOCELL 4	469
1014. FERDEX 100	260
1015. FERDEX PLUS.....	261
1016. FERMACTO	510
1017. FERODEX 20% WITH VIT B12®	288
1018. FERODEX®	288
1019. FEROPAN 200 INJ	288
1020. FEROSOL – E Inj	288
1021. FEROVITA.....	288
1022. FERRO 2000.....	289
1023. FERRODIN	289
1024. FERROVET	289
1025. FERROVET 10% INJ SOL	289
1026. FERTAGYL.....	338
1027. FIBOSEL	510
1028. FINASE EC 40P.....	510
1029. FINIGEN	241
1030. FLOGISTAN®	335
1031. FLOXA M2P.....	100
1032. FLOXAMAS.....	101
1033. FLOXAMYCINE.....	101
1034. FLOXATRIL	100
1035. FLOXIDIN 10% INJ	100
1036. FLOXIDIN 10% ORAL SUSP.....	100
1037. FLOXINE.....	101
1038. FLOXIVET	102
1039. FLS LIQUID	566
1040. FLU DETECT TYPE A AG TEST STRIP	480
1041. FLUBENOL 5%.....	212
1042. FLUBENZIM 5%.....	187
1043. FLUCONIX – 250.....	212
1044. FLUKICIDE® 12,5%.....	212
1045. FLUKICIDE® BOLUS.....	212
1046. FLUMISOL	101
1047. FLUNIXIN INJECTION.....	335
1048. FLUNIXVET INJ.....	335
1049. FLUQUINE.....	101
1050. FLY ZERO GRANULE	241
1051. FOKKAMEL EXTRA.....	567

1052. FOKKAMEL PLUS	567
1053. FOKKAMIX 9	567
1054. FOLLIGON	338
1055. FORMADES	30
1056. FORMALIN ACT	30
1057. FORMULA – 1	289
1058. FORMULA HP	289
1059. FORMYCINE GOLD PREMIX	510
1060. FORMYCINE LIQUIDO	510
1061. FORTEVIT	290
1062. FORTICOAT – NL	102
1063. FOS – T	103
1064. FOSBAC	102
1065. FOSBAC PLUS T	102
1067. FOSTIGRIN	102
1068. FOWL POX	385
1069. FRESTA	599
1070. FRONTLINE PLUS FOR CATS	241
1071. FRONTLINE PLUS FOR DOGS	242
1072. FRONTLINE SPOT ON	242
1073. FRONTLINE SPRAY	242
1074. FUMISID®	30
1075. FUNGEX	174
1076. FUNGINAT FP – 51	174
1077. FUNGINAT FP 51	511
1078. FUNGISAL MIX	511
1079. FUNGISAL MIX P	511
1080. FUNGIZAL	511
1061. FV 2 A	567
1062. FX PLUS 20 INJECTABLE SOLUTION	103
1063. FX PLUS ORAL SOLUTION	103
1064. FYLAX DRY SP	512
1065. FYLAX FORTE HC LIQUID	512
1066. FYLAX FORTE HC SP	512
1067. FYLAX LIQUID	512
1068. FYSAL FIT4	512
1069. FYSAL LIQUID	512
1070. FYSAL SP	512



Hal

1071. GALLIACID	512
1072. GALLIMUNE 201 (IBD + REO)	385
1073. GALLIMUNE 203 (ND + IB)	386
1074. GALLIMUNE 301 (ND + IC2)	386
1075. GALLIMUNE 302 (ND + IB + EDS)	386
1076. GALLIMUNE 403 (ND + IB + IBD + REO)	386
1077. GALLIMUNE 405 (ND + IB + IC2)	387

1078. GALLIMUNE 408 (ND + IB + EDS + IBD)	387
1079. GALLIMUNE 503 (ND + IB + EDS + IC2)	367
1080. GALLIMUNE FLU H5N9	387
1081. GALLIMUNE IBD	387
1082. GALLIMUNE MG	388
1083. GALLIMUNE ND	388
1084. GALLIMUNE ND DAY OLD	388
1085. GALLIMUNE REO	388
1086. GALLIMUNE SE	388
1087. GALLIPRO®	567
1088. GALLIVAC AE	389
1089. GALLIVAC Lasota	389
1090. GALLIVAC REO	389
1091. GANADEXIL ENROFLOXACINA 10%	103
1092. GANASUPERVIT PLUS	290
1093. GENEX POULTRY	513
1094. GENOPHOS – 5000G	513
1095. GENTA – 100	104
1096. GENTA 100 PANTEX INJECTABLE	105
1097. GENTADOX	104
1098. GENTAJECT 10%	104
1099. GENTAMIN	104
1100. GENTAMOX	104
1101. GENTAMYCIN INJECT	105
1102. GENTAVET 50	105
1103. GENTICOL – Inj	106
1104. GEORGIA STRAIN	389
1105. GERM – IOD	30
1106. GF – 82	290
1107. GLUCORTIN – 20	251
1108. GLUTACAP®	30
1109. GLUTACID	31
1110. GLUTACID	31
1111. GLUTACIDE	30
1112. GLUTADES®	31
1113. GLUTAMAS	31
1114. GLUTANOL®	31
1115. GLUTARALDEHYDE 30% BENZALKONIUM CHLORIDE 20%	31
1116. G-MICROCID	30
1117. GOLDEN GUARD	513
1118. GONASER	338
1119. GONAVET VEYX	32
1120. GPC 8	32
1121. GQ PLUS	32
1122. GROFAS	291
1123. GROGEL	291
1124. GROW MAX	513

1125. GROW MORE	291
1126. GROWVIT	567
1127. GUMB – VAC	389
1128. GUMBEX	106
1129. GUMBIN MB	390
1130. GUMBOKAL SPF	390
1131. GUMBONAL	106
1132. GUMBOPEST	390
1133. GUMBORIFFA 0,3	390
1134. GUMBORO MB	390
1135. GUSTOR BP 70	513

H

Hal

1136. HAEMOVAX 0,3	391
1137. HALOR C	514
1138. HALTOX	514
1139. HEARTGARD PLUS CHEWABLE	213
1140. HEKSAPLEX®	291
1141. HEMADEX®	291
1142. HEMATODIN	261
1143. HEMATOPAN B12	261
1144. HEMICELL – D	514
1145. HEMICELL – HT	514
1146. HEMICELL – L	103
1147. HEMICELL – MP	514
1148. HEMICELL W LIQUID	515
1149. HEMIDOX	103
1150. HEMISIN	213
1151. HEMISOL	213
1152. HEMOPIG	291
1153. HENCOX	187
1154. HEPARENOL	261
1155. HEPAVEX 200	297
1156. HERBAGRO 311	600
1157. HEXADIN®	253
1158. HEXADOG	470
1159. HEXAMAS	106
1160. HEXIPRA METRIN	242

1161. HG – GEL VAC	391
1162. HG – GEL VAC 3	391
1163. HIDRO REX VITAL AMINOACIDOS	392
1164. HI-G	32
1165. HI-G PLUS	32
1166. HIMMVAC HOG CHOLERA (T/C) VACCINE	458
1167. HIMMVAC IB – ND – EDS COMBINED OIL VACCINE	392

1168. HIMMVAC IB – ND COMBINED OIL VACCINE	391
1169. HIMMVAC IB LIVE VACCINE	391
1170. HIMMVAC IBD LIVE VACCINE	
1171. HIMMVAC ILT LIVE VACCINE	392
1172. HIMMVAC LASOTA LIVE VACCINE	
1173. HIMMVAC ND – IB COMBINED LIVE VACCINE	393
1174. HIMMVAC ND HIGH VACCINE	392
1175. HIMMVAC ND OIL VACCINE	392
1176. HIPRAGUMBORO – BPL2	393
1177. HIPRAGUMBORO – CH/80	393
1178. HIPRAGUMBORO – GM97	393
1179. HIPRALONA – NOR S	106
1180. HIPRAMIN – B	292

1181. HIPRAMOX	107
1182. HIPRAPOX	393
1183. HIPRAVIAR – B1	393
1184. HIPRAVIAR – BPL2	393
1185. HIPRAVIAR – CLON	394
1186. HIPRAVIAR – CLON/H120	394
1187. HIPRAVIAR – ILT	394
1188. HIPRAVIAR – ND BROILERS	394
1189. HIPRAVIAR – S	394
1190. HIPRAVIAR – S/H120	394

1191. HIPRAVIAR – TRT4	394
1192. HIPRAVIT – AD3E FORTE	292
1193. HITOPVIT	293
1194. HORMONIPRA	339
1195. HOSTAZYM C 250 MICROGRANULATE	515
1196. HOSTAZYM P 10000	515
1197. HOSTAZYM P 5000	515
1198. HOSTAZYM X 250 MICROGRANULATE	515
1199. HP 300	515
1200. HYORESP	458

1201. HYPEROX	32

I

Hal

1202. IB – OLVAC	395
1203. IB H – 52	395
1204. IB H-120	395
1205. IBA VAC	395
1206. IBA VAC ST	395
1207. IBD – VAC®	396
1208. IBD + NDV + IB	396
1209. IBD BLEN	396
1210. IBD V877	396

1211. IB-VAC®.....	396	1258. IODOPHORE 11,5%.....	34
1212. IC – VAC®.....	396	1259. IODOSEPT.....	34
1213. ILT.....	397	1260. IOGUARD – 300.....	34
1214. ILT – VAC®.....	397		
1215. IMAYEROL.....	346	1261. IRON – E INJEKSI.....	262
1216. IMEQUYL.....	107	1262. IRON – G.....	516
1217. IMEQUYL SOL 20%.....	107	1263. ISTAM.....	34
1218. IMOPEST.....	397	1264. ISTAM 20%.....	34
1219. INACTIVATED CORYZA VACCINE.....	397	1265. ISTAM 30%.....	34
1220. INDIGEST INJECTABLE.....	256	1266. ITA ND + IB + EDS.....	399
		1267. ITA ND + IBD.....	399
1221. INFECTIOUS BRONCHITIS H – 52.....	398	1268. ITA NEW (ND).....	399
1222. INFECTIOUS BRONCHITIS H120, LIVE VACCINE.....	397	1269. IVERVET.....	214
1223. INFECTIOUS BRONCHITIS H52, LIVE VACCINE.....	398	1270. IVOCIP.....	242
1224. INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS LIVE VACCINE (K137).....	398	1271. IVOCIP PASTE.....	214
1225. INGELVAC® MYCOFLEX.....	418	1272. IVOCIP PLUS.....	214
1226. INGELVAC® PRRS MLV.....	459	1273. IVOMEC INJECTION.....	214
1227. INJECTAMIN®.....	293	1274. IVOMEC F INJECTION.....	214
1228. INJECTAVIT.....	293	1275. IVOMEC FOR SWINE.....	215
1229. INJEKSI KALSIMUM BOROGLUKONAT.....	293	1276. IVOMEC INJECTION.....	214
1230. INJEKSI VITAMIN B KOMPLEKS.....	294	1277. IZOVAC B1 HITCHNER.....	399
		1278. IZOVAC CLONE.....	399
		1279. IZOVAC CORYZA 3.....	400
		1280. IZOVAC FC.....	400
1231. INJEKSI VITAMIN B12.....	294		
1232. INMUGAL IBA GUMBORO.....	398	1281. IZOVAC FOWL – POX.....	400
1233. INMUGAL VP LASOTA.....	398	1282. IZOVAC GUMBORO.....	400
1234. IMMUNAIR 17.5.....	516	1283. IZOVAC GUMBORO 2.....	400
1235. INOXYL ORAL SOLUTION.....	107	1284. IZOVAC H120 – B1 HITCHNER.....	401
1236. INTERCIDE®.....	33	1285. IZOVAC H120 – LA SOTA.....	400
1237. INTERFLOX – 100.....	107	1286. IZOVAC IB H120.....	401
1238. INTERFLOX ORAL.....	108	1287. IZOVAC ILT.....	401
1239. INTERMECTIN.....	213	1288. IZOVAC LASOTA.....	401
1240. INTERMECTIN SUPER.....	213	1289. IZOVAC MG.....	401
		1290. IZOVAC ND.....	401
1241. INTERSPECTIN – L.....	108		
1242. INTERTOCIN – S.....	339	1291. IZOVAC ND – BROILER.....	402
1243. INTERTRIM – 500 ORAL.....	108	1292. IZOVAC ND – EDS.....	402
1244. INTERTRIM LA.....	108	1293. IZOVAC ND – EDS – IB.....	402
1245. INTRA HYDROCARE.....	33	1294. IZOVAC ND – IBD.....	402
1246. INTRAHER – 200 B12.....	294		
1247. INTRAMOX – 150.....	109		
1248. INTRAMOX – 150 LA.....	109		
1249. INTRAMOX – 200 WS.....	109		
1250. INTROVIT – B – COMPLEX.....	295		
1251. INTROVIT – E – SELEN.....	295		
1252. INTROVIT – E – SELEN WS.....	295		
1253. INTROVIT 4 + WS.....	295		
1254. INTROVIT AD3E WS.....	296		
1255. INTROVIT ORAL.....	296		
1256. IODENE.....	33		
1257. IODINACID.....	33		

J

Hal

1295. JECTAVIT B12® INJ.....	402
1296. JURAMATE.....	339

K

Hal

1297. K VAC CHICKEN ND.....	402
1298. K VAC CORYZA.....	403
1299. K VAC ND.....	403

1300. K VAC ND-IB	403
1301. K.O – MEX EC	403
1302. KALBAZE – ZG	215
1303. KALBAZEN C	215
1304. KALBAZEN KAPLET	215
1305. KALMIRAL	568
1306. KALMOXTIN	109
1307. KALOXY-VET	110
1308. KALVIDOG	297
1309. KALVIMIX-RX	568
1310. KALVOLAC	568
1311. KANA SOLUTION	110
1312. KANAMEX®	110
1313. KANAMIN	110
1314. KANIVET	111
1315. KATRAMIX 325	568
1316. KATRAMIX I	568
1317. KATRAMIX II	568
1318. KATRAMIX III	568
1319. KATRIWORM	187
1320. KC – POL	569
1321. KC PERMASOL	297
1322. KEMIRA BACTERIA CONTROL LF2 NC	516
1323. KEMIRA BACTERIA CONTROL SF1	516
1324. KEMIRA MOULD CONTROL LP 1 NC	516
1325. KEMIRA MOULD CONTROL LP 3 NC	517
1326. KEMIRA MOULD CONTROL SP 1	517
1327. KEMIRA Pro GIT SF1	517
1328. KEMIRA Pro GIT SF3	517
1329. KEMTRACE CHROMIUM DRY 0,04%	517
1330. KEMZYME DRY	518
1331. KEMZYME V DRY	518
1332. KEPKOC 2,5% ORAL	188
1333. KEPROMEC INJ.	188
1334. KEPROMEC ORAL	188
1335. KETAMIL	15
1336. KETAMINE 10 % INJ.	15
1337. KICKSTART	35
1338. KILCOX EXTRA	35
1339. KILLWORM	216
1340. KILTIX	243
1341. KISA SP	111
1342. KITAMOXIN POWDER	111
1343. KLINO – MINERAL	569
1344. KLINOFEED	174
1345. KLINORIL®	111

1346. KLINOSAN	518
1347. Klorin – GARD®	35
1348. Klorivaks	111
1349. KLOSAN® 200	216
1350. KLOSAN® BOLUS	216
1351. KLOSAN® KAPLET	217
1352. KOFA GRAIN -pH 5-	518
1353. KOKCISAN 120 G	189
1354. KOKSIDEX	189
1355. KOKSINDO	189
1356. KOLAMOX LA INJECTION	111
1357. KOLERIDIN	112
1358. KOLERIDIN K	112
1359. KOMAVET	404
1360. KRISTAPEN	112
1361. KULACTIC	519
1362. KUMARUK	297
1363. KUMARUK HERBAL	600
1364. KURKUMAVIT®	569
1365. KUTUTOX	244

L	Hal
1365. L – LYSINE HCL	614
1366. L – THREONINE	614
1367. L – TRYPTOPHAN	614
1368. L.E ~ 435	220
1369. LA SOTA MASS BLEN	404
1370. LABRO	297
1371. LACTACLOX	335
1372. LACTAGEN INJEKSI	339
1373. LAGANTOR BSA	217
1374. LAGANTOR BSA BOLUS	217
1375. LAGANTOR F 1 CUSTOMIX	569
1376. LAMOXI®	113
1377. LARSIDEX	519
1378. LARUTAN DAPAR	608
1379. LARVAC	404
1380. LARVADEX 10% PREMIX	244
1381. LARVAKILL® 10%	244
1382. LARVAKILL® 2%	244
1383. LARVASID – 10®	244
1384. LARVATOX	244
1385. LARVAZINE	519
1386. LARYNGO – VAC	404
1387. LARYNGOTRACHEITIS, LIVE VACCINE	405
1388. LASOTA	405
1389. LASOTA + H – 120	405

1390. LASOTA STRAIN (NEWCASTLE DISEASE VACCINE)	405
1391. LAYERMUNE 2	405
1392. LAYERMUNE ND	406
1393. LAYERMUNE SE	406
1394. LENTOVET	406
1395. LEUCOMAS	189
1396. LEUCOSTOP	175
1397. LEVA – 200 ORAL	217
1398. LEVA + PLUS PREMIX®	217
1399. LEVA – SAN® BL	218
1400. LEVAGRIN	217
1401. LEVMAS	218
1402. LEVAMID	218
1403. LEVAMISOLE 2.000 MG	218
1404. LEVAMISOLE POWDER	218
1405. LEVAMIT – 125®	219
1406. LEVAMOL	219
1407. LEVANUM®	219
1408. LEVASOL	219
1409. LEVAVERM 10%	219
1410. LEVIWORM 200	220
1411. LEVOCAP	113
1412. LEVOSTA®	113
1413. LEVUCCELL SB 20	519
1414. LG ACCENT	113
1415. LIDOCAIN	15
1416. LIFE JACKET	35
1417. LIFEFORCE FORMULA	519
1418. LIFEGARD – T	35
1419. LIFELINE	36
1420. LIGNOBOND DD	519
1421. LIMOXIN – 200 LA	114
1422. LIMOXIN – 25 SPRAY	114
1423. LIMOXIN – 50	113
1424. LINCO SP	114
1425. LINCO SPECTIN 100 SOLUBLE POWDER	114
1426. LINCO SPECTIN STERILE SOLUTION	115
1427. LINCO-S INJECTABLE SOLUTION	115
1428. LINCOMIX 110	520
1429. LINSMYCIN SOLUBLE POWDER	115
1430. LIPTOBAC – L	569
1431. LIPTODRY	36
1432. LIPTOSAFE-L	570
1433. LIQAVITE	297
1434. LIQUID LYSINE	614
1435. LISOVIT	262
1436. LIVACOX – T	406
1437. LIVACOX Q	406
1438. LIVE HOG CHOLERA VACCINE	459
1439. LIVER EXTRACT INJEKSI	262
1440. LMS 200®	220
1441. LONGAMOXYL	116
1442. LONGICINE	116
1443. LONGILIFE 250 S	36
1444. LT – IVAX	407
1445. LT BLEN	407
1446. LUCANTIN PINK	614
1447. LUCANTIN RED	615
1448. LUCANTIN YELLOW	615
1449. LUCAROTIN 10% FEED	570
1450. LUCTAMOLD HC 1777Z	174
1451. LUMIPHYTASE 5 XG	520
1452. LUPROSIL ADSORBATE	520
1453. LUPROSIL NC	520
1454. LUPROSIL SALT	615
1455. LUTALYSE	615
1456. LUTAVIT A 1000 PLUS	339
1457. LUTAVIT A 500 PLUS	615
1458. LUTAVIT A 500 S	615
1459. LUTAVIT AD3 1000/200 PLUS	616
1460. LUTAVIT AD3 500/100 PLUS	616
1461. LUTAVIT B2 SG 80	616
1462. LUTAVIT CALPANT	616
1463. LUTAVIT E 50	616
1464. LUTAVIT E 50 S	616
1465. LUTAVIT K3 MSB	616
1466. LUTAVIT VITAMIN C MONOPHOSPHATE	617
1467. LYISOFORTE DRY	520
1468. MACROTIL 250 SOLUTION	116
1469. MADIMPEX 10G	570
1470. MADUX 1%	520
1471. MALADEX	190
1472. MALAKILL	190
1473. MAMALIA MINERAL	298
1474. MAMIMUNE	570
1475. MANNANASE GRANULAR	520
1476. MANNANASE POWDER	521
1477. MAPRELIN	340
1478. MARATON	298
1479. MARBOCYL 10%	116
1480. MARBOCYL 2%	116
1481. MARPOSTAR 10%	116

1482. MAREK DISEASE VACCINE (STRAIN CVI-988)	407	1527. MEDIVAC ND – EDS-IB EMULSION ...	414
1483. MAREK RISPEN CVI 988 (MAREK'S DISEASE VACCINE LIVE CHICKEN HERPES VIRUS).....	407	1528. MEDIVAC ND – EDS EMULSION.....	412
1484. MAREK RISPEN CVI 988 + HVT	407	1529. MEDIVAC ND – IB	415
1485. MAREK'S DISEASE VACCINE, SEROTYPE 3, LIVE VIRUS/MAREK's HVT.....	407	1530. MEDIVAC ND - IB - EMULTION.....	414
1486. MARUKI SERBUK.....	221	1531. MEDIVAC ND – IB – GUMBORO EMULSION	415
1487. MARUKI CAIR	220	1532. MEDIVAC ND CLONE 45	412
1488. MASABRO	298	1533. MEDIVAC ND EMULSION	413
1489. MASACHICKS.....	298	1534. MEDIVAC ND EMULSION 0.3	413
1490. MASAMIX.....	570	1535. MEDIVAC ND GUMBORO EMULSION	413
1491. MASAMIX SUPER	570	1536. MEDIVAC ND HITCHNER B1	413
1492. MASAVIT	299	1537. MEDIVAC ND LA SOTA	414
1493. MASQUIN	117	1538. MEDIVAC POX.....	415
1494. MASTILAK®	346	1549. MEDOXY L	117
1495. MAVAX FOWL POX.....	408	1540. MEDOXY LA	118
1496. MAVAX LA SOTA	408	1541. MEFISTO	37
1497. MAVAX ND	408	1542. MEGACLOX	118
1498. MAVAX ND + EDS + IB	408	1543. MEGAVIT POULTRY	299
1499. MAXCARE	570	1544. MELODY	571
1500. MAXCARE BEEF ECO	571	1545. MENOROX LIQUID 20%.....	118
1501. MAXCARE BROILER	571	1546. MENTOFIN	600
1502. MAXI – MIL HP	571	1547. METABOL INJ	299
1503. MAXI – MIL S	521	1548. METABOLASE	299
1504. MAXIBAN 72 PREMIX	521	1549. METAMINO	571
1505. MAXUS 100 PREMIX	521	1550. METRICURE	118
1506. MAXUS 200	117	1551. MFEED	522
1507. MAYYA TURBO TOX	521	1552. MI – LAT	245
1508. MD – 09	521	1553. MIA – OVODUR	522
1509. MD – VAC CFL	408	1554. MICOFUNG	522
1510. MECTISAN®	221	1555. MICOSPECTONE	119
1511. MEDIBIRD	36	1556. MICOTIL	119
1512. MEDICOX SOLUTION	190	1557. MICOTIL – 300 INJECTION	119
1513. MEDILAN	605	1558. MICRO AID FEED GRADE	522
1514. MEDIMILK	608	1559. MICRO AID LIQUID 10%.....	522
1515. MEDISEP	36	1560. MICROCID	37
1516. MEDITRIL K	605	1561. MICRODES 100	37
1517. MEDIVAC AI	608	1562. MICROGEN FARM DESINFECTANT	38
1518. MEDIVAC AI 0.3.....	36	1563. MICROMINERAL POULTRY	572
1519. MEDIVAC CORYZA B.....	117	1564. MICROTECH 5000 GRANUL	523
1520. MEDIVAC CORYZA T SUSPENSION ...	409	1565. MICROTECH 5000 LIQUID	523
1520. MEDIVAC GUMBORO A.....	410	1566. MICROTECH 5000 POWDER	523
1521. MEDIVAC GUMBORO B.....	410	1567. MICROVIT A PROSOL 500.....	617
1522. MEDIVAC GUMBORO EMULSION.....	410	1568. MICROVIT A SUPRA 1000.....	617
1523. MEDIVAC IB H – 120	411	1569. MICROVIT A SUPRA 500	617
1524. MEDIVAC IB H – 52	411	1570. MICROVIT AD3 SUPRA 1000 – 200	617
1525. MEDIVAC ILT.....	411	1571. MICROVIT B1 PROMIX.....	617
1526. MEDIVAC ND – AI EMULSION	412	1572. MICROVIT B12 PROMIX 1000.....	618
		1573. MICROVIT B2 SUPRA 80	617
		1574. MICROVIT B3 PROMIX (NIACIN).....	618

1671. NATUPHOS 5000 G	619	1721. NEWCA – MEX	419
1672. NATUPHOS 5000 L	619	1722. NEWCASTLE B1	419
1673. NATUSTAT	528	1723. NEWCASTLE DISEASE AND EGG DROP SYNDROME VACCINE INACTIVATED (La Sota Strain + 911 Strain)	420
1674. NATUZYME	528	1724. NEWCASTLE DISEASE B1 BRON CONN MASS	420
1675. NBLH – VAC®	417	1725. NEWCASTLE DISEASE KILLED VACCINE (LA SOTA)	421
1676. ND SINCO BRONVAC	417	1726. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS	421
1677. ND VACCINE LASOTA	417	1727. NEWCASTLE DISEASE LASOTA BRON MASS II	421
1678. ND VIRUS LASOTA AND IB VIRUS 120 LIVE VACCINE	417	1728. NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (CLONE 30)	422
1679. NDG – VAC®	417	1729. NEWCASTLE DISEASE LIVE VACCINE (LA SOTA)	422
1680. NDLS – VAC®	418	1730. NEWCASTLE DISEASE N – 63	423
1681. NDV4HR	418	1731. NEWCASTLE DISEASE N – 79	423
1682. NECTIN	418	1732. NEWCASTLE DISEASE VACCINE INACTIVATED (LA SOTA STRAIN)	423
1683. NEDEVAC	418	1733. NEWCASTLE DISEASE VACCINE LIVE (LASOTA STRAIN)	423
1684. NEGUVON	245	1734. NEWCASTLE DISEASE VACCINE, LIVING, BP (VET) (B1 STRAIN)	423
1685. NEMASOL – K	222	1735. NEWCASTLE DISEASE VACCINE, LIVING, BP (VET) (LASOTA STRAIN)	424
1686. NEMOVAC	418	1736. NEWCASTLE DISEASE-INFECTIOUS BRONCHITIS LIVE VACCINE (LASOTA+H120)	420
1687. NEO – EGGOSTIM®	528	1737. NEWCASTLE INFLUENZA KILLED VIRUS VACCINE	424
1688. NEO ANTISEP	39	1738. NEWCASTLE K	424
1689. NEO ANTISEP NEW FORMULA	39	1739. NEWCASTLE LASOTA	424
1690. NEO BLUE	346	1740. NEWVAC LASOTA	425
1691. NEO ERYDOVET – 25®	123	1741. NICLO – 75	191
1692. NEO MEDITRIL	123	1742. NICLOMAS	222
1693. NEO MEDITRIL – I	123	1743. NICLOMIX – L®	222
1694. NEO RABIVAK TC	470	1744. NOBILIS AE + POX	425
1695. NEO TERRAMYCIN 25	124	1745. NOBILIS AE 1143	425
1696. NEO ULTRADES	39	1746. NOBILIS CORVAC	425
1697. NEOAMP	122	1747. NOBILIS CORYZA	425
1698. NEOBRO	302	1748. NOBILIS DILUENT CA	609
1699. NEOCIN SOLUBLE POWDER	122	1749. NOBILIS DILUENT FD	609
1700. NEOFIL FORTE	122	1750. NOBILIS E COLI INAC	426
1701. NEOMIX 325	122	1751. NOBILIS EDS	426
1702. NEO–MOXY	124	1752. NOBILIS G + ND	426
1703. NEOPRIDIMET	123	1753. NOBILIS GUMBORO 228E	426
1704. NEOPROFEN INJECTION	335	1754. NOBILIS GUMBORO D78	426
1705. NEOTETRA – 50®	123	1755. NOBILIS GUMBORO INAC	427
1706. NEOVIT E 20% + Se	302		
1707. NEOXIN	123		
1708. NEPHRYL	253		
1709. NEPOREX 2 WSG	245		
1710. NEPTIK	253		
1711. NETRABIL	609		
1712. NEUMOVIRIC	124		
1713. NEW BRONZ	419		
1714. NEW BRONZ MG	419		
1715. NEW COLIPRIM	124		
1716. NEW ERYSULFA	125		
1717. NEW METHIOVIT	302		
1718. NEW OX	125		
1719. NEW SQ – PLUS	191		
1720. NEW VERNA	125		

1756. NOBILIS IB + G + ND	427
1757. NOBILIS IB + ND	427
1758. NOBILIS IB + ND + EDS	427
1759. NOBILIS IB 4/91	428
1760. NOBILIS IB H – 120	428
1761. NOBILIS IB MA 5	428
1762. NOBILIS IB MULTI + ND + EDS	428
1763. NOBILIS IB MULTI + G + ND	429
1764. NOBILIS IB MULTI + ND	429
1765. NOBILIS ILT	429
1766. NOBILIS ILT BIOTRACH	429
1767. NOBILIS INFLUENZA H5	430
1768. NOBILIS INFLUENZA H5 + ND	429
1769. NOBILIS MA5 + CLONE 30	430
1770. NOBILIS MAREXINE CA126	430
1771. NOBILIS MG 6/85	430
1772. NOBILIS MG INAC	431
1773. NOBILIS ND + EDS	431
1774. NOBILIS ND BROILER	431
1775. NOBILIS ND C2	431
1776. NOBILIS ND CLONE 30	431
1777. NOBILIS ND HITCHNER	432
1778. NOBILIS ND LA SOTA	432
1779. NOBILIS NEWCAVAC	432
1780. NOBILIS REO + IB + G + ND	432
1781. NOBILIS REO 1133	432
1782. NOBILIS REO 2177	432
1783. NOBILIS REO ERS INAC	433
1784. NOBILIS REO INAC	433
1785. NOBILIS RISMAVAC	433
1786. NOBILIS RISMAVAC + CA 126	433
1787. NOBILIS RT+ IB MULTI+ ND+ EDS	434
1788. NOBILIS RT INAC	434
1789. NOBILIS RTV 8544	434
1790. NOBILIS SALENVAC	434
1791. NOBIVAC DH	471
1792. NOBIVAC DHP	471
1793. NOBIVAC DHPI	471
1794. NOBIVAC PARVO – C	471
1795. NOBIVAC PUPPY DP	471
1796. NOBIVAC RABIES	472
1797. NOBIVAC RL	472
1798. NOBIVAC TRICAT	472
1799. NOBLOAT	257
1800. NOFLI LOTION	245
1801. NOFLI SHAMPOO	246
1802. NOPCOXYME II	529
1803. NOPSTRESS TF	302
1804. NOPSTRESS WITH ELECTROLYTES	303
1805. NORAN – 150	125

1806. NORAN – 200 ORAL	126
1807. NORAN - 200 WS	126
1808. NORFLOX 33	126
1809. NORITACK LIQUID	126
1810. NOROMECTIN INJECTION	191
1811. NOROPROST	340
1812. NOROTRYL	126
1813. NOROTYL LA	126
1814. NORVAX STREPSI	477
1815. NOVALDON®	3356
1816. NOVAMOX – G INJ	127
1817. NOVAQUYL	127
1818. NOVASIL PLUS	176
1819. NUKAMIX 10	574
1820. NUOQIU PREMIX 5%	529
1821. NUPRO	574
1822. NUTRASE XYLA	529
1823. NUTRASE XYLA 500	529
1824. NUTRASE XYLA LIQUID	529
1825. NUTRI – SURE DWI	529
1826. NUTRI C	575
1827. NUTRIAROMA MILKY – VANILLA	530
1828. NUTRILAC IGA LIQUID	530
1829. NUTRI-LACK	575
1830. NUTRIMIN PM 518 POULTRY MINERAL PREMIX	575
1831. NUTRIMIN FM518 FISH	575
1832. NUTRIMIN SM 318 SWINE MINERAL PREMIX	575
1833. NUTRIPLUS GEL	303
1834. NUZYME	530
1835. NYCLOSOL	223
1836. NYCLOSOL – 50	223
1837. O.T.C – LA INJECTION	132
1838. OBAT TEMBOLOK	257
1839. OCTACIN EN 10% ORAL SOLUTION	127
1840. OCTACIN EN 5% INJECTION	127
1841. OCTAMIX AC	128
1842. OESTRADIOL BENZOAT	340
1843. OL – VAC	434
1844. OLVAC 1000	435
1845. OLVAC A + B	435
1846. OLVAC B + G	435
1847. OMNICIDE	40
1848. OO – CIDE	40
1849. OPTAFLEX 100	530
1850. OPTICIDE	40



1851. OPTIGEN.....	531
1852. OPTIGEN II.....	530
1853. OPTIMIN COPPER 15%.....	531
1854. OPTIMIN IRON 15%.....	531
1855. OPTIMIN MANGANESE 15%.....	531
1856. OPTIMIN SE Y.....	575
1857. OPTIMIN SEY 3000.....	531
1858. OPTIMIN ZINC 15%.....	531
1859. OPTIMIN ZINC METHIONINE 20%.....	531
1860. OPTIMIN ZMC.....	532

1861. OPTIMISE.....	532
1862. OPTIZYME.....	532
1863. ORANGE.....	576
1864. OREGO – STIM LIQUID.....	532
1865. OREGO – STIM POWDER.....	532
1866. ORGANIC GREEN CULTURE.....	128
1867. ORIVET.....	459
1868. ORO GLO DRY.....	533
1869. OSTELIN.....	576
1870. OTAFLOX.....	127

1871. OTAGUMMED.....	303
1872. OTAQUINE SOL.....	128
1873. OTC SPRAY.....	303
1874. OTRALECT.....	303
1875. OTRALITE.....	303
1876. OTRAVIT.....	304
1877. OVALUMON INJEKSI.....	340
1878. OVASTIM.....	533
1879. OVASTIM SP.....	533
1880. OVO – 4.....	435

1881. OVULA EXTRA.....	576
1882. OXALDIN.....	128
1883. OXALDIN LIQUID.....	128
1884. OXIBENDAZOLE – 100.....	223
1885. OXICAP E2.....	533
1886. OXIHOLD.....	533
1887. OXILEN AD.....	128
1888. OXIPRA – 20 LA.....	129
1889. OXISTAT.....	533
1890. OXOLINAL.....	129

1891. OXTRA EFFERVESCENT PESSARIES.....	129
1892. OXTRA LA.....	129
1893. OXY – KEL 10%.....	132
1894. OXY – KEL 20 LA.....	132
1895. OXY – SAN® 10%.....	132
1896. OXY NIL RX DRY.....	534
1897. OXYJECT – 100.....	130
1898. OXYLIN INJEKSI.....	123
1899. OXYTETRA 200 LA.....	131
1900. OXYTETRA 5 COOPHAVET.....	131

1901. OXYTETRACYCLINE – 25.....	131
1902. OXYTETRAVET 20% LA INJ.....	130
1903. OXYTETRAVET AEROSOL.....	130
1904. OXYTOCIN – 10.....	340
1905. OXYTOCIN INJEKSI.....	341
1906. OXYTOCIN VET.....	341
1907. OXYTOCINA PITUITARIA.....	341
1908. OXYTRAL LA®.....	131
1909. OXYTRAL®.....	130

P

Hal

1910. PACOM – A.....	40

1911. PAMIZOLE PS.....	133
1912. PANACUR 10% SUSP.....	223
1913. PANHELMIN.....	224
1914. PANKILL.....	40
1915. PANMECTIN – 10.....	246
1916. PANTISOL.....	304
1917. PANTO VITAMIN.....	304
1918. PANTOMINOVIT.....	304
1919. PANTRISUL INJECT.....	132
1920. PARACILLIN SP.....	133

1921. PARAGIN.....	251
1922. PARAMECTIN RV Pour-On for CATLE.....	246
1923. PARAMOL – 50.....	13
1924. PARVIGEN.....	472
1925. PAYLEAN PREMIX.....	534
1926. PELLTECH.....	534
1927. PEN – HISTA STREP.....	134
1928. PEN – O – VET.....	134
1929. PEN & STREP.....	134
1930. PENERGETIC – T.....	305

1931. PENSTREP – 400.....	133
1932. PENSTREP 20/20.....	134
1933. PENSTREP 4 0,5.....	133
1934. PENTADOG.....	472
1935. PENZAVET.....	135
1936. PEPEROXIN SOL.....	135
1937. PEPTIDA – G.....	576
1938. PERFEXOL – H.....	576
1939. PERFEXOL – L.....	576
1940. PERMASOL 500 GRANULE.....	576

1941. PERMASOL 500 LIQUID.....	305
1942. PERMETHYL 5%.....	305
1943. PESTIFFA.....	459
1944. PESTIKAL.....	436
1945. PESTIKAL + EDS + IB.....	435
1946. PEST-VAC.....	459
1947. PG 600.....	341

1948. PGF VEYX.....	342	1998. POULVAC EDS NEW BRONZ VAC.....	437
1949. PGF VEYX FORTE.....	341	1999. POULVAC EDS VAC.....	437
1950. PHARMASIN 10 PREMIX.....	534	2000. POULVAC IB H120.....	437
1951. PHARMASIN 100% WS GRANULES.....	135	2001. POULVAC IC ABC OIL.....	438
1952. PHARMASIN PULVIS.....	135	2002. POULVAC MAREK CVI.....	438
1953. PHENOXYPEN WSP.....	135	2003. POULVAC MIX 6.....	438
1954. PHENVIRO PLUS.....	40	2004. POULVAC NDW.....	438
1955. PHENYLJECT.....	251	2005. POULVAC OVOLINE CHI+HVT MAREK'S DISEASE VACCINE.....	439
1956. PHORCE.....	534	2006. POULVAC PABAC IV.....	439
1957. PHOSRETIC.....	135	2007. POUSTIN C.....	306
1958. PHYLINK 5000.....	576	2008. POWER CHICKS.....	536
1959. PHYZYME XP 1.000 TPT.....	535	2009. POWER VIT.....	306
1960. PHYZYME XP 10.000 TPT.....	535	2010. POWERCILLIN INJECTION.....	137
1961. PHYZYME XP 5.000 G.....	535	2010. POWERMEC SOLUTION.....	192
1962. PHYZYME XP 5.000 L.....	535	2011. POWL POX.....	439
1963. PIG – IRONJECT 20% + B12.....	305	2012. POWL POX.....	440
1964. PIG – PREMIX®.....	577	2013. POXIMUNE.....	440
1965. PIG MINERAL POWDER.....	577	2014. POXIMUNE AE.....	440
1966. PIGMIX.....	577	2015. POXINE.....	440
1967. PIGNOX.....	577	2016. PRAMISOLE.....	225
1968. PIGWORMS.....	244	2017. PREFECT.....	536
1969. PINOCID®.....	41	2018. PREMULAC – L.....	578
1970. PIPEDON BOLUS.....	224	2019. PREMVIT.....	306
1971. PIPEDON-X LIQUID.....	224	2020. PREVENTIC.....	246
1972. PIPERA – SAN®.....	224	2021. PRIMA ALBENS – 10.....	226
1973. PIPERAMAS.....	225	2022. PRIMA AMINOACID PLUS 2002.....	306
1974. PIPERAVAKS – S.....	225	2023. PRIMA AMPROFURA – 77.....	192
1975. PIPERAZINE – 36.....	191	2024. PRIMA COCCI PLUS.....	192
1976. PIRETAMAS.....	336	2025. PRIMA COLIMIX PLUS.....	138
1977. PIRIMYCIN.....	136	2026. PRIMA COLMY PLUS.....	138
1978. PIRIPEN INJ.....	136	2027. PRIMA CUATS – 30.....	41
1979. PIRIVET.....	136	2028. PRIMA CYPRO PLUS.....	138
1980. PITACID.....	225	2029. PRIMA DEXTRA – CY PLUS.....	307
1981. PLUSET.....	342	2030. PRIMA DOXERY PLUS – 99.....	138
1982. PM – OLVAC.....	436	2031. PRIMA GENTA 5% Injection.....	139
1983. PNEUMODOG.....	473	2032. PRIMA HIT STRESS.....	307
1984. PNEUMOTOS – I.....	136	2033. PRIMA IODINE – 33.....	41
1985. POLYBRON N – 63.....	436	2034. PRIMA LINCOSPECT.....	139
1986. POLYVIT STRESS.....	305	2035. PRIMA NEOERY – 25.....	139
1987. PORCILIS ART.....	460	2036. PRIMA OXYCOL.....	139
1988. PORCILIS ERY.....	460	2037. PRIMA OXYMYCINE PLUS.....	139
1989. POTAHORMON INJEKSI.....	342	2038. PRIMA QUINCURE – 25.....	140
1990. POULTRY GROW.....	535	2039. PRIMA QUINOL – F.....	140
1991. POULTRY MINERAL 2000.....	535	2040. PRIMA QUINOL – FL.....	140
1992. POULTRY VITAMIN 21270.....	535	2041. PRIMA QUINTRIL 10% PLUS.....	137
1993. POULTRY VITMAIN PREMIX.....	577	2042. PRIMA VAM – 200.....	226
1994. POULTRY SAR ME.....	535	2043. PRIMA VITA PLUS.....	307
1995. POULVAC BURSA F.....	436	2044. PRIMA ZINEOS 808 PLUS.....	140
1996. POULVAC CORYZA ABC IC3.....	437	2045. PRIMACIDE – 200.....	41
1997. POULVAC E COLI.....	437		

2046. PRIMADES.....	41	2095. PULLOGEN.....	443
2047. PRIMADINE.....	41	2096. PULLOXAL.....	141
2048. PRIMADOXIN.....	137	2097. PULMOTIL AC.....	141
2049. PRIMATICOL.....	137	2098. PULMOTIL PREMIX.....	537
2050. PRIMATRIM.....	137	2099. PUMA (PUTU MACAN).....	601
		2100. PUNCH.....	537
2051. PRIMAVIL.....	137	2101. PUNCH LIQUID MOLD INHIBITOR.....	537
2052. PRIMAZINE 808 PLUS.....	138	2102. PUREVAX.....	473
2053. PRIMAZOL®.....	138	2103. PUYUH MEDI EGG.....	308
2054. PRIMEQUYL.....	140	2104. PUYUH VITAKIT.....	141
2055. PRIMODOG.....	473	2105. PUYUH VITANAK.....	308
2056. PRISTAM.....	42	2106. PUYUHVIT.....	308
2057. PRO – CELL.....	610	2107. PVP IODINE 50 G.....	42
2058. PRO – MIX® LAYER.....	578	2108. PX – X4DM.....	537
2059. PRO VAC 3.....	440	2109. PX – X5BM.....	537
2060. PRO VAC 4.....	440	2110. PX – X6CM.....	580
		2111. PX – Y1AM.....	538
2061. PROCHAL – CU.....	578	2112. PX – Y1ATM.....	538
2062. PROCHAL – MnS.....	578	2113. PX – Y1BM.....	580
2063. PROCHAL – Zn.....	578	2114. PX – Y1CM.....	538
2064. PROCHICKGRIN.....	536	2115. PX – Y20TM.....	538
2065. PROCID.....	536	2116. PX – Y2AM.....	538
2066. PROFISH Ω POULTRY.....	536	2117. PX – Y2DM.....	538
2067. PROGENOS.....	578	2118. PX – Y3AM.....	538
2068. PROHEART SR-12.....	226	2119. PX – Y3DM.....	538
2069. PROMECTINE ORAL.....	226	2120. PX – Z5AM.....	539
2070. PROMERIS DUO SPOT ON FOR DOGS.....	226	2121. PX – Z88.....	580
2071. PROMIX PREMIX.....	579	2122. PX – Z9AM.....	580
2072. PROMOTOR L.....	307	2123. PYRIKOL – DROPS.....	1346
2073. PROMOZEN – L.....	600	2124. PYRISIN – 525®.....	192
2074. PROPHYL.....	42	2125. PYRONIL.....	227
2075. PROSTAVET-C.....	342	2126. PYRONIL – 1000 BOLUS.....	227
2076. PROTECTOR MINERAL PREMIX I.....	579	2127. PYRONIL – 2500 BOLUS.....	228
2077. PROTECTOR MINERAL PREMIX II.....	579	2128. PYRONIL – 300 KAPLET.....	227
2078. PROTECTOR MINERAL PREMIX III.....	579	2129. PYRONIL SUSPENS.....	227
2079. PROTECTOR VITAMIN PREMIX I.....	579	2130. PYROSPASH.....	42
2080. PROTECTOR VITAMIN PREMIX II.....	579	2131. PYROXY INJ.....	141
2081. PROTEK – ALL PLUS.....	307	2132. PROVYSOL.....	580
2082. PROTEK – STRES®.....	308		
2083. PROTEK CORYZA KILL VACC.....	441		
2084. PROTEK IBD KILL VACC.....	441		
2085. PROTEK ND – EDS – IB KILL VACC.....	442		
2086. PROTEK ND – IB KILL VACC.....	442		
2087. PROTEK ND – IBD KILL VACC.....	443		
2088. PROTEK ND KILL VACC.....	441		
2089. PROTEK ND LIVE VACC.....	441		
2090. PROTExIN CONCENTRATE.....	536		
2091. PROVITA – 20®.....	537		
2092. PROVYSOL.....	580		
2093. PROXAN – C.....	141		
2094. PROXAN – S.....	141		

Q

Hal

2133. QUANTUM 2500 TR.....	539
2134. QUAT 50.....	42
2135. QUICKBAYT 10 WG.....	247
2136. QUINABIC 14% INJECTABLE SOLUTION.....	142
2137. QUINABIC 7% INJECTABLE SOLUTION.....	142
2138. QUINABIC WSP.....	142
2139. QUINCURE 20 LIQ.....	142

2140. QUINOEX.....	142
2141. QUINOVET F.....	142
2142. QUINOXAN.....	192
2143. QUINTRIL INJ 5%.....	143
2144. QUINTRIL LIQ 10%.....	143
2145. QUIXALUD.....	539

R

Hal

2146. R. P. MINERAL.....	580
2147. RABIGEN MONO.....	473
2148. RABISIN.....	473
2149. RABIVET SUPRA'92.....	474
2150. RABVAC 3.....	474

2151. RABVAC 3 TF.....	474
2152. RACUMIN 0,0375 BB.....	247
2153. RAMECTIN INJECTION.....	228
2154. RAMIKAL TRACE MINERAL PREMIX.....	580
2155. RED ROCKIES.....	581
2156. REDOX T.....	539
2157. REMACYCLINE LA.....	143
2158. REN – CLEAR.....	253
2159. RENNIL®.....	253
2160. REOMUNE 3.....	443

2161. REPROMUNE 4.....	443
2162. RESPIMUNE.....	444
2163. RESPIRAC.....	143
2164. RESPIRANT.....	143
2165. RESPIRATREK.....	143
2166. RESPIROXAN.....	144
2167. RESPIROXAN 10.....	144
2168. RESPISURE.....	460
2169. REVOLUTION 12%.....	228
2170. REVOLUTION 6%.....	228

2171. REX VITAL.....	309
2172. RHINIFFA T.....	461
2173. RHISOMIX.....	581
2174. RHISOMIX 208.....	581
2175. RHODEGG.....	539
2176. RHODIMET AT 88.....	619
2177. RHODIMET NP 99.....	619
2178. RHODIMIX 22.....	581
2179. RHODIMIX 273.....	582
2180. RHODIMIX 784.....	582

2181. RHODIMIX CF3.....	582
2182. RHODIMIX MB 100.....	582
2183. RHODIVIT.....	309
2184. RICAN PREMIX POWDER.....	539

2185. RIDAN.....	309
2186. RIMADYL.....	336
2187. RINTAL BOLUS.....	229
2188. RINTAL GRANUL 10%.....	229
2189. RISA – KOL.....	144
2190. RISA – KOL KAPSUL.....	144

2191. ROBORANTE CALIER.....	262
2192. RODALON.....	43
2193. ROMINDO MICROMIX 2000.....	582
2194. RONOZYME AX (CT).....	540
2195. RONOZYME NP (CT).....	619
2196. RONOZYME NP (L).....	619
2197. RONOZYME P 5000.....	620
2198. RONOZYME PROACT (CT).....	540
2199. RONOZYME WX (CT).....	620
2200. RONOZYME WX (L).....	620

2201. ROSAN® PREMIX.....	540
2202. ROSIGOLD – P.....	583
2203. ROSIGOLD – S.....	583
2204. ROSIGOLD WSP.....	583
2205. ROVABIO MAX AP.....	540
2206. ROVABIO™ EXCEL AP.....	540
2207. ROVABIO™ EXCEL LC.....	540
2208. ROVIMIX 528.....	583
2209. ROVIMIX A – 1000.....	620
2210. ROVIMIX AD3 1000/200.....	620

2211. ROVIMIX AQUA VIT PREMIX.....	583
2212. ROVIMIX B1.....	620
2213. ROVIMIX B2 80 SD.....	620
2214. ROVIMIX B6.....	621
2215. ROVIMIX BETA – CAROTENE.....	621
2216. ROVIMIX C – EC.....	621
2217. ROVIMIX CALPAN.....	621
2218. ROVIMIX CP 3 DC.....	583
2219. ROVIMIX E – 50 ADSORBATE.....	621
2220. ROVIMIX FOLIC 80 SD.....	621

2221. ROVIMIX NIACIN.....	621
2222. ROVIMIX STAY C.....	622
2223. ROVIMIX®HY – D 1.25%.....	622
2224. ROVIMIX 8188.....	584
2225. ROVISOL DM 295.....	584
2226. ROVISOL JCI 1000.....	584
2227. ROVISOL JCI 1002 (VITAMIN CONCENTRATE).....	584
2228. ROVISOL SP – 802.....	584
2229. ROXACIN INJ.....	144
2230. ROXACIN ORAL.....	145

2231. ROXINE®.....	145
2232. ROXINE® 10% ORAL SOLUTION.....	145
2233. ROXINE® 25% ORAL SOLUTION.....	145

2234. ROXINE® INJEKSI.....	145
2235. ROXINE® KAPLET.....	145
2236. RUMENSIN 200 PREMIX.....	540
2237. RYOMICIN.....	309



Hal

2238. SALIGRAN G120.....	584
2239. SALINDOX 120 BMP.....	541
2240. SALKIL.....	541
2241. SALSTOP SD.....	176
2242. SALTEC 501.....	541
2243. SALTEC 511.....	541
2244. SAMYANG TYLOSIN – 200 INJECTION.....	145
2245. SAN – ALBEND®.....	229
2246. SANBE – MIX® A.....	541
2247. SANBE – MIX® B.....	541
2248. SANBE – MIX® C.....	542
2249. SANBE – MIX® D.....	542
2250. SANITAS - 151®.....	43
2251. SANIVIR.....	43
2252. SANIVIR PLUS.....	43
2253. SANMIX – B®.....	542
2254. SANMIX®.....	585
2255. SANTOQUIN LIQUID.....	542
2256. SANTOQUIN MIXTURE 6.....	543
2257. SANVIMIN®.....	585
2258. SAQUADIL 100.....	192
2259. SAQUADIL 50.....	192
2260. SARA KILL.....	44
2261. SEBOLYTIC.....	605
2262. SEL – PLEX.....	544
2263. SEL – PLEX 2000.....	544
2264. SEL – PLEX 2700.....	544
2265. SEL – PLEX 3000.....	544
2266. SELACID DRY.....	543
2267. SELACID GREEN GROWTH P LIQUID.....	543
2268. SELACID GREEN GROWTH P MP.....	543
2269. SELDOX HM DRY.....	543
2270. SELETOCO INJECTION.....	310
2271. SELEVIT – SB FORTE®.....	310
2272. SELFEED CF.....	543
2273. SELKO PH.....	543
2274. SEPTIDES.....	44
2275. SEPTISAN®.....	44
2276. SEPTIVET.....	461
2277. SEPTOCID.....	44
2278. SEPTO-SKIN CALIER.....	146

2279. SEROLAT HL.....	585
2280. SEROLAT PEP.....	585
2281. SETON 2%.....	15
2282. SGT MUAANDHI DEWE.....	601
2283. SHIFT.....	44
2284. SHOTAPEN LA.....	146
2285. SIERADES.....	45
2286. SIERAMIX – A.....	585
2287. SIERAMIX – B.....	585
2288. SIL – ALL WATER SOLUBLE.....	544
2289. SINDOCHICKS.....	310
2290. SINDOFLOK SOL.....	146
2291. SINDOFLOX FORTE.....	146
2292. SINDOMIX 17 EM.....	586
2293. SINDOVIT SUPER.....	310
2294. SINDOXAN.....	146
2295. SING A SONG.....	310
2296. SIPRO – 10.....	147
2297. SIRNASET®.....	229
2298. SMIZYME Phytase 5000 U/g Granular.....	544
2299. SMIZYME Phytase 5000 U/g Liquid.....	545
2300. SMIZYME Phytase 5000 U/g Powder.....	545
2301. SOGECOLI.....	1147
2302. SOLFAC 10 WP.....	248
2303. SOLUBENOL 100 MG/G.....	230
2304. SOLUBLE ORGANIC GREEN CULTURE.....	545
2305. SOLVIT.....	311
2306. SORB – IT.....	545
2307. SORBATOX.....	545
2308. SOTASEC.....	444
2309. SP – V5.....	586
2310. SP FV – 1.....	586
2311. SPECILAC 41% LACTOSA.....	545
2312. SPECILAC RED.....	546
2313. SPECIORLAC.....	147
2314. SPECLIN.....	148
2315. SPECTARAL – 25®.....	45
2316. SPECTARAL®.....	45
2317. SPECTOLIN.....	147
2318. SPECTOVET INJ.....	148
2319. SPIRA – SAN PLUS.....	148
2320. SPIRADEGG.....	546
2321. SPIRADIN – 20.....	148
2322. SPORADES.....	45
2323. STAFLEX.....	248
2324. STAFAC – 500.....	546
2325. STAMIX 20.....	546
2326. STAMIX SP 500.....	546
2327. STERILE DILUENT.....	45

2328. STERILE DILUENT		610
2329. STERILIDES		46
2330. STOP WORM (BLUE TABLETS)		230
2331. STOP WORM (PINK TABLETS)		230
2332. STOVANOL – SF		148
2333. STREPCILLIN		148
2334. STREPTOMISINA SULFATE		149
2335. STREPTOMYCIN INJEKSI		149
2336. STREPTOMYCIN® Serbuk Injeksi		149
2337. STREPTOVET		149
2338. STRESS – STOP®		311
2339. STRESS BLOCK		586
2340. STRESS PROTECTOR		311
2341. STRESSGRIN		311
2342. STRONG – VIT		546
2343. STRONG EGG		312
2344. STRONG N FIT		312
2345. STRONGPLUS		312
2346. SUANOVIL		150
2347. SUANOVIL SOL. 20		150
2348. SULDIVIT		150
2349. SULDIVIT		153
2350. SULFA STRONG INJEKSI		151
2351. SULFADIM		193
2352. SULFAMIX		150
2353. SULFANILAMIDE SALEP		346
2354. SULFATRIM 48% ORAL SUSPENSION		151
2355. SULFAXALINE		193
2356. SULFIDIN		151
2357. SULPHAPRIM INJ.		151
2358. SULPIDON® INJEKSI		336
2359. SULPIG		152
2360. SULTRIM SUSPENSION		152
2361. SULTRIVAKS		152
2362. SUNNY BINDER		547
2363. SUNPHASE G		547
2364. SUNPHASE L		547
2365. SUPER – BRO		314
2366. SUPER – EGG		314
2367. SUPER – LUBE		547
2368. SUPER – P		314
2369. SUPER – VITA		314
2370. SUPER BIOSECURITY		46
2371. SUPER FIT		313
2372. SUPER FIT FORTE		312
2373. SUPER IODOCIDE		46
2374. SUPER MIX		587
2375. SUPER POWER		313
2376. SUPER TOP		313
2377. SUPER VITAMINO		313
2378. SUPERVETACLEAN		46
2379. SUPLEMEN HERBAL SENIOR		601
2380. SUPRALIT		315
2381. SUPRALIT +		314
2382. SURAMOX 50% OSP		152
2383. SURMAX – 200 PREMIX		547
2384. SURMAX 100 PREMIX		547
2385. SUROLAN		346
2386. SURPZIN		193
2387. SUTRIMIX PLUS		152
2389. SUVAXYN E		461
2390. SUVAXYN RESPIFEND MH		461
2391. SWINE MINERAL PREMIX		587
2392. SWINE VITAMIN PREMIX		587
2393. SY IVERMECTIN INJECTION		248
2394. SYNERGIZE		46
2395. TAKTIC		248
2396. TAPINEX POWDER		230
2397. TAVET ENROFLOXACINE 10%		153
2398. TAVET GST		153
2399. TAVET OXITETRACYCLINA		153
2400. TAVET SULFA X3		153
2401. TECHNOMOS		548
2402. TECTIN INJ.		249
2403. TEK – TROL		47
2404. TELUR VIT		315
2405. TENO – VAXIN		444
2406. TERMIN 8 LIQUID		176
2407. TERMIN 8 POWDER		548
2408. TERMINATOR		47
2409. TERMITOX		548
2410. TERRAMYCIN® INJECTABLE SOLUTION		154
2411. TERRAMYCIN® LA INJECTABLE SOLUTION		154
2412. TERREXINE		154
2413. TERROXYVET		155
2414. TESTOHORMON INJEKSI		342
2415. TETRAFEIN MERAH		155
2416. TETRAMISON INJEKSI		231
2417. TETRAMISON TABLET		249
2418. TETRAVET AEROSOL		155
2419. TH4+		47
2420. THE ONE		47
2421. THERAPY		155

2422. THREAMINO.....	587	2471. TRIMETOGRIN.....	159
2423. TI – FLOXAN.....	156	2472. TRIMEZYN BOLUS.....	159
2424. TIAMULIN.....	156	2473. TRIMEZYN K.....	159
2425. TILMOVET 25%.....	156	2474. TRIMEZYN S.....	159
2426. TIMING GOLD.....	548	2475. TRIMIXIN 480 WS.....	160
2427. TINKANIUM.....	156	2476. TRIMOXAL PIGLET SUSPENSION.....	160
2428. TM – PERAZINE.....	231	2477. TRIPLE CAPS.....	232
2429. TM – VITA®.....	315	2478. TRIPLE WORMER BOLUS.....	249
2430. TN OX.....	548	2479. TRI-REO.....	444
2431. TNI BETAIN.....	622	2480. TRISULMIX INJECTABLE/ SULRIJECT.....	160
2432. TNI BETAIN HC 70.....	622	2481. TRISULMIX LIQUIDE.....	160
2433. TOLACOX.....	47	2482. TRIWORM.....	232
2434. TOLACOX LIQUID.....	249	2483. TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 430.....	588
2435. TOLCOXIN.....	194	2484. TROUW NUTRITION VITAMIN PREMIX 528.....	588
2436. TOLEVIT 10.....	315	2485. TRYAMIDIUM.....	195
2437. TOLEVIT 10 PLUS SE.....	315	2486. TRYAMINO.....	588
2438. TOLFEDINE CS INJECTION.....	336	2487. TRYPONIL.....	232
2439. TOLOXAN.....	231	2488. TURBO.....	316
2440. TOLTRACOX.....	194	2489. TWENTY 1 WP.....	48
2441. TOLTRAPAN.....	194	2490. TYCOTIL.....	160
2442. TOLTRARIL S 2,5%.....	194	2491. TYFURAL.....	160
2443. TOLTRARIL S 5%.....	194	2492. TYLAN 100 PREMIX.....	550
2444. TOLTRAVET 2,5% ORAL SOLUTION.....	194	2493. TYLAN 40 PREMIX.....	550
2445. TONOPHOSPHAN COMPOSITION.....	316	2494. TYLAN SOLUBLE.....	161
2446. TOP MIX.....	587	2495. TYLAPRIM.....	161
2447. TOP MIX HC.....	587	2496. TYLO – SAN.....	162
2448. TOPCEF.....	156	2497. TYLOCARE.....	161
2449. TOPVIT®.....	316	2498. TYLOCOL.....	162
2450. TOSAPRIM WS.....	157	2499. TYLODOX.....	163
2451. TOXFIN™ DRY.....	548	2500. TYLOFLOX.....	161
2452. TOXIBAN AM.....	549	2501. TYLOGRIMIX.....	550
2453. TOXIBOND.....	549	2502. TYLOJECT 20%.....	161
2454. TOXIDEX.....	549	2503. TYLOMAS.....	162
2455. TOXIDREN.....	316	2504. TYLOON.....	163
2456. TOXISORB CLASSIC.....	549	2505. TYLOPRIM.....	162
2457. TOXISORB PREMIUM.....	549	2506. TYLORATE INJ.....	162
2458. TOXO MX.....	549	2507. TYLOSIN – 50.....	163
2459. TOXO XL.....	550	2508. TYLOSIVET.....	163
2460. TRANSVAC.....	444	2509. TYLOTRYL.....	164
2461. TREMORMUNE.....	444	2510. TYLOVA 200 INJECTABLE SOLUTION.....	164
2462. TRI ALPUCINE.....	157	2511. TYLOXACIN.....	164
2463. TRIDIAZINE ORAL SUSPENSION.....	157	2512. TYMPANOL – SB®.....	257
2464. TRIDOX LA.....	157	2513. TYSINOL.....	164
2465. TRIMAZINE.....	157		
2466. TRIMESULF.....	158		
2467. TRIMETH.....	158		
2468. TRIMETHODINE.....	158		
2469. TRIMETHODINE BOLUS.....	158		
2470. TRIMETHOSULF.....	158		

U

Hal

2514. ULTRA – PEL	588
2515. ULTRADES	48
2516. ULTRADES PLUS	48
2517. ULTRALIN 45 %	164
2518. ULTRAMIN	317
2519. ULTRAVIT M	317
2520. ULTRAXIDE	48
2521. UNIMINERAL	588

V

Hal

2521. V – MAX	551
2522. V.A. CHICK VAC	445
2523. VA VAC	445
2524. VAIOL – VAC	445
2525. VAKSIMUNE AI	445
2526. VAKSIMUNE ANTHRAX	462
2527. VAKSIMUNE CLONE	446
2528. VAKSIMUNE CLONE IB	446
2529. VAKSIMUNE CORYZA	446
2530. VAKSIMUNE CORYZA L	446
2531. VAKSIMUNE CORYZA N	446
2532. VAKSIMUNE EDS	447
2533. VAKSIMUNE IB	447
2534. VAKSIMUNE IB INAKTIF	447
2535. VAKSIMUNE IBD D	447
2536. VAKSIMUNE IBD L	447
2537. VAKSIMUNE IBD M	447
2538. VAKSIMUNE ILT	447
2539. VAKSIMUNE K	448
2540. VAKSIMUNE ND AI	448
2541. VAKSIMUNE ND AIN2	448
2542. VAKSIMUNE ND CLONE	448
2543. VAKSIMUNE ND EDS	449
2544. VAKSIMUNE ND EDS IB	448
2545. VAKSIMUNE ND IB INAKTIF	449
2546. VAKSIMUNE ND IB PLUS	449
2547. VAKSIMUNE ND IBD INAKTIF	449
2548. VAKSIMUNE ND INAKTIF	449
2549. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,1	449
2550. VAKSIMUNE ND INAKTIF 0,3	449
2551. VAKSIMUNE ND L INAKTIF	450
2552. VAKSIMUNE NDB1	450
2553. VAKSIMUNE NDB1 IB	450
2554. VAKSIMUNE NDHV	450
2555. VAKSIMUNE NDHV IB	450
2556. VAKSIMUNE NDLS	451

2557. VAKSIMUNE NDLS IB	451
2558. VAKSIMUNE POX	462
2559. VAKSIMUNE SE	462
2560. VAKSIN ND LASOTA	451
2561. VALBAZEN 11.25% SUSPENSION	232
2562. VALOSIN FG 50	550
2563. VALOSIN WATER SOLUBLE	550
2564. VANGUARD PLUS 5 L4 CV	474
2565. VANGUARD PLUS 5/CV – L	475
2566. VANGUARD PLUS 5/L	475
2567. VANGUARD PLUS CPV	476
2568. VANGUARD PLUS CPV/CV	476
2569. VANNAGEN	550
2570. VANODOX	48
2571. VANOQUAT	49
2572. VAXSAFE MG VACCINE	451
2573. VAXSAFE MS VACCINE	452
2574. VB – 1093 T	589
2575. VB – 1099 SL	589
2576. VBBR – 0899/SL	589
2577. VERM – O® BOLUS	232
2578. VERM – O® KAPLET	233
2579. VERMICID	233
2580. VERMIPRAZOL – 10%	233
2581. VERMIXON SIROP	233
2582. VERMIZYN	233
2583. VET – CHOICE	318
2584. VET – MIX®	591
2585. VET – OXY LA®	166
2586. VET – OXY SB®	167
2587. VET ADE FORTE	317
2588. VET B – 1	317
2589. VET B – 12	317
2590. VET B – PLEKS	317
2591. VET STREP	167
2592. VETA CORYZEV	165
2593. VETA CYPROCIN	165
2594. VETA DINE	49
2595. VETA FLOXA	165
2596. VETA GUARD	49
2597. VETA MYCOLA	165
2598. VETA QUAT	49
2599. VETA RESPIREX	166
2600. VETA ZURIL	196
2601. VETADRYL® INJEKSI	251
2602. VETAMIX	589
2603. VETCOX	195
2604. VETERDRYL	318
2605. VETILAC 41% LACTOSA	551
2606. VETIODINE	50

2607. VETMACOL FORTE	166	2656. VITA PLEX DROPS	321
2608. VETMIX AQUAVIT	590	2657. VITA SOLE	591
2609. VETMIX POULTRY HIGH CONCENTRATES	590	2658. VITA STRESS	322
2610. VETMIX POULTRY PLUS	590	2659. VITA STRESS – B	322
2611. VET-PENSTREP 4 : 1	167	2660. VITA STRONG	323
2612. VET-PENSTREP 4: ½	167	2661. VITA TETRA CHLOR	168
2613. VETQUIN	195	2662. VITA TETRA CHLOR S	168
2614. VETRIBAC	195	2663. VITABRO	323
2615. VETRIBAC D	196	2664. VITACART PLUS	323
2616. VETRIMOXIN 50 WS	166	2665. VITACHIP	323
2617. VETRIMOXIN LA	166	2666. VITAEGGS	551
2618. VETRIMOXIN LA CLAS	166	2667. VITAKUR	551
2619. VEYXYL LA 20%	168	2668. VITAL CHORUS – FORTE	324
2620. VH	452	2669. VITAL PREMIX	591
2621. VH + H – 120	452	2670. VITALINK BV 218 BROILER VITAMIN PREMIX	591
2622. VI – SORBITS	320	2671. VITALINK LV118 LAYER VITAMIN PREMIX	592
2623. VIAMIN – 34 INJECTION	318	2672. VITALINK LVM 102 LAYER STARTER PREMIX	592
2624. VIANO – 10	168	2673. VITALINK LVM 202 LAYER PULLET PREMIX	592
2625. VIBA ZONE	50	2674. VITALINK LVM 302 LAYER PHASE I PREMIX	592
2626. VIDONE®	50	2675. VITALINK LVM 402 LAYER PHASE II PREMIX	593
2627. VIGANTOL E	318	2676. VITALINK LVM 702 LAYER PREMIX	593
2628. VIGO VIT	319	2677. VITALINK PV5288 POULTRY VITAMIN PREMIX	593
2629. VIGOSINE	263	2678. VITALINK SV 318 SWINE VITAMIN PREMIX	593
2630. VIGROO	319	2679. VITALINK SVM 105 SWINE PRE – STARTER PREMIX	593
2631. VIMMUNE	591	2680. VITALINK SVM 205 SWINE STARTER PREMIX	593
2632. VIRA SHIELD 4	462	2681. VITALINK SVM 305 SWINE GROWER PREMIX	593
2633. VIRA SHIELD 6	462	2682. VITALINK SVM 405 SWINE FINISHER PREMIX	594
2634. VIRAKIL NG	50	2683. VITALINK SVM 505 SWINE GESTATION PREMIX	594
2635. VIRBAMEC L	250	2684. VITALINK SVM 605 SWINE GESTATION PREMIX	594
2636. VIRBAMEC LA	233	2685. VITALINK SVM 705 SWINE PREMIX	594
2637. VIREX	50	2686. VITALINK VP 50180	594
2638. VIRIDAN	51	2687. VITAMAS	324
2639. VIRKON S	51	2688. VITAMILD PLUS	324
2640. VIROCID	51	2689. VITAMIN AD3E	325
2641. VIROGUARD	51	2690. VITAMIN AD3E PANTEX INJECTABLE	324
2642. VIROPHOR	52		
2643. VIROTEC	52		
2644. VIRTOX	52		
2645. VIRUCIDAL EXTRA	52		
2646. VIRUKILL	52		
2647. VIRUS KLIN	53		
2648. VIT – ECO	320		
2649. VIT AD3 E 300 INJ.	320		
2650. VIT GEMUK (SAPI+KAMBING)	320		
2651. VIT GEMUK (UNGGAS)	321		
2652. VITA CHICKS	321		
2653. VITA F – 1P	321		
2654. VITA PLEX	322		
2655. VITA PLEX B	321		

2691. VITAMIN B COMPLEX-S INJEKSI.....	325
2692. VITAMIN B12 INJEKSI	325
2693. VITAMIN B6 INJEKSI	325
2694. VITAMIN E SELLENIUM.....	325
2695. VITAMIN E50 + Se INJ	326
2696. VITAMINO SOL (VIRBAC VITAMINO SOLUTION).....	319
2697. VITAMINO SP.....	319
2698. VITAMINOACIDOS.....	551
2699. VITAMIX INJEKSI	326
2700. VITAPOULT	326
2601. VITARAL.....	326
2602. VITARAL PLUS.....	326
2703. VITASAM.....	327
2704. VITASAM EFFERVESCENT	327
2705. VITASOL – E	327
2706. VITLECT XP	595
2707. VITOL – 140.....	327
2708. VITOSELEN.....	328
2709. VITRAMIX – LC.....	595
2710. VITRAVIT.....	595
2711. VL – 1093 T	595
2712. VOLVAC® AC PLUS BACTERIN KV	452
2713. VOLVAC® AC PLUS EMUL BACTERIN KV.....	452
2714. VOLVAC® AI KV.....	452
2715. VOLVAC® IBD MLV.....	453
2716. VOLVAC® LT MLV.....	453
2717. VOLVAC® ND + IB + EDS KV.....	454
2718. VOLVAC® ND + IB KV.....	454
2719. VOLVAC® ND + IB MLV.....	454
2720. VOLVAC® ND CONC. KV.....	453
2721. VOLVAC® ND KV.....	453
2722. VOLVAC® ND LASOTA MLV.....	454
2723. VS – 1093 T	595
2724. VSH – 7.....	596
2725. VVMD – VAC.....	454
2726. WATER TREATMENT.....	551
2727. WHEAT EASE – M (LIQUID).....	552
2728. WHEAT EASE – M (POWDER).....	552
2729. WIDECILLIN FINE GRANULES 10%...	169
2730. WIDECILLIN FINE GRANULES 20%...	169
2731. WINVAC ND EDS IB.....	455
2732. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS.....	455
2733. WINVAC NEWCASTLE BRONCHITIS GUMBORO ND – IB – IBD).....	455

W

Hal

2734. WINVAC NEWCASTLE CONCENTRATED	455
2735. WINVAC NEWCASTLE EDS.....	456
2736. WINVAC NEWCASTLE GUMBORO (ND – IBD).....	456
2737. WISEDEM GOLDEN Y – 20.....	552
2738. WISEDEM RED.....	552
2739. WONDER AMOXYLIN.....	169
2740. WONDER IODINE SPRAY.....	347
2741. WONDER IVERMEC INJEKSI.....	234
2742. WONDER POULTRY EGG FORMULA.....	552
2743. WONDER QUINOLIN.....	170
2744. WONDER TRIMETHOPRIM.....	170
2745. WONDER VITAMIN B1 INJEKSI.....	328
2746. WONDER VITAMYCIN POWDER.....	328
2747. WONDER ZEOLIT.....	553
2748. WOOGENE COLISTIN 150.....	553
2749. WORMECTIN INJEKSI.....	234
2750. WORMINEX 10% LIQUID	197
2751. WORMNIL.....	234
2752. WORMZOL B.....	235
2753. WORMZOL K.....	235
2754. WORMZOLE - 100 SOL.....	235

X

Hal

2755. X – TRA ALBENDAZ.....	235
2756. X – TRA AMPICOL.....	170
2757. X – TRA AMPROCOC.....	197
2758. X – TRA ANTISTRESS.....	328
2759. X – TRA BETAGAIN.....	328
2760. X – TRA CARNICEL.....	328
2761. X – TRA CARNIVA.....	329
2762. X – TRA DOXYTRO.....	170
2763. X – TRA E – SELEN SUPERMIN.....	329
2764. X – TRA FASTBRO.....	329
2765. X – TRA MOXICOL.....	170
2766. X – TRA TRISULF.....	171
2767. X – TRA VITALIT.....	329
2768. XAMACOL – 40.....	553
2769. XTRA VITAN.....	329
2770. XYLA.....	13

Y

Hal

2771. YEA – SACC TS.....	553
2772. YEA – SACC1026.....	553
2773. YIDUOZYME 9180.....	554
2774. YIDUOZYME 9681.....	554

2775. YIDUOZYME P – 8601	554
2776. YODOR – VEX	53
2777. YUCOMY – 20 – POWDER	176
2778. YUMAMYCIN 1%.....	554

Z

Hal

2779. ZADOXYL.....	171
2780. ZAGRIBIND.....	554
2781. ZAGRO AD3EK	329
2782. ZAGROMIN 369.....	554
2783. ZAGROMIX 368	554
2784. ZAGROSOL AD3E.....	330
2785. ZAGROSOL B-COMPLEX.....	554
2786. ZAGROSOL ES	554
2787. ZAGROVIT	330
2788. ZAGROVIT E – 50	554

2789. ZAGROVIT ES.....	330
2790. ZALDES.....	53

2791. ZAMBAC ZN 150	554
2792. ZETOX	554
2793. ZIBAGRAN G150	556
2794. ZINC BACITRACIN PREMIX 15%.....	556
2795. ZIPYRAN PLUS.....	197
2796. ZODALBEN 12,5%.....	197
2797. ZOLETIL – 50.....	15
2798. ZOOBETAMIN.....	330
2799. ZOBIOTIC	171
2800. ZOOSOL AMINOSAL	330

2801. ZOOSOL CALORVIT	331
2802. ZOOSOL LISOVIT.....	331
2803. ZOOSOL PAN 50.....	331
2804. ZYMPEX 006	556
2805. ZYMPEX 008	556



IOHI

Indeks Obat Hewan Indonesia

EDISI IX 2014



DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

2014