



Agdex : 400

Beternak ayam KUB pedaging memiliki prospek yang bagus.



Pakan diberikan 2 kali pada pagi dan sore hari atau 3 kali sehari (pagi, siang dan sore). Semakin sering frekuensi pemberian pakan per hari, akan semakin baik dan mengurangi pakan yang terbuang.

Jumlah pakan ayam KUB diberikan sesuai kebutuhannya, yang berbeda pada tingkatan umur ayam. Kebutuhan pakan dengan konsentrat (pakan khusus ayam pedaging) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan pakan ayam KUB

Umur (minggu)	Kebutuhan pakan (gr/ekor/hari)
0 - 1	5 - 10
1 - 2	10 - 15
2 - 3	15 - 20
3 - 4	20 - 25
4 - 5	25 - 30
5 - 6	30 - 40
6 - 7	40 - 50
7 - 10	50 - 70

Dengan memberikan pakan sesuai umur dan bobot ayam, maka pakan dapat terkontrol sehingga tidak terlalu berlebihan atau terbuang sehingga boros pakan.



Gambar 5. Ayam KUB umur 3 minggu

Air minum bagi ayam pedaging harus selalu tercukupi. Air minum yang diberikan harus air bersih yang selalu diganti secara rutin setiap hari. Tempat air minum harus selalu di cuci setiap pagi hari.

Pada saat pertama kali DOC masuk, air minum diberi gula (larutan gula) sebagai energi menekan stress setelah transportasi.

C. PROGRAM KESEHATAN

Perawatan yang perlu mendapat perhatian adalah memberikan vitamin anti stress dan vaksinasi, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal pemberian vaksin ayam KUB pedaging

No	Jenis Vaksin	Umur	Teknik
1	ND-clone	4	Tetes mata
2	ND Kill	10	Suntik/SC
3	IBD	18	cekok
4	ND - IB	35	Air Minum
5	ND- Lasota	72	suntik



Gambar 6. Vaksin tetes mata



Gambar 7. Vaksin suntik

Penyusun :
Drh. Wiendarti Indri W, MSi

Ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian (Ayam KUB) tipe pedaging memiliki keunggulan berupa bobot hidup ayam meningkat secara nyata dari minggu per minggu. Dan konsumsi kumulatif ransum per ekor sangat efisiensi, yang ditandai dengan penggunaan ransum (FCR) kecil.

Ayam KUB pedaging menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung pada umumnya. Dibandingkan dengan ayam kampung Super (persilangan betina ras dan pejantan kampung), ayam KUB menunjukkan pertumbuhan bobot badan lebih cepat; lebih tahan penyakit sehingga tingkat kematian lebih rendah. Kecuali itu, kemurnian ayam kampung lebih terjamin.

Bagaimana memelihara ayam KUB pedaging agar memberi hasil yang baik ?

A. PERSIAPAN

- Kandang dan perlengkapannya. Diperlukan dua jenis kandang yaitu untuk perawatan bibit (booder) dan pembesaran (postal). Untuk efisiensi, dapat membuat brooder di dalam kandang postal yang di sekat dengan menggunakan triplek/papan.



Gambar 1.
Brooder dan persiapan lantai sekam

Brooder dibuat dari papan dengan ukuran seluas ukuran triplek yang biasa dijual di pasaran yaitu panjang 225 cm dan lebar 120 cm. Sedangkan tinggi brooder adalah 40 cm dengan penutup (atap) dari satu lembar triplek.

Sebelum DOC masuk, kandang dibersihkan (sarang laba-laba dll.) dan disemprot dengan disinfektan. Lantai dalam brooder diberi sekam kering dan koran bekas sebagai alas DOC.

Dalam 1 kotak brooder perlu diberi tempat pakan (feeder tray) dan tempat minum masing-masing sebanyak 3 buah.

b. Pemilihan bibit

Untuk menghasilkan ayam yang berkualitas dilakukan seleksi DOC KUB pedaging unggul yang memenuhi standar, yaitu DOC dengan bobot antara 25 – 30 gr/ekor.



Gambar 2. Seleksi DOC dengan diimbang

B. PEMELIHARAAN

Pemeliharaan ayam kampung pedaging meliputi perawatan awal sejak DOC hingga 2 minggu di dalam kandang brooder dan dilanjutkan dengan pembersihan di dalam kandang postal selama 2 sampai 2,5 bulan.

a. Kepadatan kandang

Setiap kotak brooder dapat digunakan untuk memelihara 250 ekor DOC. Ayam dipelihara dalam kotak brooder selama 2 minggu dengan menggunakan lampu 60 watt untuk pemanas.

Pada malam hari atap brooder di tutup rapat agar suhu dalam brooder dapat mencapai 35-38°C. Dan pada pagi harinya atap dibuka, yaitu pada saat memberi pakan dan mengganti air minum. Kemudian sepanjang pagi sampai sore atap ditutup setengahnya, dan malam hari ditutup rapat. Demikian seterusnya hingga ayam berumur 2 minggu.

Setelah ayam berumur 2 minggu, siapkan kandang pambesaran (kandang postal). Sebelum ayam di lepas ke dalam kandang postal, lantai kandang diberi sekam kering secara merata dengan



Gambar 3. DOC dalam brooder buatan



Gambar 4. Contoh kandang pembersihan

Kepadatan ayam di dalam kandang postal pada umur 3 minggu adalah 25 ekor/m² dan mulai umur 4 minggu hingga panen (sekitar 10 minggu) kepadatannya adalah 10 ekor/m².

Perawatan kandang yang utama dalam pemeliharaan adalah kontrol terhadap kondisi sekam. Penggantian sekam cukup sebagian saja yaitu pada sekam yang basah atau menggumpal (biasanya dibawah tempat minum). Ambil-sekam yang basah atau menggumpal dan ganti dengan sekam baru. Jagalah agar kondisi lingkungan kandang tetap bersih dari kotoran. Lakukan penyemprotan kandang dengan disinfektan secara berkala atau 1 kali/minggu.

b. Pakan dan Minum

Pakan ayam kampung pedaging dapat menggunakan pakan pabrik khusus untuk ayam pedaging. Dapat pula dengan meramu sendiri pakan khusus untuk ayam pedaging, yaitu dedak dan konsentrat dengan perbandingan 1:1. Atau membuat campuran antara konsentrat 35 %, jagung 50 % dan dedak 15 %.

